

# Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ,

## ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ

## ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

« Δοκίμ' ἢ μοι δέη γραφῆς εἶναι ταῦτα μάλιστα, ὅτι οὐ  
» ἀκαταμάχτα ἐστὶ ταῖσι γράφοις, εἰς αἷμα ἴδιον αἰ-  
» δέουσι. » ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ διαίτης ἑσίων.

ΤΟΜΟΣ Β΄.

1864.

ΤΕΥΧΟΣ Δ΄.

### ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΩΙ ΤΕΥΧΕΙ ΤΟΥΤΩΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Α'. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ [1]. Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων ζωϊκῶν Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς Θεραπείας αὐτῶν [Ε. ἢ σ.] — [2]. Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σφιλιδικῶν πιθήσεων καὶ τῆς Θεραπείας αὐτῶν [Β. ἢ σ.] — [17]. Περὶ ἀκρατείας οὔρου καὶ τῆς Θεραπείας αὐτῆς [Σ. καὶ τ.].  
Β'. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ [18]. Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλ-

μικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσηφρείου κυάμου (Psef'u), καὶ τῆς Θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. [Σ. καὶ τ.] — [8]. Περὶ καλλιμίνης (Algorinae) ὑπο φαρμακολογικῆν, φυσιολογικῆν, ὀφθαλματρικῆν καὶ Θεραπευτικῆν ἐπισήμην [Σ. καὶ τ.] — [23]. Περὶ τῶν ἀλάτων τοῦ λιθοῦ ὡς Θεραπευτικῶν τῆς ἀρθρίτιδος καὶ τῶν ρευματισμῶν. — [24]. Περὶ τοῦ οἴου ὡς Θεραπευτικοῦ τοῦ χρόνιου ρευματισμοῦ τῶν

τενόντων. — [25]. Περὶ τοῦ περιθινθίου ἐλαίου ὡς ἀνεπιπόνητον βοήθημα κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς πρώτης ὀδοντοφυίας προξενουμένων ἀλγημάτων τῶν οὐλῶν. — [27]. Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς φιλλόδρουτος ἄνθορακος ὡς ἀντιδυσεντερικοῦ μέσου. Γ'. ΠΙΘΙΚΙΑ [9]. Περὶ τῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως γυίων [Β. ἢ σ.].

### ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ.

[1.] Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων ζωϊκῶν Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς Θεραπείας αὐτῶν.

[Συνέχεια.]

Λυσιτελές θεωροῦμεν νὰ εἴπωμέν τινα καὶ περὶ τῶν πρὸς διάδοσιν τῶν στρογγύλων ἐλμίνθων εὐνοϊκῶν συνθηκῶν. Ἀναλογιζόμενοι, ὅτι ἕκαστον τῶν ἐντοσθιδίων τούτων Παρασίτων γενεσιουργεῖται ἐξ ἐνὸς ὁπίου, ὅτι τὰ ὄνια τῶν ἐν τῷ ἐντερικῷ σωλήνι τοῦ ἀνθρώπου παρασιτουσῶν στρογγύλων ἐλμίνθων, ἀποτιθέμενα μετὰ τῶν ἀφοδευμάτων κατὰ μυριάδας ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, χρήσουσιν ἀπολύτως πρὸς ἀνάπτυξιν αὐτῶν τῶν ἐν τῷ ἐντερικῷ καὶ αὐτῶν σωλήνι τοῦ ἀνθρώπου βιοτησίων συνθηκῶν, ἔτι δὲ, ὅτι τὰ ὄνια τῶν στρογγύλων ἐλμίνθων δύνανται, οὐ μόνον ἐν τῷ ὕδατι τῶν ἐλῶν, τῶν βυαλίων, τῶν φρεάτων κ.τ.τ.

(ΙΠΠΟΚΡ. ΤΟΜ. Β΄. ΤΕΥΧ. Δ΄.)

νὰ διασώσῃ τὴν ζωτικότητα αὐτῶν ἐπὶ ἐξ ἢ ἐπτά μῆνας (ἐνίοτε δὲ καὶ ἐτι πλέον), ἀλλὰ καὶ νὰ προβῶσιν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν αὐτῶν τοσοῦτον, ὥστε ἅμα καταστήσωσιν εἰς τὸν ἐντερικὸν τοῦ ἀνθρώπου σωλήνα νὰ ἐκκολάπτωνται καὶ οὕτως ἐξέρχωνται τὰ ἐν αὐτοῖς ἔμβρυα, — ἀναλογιζόμενοι, λέγομεν, πάντα ταῦτα, κλίνομεν νὰ παραδεχθῶμεν, ὅτι ὁ κυριώτερος ἀγωγὸς, δι' οὗ τὰ ὄνια τῶν στρογγύλων ἐλμίνθων μετέγονται εἰς τὸν ἀνθρώπινον ὀργανισμὸν, εἶναι τὸ πινοόμενον ὕδωρ. Ἐπειδὴ δὲ, ὅταν τὸ ὕδωρ διυλισθῇ, ἐπέχονται ὑπὸ τοῦ ἠθμοῦ τὰ ἐν αὐτῷ ὄνια τῶν στρογγύλων ἐλμίνθων, διὰ τοῦτο, ὅπου μὲν γίνεται γρήσις πρὸς πόσιν διυλισμένου ὕδατος, ἐκεῖ εἶναι σπανία ἢ ἐν τῶν περὶ τῶν ὁ λόγος ἐντοσθιδίων Παρασίτων ἐλμίνθιασις, ὅπου δὲ τὸ πινοόμενον ὕδωρ εἶναι φρεάτιον, ἢ τελματιαῖον, καὶ πρὶν ἢ συναχθῆ εἰς τὸν τόπον, ἀφ' οὗ γίνεται ἡ ὑδρευσις αὐτοῦ, διακλύζει χωρία, ἐν οἷς ὑπάρχουσιν ἀκατεθειμένα ἀφοδευματικὰ ὕλα, δὲν διηθεῖται δὲ προηγουμένως, ἐκεῖ

παρατηρείται λίαν συχνά ή εκ τών περιών ό λόγος έντοσιθιδίων Παρασίτων έλμινθιασις.

Περί τών τοπικών και τών κατά συμπίθειαν συμπτωμάτων τής εκ τών στρογγύλων έλμινθων προερχομένης έλμινθιάσεως προσθέτομεν τά ακόλουθα. Όταν μόν αι έλμινθες αύται ώσιν όλιγαι, τότε ουδεμίαν, ως επί τό πολύ, έργάζονται τοπικήν ή καθολικήν διατάραξιν. Όταν δέ ώσι πολυπληθείς, τότε παραβλάπτουσι, ως επί τό πλείστον, τήν τε λειτουργικήν ενεργειαν τών πεπτικών οργάνων και τήν διάθρεψιν, επιφέρουσι δέ και ποικίλα κατά νευρικήν άντανάκλασιν νοσολογικά φαινόμενα. Τά εκ τής παρουσίας τών στρογγύλων έλμινθων έν τώ έντερικώ σωλήνι προερχόμενα συμπτώματα άνεφέρομεν ήδη έν ταις γενικαίς παρατηρήσει. Έκ τών συμπτωμάτων τούτων ουδέν έχει παθογνωμονικήν σημασίαν. Είσι δέ τά μάλλον συνήθη τά εξής: κωλικοί στρόφοι κατά τήν όμφαλικήν, πρό πάντων, χώραν, άλγη (ως επί τό πολύ μόν, νυγματώδη, ένιοτε δέ, και δρυπτικά) κατά τήν γαστέρα, μετωρισμός ταύτης, διαταράξεις τής πέψεως, πτυαλισμός, ναυτιάσεις ή έμετος, ένιοτε ρύσις κοιλίας, διαχωρούσης ιξώδεις και διαιμούς ύλας, κνησημονή κατά τούς μυκτήρας, ούρα προσομοια τώ όρρώ του γάλακτος και απολείποντα ύπόλευκον ίζημα. Προς τούτοις παρατηρούνται ένιοτε εξοιδήσεις του προσώπου, κωμίζουσα χροιά τών βλέφαρων, άνισος διαστολή τών κορών τών οφθαλμών, δριμεία όσμή του έκπνευσμένου άέρος, άπισχνανσις και τών σφιγμών άταξία. Οι στρογγύλας έλμινθας έχοντες άνθρωποι είσι προσέτι δυσήνευροι, ριπτάζονται καθ' ύπνον και θρόνους τούς οδόντας. Και έκαστον μόν τών εισημένων συμπτωμάτων, λαμβανόμενον καθ' έαυτό, δέν δύναται να θεωρηθή ως ασφαλές διαγνωστικόν σημείον, όταν δέ συνυπάρχουσι πολλά εξ αυτών, τότε δύναμεθα να μετά πιθανότητος κατα τό μάλλον και τό ήττον μεγάλης παραδεχθώμεν, ότι τό εργαζόμενον αυτά αίτιον είναι προγγύλας έλμινθες έν τώ έντερικώ σωλήνι. Έτι μείζων καθίσταται ή πιθανότης, ότι πρόκειται περί έλμινθιάσεως εκ τών περιών ό λόγος έντοσιθιδίων Παρασίτων, όταν οι κωλικοί στρόφοι και τά κατά τήν γαστέρα άλγη υπάρχωσι από τινος ήδη καιρού, ούχωνται και επανήνωσι, μηδεμίαν υπαρχούσης γνωστής αίτίας, δέν συνοδεύονται ύπό διαρροίας, τά διαχωρήματα ώσιν ιξώδη και δίαιμα, άμα δέ συνυπάρχουσι και τινά συμπτώματα, μηδεμίαν δύναμενα να έχωσι αιτιώδη σχέσις προς άλλην τινά πάθησις του έντερικού σωλήνος, οίον κνησημονή κατά τούς μυκτήρας, άνισος διαστολή

των κορών κ.τ.λ. Κατά τον Κ. Rosen εν των ασφαλεστέρων διαγνωστικων σημειων της παρουσίας στρογγύλων έλμινθων έν τώ έντερικώ σωλήνι είναι τό ότι ό έλμινθιδών αισθάνεται ευφορίας τινός μετά τήν πόσιν ψυχρού ύδατος. Ο δέ Κ. Romans προσθεύει (\*), ότι επί τής έν τώ έντερικώ σωλήνι παρουσίας τών στρογγύλων έλμινθων ασφαλές σημειωτικόν φαινόμενον είναι έρυθρά τινά στιγμάτια, επανεστηκότα επί τών άκρων τής γλώσσης. Άλλ' ή δοξασία αύτη ύπ' ουδενός άλλου ιατρού επεβεβαιώθη. Το μόνον ασφαλές σημειωτικόν δεδομένον προς διάγνωσιν τής εκ τών περιών ή λόγος έντοσιθιδίων ζωικών Παρασίτων έλμινθιάσεως είναι, ως ήδη έφημεν, ή παρουσία τών ωαρίων αυτών έν τοις διαχωρήμασι.

Τά προς θεραπείαν τής εκ τών στρογγύλων έλμινθων προερχομένης έλμινθιάσεως άχρι τουδε εφαρμολογούμενα μέσα είσι πολλά και παντοία. Επειδή δέ τά έντοσιθίδια ταύτα Παρασίτα διαιτώνται έν μοίρα του έντερικού σωλήνος, είς ήν δέν είναι δυνατόν να φθάσωσι τά δια κλυμάτων, προσαγοόμενα ρευστά, διά τουτο προς τήν θεραπείαν τής περιής ό λόγος έλμινθιάσεως απαιτείται μάλλον διά του στόματος προσαγωγή τών προσφόρων άνθελμινθικών φαρμάκων. Τοιαύτα δέ είσι ή άβροτονίνη, τό άρτεμησειον σπέρμα (Sem. Cinna), τό σπέρμα του άσπλήνου (Sem. Tanacet), ή βίτζα τής άγρίας νάρδου, τά έμπυρευματικά έλαια και τό καθήρτειον έλαιον (τόν τρόπον τής σκευάσεως του όποιου ανεγράφαμεν ήδη έν τοις περι θεραπειάς τής εκ ταινίας έλμινθιάσεως [Τεύχ. Γ' σελ. 59]). Όφέλιμος προσέτι θεωρείται ή καθ' έκάστην έδωδή προσφάτων δαυκίων ή ή χρήσις του χυλίσματος αυτών (Roob Dauci). Εκτός τούτων συνιστώνται ως ανυσιμώτατα Άνθελμιντικά προς τήν περιής ή λόγος έλμινθιασιν ή πρωτοχλωριούχος υδράργυρος, τό ένστίμμιον χρυσίζον οείον, ή άρμυριακή κόμμις, τό ρήον, τό έλμινθόχορτον, ή άλση, ή βίτζα του πολυγάλου, ό φλοιός τής κασκαρβίλλης, του κολάμβου (μετά διττανθρακικού νάτρου), ό σάπων, τά χλωρά κελύφη των λεπτοκαρών, ό θειικός σίδηρος και ή καφουρά. Άνυσιμώτατον μέσον προς τον περιού ή λόγος θεραπειτικόν σκοπόν λέγεται και ή επί τής κάτω κοιλίας επάλειψις χρισμάτων (Linimenta) διά καφουράς, ή δι' έλαιών ή έμπυρευματικών ελαίων (οίον διά τερεβινθίνου έλαιου, δι' άψινθελαίου, πηγαυελαίου, πετρελαίου κ. ά.), διά σιελίου

(\*) Ann. de la Soc. méd. prat. de Montpellier. Tome XXII.

του μηδικου δι' άλσης, έτι δέ τής εοελου χολης μετ' αιθερίων ή έμπυρευματικών ελαίων. Τινές συνιστώσι ως άνθελμιντικήν δύναμιν έχοντα και τά δι' άρωματικών βοτανών πεπληρωμένα σάκκια, προσιστώμενα επί τής κάτω κοιλίας. Έν τή ιδία ήμών Ιατρική πράξει εφαρμολογούμεν συνήθως προς εκβολήν τών στρογγύλων έλμινθων (καθώς και τών άσκαριδών) τό κατά τήν εξής αναγραφην έσκευασμένον φάρμακον

Λαβέ Άβροτονίνης Κόκκουσ δύο (μέχρι τεσσάρων) και διαλύσας έν

Κικίνου έλαιου Ούγγια  
δός. Έπίγραφον δέ « Καθ' έκάστην δευτέραν [ επί δι τών παιδων « τετάρτην » ] ώραν ανά έν μικρόν κοχλιάριον μέχρις υπαγωγής κοιλίας ο.  
(R. Santonini gr ij (—jv),  
Solve in  
Ol. Ricini ʒj.

D.)  
δυνάμεθα δέ να διαβεβαιώσωμεν, ότι διά του φαρμάκου τούτου εφοκόμεθα πάντοτε έν τώ διαστήματι ολίγων ώρων του σκοπούμενου θεραπειτικού αποτελέσματος. Ένιοτε εδώσαμεν κατά τών στρογγύλων έλμινθων και τό ως εξής έσκευασμένον άνθελμινθικόν εκλειγμα

Λαβέ Άρτεμησιου σπέρματος Δραχμās δύο,  
Ρίλης νάρδου τής άγρίας Δραχμην,  
— Ίαλάπης Δραχμην ήμισίαν,  
λειοτριβήσας δέ άπαντα, πρόσθετα  
Όξυμέλιτος σκικιλικου τό άρκοον  
και σκευάσας εκλειγμα, δός, επιγράφας « Κατά πάσαν τρίτην ώραν ανά έν μικρόν κοχλιάριον ».  
(R. Semin. Cinae pulver. ʒij,  
Radic. Valerian. pulver. ʒj,  
— Jalap. pulver. ʒβ.  
Oxymel. scillit. q. s. ut f. Electuar.)

Τό φάρμακον τούτο ενεργεί επίσης ασφαλώς και ταχέως ως και τό πρώτον, άλλ' απολείπεται εκείνου κατά τό ότι προξενεί κωλικούς στρόφους. Προς τήν Ιατρείαν των δυσπειθών και πέν φάρμακον δυσχερώς προσιεμένων παιδιών δίδομεν τούς ως εξής έσκευασμένους τροχίσκους

Λαβέ Άρτεμησιου σπέρματος λειοτριβοūs Δραχμās δύο,  
Σουκκολάτας λειοτριβοūs Ούγγιαν ήμισίαν,  
Κινναμώμου Δραχμην,  
και  
Γλισχράσματος κόμμιως τραγακάριθης τό άρκοον. Σκευάσας δ' εκ τούτων τροχίσκους τριάκοντα, δός.

(R. Semin. Cinae pulver. ʒij  
Succolat. pulver. ʒβ,  
Cass. Cinnam ʒj,  
Mucilag. Gummi Tragacanth. q. s. ul f. Trochisci N°. xxx.)

Τών τροχίσκων τούτων λαμβάνει ό έλμινθιδών παις ανά τέσσαρας ή πέντε κατά πάσαν τρίτην ώραν. Επιστεύθη δέ και δι' αυτών τό θεραπειτικόν σκοπούμενον έν πάσαις ταις περιπτώσεσι, καθ' ός εποικασάμεθα χρήσις αυτών.

3. Περί τής εκ τών πτερυγιωτών άσκαριδών έλμινθιάσεως.

Τάς εις τό είδος τούτο ύπαγοόμενας άσκαρίδας εδρεν άπαξ μόνον έν τώ έντερικώ του ανθρώπου σωλήνι ό Bellingham έν Ιρλανδία. Φαίνεται δέ, ότι πρότερον έτι είχε παρατηρήσει τά έντοσιθίδια ταύτα Παράσιτα έν τώ έντερικώ σωλήνι του ανθρώπου ό Άγγλος Ιατρός Thompson. Επειδή δέ ουδέποτε άλλοτε παρετηρήθησαν παρασιτούσαι έν τώ ανθρώπω αι έλμινθες αύται, διά τουτο δέν εγγυρεί ενταύθα μακρότερος περι αυτών λόγος.

4. Περί τής εκ τής ανθρωποδιαιτου Τριχοκέφαλου προερχομένης έλμινθιάσεως.

Αι έλμινθες αύται έχουσι μήκος 34—50 χ. τ. μ. και είσι τριχοειδώς λελεπτυσμένοι κατά τά δύο τρίτα του μήκου αυτών. Είσι δέ κατ' άξονα στρογγύλαι (striates), πλην επιμήκουσ τινός ταινίας, έσχηματισμένης εκ μικρών θηλιών. Τά έν τώ έντερικώ σωλήνι αποτικτώμενα ωάρια τής έλμινθος ταύτης, αφοδεούμενα, δύναται να διατηρήσωσι επί πολλούς ένιοτε μήνας τήν ζωτικότητα αυτών και άναπτύχθωσι τοσοούτον, ώστε άμα, διά των έσθιομένων σιτιών ή του πινομένου ύδατος, εισέλθωσι εκ νέου εις τον έντερικόν σωλήνα, εκνεοτεύονται τά έν αυτοίς έμβρυα. Περί τής αναπτύξεως δέ των έλμινθων τούτων και περι των προς διάδοσιν αυτών βοηθητικών συνθηκών ισχύουσι τά περι τής αναπτύξεως και διαδόσεως των στρογγύλων έλμινθων ειρημένα.

Τό έντοσιθίδιον τούτο Παράσιτον εγένετο γνωστόν πρό ενός μόλις αιώνος, παρατηρηθέν (τό 1760—1761) επί τινος επιδημίας βλενογενούς πυρετου, ής τήν ιστορίαν κατέλιπον ήμιν ό Roederer και Wagler. Φαίνεται όμως, ότι και ό Morgagni ειχεν ήδη παρατηρήσει τας του είδους τούτου έλμινθας. Άλλ' ουδεις προσέτερον εις ήν ά μέγας ανατόμος έποίητο μνησίαν αυτών έν ταις « Περί άνατομίας επιστολαίς » αυτου (XIV. §. 41.). Τό περι τής ανακαλύψεως του νέου τούτου είδους των έλμινθων ιστορούνται ως εξής. Είς























## ΠΟΙΚΙΛΙΑ.

[9.] Περὶ τῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως γυίων.

[Συνέχεια.]

δ'. Σκηνογράφος τις, ἄγων ἤδη τὸ 23<sup>ον</sup> ἔτος, ἠκρωτηριάσθη κατὰ τὸν πόδα, ἐνῶ ἦν ἔτι παιδίον ἑπταετής, ὑπὸ τοῦ *Boyer*. Ἄλλ', οὐδὲν ἦσαν, ὁ μικρὸς ἀνάπηρος εἶχεν ἀποκτήσει τασαύτην ἕξιν περὶ τὸν μεταχειρισμὸν τοῦ ψευδοῦς αὐτοῦ γυίου, ὥστε καὶ συνέπαιξε μετὰ τῶν συναλκιωτῶν αὐτοῦ. Ἐπιδοθεὶς εἰς τὴν Σκηνογραφικὴν, εἶναι σήμερον ἠναγκασμένος νὰ ἴσταται δι' ὅλης σχεδὸν τῆς ἡμέρας ἐπὶ ἀναβάθρας. Διαβεβαιῶ δὲ, ὅτι δὲν κάμνει οὐδεμίαν διάκρισιν περὶ τὴν χρῆσιν τοῦ ἀληθοῦς καὶ τοῦ ψευδοῦς αὐτοῦ ποδός. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἐξέρχεται πρὸς περίπατον μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ ἐργαζομένων καὶ χορεύει πολλάκις κατὰ τὰς κυριακάς. Ἐκαστος τεχνητὸς αὐτοῦ ποὺς διαρκεῖ, κατὰ μέσον ὄρον, 3—4 ἔτη καὶ ἔχει βάρος 4, περίπου, χιλιοστημιόριον τοῦ Γράμματος.

ε'. Τορευτὴς τις, ἄγων ἤδη τὸ 30<sup>ον</sup> ἔτος, ἠκρωτηριάσθη ὑπὸ τοῦ *Blandin* κατὰ τὸ κατώτερον τῆς κνήμης τριτημιόριον ἐνῶ ἔτι ἦν ὀκταετής παιδίον. Ἐκτοτε φέρει τεχνητὸν ἀκροκνήμιον μετ' ἀκρου ποδός. Ὁ ἐπὶ τοῦ ψευδοῦς τούτου γυίου ἐπερυσμὸς τοῦ σώματος γίνεται διὰ τῆς πυέλου. Μόνον ἔταν, ἀπολυθεὶς ἐκ τοῦ νοσοκομείου, ἐπανῆλθε παρὰ τοὺς γονεῦσιν αὐτοῦ, ἐπειδὴ, ὡν λίαν φιλοπαίγμων, ἔθραυε συχνάκις τὸ ἐλατήριον, ὅπερ ἐκράτει ἀνατεταμένον τὸ ἄκρον τοῦ ποδός, ἀφῆρέθη ἀπ' αὐτοῦ ὁ τεχνητὸς ποὺς καὶ τῷ ἐδόθη, οἶονε! πρὸς τιμωρίαν, ἀπλοῦν καλόβαθρον. Μετὰ τινος δὲ μῆνας παρεχωρήθη αὐτῷ πάλιν ὁ τεχνητὸς ποὺς. Ὁ ἀνάπηρος οὗτος ἐργάζεται σήμερον εὐχερέστατα τὴν τέχνην αὐτοῦ, καὶ τοι ὡν ἐντεῦθεν ἠναγκασμένος ἵνα ὀρθοστατῇ δι' ὅλης σχεδὸν τῆς ἡμέρας. Καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ ἐνός τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἐπιστηρίζει τὸ βάρος ὅλου τοῦ σώματος, διὰ δὲ τοῦ ἑτέρου (τοῦ τεχνητοῦ) περιδινεῖ τὸν τῆρον. Προσέτι βαδίζει εὐχερέστατα, πορεύεται μακρὰς ὁδοὺς (4—5 μίλια) καὶ ἀνέρχεται εἰς ἀναβάθρας μετὰ πολλῆς ταχύτητος. Τὸ ὅλον βάρος τοῦ τεχνητοῦ ποδός εἶναι 2—3 χιλιαγράμμων. Πλέον δὲ ποτε ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἐν τινὶ λίμνῃ ἐπὶ ἀλιάδος τινός καὶ καταπεσὼν εἰς τὸ ὕδωρ, οὐδαμῶς ἐμποδίζετο κατὰ τὴν νῆξιν ὑπὸ τοῦ τεχνητοῦ σκέλους.

ς'. Ὁ χειρουργὸς *Blandin* ἐπέδειξε τῇ ἐν Παριείοις *Ακαδημίᾳ* τῆς ἰατρικῆς, ὡς σπάνιον παρά-

δειγμα εὐχερείας περὶ τὸν μεταχειρισμὸν τῶν τεχνητῶν ποδῶν, δεκαετὲς κοράσιον, ὅπερ οὗτος εἶχεν ἀκρωτηριάσει κατὰ τὴν κνήμην καὶ τὸ ὅποσον διὰ τεχνητοῦ ποδός ἠδύνατο νὰ ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει κλίμακας, χορεύει καὶ ἀλλήται ὑπεράνω σχοινίου ἐν περιδινήσει.

Αἱ ἀκόλουθοι δύο περιπτώσεις ἀναφέρονται εἰς ἐργάτιδας, αἵτινες μετὰ τὴν περιθεσιν τεχνητοῦ ποδός ἠδυνήθησαν νὰ ἐπαναλάβωσι τὴν προτέραν αὐτῶν ἐργασίαν. Λέγει δὲ ὁ *K. Dehoui*, ὅτι πρὸ πάντων εἰς τοὺς τῆς ἦσαν εὐπορούσης τάξεως ἀνθρώπους εἰσὶν μάλλον δυσάνεκτοι οἱ δυστυχήσαντες νὰ ἔχωσι δυσφορίαν τινὰ ἐξ ἀκρωτηριασμοῦ, χλευαζόμενοι ἀνιλεῶς ὑπ' αὐτῶν, ὅταν, ἀντὶ τεχνητοῦ ποδός, φέρωσιν ἀπλοῦν καλόβαθρον. Διὰ τοῦτο ἕκαστος ἀνάπηρος, ὅσον ἐνδεὴς καὶ ἀν εἶναι, καθορθώνει ἐκ παντὸς τρόπου νὰ περιποιήσῃ εἰς ἑαυτὸν τεχνητὸν πόδα. Πρὸς ἀπόδειξιν δὲ τούτου ἀναφέρει ὁ *K. Dehoui*, ὅτι εἰς οὐδὲν τῶν ἐν Παρισίοις ἐργοστασίων εἶδεν ἐργάτην, ἀποβεβληκῆτα τὸν ἕτερον τῶν ποδῶν καὶ μὴ φέροντα πτωχικὸν τινα ἐξ ἐπιτεχνήσεως, ἐπικαλύπτοντα ὅπως οὖν τὴν δυσφορίαν ταύτην.

ζ'. Θεράπεινά τις, ἀκρωτηριασθεῖσα ὑπὸ τοῦ *K. Lonsain* κατὰ τὸν ἕτερον πόδα ἀμέσως ὑπὲρ τοὺς ἀστραγάλους, ἀπελύθη ἐκ τοῦ νοσοκομείου, φέρουσα ἀπλοῦν καλόβαθρον. Ἄλλ' ἐπειδὴ οὕτως ἔχουσαν οὐδεὶς ἐδέχετο ὡς θεράπειναν, ἠναγκάσθη νὰ προμηθευθῇ τεχνητὸν πόδα, ὅτε καὶ ἠδυνήθη νὰ τοποθετήσῃ αὐτὴν παρ' αὐτῷ τῷ κηλοδεμνοποιῶ *Martin*. Ἐφερς δὲ τὸν αὐτὸν τεχνητὸν πόδα ἐπὶ 18 ἡμέρας ἔτη.

η'. Γυνὴ τις ἀρβυλοποιὸς, ἀκρωτηριασθεῖσα ὑπὸ τοῦ *Blandin* καὶ ἐφοδιασθεῖσα κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ νοσοκομείου ἐξοδὸν αὐτῆς διὰ ποδός τεχνητοῦ, ἐξηκολούθησε καὶ μετὰ ταῦτα ἐργαζομένη τὴν τέχνην αὐτῆς. Νυμφευθεῖσα δὲ δύναται νὰ διαφροντίζη, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη οἰκοδόμοισιν, τὰ κατὰ τὸν οἶκον αὐτῆς. Βαδίζουσα ὑποσκάζει οὕτως ἐλάχιστα, ὥστε μόλις διακρίνει τοῦτο ὁ γινώσκων, ὅτι ὁ ἕτερος τῶν ποδῶν αὐτῆς εἶναι ψευδής.

[Ἔπεται ἡ συνέχεια.]