

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ,

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ



ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

“ Δικαί δι μοι ἔστι γραφῆς εἶναι ταῦτα μέγιστα, ἕκαστα
.. ἀκαταμάχιστα ἔστι εἶναι ἰατρῶν, ἰππικῶν ἄντα εἶδῆναι... ”
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ διαίτης ἑξέσεων.

ΤΟΜΟΣ Α΄.

1862.

ΤΕΥΧΟΣ Β΄.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΩΙ ΤΕΥΧΕΙ ΤΟΥΤΩΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

<p>Α΄. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ· 43. Περὶ τοῦ λαρυγγοσκοπίου καὶ τῆς χρήσεως αὐτοῦ ἐν τε τῇ Φυσιολογίᾳ καὶ τῇ Παθολογίᾳ.— 44. Περὶ ἐκτοπισμοῦ τοῦ σπληνός. Β΄. ΔΗΜΟ- ΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ· 45. Περὶ τῆς βλάβης, τῆς προσερχομένης ἐκ τῶν δι’ ἀρσενικοῦ εἰργασμένων βιομηχανικῶν προ- ἰόντων. Γ΄. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡ- ΜΑΚΗΥΤΙΚΗ· 46. Περὶ τῆς χρήσεως τοῦ αἰθερίου σιναπιτικοῦ ὡς φοινι- κτικοῦ.— 47. Περὶ τῆς διὰ τοῦ ὤξυ-</p>	<p>δαμένου χαλκοῦ (Cupri oxydati) ἀ- λουφῆς.— 48. Περὶ τοῦ Κρεασόου (Kreasoti) ὡς ἀντιμετωίου.— 49. Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ ἰωδούχου σιδήρου μετ’ ἰωδούχου κιν- νης (Ferri cum Chinino iodato).— 20. Περὶ τῆς ἐξωτερικῆς χρήσεως τοῦ διττειωδούχου ἐρυθροῦ ὕδαρργύρου (Hy- drargyri b ijodati rubri) κατὰ τῆς βρογχικῆς.— 21. Περὶ τῆς θεραπευ- τῆς τῆς ὀφθαλμοῦ δυσεντερίας διὰ μεγάλων δόσεων ἰπερακουρῆς.— [14.] Περὶ τῆς</p>	<p>ἐνεργείας τῆς ἀβροτοίνης (Santon- inii) καὶ τῶν ακευσιῶν αὐτῆς. Δ΄. ΠΟΙΚΙΛΑ· 22. Περὶ τῆς ἐπιβροχῆς τοῦ χρώματος τῶν ὑελίνων ἀγγείων ἐπὶ τῶν ἐν αὐτοῖς φυλαττομένων φαρμά- κων.— 23. Περὶ τετραμάστου γυναι- κός.— 24. Περὶ τῆς ἐξωτερικῆς χρή- σεως τῆς ἀγρίας νάρδου (Valeriana silvestris) ὡς ληξυπέτου.— 25. Περὶ τῆς χρήσεως τοῦ ὀφθαλμοσκοπίου πρὸς διάγνωσιν τῶν νοσημάτων τοῦ νευρικοῦ συστήματος.</p>
---	--	---

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.

13. Περὶ τοῦ λαρυγγοσκοπίου καὶ τῆς χρήσεως αὐτοῦ ἐν τε τῇ Φυσιολογίᾳ καὶ τῇ Παθολογίᾳ.

(Κατὰ τὸν Κύριον J. N. CZERMAK).

Ἡ ἐπίνοια τῆς ἐπὶ τοῦ ζῶντος ἀνθρώπου, ὑπὸ τε φυσιολογικῆν καὶ παθολογικῆν ἔποψιν, ἐξετάσεως τοῦ λαρυγγος διὰ τῆς εἰς τὸν φάρυγγα εἰσαγωγῆς μικροῦ κατόπτρου, ἐστηρικμένου εἰς μακρὰν λα- βὴν, ἐπῆλθεν εἰς πρῶτον τὸν Ἄγγλον *Αιστωνα*, ἀναφέροντα ἐν τῇ *Πρακτικῇ* αὐτοῦ *Χειρουργικῇ* (*), ὅτι μετεχειρίσθη μετ’ ἐπιτυχίας ὡς διαγνωστικὸν μέ- σον τὸ ἀπλοῦν ταῦτο ὄργανον. Μετὰ τὸν *Αιστωνα*

ἐδημοσίευσεν ὁ Κ. Γαρκίας (*) σειρὰν ἀρκούντως ἀκριβῶν λαρυγγοσκοπικῶν παρατηρήσεων περὶ τῆς φωνήσεως. Ἀλλὰ τοῦ μὲν *Αιστωνα* οἱ λόγοι πε- ριήλθον εἰς παντελῆ λήθην, τοῦ δὲ *Γαρκία* τὰς ἐξόχους ἐπιτυχίας οἱ μὲν τῶν φυσιολόγων ὑπεδέξαν- το μετὰ τινῶν δισταγμῶν, οἱ δὲ ἐκλήρυξαν ἀντικρὺς ψεύδη.

Τῷ 1857 ἤρξατο τὰ πρῶτον ὁ Κ. Ζερμάκ τῶν λαρυγγοσκοπικῶν αὐτοῦ ἐρευνῶν ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ διευκρινίσῃ τὰ περὶ τὴν παραγωγὴν τῶν γνησίων λαρυγγοπροσφέρτων φλόγγων, ἐπαναλαμβάνων καὶ, εἰ δυνατόν, ἐπεκτείνων τὰς φυσιολογικὰς τοῦ *Γαρ- κία* παρατηρήσεις. Ἄμα ἀρξάμενος τοῦ ἔργου αὐ- τοῦ ὁ εἰρημένος φυσιολόγος, συνείδε τὴν πρακτι- κὴν ἀξίαν τῆς νέας ἐξεταστικῆς μεθόδου, διὸ καὶ πρὸς μᾶλλον τεθαρρημένος εἰς τὰς περαιτέρω αὐτοῦ ἐρεῦνας. Τὸ δὲ περιγενόμενον τῶν παρατηρήσεων, ὡς

(*) *Practical Surgery with 50 engravings on wood by Rob. Liston, Esq. London, 1840. σελ. 447. « Ulcerated glottis.—A view of the parts » may be sometimes obtained by means of a specu- lum—such a glass as is used by dentists on a long stalk, previously dipped in hot water, in- troduced with its reflecting surface downwards, » and carried well into the fauces. »*

(*) *Garcia. « Observations on human voice ». Philosoph. Magazine and Journal of science. Τόμ. I'. σελ. 218 καὶ Gazette hebdomadaire de méd. et de chir., 1855. Τεύχ. 40.*

γίξ, φλεγμονή του επιπεφυκότος, δίψα, άυπνία και ξηρασία του φάρυγγος. Εξ όλων δέ τούτων ήν, άκατανόητως, μεγάλη ή λειποδράνεια. Η νοσηρά αυτή άμφοτέρων των συζύγων κατάστασις εξηκολούθει έτι μετά τινας έβδομάδας, ότε ο άνήρ, μεταβάς διά τινα αύτου υπόθεσιν εις έτέραν πόλιν και διατρίψας εν αυτή επί όκτώ ήμέρας, επανήλθεν έντελώς υγιής, ένφ ή οικιοι μείνασα σύζυγος αύτου εξηκολούθει πάσχουσα. Αλλά μετά τινας ήμέρας κατελήφθη και αύθις ο σύζυγος υπό των προτέρων ένυχλήσεων και εξηκολούθει νοσών μέχρις ου περιηρέθησαν από της κατοικίας αύτων αι πρασινόχροες ταπίδες· τότε δέ άνέλαβον έντελώς άμφοτέροι οι πάσχοντες.

Ο ιατρός Κ. *Willestein* αναφέρει εν τφ «*Archiv für Pharmazentische*», ότι εν τή οικία αύτου, ήτις είναι φωτεινή, υφόφορος και όλως ξηρά, υπήρχεν εις θαλαμος, εις δι πάς ο εισερχόμενος ήσθάνετο δυσοσμίας τινός, έμφεροϋς προς την του σκορόδου. Η όσμη αύτη δέν ειγεν άείποτε την αύτην έντασιν, αλλά ήν μάλλον επαισθητή κατά τάς υγράς ήμέρας. Ήσαν δέ του θαλάμου εκείνου οι τοίχοι κεκαλυμμένοι από πολλού διά ποικιλοχρόων ταπίδων, ών τά κασμήματα παρίσταν και τινα πράσινα άνθύλλα. Οι έν τφ θαλάμω εκείνω διαιωόμενοι κατελαμβάνοντο μετά τινας ήμέρας υπό καρδιακής ισχυράς, ήτις όμως επαιεν άμα κατέλειπε τον νοσηρόν εκείνον θαλαμον ο έγκάτοικος αύτου. Αποξέσας δέ ο Κ. *Willestein* άλλην εκ της βαφής των επί των ταπίδων εκείνων πρασίνων άνθυλλίων και ρίψας αύτην επί διαπύρων άνθράκων, άντελήφθη ισχυράς όσμής, προσομοίας τή του σκορόδου.

Ο αύτος ιατρός αφηγεΐται προσέτι την ακόλουθον περίπτωση έν τή κατοικία οικιαγενείας τινός έν Μανάχω ήσαν δύο θαλαμοι, αποπέμποντες, άκατανόητως, λίαν δυσάρεστον όσμήν, παραπλυσίαν τή του σκορόδου. Πäs δέ ο επί τινος ώρας διατρίβων εν τοις θαλάμοις εκείνοις ήλίσκετο υπό σπυδαίων ένοχλημάτων. Τών δύο εκείνων θαλάμων ο μόν ήν κεκοινημένος έσωτερικώς δι' ώραλου πρασίνου κονιάματος, ου ή βαφή ήν αρσενικούχον. Πράσινον της Σουεδοφόρτης, ο δ' έτερος έφερε πρασίνους ταπίδας, κεχρωσμένας επίσης δι' αρσενικούχου βαφής.

Ο έν Μαγγεστέρη ιατρός Κ. *Ballendr* διηγείται, ότι τρία, καθ' άπαντα υγιή, παιδιά, αφού ένοικίσθησαν έν τινι θαλάμω, άρτίως περικοσμηθέντι διά πρασινοχρόων ταπίδων, έγέγοντο νοσώδη, άπιστοχούοντο όλονέν και κατελήφθησαν υπό άυπνίας και σπασμών των προσωπικών μυών. Άμα δέ άπεμακρύνθησαν τής νοσοποιού άτμοσφαιρας του θαλάμου

εκείνοι, άπηλλάγησαν παραχρήμα άπασών εκείνων των ένοχλήσεων.

Ο Κ. *Metcalf* έδημοσίευσε κατά τό παρελθόν έτηνος (*Lancet* II. 21.) μίαν περίπτωσιν *όξείας* δηλητηριάσεως, προελθούσης, καθ' ή φρονη, εξ άρσενικώδους χαλκού, δι' ου ήσαν κεχρωματισμένα αι ταπίδες του θαλάμου, έν φ διητάτο ο δηλητηριασθεις παίς. Ο παίς ούτος, έτών 3 1/2, έγένητο, άτφνης και άνευ προδρομικών συμπτωμάτων, άνορεκτος και κατελήφθη υπό ρίγους και σπασμών. Ακολούθως επήλθον συχναι, λίαν κακώδεις, ύδαρείς και άβούλητοι κενώσεις, είτα δ' επανειλημμένοι τετανικοί σπασμοι, έναλλάσσοντες μεθ' ήραιας. Μετά 38 ώρας από της άρχής της νοσήσεως επήλθεν ο θάνατος. Αναταμέντος του νεκρού του παιδός, εύρέθησαν επί της βλενομεμβράνης του στομάχου, πλησίον της καρδιάς, μικραι έρυθραι έξαγγίσεις (*exiguavascularities*). Εν τφ περιεχομένω του στομάχου και έν τφ ήπατι εύρέθη διά της χημικής δυχνεύσεως χαλκός και αρσενικόν, ουχί δέ και έν τφ έντερικφ σωλήνι (ου ή βλενομεμβράνη ήν ένειμένη), ουδ' έν ταίς κενώσεσιν, ουδ' έν τφ υπολειμματι της τροφής, ήν προσήνεχθη τελευταίον ο τεθνεώς. Απεδείχθη προσέτι, ότι αι πρασινόχροες ταπίδες του θαλάμου, έν φ διητάτο και έτελεύτησεν ο παίς, ήσαν κεχρωσμένα δι' αρσενικώδους χαλκού. Ήν δέ ή δηλητηρίασις αύτη βαφή ούτω κακώς προσκεκολλημένη επί των ταπίδων εκείνων, ώστε απέπιπτεν εκ της άεροδιγεστερας επιψύσεως.

Κατά την προκειμένην περίπτωση ούδεμία, υστερον της χημικής εξετάσεως, δύναται να ύπάρχη άμφιβολία, ότι ή δηλητηρίασις προήλθεν εκ τινος ένώσεως του χαλκού και του αρσενικού. Αλλά ουδαμώς φαίνεται αποδεδειγμένον, ότι τό δηλητηριον προήρχετο εκ της βαφής των ταπίδων, καθ' όσον ένδέχεται να ήτον της δηλητηριάσεως τό αίτιον πυξίς τις χρωμάτων, ή πρασινόχροα σακχαρικά, ή τι των τοιούτων.

Αποδεικτικώτερα άκασών των περιπτώσεων τούτων είναι ή υπό του Κ. *Oppenheimer* έν τοις Πρακτικοίς της «*έν Έυδελβέργη* εταιρίας των γιατρών και φυσιογράφων» περιγεγραμμένη. Κατ' αύτην εύρέθη διά της χημικής δυχνεύσεως αρσενικόν, ου μόνον έν τφ κονιάματι των τοίχων, αλλά και έν αύτῃ του θαλάμου τῆ κόνει. Έχει δέ ή περίπτωση αύτη ως εξής: γυνή τις, άγουσα τό 44^{ον} έτος, έπαθε κατά τό θέρος του 1867 (όπερ ήν καυματώδες και ξηρόν) κατ' άμφοτέρους τους όφθαλμούς βλεφαραδεντίδα μετ' επιπεφυκίτιδος των τε άνω και των κάτω βλεφάρων και μετά μικρών έν αυτοίς εξέλικώσεων. Μολονότι δέ έγένητο χρήση

των κατά της όφθαλμίας ταύτης συνήθων βοηθημάτων, ούδεμία επήλθε βελτιώσις. Αλλά άμα ή πάσχουσα κατέλιπε τον πρασινοβαφή θαλαμον, έν φ κατόκει, ήλθη πληρέστατα. Κατά δέ τό θέρος του 1868, άμα ή γυνή εκείνη κατόκησε και αύθις έν τφ αύτφ θαλάμω, επανήκεν ή προτέρα όφθαλμία, μετ' αύτης δέ συνεπήλθε και χρόνιος του στομάχου κατάρρους. Τόν Νοέμβριον του αύτου έτους ή άρρώστος ήτιάτο άνορεξίαν, ναυτιάσεις και κεφαλαλγίαν· κατελήφθη δέ και υπό σφοδρού πυρετού, έσχεν επίχρυσμα παχύ επί της γλώσσης, κενώσεις διαήροικας, τον σπλήνα μείζονα, ή κατά φύσιν, και την γλωττίδα σπασμώδη. Μετά τρεις όμως εβδομάδας από της εκ νέου έν τφ νοσώδη θαλάμω ένοικήσεως αύτης, ήλαττώθη ο τε πυρετός και τά έντερικά συμπτώματα, άλλ' ουδέν ήττον παρέμεινεν ή τε άνορεξία και τό της γλώσσης επίχρυσμα, προσεπελούσης και βλεφαρίτιδος. Από της πέμπτης εβδομάδος ή πάσχουσα ήτιάτο εκάστην έσπέραν ρίγος και καύσον, άτινα όμως επαιυσαν τή χρήση της θειικής κινίνης. Έκτοτε προσεπήλθον, έν μετά τό άλλο, ή λεγομένη υστερική σφαίρα και έξιδρώσεων παρισθμίων, έν οις παρετηρούοντο πολλαί κηλίδες λευκόφαιαι, όσον πίσου τό μέγεθος. Τοιαύτα έξιδρώματα κατεΐχον και την όπισθίαν του φάρυγγος επιφάνειαν. Προς τούτοις αι καρδιακά σφύξεις και αι αναπνευστικά κινήσεις έγέγοντο λίαν άτακτοι, προσεπήλθε δέ και δύσπνοια. Άπαντα ταύτα τά συμπτώματα παρατηρούοντο, ως γνωστόν, επί των εργαζομένων τό αρσενικόν και προτρέχουσι του μαρασμού. Εν τή κόνει του θαλάμου της πασχούσης παρατηρήθησαν έμφανεστάτα πλείστα αρσενικού μόρια. Απομακρυνθείσης της πασχούσης από του δηλητηριώδους εκείνου θαλάμου, επήλθεν, έν διαστήματι 4—5 εβδομάδων, έντελεστάτη ίασις.

Έν τῃ «*Εβδομαδιαία εφημερίδα Βιάννης*» ο εύρίσκομεν, υπό του Κ. *Lorinser* αναγεγραμμένας πέντε περιπτώσεις, αναγομένας ένταύθα. Παρατηρήσας ο μνησθεις ιατρός, ότι άσθενεις τινες, κατακειμενοι έν πρασινοχρόοις θαλάμοις, ή άδιαλείπτως έν αυτοίς διακείμενοι, διετίλουν έν νοσηρά καταστάσει, εξηρένησεν επιτατικώτερον τό αντίκειμενον τούτο, μη άρκεσθεις εις μόνην την άνεύρεσιν του αρσενικού έν τφ κονιάματι των θαλάμων, άλλ' υποβαλόν και τά ούρα των πασχόντων εις χημικήν εξέταση, γενομένην υπό του καθηγητου Κ. *Kletzinsky*. Εκ της εξέτάσεως ταύτης προήλθεν ή λίαν περιεργος γνώσις, ότι έν τοις ούροις των πασχόντων ένυπήρχεν, ου μόνον αρσενικόν, αλλά και χαλκός. Αί υπό του Κ. *Lorinser* δημοσιευθείσαι πέντε αύται περιπτώσεις εισιν αι εξής. Κοράσιόν τι δεκαε-

πταετής, άσθενικόν, κατελήφθη υπό κεφαλαλγίας άνορεξίας, εκλύσεως των δυνάμεων, γενομενον έν ταύτφ ώχρόν και πλαδαρόν την όψιν και καθ' όλον τό σώμα λειπόσαρκον. Μολονότι δ' επανήκεν διά της παρατεταμένης των σιδηροήγων φαρμάκων χρήσεως τά διαλυπόντα έμμηνα, ήξησεν ουδέν ήττον ή άτονία της πασχούσης τοσοούτον, ώστε πολλακις αύτη ήδυνάτει να εξέλθη της κατοικίας της, ή χροιά αύτης ήν έτι ώχρά, αι παρεμια συμπτωματα, οι όφθαλμοι περιελημμένοι υπό παλιδνωμάτων, ή δέ όρεξις ειχε παντελώς εκλείψει. Προσέτι ένέστη δυσκαλιότης και ναυτιάσεις, ή πάσχουσα έγένητο δύσπνοιος, κεφαλαλγής, έσχε διάττοντα άλγη κατά τους ώμους, βάρος κατά τά γόνατα και ήν λίαν έθυμος. Επειδή δέ της πασχούσης ή κλίμη έκειτο, κατά τό μήκος αύτης, παρά τον τοίχον του προδύω έτων κονιέντος κοιτόνος, υπόπτουσεν έντεθεν ο Κ. *Lorinser*, ότι άπαντα έκείνα τά ένόχληματα προήρχοντο εκ της του αρσενικού επιρρείας, διό υπέβαλε τό κονίαμα του θαλάμου εις χημικήν εξέταση, εκτελεσθείσαν υπό του καθηγητου Κ. *Kletzinsky*. Το αποτέλεσμα της χημικής ταύτης έρεύνης ήν, ότι ή βαφή εκείνη ήν αρσενικώδης χαλκός. Καταλιπούσα διά τούτο ή πάσχουσα τον νοσώδη εκείνον θαλαμον, άνέλαβεν έντελώς, έν διαστήματι δύο μηνών, τῃ χρήσει του τε υδροϊωδικοϋ καλίου και των γλιεράων λουτρών.

6.) Γυνή τις, άριούντως βίωμαλέα, άγουσα τό 54^{ον} έτος, κατελαμβάνετο επανειλημμένως επί τινα ήδη έτη υπό πυρετού και πλανητικων άλγημάτων έν τε τοις ώμίοις άρθροις και κατά τά νύατα. Τά ένόχληματα ταύτα, ένσκήφαντα επιμονιώτερον τον χειμώνα του 1866—67, ότε προσεπήλθεν ισχνανσις, άτονία και παντελής άνορεξία, παρέμεινεν επί πολυ, μέχρις ου ή πάσχουσα μετέβη εις την έξογήν, όπου και άνέλαβεν έντελώς. Αλλά επαναστρέψασα τον Νοέμβριον του 1868 εις την προτέραں αύτης κατοικίαν, κατελήφθη εκ νέου υπό σφοδρού πυρετού, μετ' ου πολυ δέ και υπό σφοδρών άλγηθόνων κατά τε την κεφαλήν και τους ώμους, ώστε ήναγκάσθη να διαμείνη κλινήςης. Μεθ' ήμέρας τινάς έγένητο ύφεσις του πυρετού, επιδρωσάσης άφθόνως της άρρώστους, είτα δέ παντελής αύτου έξαφάνισις. Αί κατά την κεφαλήν και τους ώμους άλγηθόνες ειχον ήδη λωφθεί, αλλά προσεπήλθε κατά μικρόν ιδιαίτέρόν τι, λίαν δυσάρεστον, αίσθημα κατά την κεφαλήν, ώστε άνεσκαλεύετο ο έγκέφαλος της πασχούσης. Επανερχόμενον δέ τό αίσθημα τούτο τακτικώς εκάστην δευτέραں νύκτα, διήρκει μέχρι της πρωϊας. Μετά του αίσθήματος τούτου ένίσταντο έλγοντα μόν άλγήματα κατά τους ώμους,

νομεν ένα μεταφέρωμεν ενταύθα και τας ακόλουθους περιπτώσεις, αΐτινες αΐρουν την γμελίειον δοξασίαν υπέρ πάσαν άμφισβήτουσιν.

Ο έν Λύγούστη ίατρος Κ. Müller, γραφας (*) έπίσης περί της έπιβλαθοῦς εις την υγείαν έπίρροψς των δι' άρσενικού κονιωματίων, αναφέρει προς τεκμύριωσιν των λεγομένων τας έξης τρεις περιπτώσεις α.) οί τρόφιμοι του έν Λύγούστη διδάκτρητου των κωφάλλων, δεκαεπτά τόν αριθμόν, ένῶ εισήλθον εις τῶ κατάστασημ εκείνο εύχροοῦντες και καθ' άπαντα υγεις, απέβαλον κατά μικρόν την εύχροίαν αύτων, γενόμενοι καχεκτικοί και λιπτόσαρκοι. Η άρεξις αύτων ήλαττοῦτο άσμέραι, η θερμοκρασία του δέρματος αύτων ήν ύπεσταλμένη, οί δέ σφιγμοί αύτων ήσαν σμικροί και άσθενεις. Επί τινων προσεπήλθον και ναυτιάσεις, είτα κωλικά άλγη και διάρροια, επ' άλλων δέ ξηρά και βασανιστική βήξ μετά δυσπνοίας. Εφαίνοντο δ' άπαντες χαῦνοι, νωθροί, άτνοιοί, άμύβλεις και ούδύλωσ εύδιάθετοι, οῦ μόνον προς τῶ μακρόνειν άλλ' οῦδὲ προς τῶ παιζειν. Τινῶν έξ αύτων άνοιδῆσαν τῶ τε πρόσωπον και οί πόδες. Εῶ' ένός

έξεταζόμενον χρώμα η άρσενικούχον, παρατηρούμεν μετά τινας στιγμάς, ότι ὁ χάρτης γίνεται ώχρὸς ως εκ του παραγομένου άρσενικώδους άργύρου. Έάν δέ ὁ χάρτης κρατηθῆ επί μακρότερον χρόνον υπέρ την άμμιωνίαν, μέλιστανται εις κυανοῦν χρώμα έν πρώτοις τὰ άκρα της ύγρας αύτου μοίρας, είτα δὲ και ὁλόκληρος αύτη, ως εκ της παραγωγῆς έναμμωνίου χαλκού (Cupri ammoniacalis, η C. ammoniati). Τῶ ώχρόν εκείνο χρώμα ένίσταται έν τῶ χάρτη και όταν η έξεταζόμενη πράσιнос βαφικῆ ύλη δὲν παρήχη δι' άρσενικού άλλ' δι' ὀξέος πικρικού και Ίνδικού τότε ὅμως ούδύλωσ μεταβάλλεται τῶ ώχρόν εις πράσινον, ως επί των άρσενικούχων χρωμάτων.

Η δευτέρα των υπό του Κ. Parrenheim προς έξίχουσιν του άρσενικού έφευρημένων μεθόδων σκοπεί την άποχώρισιν του άρσενικού έν μεταλλικῆ κατάστασει. Έχει δὲ η μέθοδος αύτη ως έξης* έπισταλάξαντες επί του έξειαστέου χρώματος βανίλα άσράτου υδροχλωρικού ὀξέος και περιμείναντες άχρις οῦ εκείνο διαβραχῆ προσηκόντως, προσάγομεν εις τῶ έπισταλαγμένον ὀξύ χαλκήν σκυταλίδα, διακινούντες ταύτην επ' ὀλίγον* εάν τῶ έξεταζόμενον χρώμα η άρσενικούχον, παρατηρούμεν μετά τινας λεπτά άποτιθέμενον τῶ άρσενικόν επί της χαλκής σκυταλίδος έν είδει χαλυδοχρόου και στίλβοντος άποθέματος.

(*) Wiener medicinische Wochenschrift, N^o. 48 κ. έ. 1860.

μάλιστα, του μάλλον προσβεβλημένου και δια του μετενεχθέντος εις τῶ θεραπευτήριον, κατ' άρχάς μὲν εφάνετο η πάθσις έχουσα τὸν χαρακτήρα θωρακικού νοσήματος, είτα δὲ παρουσίασε τὰ συμπτώματα του ὀξέος καθολικού ὕδρωπος, οῖον δύσπνοιαν, έτεταμένην άμβλύτητα του επικρουσικού ήχου κατά τε την καρδιακήν χώραν και τας ὀπισθίους και προσθίους μοίρας άμφοτέρων των πνευμόνων, έπαρσιν και περιτένειαν της κάτω κοιλιός, βρογχιικήν άναπνοήν κατά τας γωνίας άμφοτέρων των ώμοπλατών, σφυγμούς μεγάλους και πρόσσωπον οίδηματώδες. Έπειδή δὲ προς τὰς είρημένους συμπτώμασι του ὀξέος καθολικού ὕδρωπος προσεπήλθον και έξαγγίσεις αίματος πολλαχού των κάτω άκρων έν τε τῶ δέρματι και τῶ υπ' αύτῶ συνδετικῶ ιστῶ, ένῶ οὐδεμία προηγῆθη πίεσις, η πληγή, και έπειδή προσέτι, άκριβοῦς έξετάσεως γενομένης, εύρέθη, ότι ούδέτερον των δύο κυριωδεστέρων του καθολικού ὕδρωπος αίτίων παρήν, τουτέστιν οὔτε η βραχέτειος των νεφρών πάθσις, οὔτε νοσηρά τις των πνευμόνων, η της καρδιός, κατάσταση, έπαγομένη καθολικήν φλεβώδη στάσιν, τὰ δ' έν τοίς νεφροίς και τη καρδία εδράζοντα συμπτώματα έξηγούντο εύχερώς έξ αύτου του καθολικού ὕδρωπος, είπετο έντεῦθεν, ότι η πάθσις προήρχετο εκ νοσηράς του αίματος διακράσεως. Έξετασθείσης της τε έν χρήσει τροφῆς και του προς πάσιν ὕδατος, έτι δὲ και των μαγειρικῶν σκευῶν και οὐδεμιάς έν αύτοις εύρεθείσης νοσοποιού ιδιότητος, έτραπή άπασα η ύπόνοια εις τῶ πράσινον κονίαμα, ὅπερ έφερον άπαντα τὰ ένδαιτηήματα των τροφίμων, οῖον οί κοιτώνες, αί αίθουσαι των παραδόσεων και τῶ έστιατόριον. Άποξέσας τότε ὁ Κ. Müller μικρόν εκ του κονιωματος εκείνου και υποβαλῶν αύτῶ εις χημικήν έρευναν, εύρεν, ότι έμπεριείχεν άρσενιώδη χαλκόν. Διῶ περιηρέθη παραχρήμα πανταχούθεν του καταστήματος τῶ δηλητηριώδες εκείνο κονίαμα και εκτοτε ανέλαθον άπαντες οί τρόφιμοι, άλλὰ τοσοῦτον βραδέως, ὥστε μόλις μετά μῆνας 3-4 άνεκτήσαντο πλήρη την προτέρην αυτών υγείαν. Άπό της άφαιρέσεως δὲ του πρασίνου εκείνου κονιωματος οὔδεμία πλέον συνέθη έν τῶ καταστήματι ὁμοία νόσησις, τούναντίον μάλιστα οί έν αύτῶ διαιτώμενοι παῖδες διετέλεσαν εκτοτε καθ' υγείαν έν λίαν εύχαρίστῳ κατάστασει.

[Ακολουθεί].

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ.

16. Περί της χρήσεως του αιθέρειου σινάπελαιου ως φοινικτικού.

Εν τῶ στρατιωτικῶ νοσοκομείῳ Βιέννης και έν ταις δυοί κλινικαίς της έν τη αύτῆ πόλει στρατιωτικῆς Σχολῆς της Ιατρικῆς (Josephsakademie) έγέγοντο άρτίως δοκιμαί διὰ του αιθέρειου σινάπελαιου προς εκτίμωσιν της πρακτικῆς αύτου άξίας ως φοινικτικού, ὅπως αντικαταστήθῃ δι' αύτου τῶ προς φοινιγμόν σύνθηες διὰ σινάπεως φύραμα* έτι δὲ προς έξέρεισιν του προσφορωτέρου τρόπου της εφαρμογῆς και συγκρητικόν ὑπολογισμόν της δαπάνης.

Εκ των δοκιμῶν τούτων έξήχθη, ότι τῶ δι' οίνοπνεύματος ήραιωμένον (4 σταγόνας του έλαιου έν 1 ὤ 3 οίνοπνεύματος) αιθέρειον σινάπελαιον, εφαρμολόμενον επί του δέρματος, η καθ' έαυτῶ, η διὰ λιπῶν ὀθονίων, έμβεβρεγμένων εις αύτῶ, εργάζεται τοιοῦτον φοινιγμόν, οῖον οί συνήθεις σινάπισμοί. Μάλιστα παρετηρήθη, ότι τῶ εκ της χρήσεως του αιθέρειου σινάπελαιου φοινικτικόν άποτέλεσμα έπέρχεται πολλῶ τάχιον και πολλῶ έντονώτερον, η τῶ εκ των συνήθων σινάπισμῶν. Έτσι τε τῶ καθολικόν άποτέλεσμα των δοκιμῶν τούτων ήν, ότι τῶ αιθέρειον σινάπελαιον, προσηκόντως ήραιωμένον τη προθήκη οίνοπνεύματος, είναι έπιτηδειότατον, ὅπως αντικαταστήσῃ ως φοινικτικόν τους διὰ της φυράσεως ὑγδισμένου σινάπεως σκευαζόμενους συνήθεις σινάπισμούς.

Της προτιμήσεως του νέου φοινικτικού υπεραγορεύουσι και οικονομικοί λόγοι, έπειδή, καθ' α οι γενομένοι ὑπολογισμοί απέδειξαν, ποσόν τοσοῦτον του δι' οίνοπνεύματος ήραιωμένου αιθέρειου σινάπελαιου, ὅσον να υπερτερῆ κατ' ένέργειαν του συνήθους δι' ὑγδισμένου σινάπεως φυράματος (τουτέστι 2 3), τιμᾶται δώδεκα περίπου λεπτῶν και ήμισσεος, ένῶ ισodύναμον ποσόν συνήθους σινάπισμοῦ χροίξει δαπάνης δεκατριῶν λεπτῶν.

Ο έπίατρος Κ. Russheim, ὁρῶμενος εκ της ιδέας, ότι, εάν εφαρμώσωμεν επί του δέρματος λιπῶν ὀθόνιον, διάβροχον εις τῶ δι' οίνοπνεύματος ήραιωμένον αιθέρειον σινάπελαιον, τῶ ὑγρόν διεισδύει εις τῶ λιπῶν ὀθόνιον και οὔτως έρχεται σμικρόν μόνον μέρος αύτου εις έπαφήν μετά του δέρματος, έντεῦθεν δὲ και ὁ φοινιγμός τούτου έπέρχεται βράδιον και άσθενέστερος, μεταχειρίζεται τῶ αιθέρειον σινάπελαιον άναμεμιγμένον μεθ' ὕδατος, καθῶτι, ως λέγει, προς τῶ σκοπούμενον φοινικτικόν άποτέλεσμα δὲν είναι χρεία διαλύσεως του έλαιου, άλλ' ως

μάλιστα λεπτεπιλεπτοτέρας αύτου καταμεμίσεως. Τῶ αιθέρειον σινάπελαιον, ὅπερ μετεχειρίσθη ὁ Κ. Russheim, είχεν έν θερμοκρασίᾳ 10^o F. ειδικόν βάρος 10203· μία δὲ δραχμῆ αύτου περιείχεν 160 σταγόνας. Ο προσφορωτέρος τρόπος της χρήσεως του νέου φοινικτικού είναι ὁ έξης: άναμιχθείσης μιᾶς σταγόνας του έλαιου σὺν 1 ὤ 3 ὕδατος (διὰ δὲ τους παίδας και τους λεπτήν έχοντας την έπιδερμίδα μιᾶς του έλαιου σταγόνας μετά 1 1/2 3 ὕδατος) διαβρέχομεν διὰ του άναμίγματος τούτου τμήμα πηχέος ποτικῶ χάρτου, και εφαρμολόμεν αύτῶ επί του φοινικτέου χωρίου του δέρματος. Επιθέντες είτα τμήμα κηρωτοῦ, ὅπως οὔτω διακωλυθῆ η ταχεία του έλαιου έξάτριπτις, άσφαλιζόμεν τῶ έπίθεμα δι' έπίδέσμου, η διὰ ταινίων έμπλάττου του κολλητικῶ. Άμα τῶ έπίθεμα τούτο έράφηται του δέρματος, ὁ πάσχων αισθάνεται παραχρήμα καύσεός τινος, ητις, αυξάνουσα κατά μικρόν, φθάνει εις τὸν ὕπατον αύτης βαθμόν μετά δέκα λεπτά. Ελάττωμένα δὲ είτα κατ' ὀλίγον, εκλείπει σχεδόν ὄλοτελώς μεθ' ήμισσιαν περίπου ὡραν, μη άπολειπομένιον οὔτε φυλκτίδων, οὔδ' άλλης τινος ὄχληράς συνεπειάς μόνον τῶ εῖ' οῦ έπέτεθη ὁ χάρτης χωρίον του δέρματος φαίνεται έξέρυθρον. Κατά τους ὑπολογισμούς του Κ. Russheim έν κατά την μέθοδον αύτου έσκευασμένον φοινικτικόν έπίθεμα δέται ελάττονος δαπάνης, η τῶ σκευαζόμενον κατά την προεκτεθείσαν μέθοδον του Κ. Bernaizik διὰ της έν οίνοπνεύματι διαλύσεως του αιθέρειου έλαιου.

17. Περί της δι' ὀξυδωμένου χαλκού (Cupri oxydati) αλοιοφῆς.

Ο έν Βασιλείᾳ καθηγητής Κ. Horre άφηγεῖται (Zeitung des Vereins für Heilkunde in Preussen) την έξης περίπτωσιν άνήρ τις, 23 ετών, παθῶν πρό τινων μηχανῶν σφυλιτικᾶ έλκη, βλενδρόριαν, σφυλιτικῆν ὀρχίτιδα και σ. φαρυγγίτιδα, άπικλάγη άπάντων τούτων διὰ του διττοχλωρούχου ὕδραργόρου (Hydrarg. bichlorat. corrosivi, κ. τ. έ. φ. αλικῶ ὑδραργόρου άχνης), ὑπολειφθέντων ίχνῶν μόνων τινων της φλεγμονῆς του άριστεροῦ ὄρχεως. Η άριστερά έπίδιδυμις ήν μαίζων, η κατά φύσιν, παρ' αύτῆ δὲ και προς τὰ έσω παρετηρείτο σμικρός ὄγκος τῶ μὲν μέγεθος ὅσον λεπτοκαρύου, την ένδοτικότητα περιτενῆς και επί της πίεσει μικρόν άλλγῶνων, ως και η έπίδιδυμις. Ο ῥηθεις ὄγκος δὲν ὑπῆρχε πρότερον, κατά την διαβεβαίωσιν του πάσχοντος. Διὰ την παραμύμιον ταύτην πάθσιςιν τῶ

ἀριστερόθεν τοῦ στέρνου καὶ 12 ἑ. τ. μ. ὑπὸ τὰς κλαῖς ὑπῆρχεν ἀνὰ εἰς μαστὸς, ἐντελῶς ἰσομεγέθης πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔχων τὸ μέγεθος, ὕπερ συνήθως ἔχουσιν οἱ τῶν πρωτοτόκων γυναικῶν. Οἱ μαστοὶ οὗτοι προέβαλλον ὀπωσσοῦν, κατὰ δὲ τὴν ἄλλω τῆς θηλῆς αὐτῶν ἔφερον ἀνὰ δέκα, ἀρκούντως συμμετρικῶς διατεταγμένους, γαλακτοφόρους πόρους, οἵτινες ἐπὶ τῇ πίσει ἐβλυζον πῦαρ. 63 χ.τ.μ. ὑπὸ τοὺς ἀνωτέρους τούτους μαστοὺς ἐφαίνοντο δύο ἄλλοι, ἐλάσσονες τῶν ἀνωτέρων κατὰ τὰ $\frac{2}{3}$. Αἱ θηλαὶ αὐτῶν ἦσαν σμικραὶ καὶ ἐπανίσταντο κατὰ πᾶσαν διέγερσιν. Περιεβάλλοντο δὲ ὑπὸ στενῆς ἄλω, ἧς τὸ χρῶμα ἦν λίαν ὀρφνόν. Οἱ τέσσαρες οὗτοι μαστοὶ ἀπεξέκρινον ἅπαντες γάλα. Καθ' ἃ δὲ ἡ μικροσκοπικὴ ἐξέτασις ἐδείξε, τὸ ἀπέκκριμα ἐνὸς ἐκάστου τῶν μαστῶν τούτων ἦν ὅμοιον πρὸς τὸ τῶν λοιπῶν. Ἀλλ' οἱ κατώτεροι, οἱ πλεονάζοντες (surnuméraires), ἐξέκρινον ὀλιγώτερον γάλα, ἢ οἱ ἀνώτεροι, ἅτε καὶ πολλῶν ἐκείνων ἐλάσσονες. Ἐπειδὴ δὲ ἡ τεκοῦσα ἦν ὀλίγαίμος, εἶχε δὲ καὶ φυματῖα ἐν τοῖς πνεύμοσιν, ἐδέθησεν ἵνα, μετὰ δύο ἡμέρας ἀπὸ τοῦ τοκετοῦ, δοθῇ τὸ νεογνὸν εἰς θηλάστριαν. Ὅπως ἐπισχεθῇ ἡ τοῦ γάλακτος ἀπέκκρισις, ἐγένετο (ἀλλ' ἐπὶ μόνων τῶν ἀνωτέρων μαστῶν) τοπικὴ χρῆσις τοῦ ὑδρῶδικοῦ κάλειος, ἐπὶ τῇ ὁποίᾳ ἡ μὲν ἀπεκκριτικὴ λειτουργία τῶν ἀδένων ὑπεστάλη, αὐταὶ δὲ ἐσμικρύνθησαν ἐπισήμως ἅπασαι. Αἱ πλεονάζουσαι μάλιστα (αἱ κατώτεραι) ἐπανήλθον εἰς ἡν πρὸ τῆς κῆσεως ἦσαν ἐλλειμματικὴν (rudimentaire) κατάσταση.

Ὁ Κ. Chatain θεωρεῖ ἀναπόδεικτον τὴν δοξασίαν, ὅτι γυναῖκες, ἔχουσαι πλείονας, ἢ κατὰ φύσιν, μαστοὺς, ἔχουσι καὶ ἰδιάζουσαν προδιάθεσιν πρὸς πολλαπλὴν κύσιν.

24. Περὶ τῆς ἐξωτερικῆς χρήσεως τῆς ἀργίας νάρδου (*Valerianae silvestris*) ὡς ληξιπυρέτου.

Ὁ ἐν Βαρκελώνῃ ἰατρὸς Κ. Roujañas, δοκιμάσας, ἐν μέρει ἐφ' ἑαυτοῦ, εὗρεν, ὡς λέγει, ὄντως ὠφέλιμον τὸ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ εὐχρηστον δημῶδες ληξιπυρέτον, τοῦτέστι τὴν ἀργίαν νάρδον, ἧς τὴν ῥίζαν μεταχειρίζονται οἱ ἐγχώριοι κατὰ τοῦ διαλείποντος πυρετοῦ ἐν εἴδει καταπλασμάτων, ἐφαρμοζομένων ἐπὶ τῶν πελμάτων, ἰδίως μάλιστα μικρῶν ἐξησθενηκότων παιδίων, ὧν ὁ στόμαχος εὐανάτρεπτος, καὶ ἐπὶ κῆσιν, παρ' οἷς ἐπανειλημμένως ὑποτροπιάζει ὁ διελείπων πυρετός. Ὁ Κ. Rouja-

nas ποιεῖται χρῆσιν τοῦ εἰρημένου μέσου ὡς ἐξῆς: λαβὼν ὁ πάσχων προσφάτως λειπτρῆθεϊσαν κόκκινον νάρδου τῆς ἀργίας, ἐπιπάσσει αὐτὴν δαφιλῶς ἐπὶ λινοῦ ὀθονίου, ἢ ἐπὶ τοῦ πρὸς τὰ πέλαματά μέρους τῶν περικνημίδων, καὶ φέρει αὐτὴν ἐπὶ τῶν πελμάτων ἐπὶ δύο ἐβδομάδας νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἀνανεῶν μόνον αὐτὴν, ὅταν προσλάβῃ ὑγρασίαν, ἢ κακὴν ὄσμην.

25. Περὶ τῆς χρήσεως τοῦ ὀφθαλμοσκοπίου πρὸς διάγνωσιν τῶν νοσημάτων τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ὁ Ἄγγλος ἰατρὸς Κ. John Ogle, ὀρμώμενος, ὡς λέγει (*), ἐκ τῆς ἰδέας, ὅτι ἡ κατάσταση τῶν ἀγγείων τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ χοροειδοῦς χιτῶνος τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐκφαίνει καὶ τὴν τῶν ἀγγείων τοῦ ἐγκεφάλου, μεταχειρίζεται τὸ ὀφθαλμοσκόπιον πρὸς διάγνωσιν τῶν ἐγκεφαλικῶν νοσημάτων. Προσέτι ἐλπίζει, ὅτι διὰ τῆς ὀφθαλμοσκοπικῆς ἐξέτασεως τῶν ἔνδον τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀγγείων θέλομεν δυνηθῆ ἐν δεδομέναις τισὶ περιπτώσεσιν ἵνα διαγνώσωμεν καθ' ὅσον συμμετέχει τῆς νοσηρᾶς διαταρᾶσεως καὶ τὸ συμπαθητικὸν νευρικὸν σύστημα. Προσθέτει δὲ, ὅτι τὸ ὀφθαλμοσκόπιον δύναται ν' ἀποβῇ πολύτιμον βοηθητικὸν μέσον, δι' οὗ ἐν ἀμφιβόλοις περιστάσεσι θέλομεν δύνασθαι ἵνα διαγνώμεν, ἂν νευρικά τινα συμπτώματα προέρχωνται ἐκ πλινθῶρας τοῦ ἐγκεφάλου, ἢ ἐξ ἀναιμίας αὐτοῦ.

Πρὸς πίστωσιν δὲ τῶν λεγομένων ἀναφέρει καὶ τινὰς περιπτώσεις, ἐν αἷς ἐφήρμοσε τὴν περὶ ἧς ἡμῖν ὁ λόγος διαγνωστικὴν μέθοδον. Τούτων αἱ πλείσται εἰσὶ περιπτώσεις, καθ' ἃς, ὑπαρχούσης σκοτοδινίας, ἢ ἀτονίας τῶν γυλιῶν, τοῦτέστι συμπτωμάτων, παθολογικῶς μὴ καθωρισμένων, εὗρέθησαν διὰ τοῦ ὀφθαλμοσκοπίου ἐξαγγίσεις αἵματος ἔνδον τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ οὕτω διεγνώσθη, ὅτι ἡ ὑπάρχουσα πάθησις προῆλθεν ἐξ ὑπεραιμίας, οὐχὶ δ' ἐξ ἀναιμίας τοῦ ἐγκεφάλου. Μία τῶν ἀναφερομένων περιπτώσεων εἶναι διὰ τοῦτο περιέργος, ὅτι τὸ κατὰ τὴν ἐξέτασιν ἐπὶ τὸν ἀμφιβληστροειδῆ χιτῶνα προσπίπτον φῶς παρῆχε σφοδρότητας ἀλγηδόνος εἰς τὸν ἐξεταζόμενον.

(*) *Mod. Times and Gaz.*