

IV-1
71

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



026000315519



(A)

te
onis

Amorpha

MONSIEUR IDANNON

Αρ. εισ. 1166 1992

ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ.

ΑΕΤΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΙΜΕΙΩΤΙΚΑ

ΕΤ ΤΗΡΑΡΕΥΤΙΚΑ

Εκδόσεις...
Τύπος...
1861

Morborum acutorum & diuturnorum

ΑΡΕΤΑΕΙ CAPPADOCIS.

Græcè & Latine conjunctim edita

Tribus mss. codicibus

Veneto, Bauarico, Augustano collatis.

*Cum commentario, quo obscura doctrina de nominibus & parte
affecta morborum singulorum cum suis signis perspicua
methodo illustratur.*

Autore

GEORGIO HENISCHIO B.
MEDICO AVGVSTANO.




AVGVSTAE VINDELICORVM,

sumtibus Georgij VVilleri, apud
Davidem Francum.

Cum privilegio S. Cæs. Mact.

M. DCIII.



NOBILITATE ET PRVDENTIA
PRAESTANTISS. VIRIS
QVIRINO RECHLIN-
GERO, ET
MARCO VELSERO
DVVM VIRIS,
SENATVQVE SECRETIORIS
CONSILII

INCLYTÆ REIP. AVG.
DOMINIS AC PATRONIS SVM-
ME COLENDIS,
GEORGIVS HENISCHIVS S. D.

ARETAEVM, NVNC, VT ANTE HAC
nunquam editum: & meo cōmentario illustratum,
uiri amplissimi, alijs quàm uobis nec si consecrare
uellē, possem, nec si possem, uellem. Tot causæ sunt,
ut id facere deceat: tam amplæ occasiones, ut negli-
gere non debeam: ex quibus, quæ maximi momenti sunt, autoris idio-
ma est, scripti genus, & uetustas. Autor Græcus est, id est, natus è Græ-
ca artium parente & altrice diligentia: uos tam Græcorum scriptorū
amantes, ut & passim locis uicinis excusos indies cōmendos, & procul
inde usq; ab Atho, monte Græciæ celeberrimo pctitos, ibiq; olim ma-
nuscriptos, comparandos, & in ciuicam bibliothecam inferendos cu-
retis: & ne possessionis tantum, quæ per se parum laudis adfert, sed &
usus ratio habeatur, eosdem in schola uestra una cum latinis autoribus
semper conjungi, & mox à prima institutione iuuentuti explicari
magno studio urgetis. Quod consilium uestrum quàm sit præclarum,
quàmq; salutare, nemo non intelligit. Id certè in uobis non minus
laudari debet, quàm in Catone Censorio, qui lumen & columen Reip.
Romanæ cum esset, inter tot opera militiæ, & tantas domi contentio-
nes, ætate jam declinata literas Græcas didicit. A Græcia enim sole &
sale gentium, maximam linguæ latinæ partem, philosophiam, medi-
cinam, omnes ingenuas disciplinas habemus. Renata Græca lingua
renasci aut potius restitui cæpit omnis literatura elegantior: ut non te-
merè dixisse uideatur, qui ignorationem Græcarum literarum, omnis
inscitæ fontem, & bonarum disciplinarum *πανελευρία* uocauit.
Græcus hic, qui ad uos transit, Medicus est, id est, sanitatis effector
& conseruator: uos sanitatis ciuium tam amantes, ut medicos com-
plures uarijs officijs destinatos, uestro sumtu foueatis, qui tum phar-

maiorum in compositioni præsent, tum morbos præsentēs propulserunt,
 tum imminentes arceant. Quæ laus non tam communis est aliorum,
 quàm propria uestrum, siue quis numerum Medicorum, siue optimas
 leges, quibus adstricti sunt, consideret: unde quantum in ciues, sed &
 externos, qui huc se applicant, redūdet beneficiū, pro dignitate dici non
 potest. Præclarè enim Plutarchus sanitatem maximè diuinū, longèq;
 blandissimū uitæ condimentum uocat. Et Hippocrates, neq; diuitia-
 rum, neq; corporis, neq; ullius alterius rei ullam utilitatem esse asserit,
 citra sanitatem. Longè uerò præclarius Salomon. Non est census supra
 censum sanitatis. Neq; enim homini satis est uiuere, nisi & commodè
 uiuat: cum qui miserè uiuit, hic non uiuat, sed uiuus moriatur quoti-
 die. Medicus deniq; hic, qui in uestro nomine apparet, uetus est, id est,
 uerissimus & optimus: uos ueterem Medicinam tanti facitis, ut solam
 in uestra Rep. exerceri, tueriq; uelitis, edito eam ob causam solenni
 decreto, & instituto Medicorum collegio. Etsi enim Græci, primi atq;
 adeò antiquissimi Medici non fuerint, artem tamen hanc ab alijs, qui-
 bus antiquiores nulli fuerunt, acceperūt, Ægyptijs nimirum & Israë-
 litis: nec ulla deinceps fuit gens, in qua Medicum studium magis ex-
 cultum fuerit. Vicina enim Ægypto & Phænicia Græcia est, Medicos
 magnis præmijs affecit, Æsculapio & Hippocrati Herculi similes ho-
 nores habuit: sed & cavit Græca Asclepiadarum familia, ne quis artem
 medendi campum comunem faceret, qui ab eodem genere ortus non
 esset: quæ cum annos circiter mille continua successione duraret, for-
 mam medendi methodicam ad sumum perfectionis gradū euexit, ut
 curandis morbis sufficere, nec melior excogitari possit. Hanc igitur so-
 lam uos amplectimini: nec ullum in uestra Rep. nouis & dubijs Medi-
 cis locum relinquitis, ex quibus sunt Paracelsici & agyræ: ac illi quidē
 non tantum in ueterem Medicinam: sed & omnes alias artes injurij,
 nec tam morborum, quàm symptomatum interdum fallaces Medici:
 hi fastuosi impostores publici, quos Aristophanes uoce dithyrambica
 σφραγιδων χαρτοκομήτας per ludibrium uocauit, quod digitos ad ungues
 usq; anulis ornatos haberēt. Ex quo apparet, non esse nouā hanc sub ti-
 tulo Medici & nimio splendore auri, fallendi & nouis medicamentis
 utendi consuetudinē, quam ut arcerēt Ægyptij, legem suis Medicis
 posuerunt, ut secundum receptam & traditam ab antiquis artē primo-
 triduo mederentur: qua si non cederet morbus, liberum esset Medico,
 ingenio uti suo & noua remedia adhibere. Talem igitur autorem, uiri
 amplissimi, non casu, sed certo consilio, & habita uestra dignitatis ra-
 tione, ad uestram artem ponimus, ut sempiternum quoddam extet ue-
 stræ in Medicam, eamq; Græcā & ueterē artem propensionis symbolū,
 ex quo non inemor posteritas agnoscat V. A. rerum fortiter & præcla-
 rē gestarum laudi & splendori, curam sanitatis ciuiū singularē, & amo-
 rem in elegantiores literas, literatosq; adjunxisse non uulgarem: quod
 ut V. A. gratū sit, uehemēter etiam atq; etiā rogo. DEVS OPT. MAX.
 amplitudinem uestram ad Reip. tutelam tueatur incolumem. AVG.
 VIND. Die annunciationis Archangeli ad S. Mariam. A. C. 1603.



ARETÆI NOMEN, PA-

TRIA, ÆTAS, SCRIPTA, SECTA,

dignitas, conjunctio utriusq; textus, usus,

commentarius.



ARETÆI nomen, ut & aliorum Medicinæ principum, Æsculapij, Hippocratis & Galeni, pulchrum & uitæ generi respondens. Æsculapius, ἀσκληπιός, blandè agens, Homero κακῶν θελήτηρ ὀδύνων, tristes dolores leniens, & sanitatem, qua nihil jucundius, affertens. Hippocrates, ἰπποκράτης, equum tenens, hoc est, corpus, quo sensus & ratio tanquam equo uehitur. Galenus, γάληνος, tranquillus, quod infirmos ex atrocitate morbi inquietos, Medicus tranquillos faciat. Aretæus, ἀρεταῖος, quasi ἀρεταίων, feliciter procedens, uel beatum reddens. Sanitatem enim, tanquam summam felicitatem omnes exoptant, indeq; olim in supplicationibus uulgi acclamari solitum carmen hoc. *O beatorum antiquissima sanitas : in reliquam uitam face, ut tecum sem.* Idcirco cognatum nomen alteri Græco Eubulus, & Germanico **Volrat**.

PATRIA fuit Cappadocia, olim dicta Syria & Leucosyria, ferax hominum pessimorum, unde & nomen illi fatale fuit. Duplici enim Cappa scribuntur κακὰ : & duplex cappa malum aliquod trito prouerbio significat. Ut uerò rosa inter spinas nascitur, sic Aretæus, frugi vir, inter Cappadoces. Fuit illi conterraneus Apollonius Tyanæus, & Strabo Geographus, conciuus uerò Gregorius Nazianzenus.

Cappadox uocatur, ut differat ab Aretæo Corinthio. Eudamidæ hominis pauperrimi amico, propter fidem eximiam celebri, de quo Lucianus in *Toxari*.

ÆTAS, qua uixit, ignoratur. Pleriq; Galeno antiquiorem, alij recentiorem faciunt : nulli coæuum, quod tamen fieri potuit. Quod enim quidam Galeno posteriorem dicunt, quia nulla illius in Galeni libris fiat mentio, id Dialecticum est, non apodicticum. Potuit enim Galenus in ijs libris qui interciderunt, uel etiam, quos habemus, illius meminisse, sed neglecto nomine. Sæpe enim ille ueteres, qui ante se scripserunt, citat : nomen eorum omittit. Fuisse coæuus exemplo non dissimili Xenophontis & Platonis probari potest. Horum enim uterq; Socratem, communem præceptorem habuit : uterq; & multos & eruditos scripsit libros, in ijs tamen alter alterius nullam penitus mentionem facit, & ut quidam exillimant, ob solam æmulationem ambitiosam, ne commendatione sua condiscipuli studia extollendo priuatam laudem imminuissè uideretur. Par enim utriq; uulgò gloria fuit, cum Xenophon Attica Musa : Platonis uerò ore, Deos, si Græcè loqui uellent, usuros, passim circumferretur. Quod uerò Paulus Ægineta & Aëtius Aretæi, in suis scriptis meminerunt, ex eo euidenter colligi potest, uixisse eum ante utrumq; id est, ante annum Christi 420. recentiorem uerò fuisse C. Plinio secundo, qui cum omnium ueterum scripta quæ interierunt meminerit, Aretæum non nominat hinc constat.

SCRIPTA quæ extant sunt libri octo, nec toti. Venetijs Latine primum editi, carentes principio usque ad quinti capitis initium, & ipsum mutilatum in primo libro : capite sexto, septimo, nono, decimo, undecimo, duodecimo, decimo quinto & decimo sexto in septimo libro : toto uerò octauo, excepti duodecimo & decimo tertio, quæ tamen & ipsa tota non sunt Parisijs uerò paulò post quinque capitibus auctiores Græcè excusi ex bibliotheca regia : additum autem libri octauo caput secundum, tertium, quartum, quintum & sextum, quæ in latina editione desiderabantur. De cæteris reperiendis multum hæcenus laboraui : nondum reperire potui.



Tria inspexi manuscripta, Venetum; Bavaricum & Augustanum. Idem est initium in Augustano, quod in Lutetiano exemplari: deficient autem in illo sex capita, quæ desiderata in prima editione. Venetum & Bavaricum contractius est, utrunque à sexto capite ~~et nunc~~ demum incipiens, & sex illis capitibus similiter carens.

Hæc verò capita, quæ non alibi quàm in regio codice reperiuntur, genuina esse, non sine causa ambigo. Aëtius enim sermone II. cap. I. de diabete agens, optima, inquit (ut ait Aretæus) est in dolio facta euaporatio ad exudandum, eo modo ut caput extra dolium promineat: frigidumque aërem attrahat, reliquum verò corpus omne calefiat. Id autem in capite de diabete, quo Aretæus auctor redditur, non continetur: contineri deberet, si legitimum esset. Idem de reliquis iudicium. Nec id absurdum, cum simile quid Hippocratis libris acciderit, ut multi essent spurij, cuius causam reddens Galenus, refert tempore Ptolomæi complures lucri cupiditate, libris pravis nomina sapientum auctorum apposuisse, ut facilius à rege præmia acciperent. Defecerunt autem tot capita Aretæi, restituta quædam eodem fato, quo libri Aristotelis, & plerique aliorum Græcorum. Pluribus enim annis latuere q. dormientes, in obliuionemq; ducti, paucis tandem ab hinc annis in lucem iterum redierunt, sed ab humore & blattis magno cum hominum damno miserè corrupti. Quid igitur? an Aretæus tot lacunis deformatus, redintegrati nullo pacto potest? Non minus, arbitror, quàm Venus Anadyomene, cuius inferiorem partem corruptam, qui reficeret non potuit reperiri. Nè tamen imperfectus esset, & ad usum minus accommodatus, colores illius oblitteratos purpurisso Galeni & Alexandri Tralliani, imprimis verò Pauli Æginetæ reconcinnare & mancum suis partibus absoluerè volui, nec temere. Multa enim sunt apud Æginetam locis alijs, quæ ex Aretæo desumpta esse constat.

Differentiam utriusque textus minutior character subditiorum autorum demonstrat.

SECTA, quam sequitur Aretæus, dogmatica est & rationalis, non methodica, non empirica. Morborum enim causas inuestigat: signis ad causarum inventionem utitur: per indicationes curandi methodum instituit. Sunt autem tria dogmaticorum genera. Primi, qui nudis tantum verbis morborum singulorum causas, signa ac prognosin tradunt, & certos sibi proponunt canones, & certas remediorum formulas nullis legibus concinnatas, ex quibus morbi alijus curationem deducunt, ut minus periculosa sit curatio.

In secundo genere sunt, qui non habent canones, sed certos scopos, quos secuti morbos curant, ut Gatinaria, cuius practicum librum Syluius castigauit. Scopij sunt, verbi gratia: abscissio causæ, membri confortatio, sanguinis, ubi plethora est, correctio, resolutio residui remanentis post euacuationes, & remotio malæ qualitatis, quæ residua est.

Tertium genus dogmaticorum est omnium perfectissimum, qui omne curationis consilium, à rei, id est, morbi, qui offertur, natura petunt: conditionem ægroti & varietatem considerant: & duplici indicatione, essentiali & accidentali ex uniuersali methodo petita, curationis filum pertexunt. Aretæum igitur in primo dogmaticorum genere ponendum censemus, in quorum numero etiam P. Æginetam, Alex. Trallianum, Aëtium, Rhafen, Scrapionem, Auenzoarem, Auicennam collocamus.

DIGNITAS ex temporis antiquitate & encomijs eruditorum æstimatur. Veterem autorem esse constat, quiq; ut arbitror, ante annos circiter mille, quingentos floruit, ideoq; magno in pretio habendum. Neque enim illo seculo ad scribendum quisquam animum appulit, qui ingenio, doctrina & experientia singulari non ualeret. Commendant eum ex veteribus P. Ægineta & Aëtius:



& Aërius: laudant recentiores, sua scripta diſis illius tanquam gemmis ornant, uelut scutis defendunt, grauem autorem & ditissimum in signis morborum describendis nominant: nec immerito. In plerisque enim Hippocratem tam fallere quam falli nescium sequitur: & characterem illius in docendo aphoristicū succincto stylo & grauitate sententiarum adeo imitatur, ut alterum Hippocratem, uel practicam Hippocratis non temere quis dixerit.

CONIUNCTIO, utriusque textus Græci & Latini, quam sit utilis, quamque necessaria, nemo non intelligit. Græca sola rari intelligunt: conjungi latinis plerique expetunt. Etsi enim à uiris doctis, & in utraque lingua peritis satis dextrè translata sint, Græcus tamē sermo sæpe Latino certior, dulcior, apertior. Inest enim in proprio idiomate nescio quid latentis energix & proprietatis, quam aliena lingua tantam non habet, nec tam benè potest exprimere. Dubia verò sæpe conuersio latina est, & interdum aliquid effugit etiam oculos maximè: quod animi nubilum, quemq; lapsum interpretis lector ad ipsum quasi fontem recurrans, nullo negotio abstergit & corrigit. Addidi autem conuersionem Iunij Pauli Crassi Medici & professoris Patauini, qui cum esset optimis literis, tum Græcis, tum Latinis ornatissimus, non tantum Aretæum latinū fecit, sed & Theophilum Protospatarium, Rufum Ephesium & Galeni libros aliquot. Pauca quædam inserta textui latino & diuerso caractere impressa sunt ex notis anonymi Galli, quæ quanti sint faciendæ, peritus Græcæ linguæ animaduertet. In margine variæ sunt lectiones, partim annotatæ à Iacobo Guppylo, partim ex codice Augustano.

VSVS explicationem apud Elegantes Medicos, qui pauci sunt non, requirit: apud plebejos & quæstuosos, numero plures, declarationem maximè postulat. Quid enim, dicent hi, Græco, eoq; antiquo Medico nobis opus est, latina placent, & recentiora: non quid deceat aut ornet, sed quid expediat & det, nostro seculo spectare oportet. Quibus id respondemus breuiter. Medico præcipuè necessarium esse illud, ut sciat quibus morbis homo sit obnoxius, & quomodo eis occurrendum.

Iam verò eam scientiam soli Græci, ijq; antiquissimi autores suppeditant. Vix enim ulla est artium alia, quæ & totam se Græciæ debeat, & tota in ipsius lingua restet adhuc, quam Medica. Testis est quælibet fermè linea latinorum Medicorum, uocabulum aut Græcum, aut à Græco deductum nominans, siue affectam partem corporis, siue morbum, causam uè morbi siue medicamentum exprimat. Et in tanta opinionum Medicarum diuersitate, autoritatem veterum Cynosuræ instar sequendam omnes prudentes iudicant. Tritum enim illud est. Optima exemplaria ea sunt, quæ uetera sunt. Nec in arte Medica oraculum quod Lenoni datum est, locum non habet, sed ualet quam maximè. Cum is sciscitaretur, quomodo eruditus fieri posset, responsum hoc tulit. Si conuertatur antiquis. Si quis autem tam illiberali, sit ingenio, ut præter quæstum ei dulce sit nihil, nec solidam eruditionem pluris quam lucrum faciat, is nulla re mercenario & mechanico uideretur præstantior, nisi illa forte ratione, quod quæstus ipse plus habet ingenij & artis, & minus sordidi laboris.

COMMENTARIVS non temerè additus. Breuis est Aretæi, ut & Hippocratis, oratio, indeq; obscurior, & ferè rudi adhuc seculo amethodica. Ne igitur hic autor magis colatur, quam intelligatur, quasdam illius partes mihi explicandas sumsi, secutus ea in re exempla uirorum clarissimorum, qui nostra ætate idem in scriptis aliorum ueterum, ut Hippocratis & Galeni præstiterunt. Quod enim Cicero de antiquis Romanis dixit. Eos in Rep. constituenda tanta fuisse sapientia, ut satis superq; sapientes sint, qui illorum sapientiam non dico assequi, sed quanta fuerit, perspicere possint: idem de antiquis Medicis non minus uerè dici posse, non dubito. Laudanda igitur prudentia, extollenda
merita

merita in Remp. Asclepiadzam, Ioh. Manardi, Ioh. Baptistæ Montani Veronensis, Hier. Mercurialis, Victoris Trincauellij, Petri Salij, Iac. Milichij, Ioh. Craronis, Th. Zuingeri & aliorum Medicinæ procerum, qui nostra ætate studium & operam suam collocarunt, partim in veterum libris indagandis & in lucem emittendis, partim sua interpretatione obscuris illustrandis, breuioribus majori copia dilatandis, ingratis ob uetustatem, gratis ob nouitatem temperandis: primo flammæ, quod illi texuerunt ea, quæ supersunt addendis. Neque enim heroes illi medendi rationem, quam eam quæ ab antiquis petitur meliorem putarunt: & se suo officio satisfecisse existimarunt, si collapsam tot ab hinc annis ad fontes Græcos, à quibus Arabum riuuli sunt deduci, reuocarent, methodum uniuersalem in exemplis particularibus demonstrarent, medicos Hippocraticos, id est, tum doctrina, tum praxi verè dogmaticos redderent. Exijs verò partibus, quas plures tractat Aretæus, duas explicandas mihi proposui: unam de nominibus: alteram de parte affecta morborum singulorum, & signis illius: hanc ut difficilissimam & maximè necessariam in opere Medico: illam, ut ambiguitatem terminorum distinguerem, etymologias veras elicerem, & antiquitatem Græcæ Medicinæ demonstrarem. Illud enim in confesso est, facilius curari morbum quam dignosci, nec remedium idoneum adhiberi posse, nisi cognito morbo. Accuratè autem consideranti, appellationes Græcas, non tam Græcæ, quam vetustioris originis esse apparet, & hinc artem Medicam à primis sanctis patribus acceptam ad Græcos propagatam esse. Sic Hebraica sunt Apollo à Baal: Sufa, liliū à Schischah, id est, numero senario, quod rosam habeat sex foliorum. Manna à Manah, distribuit numeratim.

Balsamum à baal, dominus, & Schemen, oleum, quasi rex & dominus liquorum: nitrum à nather, transiliit, quod circumfiliat, vel quod maculas abluendo remoueat. Coryza à rotz, id est, cucurrit, quasi pituitæ fluxus: *Φαν* Græcum & nostrum *bocken* à Bahak, lentigo, cuius radix Bock, vacuus fuit, quod sit macula vacua à purulentia. Plura in nominibus morborum. Verum enim illud est, quod Poëta scripsit.

Tradidit AEGYPTO Babelon, AEGYPTUS Athenis.



GEORGI



GEORGII REMI I. C.

E P O S.

VERVAM amo. & haut aliter mysta mihi Iuris & AEqui
 Fas esto fari. prudens si mentiar umquam,
 Impunis non sim. penas Themis exigit ultrix
 Ajo, tibi ajo. Hygieias callentissime HENISCHI,
 Cultos esse viros mihi, magni numinis instar,
 Intonsi quotquot profitentur Apollinis artem,
 Herbarum vireis, quae tanta potentia rerum
 Naturæ, quicunq; indagare sagaci
 Mente; coliq; mihi, dico, & reuènter haberi: &
 Gemmâ qui potent, Sarrano ostroq; quiescant
 Censeri dignos. Priscis qui regibus, ipsis
 Augustis, grati & Kari de more fuere;
 Hos ego quàm possum celebri quoq; dignor honore.
 Coum quippe senem Rex conduxisse satagit
 Ingenti mercede: repulsam sed tulit ille,
 Europen Asia voluit qui jungere ponte,
 Persarum magnus domitor, cui vapulat aquor,
 Deridens verò scuticas vincla omnia rupit.
 Nouimus & clarum vi magnâ Erasistraton aurî
 Donatum Antiocho. Musæ augustissimus heros
 Aeternum statuam monumentum ex ære locauit.
 Aemulaq; istius, Ciui, Medicoq; Sophoq;
 Culta Fracastorio Verona ex rupe sacrauit
 Signum. ex argento voluit: vetitam esse, loquuntur,
 Implere hoc voti; fama si credere jus est.
 Quin etiam priuas Medicum collegia leges
 Impetrauerunt: simul annua, pignora amoris
 Cæsarei, his decreta olim stipendia, egere
 Expertis nè quâ contingeret Archiatris.
 Amplius, in pretio tanto fuit, ista salubris,
 Diros curandi, & sacrosancta professio morbos
 Vt, cui nauarent operam, condigna monarchis
 Visa sit, & medici populorum παρρηδες essent.
 Illyrium rector Genti, mortalibus agris
 Fecisti, & Iuba tu Maurum Rex docte, medellam.
 Attale, te appello. Tu Pontice Mithradate
 (Tu, qui saua duella Quiritibus intetulisti)
 Castè exercebas artem: lethalia namq;
 Antidoto docuisti aconita repellere tuto.
 Non Arabum nunc, non Indum pertexo dynastas,
 Nec nostros (foret hæc operosi longa laboris
 Materies; Alij jam laudauere) tetrarchas.
 Porro, ad vos redeo, Medici, quocunq; reclusa
 Matris natura mysteria panditis; & qui
 Morborum causas docte exploratis; & istas
 Artifices sublaturi componitis herba
 Hujus & alterius succos, & pharmaca fida:



Vos magni proceres rectè intellexistis, opinor,
 Pharmaca quid valeant, liceat quos vertere in usus.
 Nostis, momenti, vinculum seruare jugale
 Corporis atq; animi, pateat ne rimula Clothò,
 Quanti sit; quanti res ponderis, èleon; asthma:
 Lethargum; causum; tabem; pleuritida; coli
 Adfectum, renum, jecoris, capitis; stomacaccen;
 (Horret mens dudum tot commeminisse malorum)
 Herculeum morbum; attonitumq; stuporem; Elephantem;
 Precipitem addo animi lapsum: nè singula narrem,
 Membri fragam sileo podagram, atq; hydropa tumentem;
 Mille alias facies agrotum; pellere quanti
 Corporibus sit res & majestatis & artis:
 Quæ pulchrè noster commonstrat monstra domare,
 Tot portenta, homini quæ sunt hostilia tela,
 Codice, quem cernis Lector, procul ire & abire
 Imperat, & jubet ac docet optimus auctor & actor,
 Cappadocum tellus quem nutrit alma, ARETAEVS:
 Cui Medico Medicus medicinam en nunc facit, auum
 Quando viro grauia inflixit, prò, vulnera iniquum.
 Hunc benè sanatum membris, totumq; recoctum,
 Sublatis nauis, sistit totum Amphitheatro,
 Romanq; toga indutum, cum purpurâ, & auro
 È solido ornatum diademate, HENISCHIVS, albâ
 Producit dextrâ, uorsandum nocte dieq;
 Ergo pro meritis meritas exsoluere grates
 Scriptor cum nequeat fati exclusus acerbis,
 Muneris hoc Asclepiada schola, πᾶσιδες ἰατρῶν,
 Præstat, & in laudes, Medicum nouâ gloria HENISCHI,
 Officiosa tuas, laurum palmamq; tibi offert,
 Cum voto: stet honos tuus, & plaudentibus aliis
 Famam Fama tuam pia Musa perennet HENISCHI:
 Delphin dum pelagus sulcabit; sidera Olympo
 Errabunt, scintillabitq; ante ambulo Phæbi
 Phosphorus auricomo præfulgens vertice stellas.



MARTINI



MARTINI HOLTZAPFELII

D. MEDICI ET VISITATORIS

AVG. EPIGRAMMA.



*Vi veterum scriptis contendunt addere lucem,
Obscura ut possint absq; labore legi:
Non minus ingenij laudem palmamq; merentur,
Quam noua qui promunt condita Marte suo.
Iarq; antiqui scripserunt, atq; recentes,
Sed non doctrina cum grauitate pari.
Major inest illis succus, praestantia fructus
Quem sat agunt medici prèndere major inest.
Floribus utq; alijs grato rosa praestat odore:
Sic antiqua magis sunt bona scripta nouis.
Quod loquitur res ipsa igitur, Clarissime Doctòr,
Eximios inter te numerare decet.
Cujus peruigili studio, inuictòq; labore,
Expositus scholijs nunc ARETAEVS adest.
Qui Grajà Latiàq; simul depromere lingua
Sensa animi multò lucidiora queat.
Maçte nouo splendore liber, te Delius ornat
Et radijs clarum reddit Apollo suis.
Vos quoq; Paonia praestantes arte coloni,
Quæis cura est medicam ritè adhibere manam,
Hunc legite, in dubijs hunc uoluite casibus: hic vos
Et cura methodum, & pharmaca tuta docet.
Nocturna hunc uersate manu, uersate diurna:
Hoc duce uix quisquam funeris autor erit.
Sive etenim tristes cupitis cognoscere morbos,
Seu de uenturis dicere certa uelis.
Seu jam depositos sanare fideliter agros,
Hic rectam ductor monstrat inire uiam.
Si prius obscuras lectori objecerat umbras,
Clarior in uestras nunc uenit ille manus.
At tibi quas laudes, uir praestantissime HENISCHI,
Noster amor, nostri splendor honosq; chori,
De medica cui sic animo stetit arte mereri,
Soluè Apollinea docta corona schola?
Non moritura tibi debetur gratia: Cedri
Est tuus & Lauri dignus honore labor.
Ex quo, ne dubita, semper tibi gloria surget,
Gloria funereo non abolenda rogo.
Hæc tua sedulitas, doctis multò ante probata,
Extollet nomen prorsus ad astra tuum.
Vive diu celebris, felix alijsq; medere,
Ut benè sit multis, uitaq; longa, Vale.*

FEDER.



FEDERICI CERVTI

VERONENSIS.

*Est iter facientibus leuamen
Maximum, quid habere quo laborem
Possint imminuisse: seu calentes
Si Solis radij premant euntes
Aura se recreare, tunc cupita
Possint, si sitiant liquore fontis
Queant egelidi sitim leuare:
Vel cum Sole cadente, mox tenebris
Lumen eripientibus, silente
Luna, si auxilium astra tunc dedisse
Turbatis poterunt, gradu citato
Hi gaudent sibi plurimum, canora
Nec non voce graues leuant labores.
Quid tale accidit his, disertiorum
Qui volumina saepe, sepiusq;
Scrutantur vigiles, studentq;, sensus
Abstrusos sibi reddidisse apertos.
Namq; omnem hi lapidem labore magno,
Et sudore mouent, queant ut ipsi
Compotes fieri. Benigne lector,
Ne quid tu patiare, molestiores
Cuius expulit hasce mens HENISCHII.
Quos stros candidus eruditiorum
Exiracla hac tenebris, velut refulgens
Astrum, lumine clariore scripta
Graci huius facili facit videre.
Nil jam & impedit, legendo re ipsa
Latus experiere, quid nitore,
Quid lucis, obsito tenebris
Auctori tulerit peritus iste
Huic GEORGIUS, haud minus disertus
Lustrando veterum tenebricosa*

*Scripta, quam medicus bonus, fidelis
AEgroto quod obest, potens leuare.*

EIVSDEM.

*Afferre lumen gentibus
Sunt, qui volucrem dicitant,
Obscura cum nox incubat,
Terris & umbras attulit.
Orbis noui per insulas,
Indi tenent quas incola,
Passim volucris euolat,
Miranda penna prepeti,
Est huicq; nomen CYCVES;
Hoc verius, quam veritas.
Non credis? at tu lumina
Huc flecte. dudum peruolat
Cecis in antris abdito,
Tenebricoso Graculo
(Mandabat olim literis
Quaecunq; pellunt noxia)
Solers auem GEORGIUS
Pietate pulsus obtulit.
Miro profecto gentibus,
Is nunc videndus ambulat,
Nitore comptus fulgido.
Quis non HENISCHII ferat
In astra factum prouidi,
Dias in auras proferens
Cecis tenebris obsita?
Hoc liuor ipse comprobat.*



ARETAEI ARETATIOY

CAPPADOCIS DE

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ,

caulis & signis acutorum morborum.

περὶ αἰτίων καὶ σημείων ὀξέων παθῶν.

Liber Primus.

βιβλίον α.

Prooemium de morbis acutis.

προοίμιον περὶ ὀξέων παθῶν.

De phreniticis, Cap. I.

Περὶ φρενιτικῶν, κεφ. α.

De lethargicis, cap. II.

Περὶ ληθαργικῶν, κεφ. β.

De tabe, cap. III.

Περὶ μαρσμοῦ, κεφ. γ.

De Apoplexia, cap. IV.

Περὶ ἀποπληξίης, κεφ. δ.

De accessione morbi comitialis, cap. V.

Περὶ παροξυσμῶν ἐπιληπτικῶν, κεφ. ε.

De tetano seu rigore, cap. VI.

Περὶ τετανῶν, κεφ. ς.

De Angina, cap. VII.

Περὶ σιαγῆς, κεφ. ζ.

De uitijis columellæ, cap. VIII.

Περὶ τῶν κατὰ τὴν κιονίδα παθῶν, κεφ. η.

De pestilentibus faucium uitijis, cap. IX.

Περὶ τῶν κατὰ τὴν φάρυγγα λοιμικῶν παθῶν, κεφ. θ.

De pleuritide, cap. X.

Περὶ πλευρίτιδος, κεφ. ι.

PROOEMIUM.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Gal. defin. Med. Acutus affectus est is, qui facilem solutionem uel internecionem, quantum in ipso est, habet.

Γαλ. ὄροι ἰατρικῶι. ὄξυ πάθος ἐστὶ τὸ εὐπεπλον τῶν λύσιν ἢ ἀναίρεσιν, ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ ἔχον.

Idem in trod. Acuti à sanguine ferè & flava bile, in nonnullis corporis partibus, quas ij malè habent humores superfluis, & in deterius uersis constituuntur: longi à pituita & atra bile similiter uel copiosioribus, quàm naturæ modus exigit, uel in accerrimam qualitatem immutatis.

Γαλε. εἰσαγωγῆς. Τὰ μὲν ὄξεα ὡς ἐπίπαν ὑπὸ τῆς αἵματος καὶ χολῆς ξανθῆς συνίσταται. πλεονάζοντων ἐν τισὶ μέρεσι τοῦ σώματος, ἐν οἷς νοσοποιῶσιν ἐκ τρεπιδῶν ἐπὶ τὸ κακίον πᾶσι χρόνια ὑπὸ φλεγμάτων καὶ μελαίνης χολῆς ὁμοίως ἢ πληθυνόντων πολὺ, ὡς τὸ κῆρ φύσιν, ἢ μεταβαλλόντων ἐπὶ τὸ δριμυτάτον.

Paulus Aegineta lib. i. cap. 5. Diurnitas ægritudinis quatuor notis deprehenditur: motu morbi, languentis habitu, pulsū & februm specie. Ex motu quidem morbi ad hunc modum. Si quatuor particularis accessionis tempora ocysus minimoque temporis momento inuaserint, morbus acutior erit, cuius extremus terminus est septimana: magna uerò ex parte die quarto soluitur. Quod si longius quidem procrastinetur, neque tamen duodecim horarium spacium excedat, acutum esse morbum indicat,

Παῦλ. αἰγ. βιβ. β. Ἐκ πύρων ἀφίγγυσκεται ἡ νοσήματος ὁ χρόνος, ἐκ τῆς κινήσεως αὐτῆς νοσήματος, ἐκ τῆς ἡκμνοντος ἕξως, ἐκ τῶν σφυγμῶν ἐκ τῶν πυρετῶν εἰδῆς. Ἐκ μὲν τῆς νοσήματος κινήσεως ἄπῳς. εἰ μὲν οἱ ποταρῆς ἔμελε παροξυσμῶ καίροι θάπτον τῆ καὶ ἐν ελαχίστῳ παρέρχονται χρόνῳ κατόξυ αὐ εἴη τὸ νοσημα, ἕχατος ὄρος ἐστὶν, ἢ ἐβδομη πᾶσι πολλὰ, κῆ τῶν πύρων κρῖνεται. εἰ δὲ ἐν πλείονι μὲν ἔδε, μὴ ὑπερβαλλοὶ δὲ δυοκαίδεκα ὁρῶν ἀφίστημα, ὄξυ προδηλετή, τῆς τῆς



της τεσσαρες και δεκατης εισω μαλιστα κρινου-
μδρον. ει δε γε παλεινας υρας παλαινοι ως
τε τω δεχλω μονον, και τω αναθασιν εν τω
παλειονι της ημερας τε και της νυκτος δανυσαι
χρονω, το τριτον νοσημα χρονιον εστιν. ει δε μη
εχοι μερικως παροξυσμους η νοσος, αλλ' απο
δεχης αρχι πλεως οιον, εις τω αρχει παροξυσ-
μος, καθαρως εστι σωστων, και ερδηται των
οξεων αν εισι. εκ η της εκαμνοντος εξεως ερ-
γνωθησε. ει μδ ηδη μετρειαν εχουσι περσωπων,
ει ερλοιπον σωμα συμπτωσι, οξυ παροδηλα-
ται το νοσημα. ει δε παντα πασιν ασυμπτωτων
χρονιον εσαι, πληθος χαρ υλης δηλαται χρονω
παλειονι πεφθισι μδης απο δε της των αρτηριων
κινήσεως, ετως μεγας μδ κη σφαιδρος κη ταχυς
κη πυκνός ο σφυγμός, οξείας αν ειη νοσος δηλω-
πκός. ο η εναντιος χρονίας. απο η ε των πυρε-
των ειδας, καθ' οσον οι μδ θερμιοι και διακαεις,
οξείαν δηλασι τω νοσόν. οι η μαλθακώπροι,
εοιοει σμυχρόμροι χρονίαν.

qui intra diem decimum quartum plerum-
que decernit. At si pluribus horis proce-
gatur, ita ut principium duntaxat, & incre-
mentum longiore diei ac noctis tempore
absoluat, eiusmodi morbus diutinus appel-
latur. Sin exacerbationem morbus parti-
cularem nullam obtinuerit, verum ab ini-
tuo ad finem usque tanquam una ac perpe-
tua exacerbatio infestat, seu incontinuus, &
hoc quodammodo indicium dicas esse acuti.
Ex habitu uero aegri hoc pacto deprehendi-
tur. Siquidem uultus confestim, & reli-
quum etiam corpus uniuersum collabatur,
atutum morbum persagit. Si omnino
nihil macrescit, diutinum. Materiae enim
longo tempore concoquenda, copiam sig-
nificat. Pulsus magnus, uehemens, uelox,
densusque, acutum morbum indicat: con-
trarius uero longum. Ex febrium denique
specie, quatenus calidae & utentes, morbum
acutum testantur: mitiores uero, qualesque
languidiores, diutinum.

ΠΕΡΙ ΦΡΕΝΙΤΙΚΩΝ.

DE PHRENITICIS.

Κεφαλ. α.

Caput I.

Γαλ. περ αιτιων συμπτωτων βιβ. β. ονομα-
ζουσι δε φρενιτιδες μδ αι μετα πυρετων μανιας
δε αι χωρις τετων ποτε μδ τοις δακνωδεσι, και
θερμοις επιμδμαι χυμοις, οπως ο της ξυμβης
χολης εισι μαλιστα. πολλακις δε κη την δυσκρα-
σιαν τω εστι το θερμότερον αυτε ε ενγκεφαλα
συνισταμδμαι μοναι η αι μελαγχολικαι καλε-
μδμαι. παλαινοια ψυχρότερον εχουσι τον αι τον
χυμον η μδ γαρ φρενιτις εδε απλωσ εστι θερ-
μεις συνισταται χυμοισι αλλα μετα ε φλεγμο-
νιω εργαζεσθ κη τε τον ενκεφαλον κη τις μη-
νιγγας. εν η τοις αλλοις πυρετις αι παραφρο-
σιασ πληθύνοντ εν ενγκεφαλω γιγονται
ε πιατα χυμδ, κη οσαι γε κατα τις ακμας συ-
νισανται των οξυπατων πυρετων, αι μδ δακνω-
δη κη θερμεν αναθυμιαμδρον ιαχσιν εστι τον
ενκεφαλον.

GAL. lib. 2. de sympt. caus. c. 7. Deliria
quæ cum febrī sunt phrenitides: quæ si-
ne febrī sunt, infantæ nominantur. Ac
reliqua quidem deliria ex mordentibus &
calentibus succis, qualis maximè stana est
bilis: sæpe etiam ex calidiore cerebri intem-
perie. Sola uero illa, quæ melancholica
uocantur, frigidum succum pro causa ha-
bent. Quippe phrenitis non tantum exca-
lidis ortum habet succis; sed supraid, etiam
phlegmonem in cerebro & eius inuolucris
excitat. In reliquis uero febribus deliria
sunt, eiusmodi succo in cerebro exube-
rante. In ijs uero, quæ in acutissimarum
febrium summo incremento incidunt, ua-
por aliquis mordens accalidus ad cerebrum
ascendit.

Γαλ. περ των πεπνοθωτων τωπων βιβ. ε.
παραφροσωμια μδ εν γιγονται κ αιπι το της
γαστρος σωμασ κακε πσαγανη, κ διακαεις πυ-
ρετις κη παροδηλασι, κ παεινδμονιας. αλλ'
αι δια τις φρενας, εγγυς τον φρενιτικων ει-
σιν εστι μδ γαρ τοις αλλοις μορλοισ παχσσι, κη
τοις διακαεις πυρετις, εν της παρακμας
αυτων η παραφροσωμη καθισταται, της

Idem lib. 5. de locis affectis c. 3. Atque
delirate etiam solent nonnulli, ob uitium,
quod in ore uentriculi consistit, & febribus
ardentibus, & pleuritide, & perionneumonia.
Sed quæ ob septi transuersi affectum acci-
dunt deliria non multum distant à phreni-
tide. Quippe per cæterarum partium affectus
atque per febres ardentes delirium mitigari
solet, quoties morbus declinare uidetur. At
phreni-



phrenitidis propria præcipuaque nota est, ne in declinatione quidem febrium delirium quiescere. Neque enim per consensum duntaxat sub huiusmodi morbo cerebrum afficitur, sed propria primariaque affectione laborat. Vnde paulatim accidere, quiescere uetè neque subito, neq; affatim solet, ut in ijs partibus, quarum nunc mentionem fecimus. Ac anteaquam inualescat, præcedunt ipsam accidentia non pauca: eaque omnia phrenitica indicia uocantur: quæ ab ijs quoque, qui me præcesserunt, conscripta sunt. Nam interdum uigilias præcedere, siue etiam somnum, manifestis imaginibus turbatum, ita ut & clament nonnulli, & exsultant, uidere est. Interdum uerò adeo agrestis accedit obliuio, ut laborantes aliqui, cum matellam petiuisent, meiser tamèn neglexerint: aut cum lotium emitterent, matellam ipsam prodere haudquaquam meminertig. Interdum maiori cum tumultu aut temeritate respondent, præsertim ubi alii quis antea fuerit mansuetus. Atque ij omnes exiguo utuntur potu. Spiratio ipsis rara est, & magna: pulsus parui & neuosiores. Nonnunquam occipit dolor infestat. Cum uero iam proximè ad phrenitidem accedunt, oculi eis uehementer euadunt squalidi, aut ex altero ipsorum actis lachrima effunditur: ac deinde lippitudo innatat, & uenæ ipsorum, sanguine plenæ uidentur, & sanguis stillat è naribus. Quo tempore nihil quod exacte ad prudentiam pertinet, respondent, & floccos auellunt, & festucas carpunt, atque aridiore febrili, cui non ita magnæ in alterutram partem mutationes accedunt, torquentur: quemadmodum in alijs quibusdam febribus uidere est, quæ per uigorem quidem grauissimè infestant, inclinationes uerò habent mitiores. Ad hæc lingua quoque salebrosa est, nonnulli interdum audiendo falli uidentur, ac interdum mæsti iacent, uix quicquam respondentes, atque dispositione dolorifica affecti, uel actius premente aliquo, eam haudquaquam sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum paulatim phrenitis euenire solet. Ab aliarum uerò partium nulla perpetuum delirium procedit, dempto solo septo transuerso, cuius uitio excitatum delirium, parum à continuo distat, adeo ut ueteres putauerint, hac parte inflammatione affecta, homines phreniticos euadere, atque ob eandem suspicionem, phrenas, id est, mentem, eam appellauerunt, tanquam sapietæ parti conferat quippiâ. Verum delirium, quod huiusmodi uitio accidit, à phrenitide distinguitur, & ex oculorum accidentibus, & sanguinis

Φρενίτιον δ' ἴδιον ἐξ αἰρέσειν ἑσάρχει, τὸ μὴ δ' ἐν πᾶσι τῶν φρεσῶν τῶν πυρετῶν πᾶσι τῶν φρεσῶν. ἔστι γὰρ ἑστὶν συμπαθεία κατ' ἐκείνῳ τῷ νόσῳ ὁ ἐγκέφαλος πάσχει, ἀλλὰ κατ' ἰδιοπάθειαν τε καὶ πρωτοπάθειαν κάμνει. καὶ διὰ τὸ καὶ βραχὺ τὸ συνίσταται τὸ τὸ πάθος, καὶ ἐκ ἐξ αἴφνης τῶν ἀκόπῃσιν ἢ ἀθρόως, ὡς ἑστὶν τοῖς ἀλλοῖς μορίοις, ὅσα προεῖπεν ἑστῆως. ὅσα ὀλίγα τε συμπλάμματα προσηγείται τῆς καὶ σκευῆς αὐτῆς καλεῖται γὰρ πάντα ταῦτα, φρενητικὰ σημεῖα, καὶ γὰρ ἄφασιν αὐτὰ, πάντες οἱ προεῖπε. ἔστι γὰρ γὰρ ὀφθαλμῶν ἢ καὶ τινος ὑπὸς θορυβώδεις ἐπὶ φαντασμασιν ἐναργεῖσιν, ὡς καὶ κρᾶξαι ποτε καὶ ἀναπνέουσαι προσηγμένως ἐστὶν εἰδέν. ἔστι δὲ ἀλόγως ἑπιλησημοσύνας ὡς αἰτήσαντες αἰμίδα ἑστὶν κάμνοντες ἐκέτ' ἐρεῖν, ἢ ἐρησαντες ἑπιλησησῶν προεῖπαι τὸ σκευῆς ἢ θορυβώδεστρον, ἢ ὅλως θρασύτερον ἑπιλησησῶν, καὶ μάλιστα ὅταν ἐμπροσθεν ἢ κόσμου. ἀλλὰ καὶ βραχὺ τῶν πάντες εἰσὶν ἐστὶ. καὶ μέγιστον ἀναπνέουσαι καὶ ἑστὶν σφυγμῶν μικροπέρας. τε καὶ νύκτωρ ἐρεῖσιν ἐχαστοὶ καὶ ποτε καὶ τὰ κατ' ἰνὸν ὀδυνῶνται. πλεονεξίαν δὲ ἡδὴ τῶν φρενίτιον ὄντες, ἀσχημερῶς ἰκανῶς ἰχασίτες ὀφθαλμῶν, ἢ τὸ κατὰ τὸν ἑστῆρον αὐτῶν δάκρυον ἐκχεομένον ὄντι. καὶ μετὰ ταῦτα καὶ λήρα καὶ φλέβας πᾶσι ἐν αὐτοῖς μετὰ αἵματος. ἐκ ῥινῶν τε εἰσὶν αἵματος ἢ νῆκ' ἡδὴ μὴ δὲ πᾶσι ἑπιλησησῶν ἐμπροσθεν ἀκρυβῶς πᾶσι τῶν, κροκιδίξοι τε καὶ καρφολογῶσι καὶ πυρετῶν ἰχασίσι ἀσχημερῶς. ἔστι μάλιστα ἐφ' ἑκάστην μεταβολῶν πᾶσι τῶν. ὡς περ ἄλλοι πᾶσι, αἵματι γὰρ σφοδρῶς ἰχασίτες, ἑπιλησησῶν δὲ πᾶσι τῶν φρεσῶν. τὸ δὲ λέγειν περὶ γλώττης ἰκανῶς τῶν φρεσῶν, ἢ τῶν φρεσῶν ἐκὼς, καὶ ποτε καὶ κατὰ τῆς σκευῆς ἑπιλησησῶν ἑπιλησησῶν, ἢ μέρους πᾶσι ὀδυνῶν ἔχοντες, ἑπιλησησῶν δὲ ἑστῆσι, οὐ δ' ὅλως αἰσθάνεσθαι. καὶ σφοδρῶς ἑστῆσι αὐτῶν θίγη. κατὰ βραχὺ γὰρ ἐστὶ ἐπ' ἐγκέφαλῳ πάσχει φρενίτιον. ἐπ' ἄλλῳ δ' ἐδὲν μορίῳ τὸ διλεκεῖς ἐστὶ δὲ τῶν φρεσῶν, ὅτι μὴ διὰ φρεσῶν μόνῳ. πλεονεξίαν γὰρ πᾶσι καὶ τὰ διλεκεῖς, ὡς δὲ αὐτὸ ἔστι δὲ ἑστῆσι τῶν παλαιῶν, ἑστῆσι τῶν μορίῳ τῶν φλεγμῶν, γίνεσθαι φρενητικῶν, ὀνομασίῃ τε φρένας αὐτὸ διὰ τῶν αὐτῶν ἑστῆσι. ὡς καὶ τῶν φρεσῶν μορίῳ συμβαλλόμενον π. διλεκεῖται δ' ἡ δὲ τῶν τῶν φρεσῶν τῆς φρενητικῆς, πᾶσι τε κατὰ ἑστῆσι ὀφθαλμῶν συμπλάμματα, καὶ πᾶσι ἐκ τῶν ῥινῶν αἵματι



ἐκείνην ἐπὶ τῆς ἀναπνοῆς εἶδει μέγα μὲν γὰρ καὶ
 διὰ πολλὰ χρόνια τὸ πνεῦμα τοῖς ἐπιεγκέφα-
 λω φρενιπκοῖς ἐφείξῃς ἐπὶ αἰ. τοῖς δ' Ἰππ
 τῆς φρέσιν, αἰώμαλον. ὡς καὶ μικρὸν ποτὲ γε-
 νιάσθ, καὶ πυκνὸν αὐθις τὴν ποτὲ μέγα καὶ σεναγ-
 ματώδες. δέχομύτης μὲν τοῖς κατὰ τὸ Διά-
 Φραγμα φλεγμονῆς πρὶν ὡσαύφρενηται μι-
 κρὸν, ἐπικνὸν ἀναπνεύσιν, ἐμπάλιν τοῖς ἐπι-
 εγκέφαλω. ἀποηγείτω γὰρ ἐκείνοις μέγα καὶ
 ἀραιὸν πνεῦμα καὶ σκελόντι φᾶσαι, τῶν εἰρη-
 μύτων δὲ πρὶν ἀποηγείσθ φρενιπδοῦ, ἢ πρὶ γ'
 εἴη ἢ μικρὰ συμβαίνει τοῖς δέχομύτοις φλεγ-
 μῶν τὸ ΔιάΦραγμα, κατὰ πρὶν γε πάλιν ἀ-
 ναπνεύσιν μὲν ὑπερῶν ἰθὺς αὐτῶν τῶν
 φρενῶν παχυσῶν, ὁμοῦ ἐξ ἀρχῆς ἐπιεγκέ-
 φάλω ἢ ἐπὶ τῶν ὑστερῶν ὀπρῶν μύτων, ἢ δὲ
 κατασκαζομύτης ἢ πάθος καὶ σὺν δέχομύτης.
 καὶ ἢ φρενῶν δὲ πρὶν ἐπὶ κατὰ τὴν κέ-
 φαλήν, καὶ τὸ πρὶν ὀπρῶν τῆν ἐν αὐτῇ τῆν κέ-
 φαλή τῶν κατασκαζομύτων ἐχόντων τῆς ὡσαύ-
 φροσύνης.

à naribus stillis, atque spirationis specie
 Quippe phreniticorum spiratio magna est,
 & ex longis semper intervallis : contra ubi
 à septo delirium oritur, inæqualis : ut modo
 exigua sit, atque frequens, modo magna
 & angustiosa. Nam incipientē septi trans-
 uersi inflammatione, priusquam delirent
 laborantes, exiguum ac frequentem reddunt
 spiritum : contra ijs, qui ob affectum cere-
 brum delirant, magna prædit raraque spira-
 tio. Atque ut summatim dicam, ueluti eorum
 accidentium, quæ phrenitidem antecederet
 diximus, aut nullum apparet, aut si apparuerit
 aliquod, id perexiguum est, in his, quibus
 septum transuersum inflammatione laborate
 incipit : ita tursus intendi præcordia, septi
 transuersi, illico ab initio affecti proprium
 indicium est : id quod affecto cerebro po-
 sterior accedit, non incipiente uidelicet, affe-
 ctu, sed cum paratus iam fuerit. Atque ca-
 lor quoque circa caput, & faciem uehemen-
 tior est ijs, qui ob cerebri uitium delirant.

ΠΕΡΙ ΛΗΘΑΡΓΙ-
 ΚΩΝ.

DE LETHARGI-
 cis.

Κεφάλ. θ.

Caput II.

Παῦλ. αἰγ. βιβ. γ. κεφ. θ. Καὶ ὁ λήθαρ-
 γος βλάβητις ἐπὶ ἀρχῶν ἔλογικῆ, τὴν μὲν
 ἔχει τὸν αὐτὸν τῆ φρενιπδοῦ. φρενῶν τὸν ἐγκέφα-
 λον ὑλλῶν δὲ τῶν ἐναντίων, ὅτι φλίγματι γὰρ
 ὑγροτέρω καὶ ψυχροτέρω διαβρέχοντι τὸν ἐγκέ-
 φαλον. γίνετ' ἢ παρῆτι ἢ τοῖς λήθαργκοῖς πυρε-
 τὸς βληχρὸς, ἐπικνὸν ἀκνώδης, μὲν κατὰ φρενῶν.
 οἱ δὲ σφυγμοὶ ἔπις, μέγαλοι καὶ ἀραιὸι καὶ κλο-
 νώδεις εἰσι. καὶ ἀναπνοὴ δὲ, ἀγαν ἀραιὰ, ἐπὶ ἀσ-
 θενῆς, ὑπερῶν πρὶν ἀπαντῆς εἰσίν, καὶ δυσ-
 γέρι, καὶ δυσπρόκρι καὶ ἐρωτηθῶσι. καὶ ὀπρῶν
 λήθμονες, ἐπὶ φρενῶν χασμῶνται πρὶν
 νῶς, καὶ μύτων ἐπὶ, ὅτι κενυόντες, ὡς ὀπρῶν
 λήθμονες τὸ μύτων τὸ σῶμα. Διαχωρῶσι δὲ
 διὰ γαστρὸς οἱ μὲν πλείους ὑγρότερα, πρὶ δὲ καὶ
 τεταντίον ἢ γαστρὸς δόση ἡραίνεται. καὶ ἐρῶσι
 ὅποια τῶν ὑπερῶν. τίνες δὲ καὶ τρέμωσι,
 καὶ πρὶν ἰδρῶσι. καὶ ὁ κάρθ' δὲ τῆς αὐτῆς ὡν
 ὑλλῶν τῶ λήθαργω τῶν διὰ φρενῶν, τῶ τὸν πυ-
 ρετὸν ἢ γαστρὸν μὲν ἔπικνὸν, καὶ σφοδρότερον
 εἶναι. ἐπὶ δὲ τῶ λήθαργω, καὶ τῶ τὸν μὲν κί-
 ρον, ἐπὶ τῶν ἐπὶ σὺν πρὶν ἡμασι. παροξυσμὸς

Paulus Aegineta lib. 3. c. 9. Lethargus
 cum itidem rationalis uis quædam noxa
 sit, eundem quem phrenitis locum, cerebrum
 inquam occupat : sed contrariam habet ma-
 teriam, pituitam scilicet, humidiores & fri-
 gidiorem ; cerebrum irrigantem. Comitatut
 autem ueternosos, lenta quædam & ignaui
 febricula, non admodum mordax, cum de-
 latione in somnum profunda. Pulsus mag-
 ni, rati & undosi. Respirationis nimis rara
 & imbecillis, somnique in uictum desiderium
 : inactuosi & matore quodam languidi
 sunt : egrè uocantibus respondent, obliuiosi,
 desipientes, oscitant etebrō, & ore aliquan-
 diu distento manent, quasi id claudere obliti.
 Deiciunt autem per aluum plerique humi-
 diora : quibusdam uerò contrario modo nen-
 ter arefcit : lotium iumentorum urinæ simile
 reddunt. Nonnulli ex eis intremiscunt, &
 undique sudant. Caterum caros ex eadem
 lethargi materia proueniens, eo tantum ab
 illo distat, quod carū febris uehementior præ-
 cedit, lethargum sequitur : quodque carus alijs
 aliquot symptomatis superuenit : febrili pura
 exacer-



exacerbationibus plernaque & comitialibus, & coarctationibus cerebri: nunc quidem fracta caluaria: nunc uerò membrana anteriorem cerebri uentriculum ambitu seruante oblaſa. Vt cum lethargus peculiarem quandam constitutionem habet.

διε γὰρ θλιγίνεται πλάκας πυρετῶν καὶ θλιψίαις, καὶ θλίψεις ἐγκεφάλου. ποτὲ μὲν ὄσπου πλουύτος ἐν κατάγμασι ποτὲ δὲ τῶ μίλιγγροφύλακθ τὴν ἐμπροσθίαν τῆς ἐγκεφάλου κοιλίας: τὸν δὲ λήθαργον ἰδίαν τινὰ σύστασιν ἔχει.

DE TABE.

Caput III.

PAulus Aegin. lib. 2. c. 31. Hæctica febris non in humoribus modo ac spiritu, sed in solidis etiam partibus consistit: dolorisque expertus existit: qui occupati nequaquam se febricitare autumant: neque enim ardotem sentiunt, omnibus ad usum corporis partibus iuxta non admodum calentibus. Duplex uerò hæcticarum febrium species est: una quidem ardentibus febribus ut plurimum superueniant, quæ tantum prorogantur, ut longitudine temporis madorem, qui in cordis corpore existit, consumant: uel plurima ipsius parte seruata adhuc permanente. Quæ uerò persistente adhuc humiditate generantur, ubi cordis corpus occupauerint, hinc maximè accenduntur. Iam una quidem hæcticarum febrium dicta est originationo. Reliqua est, cum à principio statim inuadunt, primam originem febribus diarijs minimè dissimilem, ex tristitia, ira, lassitudine maiore, unà cum æstu solis sortitur. His quippe non est arduum mederi: atqui si in marcorem, quem marasimum nuncupant, hæcticz perueniunt, nullo medicamento uincuntur. Hæcticanè febris hæctica coincidens marasmo, promptissima est cognita. Oculi namque perquam immensam concauitatem præferunt, & hærent lemæ in circumferentia sicca, & squalida quædam elucet dispositio. Vitalis flos coloris ipsorum emarceuit: frons atida est, atque intenta: hac detenti dormituri entium more identidem conuiuent. Nec est affectio somnus, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt, & quid aliud quam ossa & cutem præferunt? aded ut si nudato corpore in partes ad uentrem attingentes oculos intendas, neque ex intestinis, neq; ex uisceribus aliquod superesse censueris: præcordiaq; uehementer sursum conuellantur. Cutis sumè resiccata est: pulsus tenuis frequens, & durus.

ΠΕΡΙ ΜΑΡΑΣΜΟΥ.

Κεφάλ. γ.

Παύλ. αἰγ. βιβ. β. κεφ. λ α. Ο ἐκπικὸς πυρετός, οὐκ ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ ἐν τῷ πνεύματι συνίσταται, μόνον ἀλλ' ἤδη καὶ τῆς θερμασίας, ἀπάντων αὐτοῖς ὁμοίως ἐκ τῆς θερμασίας τῶν μορίων. διττὸν δὲ εἰσιν εἶδη τῶν ἐκπικῶν πυρετῶν. οἱ μὲν γὰρ, ἑπὶ καυσώδεσι πυρετοῖς ὡς τὰ πολλά ζινοῦται ἢ τοι μηκυθεῖσιν εἰς ποσῆτον, ὡς ἐκ διαπνήσεως τῶ χρόνῳ τὴν ἰκμάδα τῆς καρδίας σώματος. ἢ καὶ μὲν ἐπὶ συκνῆς. οἱ δ' ἐπὶ μὲν ἐπὶ τῆς ὑγρότητος γιγνόμενοι, τὸ σῶμα τῆς καρδίας καταλαμβάνοντες, ἐπιπύθεν ἀνάπτονται. ἢ μὲν δὲ μία γένεσις αὐτῶν εἴρηται, καταλοιπὸς ἐστὶν ὅταν ἐξ ἀρχῆς ὀβέως εἰς ἑαλλῶσιν, τὴν πρῶτῳ γένεσιν ὁμοίαν ποιησάμενοι τοῖς ἐφημέροις ἑπὶ λύπῃ καὶ θυμῷ καὶ κόπῳ πλείονι μετ' ἐγκαύσεως ἅμα γενομένη. τέρας μὲν ἔχει χαλεπὸν ἐστὶν ἰαθεῖ. τὸς δὲ ἐξ αὐτῶν εἰς μαρσμοὺς ἀφικνεύμενοι, ἀδύνατον ἐστὶν ἰαθεῖ. ὁ δὲ δὴ συνειπιπῶν τῷ μαρσμοῦ πυρετός ἐκπικὸς ἐτοιμώτατος ἐστὶ γινώσθηναι. ὀφθαλμοὶ τε γὰρ κοίλας ἀμέτρως θρασῆ καὶ λήμας κατ' αὐτὸς ἐμφερομῆρας ξηραῖς, καὶ πνα αὐχμῶδη διαθέσιν ὀπλωκὸς δὲ καὶ τῆς χροῖας αὐτῶν τὸ ζωπύρον αὐθῶ. καὶ τὸ μετώπον ξηρὸν καὶ περὶ τὰ μύρον καὶ μύρον τοι καὶ μύρον ὡς τὰ πολλά καθάπερ ἐπανάπτοντες. ἐστὶ δὲ ἔχ' ἑσπῶν τὸ πᾶνθ, ἀλλ' ἐξηγήσεως ἀδυναμία καὶ κρόταφοι συμπεπλοκόπες εἰσιν. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ ὅτι καὶ δερμα μόνον εἰσι; καὶ εἰ γυμνώσας ἑπὶ σκέπῃοι τε κατὰ τὴν γαστέρα, δόξει σοι μήτε τῶν ἐντέρων μήτε τῶν σπλάγχων μηδὲν δόσῶ ζεῶθ' καὶ τὸ ὑπόχονδριον ἀνεσπῶθ' σφοδρῶς. καὶ τὸ δερμα δὲ αὐτῆς ἐχάτως καρφαλέον ἐστὶν. ὁ σφυγμὸς ἰσχνὸς καὶ πυκνὸς ἐσκληρὸς.



ἢ ἢ θερμασία κτ' ἴδιον πρῶτον εἰς βολὴν ἀμαυρά, μετ' ἄλιγον ἢ πρῶτον κ' ἀσβερωπὴν ἐνδείκνυται. μέχρι μὲν ἔν τ' ἀσβερωπείᾳ τῆς ὑγρασίας, ἐκπῆξ μόνον πυρετὸς ἐστίν, ὅταν ἢ εἰς κίνδυνον ἢ κ' ἔμμελιν, εἶναι τ' ἑαυτῆς ὑγρότη- τ' ἢ μηδὲν, ἀπρὸς τὴν ἰατρικὴν ἀσπίδα.

Calor autem, cum primùm manus inieitur, obscurus est, pauld uerò post, asperitatem & rosionem exhibito. Quandiu igitur humidita- tis quippiam superest, hœtica modò febris ap- pellatur. Cum uerò periculum est, ne tantillum humoris superfit, exquisitus iam marasmus constituitur.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΛΗΞΙΑΣ.

κεφάλ. Α.

Παῦλ. αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ιη. Τῆς μὲν κοι- νῆς ἀρχῆς τῶν νόρων παθῆσης, κακῆ δὲ πάντων τῶν κτ' τ' σῶμα μορῶν ἀπολείωντων πῶν π κίνησιν ἀμα, καὶ πῶν ἀσθησιν, ἀποπληξία τ' πάθος καλεῖται. μὲν ἔσ τὰς ἡγεμονικὰς ἐνεργείας ἐβλάθην, εἴ ἢ κτ' ἑπὶ μέρους ἢ ἐμ- φραξίς γένη, ἡμιπληγία κ' ἀσθενία ἐνο- μάξ' εἴ. εἰ δὲ καθ' ἑν π μέρων ἢ τριῶν συζυγῆ βλάθην, ἐκείνη τ' μορῶν τ' πάθος λεχθήσεται. Φησὶ γοῦν Ἱπποκράτης, ἀπὸ πλεονεξίας αὐτῶ τὸ σκέλος ἐγένετ', σάξεται ἔν τ' τῶν ἀποπληξί- των, βραχέα τις ἀνάπνοη, ἣτις εἰ μὲν ἴσθι πλὴ τῆς κτ' φύσιν ἐνεργείας ἐκτραπή. μεγίστη οἶσαι πῶν ἀσθησιν. εἰδ' ἐπ' ὀλίγον, βραχέως χειροί, ἢ ἐστίν, ὅταν ἀγαλιπῶναι, ἢ ἔμ βίαις μεγάλης προσγίγνηται. σπῆσεται δὲ τ' πᾶθ' ἀβρόως, ψυχρῶ ἀληροῦντος φλέγμα- τος τὰς κυριώτατας τ' ἐγκεφαλὰς κελίας. εἰ δὲ ποτε, ἢ τ' νοσήσ' ἀρχὴ ἀπῆσ' τ' τριῶν πᾶ- θοι, τ' κατὰ πάντα τ' προσώπ' ἀσθενή- σονται. αὐτῶ δὲ ἀπαθῆς μένοντ', διοπ πῶν ἀσθησιν κ' πῶν κίνησιν τὰ ἐν τῷ ἀπ' ἐγκεφά- λου δέχεται. εἴ ἢ κτ' τ' ἡμίσεως ἀσθενήσ' ἀσπῆσεται ἐκείνων τῶν μερῶν εἰ δὲ ἢ ὅσ' φρησις πάθοι, ἢ τ' τῶν ἐμπερῶν κοιλίῶν τ' ἐγκε- φάλου δυσκρασίαν ἀναδεχόμενων, ἢ τῶν ἐν τ' ἰθμοειδέσιν ὅσ' πῶν φραχθέντων, τὸ ἔσ' ἐστίν. οἱ τ' ἴσθι ἀπὸ πλεονεξίας κίνηται ἀπῆσ' οἱ, ἀκίνητοι τε κ' ἀνάσθησι, ἀνδ' πυ- ρετῶ προσγίγεται ἢ ἔσ' πάθους, κεφαλῆς ἀβρόον καὶ ὄξυ ἀλγῆμα, καὶ τῶν σφαγιτῶν φλε- βῶν ἐπάρμα, καὶ σκορδινία, τῶν π' ὀφθαλμῶν μαρμαρυγαί, καὶ ψύξις ἄλογ' τῶν ἀκρῶν, παλμοί π' τ' σῶμα τ' ὄξυ, κ' ἀσθενία, καὶ ὀδόντων τρισμοί ἐν τῷ καθ' ἑν οὐρῶσι π' οἶον ἰώδη ἔ μέλανα ὀλίγα, κ' κερμνώδη πινά ἐχόντ', ὑπόσπιν. συμβαίνει ἢ τὸ πάθος πῶν πρῶ- τυπικῶν ἢ κελίῶν τῆς φλεγματικώτατης κρῆ- σεσι, κ' διαίτη τ' ἑαυτῆ. εἰδ' ἐπ' ἐν νεότητι κ' ἕρως ὡρασση, μετὰ πῶν δηλοῖ πῶν ἀνάγκην.

DE APOPLEXIA.

Caput IV.

Paulus Aegin. lib. 3. c. 18. Quando comu- nis neruorum origo afficitur, atque inde uniuersæ corporis partes sensu simul & motu spoliantur, morbus attonitus Romanis, Græcis apoplexia nominatur, principalibus animæ functionibus oblatis. Sin in alter- utra capitis parte obstructio fiat, hemiplegia atque paralysis nuncupatur: si in alterius partis aliquam particulam incubuerit oblatio, eius tantummodo partis affectio dicitur. Crus itaque inquit Hippocrates, ipsi apoplexion euaserat, pro eo quod erat resolutum. Quocirca seruat in attonitis exigua quedam respiratio: quæ si plurimum à naturali operatione recesserit, summam esse affectionem arbitrare: si paululum, exiguam. Pessima uerò est, cum intetmittitur, uel magna etiam cum uiolenta trahitur. Fit autem affectio, gelida pituita semel, & confer- tim principalissimos cerebri sinus intarciente. Si quando uniuersum spinæ principium dicto modo conflictatur, omnes quæ sub facie constitutæ sunt partes, ipsa manente in- columi resoluuntur: eò quod partes quæ inibi habentur cum sensationis, tum motionis ui- res cerebro acceptum referant. Si uerò ex medietate affligitur, illarum partium resolutio constituitur. Vbi uerò odorandi facultas interit, uel anteriorum cerebri uentriculorum in- temperie affectorum, uel meatuum qui cith- moides à colando dicuntur, obruratorum, af- fectio est. Attoniti igitur procumbunt sine uoce, sine motu, citra sensum & absque febre. Præcedit eam affectionem, capitis repentinus & acutus dolor, puluini uenarum circa guttur (sphagitides Græci appellant) turgentes, uer- tiginis, tenebrosa lucis obscuritate oculis obuersante: oculorum incerti & discurrentes lucis splendores, frigus extremitatum absque causa, totius corporis tremor, difficilis motus, dentium in somno stridores, lotium quasi ru- biginosum, atrum, paucum, cum corpulentio- re farinæ simili hypostasi. Eo morbo facilius tentantur circa senium, maximè pituitosioris temperaturæ homines, & eiusdem naturæ ui- custratione uerentes. Si quem in iuuentute atq; æstiuo tēpore oppresserit, summam necessitatem arguit.

DE



Caput V.

κεφάλ. ε.

PAulus Aegineta lib. 3. cap. 13. Morbus comitialis, qui convulsio est totius corporis, cum principalium actionum lesione, aliquando in ipso cerebro consistentem causam habet, aliquando in ipsius uentriculis uniuersis. Hæc autem est quandoque pituitosus, quandoque atrabillarius humor. Quin & propter os uentriculi per consensum oboritur (quæthadmodum etiam in colicis, uelut in tractatione de illis dicitur) aut etiam ex aliarum partium distributione, aura aliqua frigida ad cerebrum petueniente, aliquando à crure, aliquando à digitis manus. Visus est quoque aliquando ab utero in aliqua muliere, quo tempore prægnans fuit, post partum autem sedatus fuit. Fit hæc affectio maximè pueris, & ex ijs amplius recens editis: postea uerò etiam adolescentibus, & in uigore consistentibus: minimè autem adultis & senibus. Præcedit igitur in comitialibus corporis & animæ seditio inuoluntaria, & tristitia, & familiarium obliuio, & insomniorum uisiones turbulenta, & capitis dolor, & repletio capitis assidua (maximè ex iracundia) & facies pallor, & linguæ motus inordinatus: quidam etiam ipsam mordent. At in ijs qui per consensum ex stomacho afficiuntur, etiam ipsius stomachi palpitation præcedit, & agitatio ac morsus: & in inedijs aut dilatis cibis exacerbantur. Instante uerò iam symptoate, collapsio ipsis derepente contingit, & convulsio, & quandoque nihil significans exclamatio. Præcipuum uerò ipsorum signum est oris spuma, quum reliqua etiam alijs morbis quodammodo communia sint. Quibusdam autem etiam urina & stercus inuoluntariè excernitur, aliquibus etiam semen. Quum igitur in aliquibus acutissima sit affectio, citò occidit, tum exacerbationum assiduitate, tum symptomatis uehementia. In quibusdam uerò in longum extenditur, adeò ut si non circa pubertatem aut lunares purgationes, aut imprægnationes, soluta fuerit, aut si post hoc tempus contracta fuerit, plerunque commoriatur, præterquam si conuenientem curationem consequatur. Declarant autem comitiales suffita hæc, bitumen, lapis Gagates, cornu caprinum. In cibo uerò acceptum hepaticum, & hepatis, dum assatur, odor.

Η Επιληψία, απασμός εστι παντός σώματος μετά βλάβης τῶν ἡγεμονικῶν ενεργειῶν, πῆ μὲν ἐν αὐτῷ τῷ ἐγκεφάλῳ συνισαμῶν ἔχει τὴν αἰτίαν. πῆ ἢ ἐκ τῆς τῆς κείλιος ἀπάσης. αὐτῆ ἢ ἐστὶν ὅτι μὲν φλεγματικός, ὅτι ἢ μελαγχολικός χυμός. ἐπὶ ἢ καὶ τὸ τῆς γαστρὸς σῶμα κατὰ συμπάθειαν γινέται. καθάπερ ἐπιληπτικῶν, ὡς ἐν τῷ περὶ σκείνων εἰρήσει λόγῳ ἡγουν καὶ ἐξ ἀναδόσεως ἐτέρων μορίων, αὐτοῖς πινὸς ἀνερχομένης ψυχρᾶς πρὸς τὸν ἐγκεφάλον, ὅτι μὲν δὸν ἔσπελας, ὅτι ἢ δὸν τῶν τῆς χειρὸς δακτύλων. ὠφθῆ δέ ποτε καὶ δὸν τῆς ὑστέρης ἐπιπνός γυναικός, καθ' ὃν ἐγκυοῦ ἐγένετο χροόν. μὲν ἢ τὴν δὸν πένιν ἀπεπαύετο γινέται ἢ τὸ πάθος τῆς μάλισσε μὲν παιδίους, καὶ τῆτων ἐπὶ τοῖς νεωγνοῖς, μὲν ταῦτα ἢ τοῖς μαιρακίοις τε καὶ ἀκμάζουσιν. ἢ κισα ἢ πρεσβύτης τε καὶ γέροντι. περηγῆται μὲν οὖν τῶν ἐπιληπτικῶν, σώματος ἐψυχρῆς εἰς ἀπεσάρετος, ἐδυσθυμία, ἐτῶν προσεχῶν λήθη, ἐενυπνίων ὄψης παραχάδεις, ἐκεφαλαλγία, ἐπλήρωσις τῆς κεφαλῆς συνεχῆς, ἐπ' ὄξυθυμίας μάλισσε, ἀχρότης τε προσώπου, ἐγλώττης ἀτακτος κίνησις, πνὲς ἢ ἐκαπαδάκυσιν αὐτῶν τῶν ἢ δὸν σωμαχῶ. ἐπαλμός αὐτῶν ἢ σωμαχῶ περηγῆται, ἐκλύνη, καὶ δῆξις, καὶ τῆς ἀσιτίας, ἢ βραδυσιτίας, παροξυώνται. ἐνσάντος ἢ ἡδῆ τοῦ συμπώματος, κατὰ πῆσις αὐτοῖς αἰφνιδίως γινεται, καὶ απασμός, καὶ ἀσμός τις ἐστὶν ὅτι ἀναδόσεως, ἐξάιρετον δὲ μάλισσε σημεῖον ἐστὶ αὐτῶν, ὅ ἢ σωματος εἰφρισμός. τῶν ἄλλων κεινῶς πῶς ὑπαρχόντων ἐἐτίροις νοσήμασι. πῶν δὲ αὐτῶν, ἐξρον ἀπεσιῶς ἐκκρίνεται καὶ κῶπρος ἐστὶ ἢ οἷς ἐ γόν. ἐπιπνῶν μὲν ἐν ὄξυτυπον ὑπαρχόν τὸ πάθος, παχέως ἀπέκτεινε τῆ τε συνεχεία τῶν παροξυσμῶν, καὶ τῆ ἢ συμπώματος ἰσχύι. ἐπὶ ἢ τῶν παλίωνων εἰς μῆκος ἐκτείνει ὡστε εἰ μὴ λυθείη κατὰ τῶν ἢ ἔσω, ἢ τῶς καθάρσεις, ἢ τῶς κνήσεις, ἢ εἰ μὲν τῆτον συσπῆ τῶν χροόν, ὡς τὰ πολλὰ σωμαποθήσκει, χωρὶς ἐμὴ τῶν προσεχῶν ἰάσεως ἐπιτύχοι. διελαγχαι ἢ ὄν. ἐπιληπτικῶς θυμωῶνμα, ἀσφαλτος, ἢ γαράτης λίθος, ἢ κέρρας αἴγιον, ἐδῆ ἰάδμου ἢ ἢ παροξυών, καὶ ἢ ἐσμὴ ὄπλο μὲν ἢ ἢ πατ.

ΣΗΜΕΙΑ



ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ

πρωτοπαθήσεως κεφαλῆς Ἰππληψίας.

tialis, ex primario capitis affectu excitati.

ΑΛ. Τραλ. βιβ. α. κεφ. ιε. Οἱ τῆς κεφαλῆς πρωτοπαθήσεως πασχόντες, ὄχι πάντες, ἀλλ' οἱ πῶς εἶσι. καὶ γὰρ βαρύνονται πρὸς τὴν κεφαλὴν, καὶ σκοτίζονται, καὶ ἀμβλυώθησι, ἔθραδύως αἰσθάνονται. παιδίοις ἢ μάλιστα ἔπι συμβαίνει τὸ πάθος, δεξιόμοιο οὐκ ὑμεῖς, ἀπὸ τῆς παιδικῆς ἡλικίας δεξιόμοιοι. εἰ μὴ οὐκ ἔστι θρεφθῆναι, ἢ καὶ γάλακτι μεταλαμβάνει, ἄδεν δὲ πλεονεργονεῖν, οὐδὲ πρᾶττειν τῶν θεραπειῶν ἐχομένων. ἐπερχομένη γὰρ ἡ ἡλικία καὶ τὸ θερμὸν ἀσθενήμονος διαφύρει τὴν περὶ τοῦ σώματος πρὸς τὴν κεφαλὴν ὑγρασία, ἔπι πληροῦσιν αὐτῆς τῆς κοιλίας. ὁμοίως συμβεβηκέναι δὲ ἡμᾶς, καὶ φροντίζεν, ὅπως τὸ γάλα τῆς τρεφούσης χρηστὸν καὶ ἀπερίττον εἴη. μοχθηρὸν γὰρ ὑπερβαρὸν καὶ παχὺ, μάλιστα οἶδεν ἐμποδίζει τῆς φύσεως. γίνονται δ' αὐτῶν καὶ εὐχυμον, ἐὰν τῆς τροφῆς περισσεύῃ καὶ τοῖς γυμνασίοις, ὥστε καὶ μετρία γυμνασίου τὴν τροφὴν, καὶ τροφῆς δόσεις κεχρησθῆναι. εἰ μὴ οὐκ ἔστιν εἴη τὸ γάλα, παχύνειν αὐτὸ μετρίως δὲ. εἰ δὲ παχὺ, λεπτιώων πρὸς οἶον, μάρμαρον, ἢ ἀνήθον, ἢ αἰσιν, ἢ εὐζωμον, ἢ πήραν, ἢ πρᾶσον. πάντων δὲ τῶν χλορῶν ὄντων περισσεύεται. τὰ γὰρ ξηρὰ δριμύτερά μᾶλλον ὄντα, πλεονεργονεῖ τὰ καὶ τὴν μητέρα ἀγγεῖα. καὶ τὸ αἷμα τῶν καμνίων Ἰππληψίας περισσεύεται. ἔπι εὐδέν ἐστι χεῖρον, ἔλαττον γὰρ ἀνάγκη διατῆται καὶ τὸ γάλα γίνεσθαι, τῆς αἱματὸς ἔλαττον γινόμενου διατῆται καθαροῦ. διατῆται καὶ τὰ ἀφροδίσια κάκιστα, πρὸς θηλασίαν. λεπτιώων γὰρ καὶ δεξιόμοιοι ἀνάγκη γίνεσθαι τὸ γάλα. εἰ δὲ συμβῆ ἔπι συλαβῆναι, ἔπι μᾶλλον ἐλευθέρωρον, καὶ φάσκειν δὲ ἐκείνῳ τὴν τροφὴν ὅπως ἔπι δίδοναι τὸ μᾶλλον τῶν παιδίων, ἀλλήν ἢ μᾶλλον ζητεῖν ἐχέουσαν γάλα

A Lex. Tral. lib. i. c. 15. Qui primario capitis affectu laborant, omnibus sunt manifesti. Etenim grauantur capite, oculi obscurantur, & caligant, tardè quæ sentiunt. At hic affectus pueris potissimè accidit. Nos igitur à puerili ætate incipientes, reliqua persequamur. Quòd si infans est, uel etiam lac assumit, nihil molendum est, neque agendum, quantum ad curationem attinet. Subsequens enim ætas, & calor augetur superfluum in capite humiditatem, replentemque ipsius uentriculos discutit. Attamen iuuare nos, curamque habere oportet, ut lac nutricis benignum sit, & recrementis liberum. Nam quod uitiosum & crassum est, ualde solet naturam impedire. Fiet autem probi bonique succi, si nutrici animum adhibeas, & exercitijs ut ipsa & mediocriter exerceatur, & cibis boni succi utatur. Si igitur lac fuerit tenuis, paulo ipsum crassius efficere conuenit: si crassum, extenuare quibusdam, quale est fœniculum, aut anethum, aut anisum, aut crucam, aut rutam, aut porrum. Omnia autem hæc dum uiridia sunt, assumantur. Nam sicca, cum magis sint acria, plus uteri uasa aperiant, & nimis sanguinis menstruorum uacuationes incitantur: quo nihil est deterius. Nam hinc necesse est etiam lac imminui, dum sanguis purgatione decreuit: quare etiam uentus nutricis pueris lactentibus est nocentissima: quippe lac hinc tenuis & fœtidi odoris fieri necesse est: si autem contingat etiam concipere, adhuc multo fit perniciosius, ac cauendum est, ne illa omnino uentus pueri mamillam porrigat: sed alia potius querenda est quæ lac habeat benignum.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ

SIGNA COMITIALIS morbi, ex alia particula contracti.

ἑτέρῳ μορίῳ Ἰππληψίας.

Οἱ δὲ ἐπὶ πνιμορίῳ καταπίπτοντες, αἰσθάνονται σαφέως τὴν ἀνάδοσιν γινόμενον ἔπι τῆς αἰσῆς, καὶ προσλέγεται τὸ μέλλον αὐτοῖς εἶσοδος τῆς ἀνάδοσως ἔπι τῆς ἐγκέφαλον δεξιόμοιοι γίνεσθαι. συμβαίνει ἢ τὸ πάθος καὶ παιδίοις, ἔπι μάλιστα πρὸς ὑψηλότεροις, διὰ καὶ παιδικὸν αὐτὸ πνιμὸν ἐκάλισσαν.

Qui uerò ob particulam quampiam concidunt, distributionem mali ad superiora fieri, manifestò percipiunt: & id quod futurum ipsis est prædicunt, quum distributio uitij ad cerebrum uerge- re incipit. Accidit autem hic affectus etiam pueris, præsertim humidioribus: qua de causa nonnulli puerilem ipsum nominant.



ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΕΙ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ

CAPPADOCIS

. ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥ

MEDICI INSIGNIS,

De Comitialis morbi accessione.

Κεφάλ. ε.

Caput V.

* ἀμβλύτητες, ἰλιγγίαι, τενόντων βαρέα, φλεβῶν ἐν τῷ τραχήλῳ πληρώσεις καὶ διαστάσεις. ναυτία τὰ πολλὰ μὲν ἐπιπίσις, ἐχ' ἤκιστα δὲ καὶ ἀπ' αἰτίας, καὶ βληχρῆ, καὶ βλέγμα ἐμειῖ) συχνόν. ἀποσιτή καὶ ἀπεψία ἐπι σμικροῖσι ἐδέσμασι, φυσώδεις, ἐπημελῆροι ὑποχόνδρια. ταῦτα μὲν οὐκ διλυκεῖα· ἡ δὲ πλησίον * εἶδεθ' ἢ ἔπαρξυσμῶν, κύκλωμα μαρμαρυγαὶ παρὰ τῆς ὄψεως πορφυρέων ἢ μελάνων, ἢ πάντων ὁμοῦ συμμεμιγμένων, ὡς δοκέειν ἐν τῷ ἔρασι τετανυδίαι. ἢ χροῖων, βαρυοσμῆ, ὀργίλοι, πικρόχολοι παρὰ λόγως. κατέπεσον γὰρ πινὲς ὑπὸ παρὰ φάσιος ἔξ ἀδυμῆς. μετεξέτεροι δὲ ῥόμα πι ποταμῶν ἀτενέες ἐνιδόντες, ἢ τροχῶ διδυμῶν, ἢ * ἑμβικιέλισοι μὲν. ἄλλοτε ὅσφι φησὶ βαρέων ὀσμῶν * κατέβαλε, ὡς ἐξ ἔργα γαγάτε λίθου. τίς δὲ μὲν ἐν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ κακὸν ἐσπείχθη τὲ, καὶ ἐντεῦθεν πημανθὲν ἀρχεται. μετεξέτεροι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν πορρωτέρων τῆς κεφαλῆς νεύρων, ὁκόσα ξυμπαθεῖα τῇ δαχτῆ, γίνε). δάκτυλοι γὰρ μεγάλοι χειρῶν ἢ ποδῶν ξυέλκον), καὶ πόνος, καὶ νάρκη, καὶ τρέμου ἐπιεται. καὶ ἐς κεφαλῆ * τουτέων ἢ ὀρμητικῆν, ἡ δὲ ἔρπον τὸ κακὸν εἰς τὴν κεφαλῆν ἵκη), πάταγος

* hebetudines, vertigines, tendorum gravitates, venarum colli repletiones & distentiones, nausea frequentius quidem à cibus; non minime tamen & ab inedia pusilla quædam nausea sequitur, & uberior pituitæ fit vomitus: paucis assumtis cibis fastidiunt, & crudi sunt: flatibus replentur, præcordia elata habent. Hæc sanè perpetuò comitantur. Cum verò accessio appropinquat, splendores quidam purpurei, aut nigri, aut omnes unà permixti ob oculos in orbem versantur, ac discurrunt, ut in caelo iris prætenta esse videatur: foedum odorem sentiunt: aures sonant, iracundi fiunt: bilis præter rationem accenditur. Quidam igitur leui de causa, utpote ob animi angorem, ceciderunt: aliqui intentè fluminis decursum, aut rotam, quæ circumvoluitur, aut turbinem, qui in orbem agitur, conspicati: alios autem rerum grateolentia, ut gagatis lapidis odoratus prostravit. His utiq; in capite vitium inhæsit, atque inde noxam inferens ortum habet. Nonnullos verò & corripit à neruis procul à capite positis incipiens, quicunque principium in consensum affectus inducunt. Itaque magni manuum, aut pedum d' ti conuelluntur: unde & dolor & stupor & tremor sequuntur: atque hæc in caput impetum faciunt, si & malum surrepens in caput inuasit. His porrò fragor quidam redditur, per-

Α του-



τουτέοιοι γίνε) ὡς ἀπὸ πληγῆς ἢ
 ξύλου, ἢ λίθου· καὶ Ἰξανασαυτες ἐκδι-
 ουγῶν), ὡς ἀπὸ τῆς Ἰπιδελῆς πα-
 ταχθέντες. ἡ δὲ μὲν τῆν ἀπάτη γί-
 γνε), ὁκόσοιοι τῶδε πρῶτον τὸ κα-
 κὸν ξυώπεσαν. οἷς δὲ ξυώηθες τὸ πά-
 θῶ, ὡ ἐπήμω ἢ νῆθς, ἐς δάκτυ-
 λον δὲ ἢ δὴ ἀφίκη), ἢ ἀπὸ τευ ἀρ-
 ξη), ξυωθήεας δρωγῆς καλέεσι ἰδῆς
 παρῆοντα, παρῆοντα τῶ μέλλοντα
 ἰπὶ * ἐμπειρίας. διασφίγειν τὲ καὶ
 * ἀνακλαίειν καὶ σωτείνειν δέον) τα
 καλῆρχοντα μέρεα, καὶ αὐτοὶ ἵ ἐωυτέ-
 οιοι ἐλκασσι τὰ μέρεα ὁκώσσερ τῶ
 νῆθον Ἰξαρμῆμοι. καὶ σφῆων ἢ τῆ δὲ
 Ἰπικερῆ ποτε, καὶ ἐς τῶ * ἡμετέρω
 σημασίω διώσαθ. πολλοῖσι δὲ φό-
 βος ἐστὶν ὡς Ἰπρόντος θηρείε, ἢ σκῆς
 φουλασίη, καὶ ἔτω κατέπεθον. ἐν ἣ τῆ
 σημασίη, ἀνακλαίειν μὲν κέε) αὐ-
 θρωπῶ. χεῖρες ἵ οἰσασμῶ σω-
 ἔρχον), σκέλεα ἔ διαπεπλεγμῆμα
 μένον. ἀλλὰ τῆ δὲ κακῆσε βαλλό-
 μῆμα αὐτέῖς ἀπὸ τῆ τενόντων. ἐ-
 σφαγμῆμοισι ταύροισιν ἢ δὲ ἰκέλη ἢ
 ξυμφορῆ. αὐχλῶ ἀγκύλος, κεφα-
 λῆ ποικίλως διάσροφος. * ἀλλοτε μὲν
 γδ ἐς τὸ πρῶτες ὄξῆ), * αὐτε ἐς τὸ
 σερνὸν ἢ γένυς ἐρεΐσει, ἀλλοτε δὲ ἐς
 τὸ μετὰ φρενον ἀνακλα), ὁκώσ τοῖς
 ἀπὸ τῆς κόμης ἐλκωμῆμοισι βίη, εὔτε
 ἐνθα ἢ ἐνθα Ἰπὶ σῆσ ὡμῆς ἰζαίει.
 χάσκει μέγα, σῶμα ξηρὸν, γλώσ-
 σα παρῆμῆς, ὡς καὶ κίνδωον τρώ-
 ματος μεγάλα γίνεαθ, ἢ ἀπὸ τῶμῆς
 ποτε σασμῶ ξυωρεΐσσειν οἱ ὀδόν-
 τες. ὀφθαλμοὶ ἐν δὲ δινημῆμοι, βλε-
 φαρά ἀπολλὰ διέχοντα ξυώπαλ-

inde, ac si ab ligno aut lapide verberentur. Cumque ab humo surrexerunt, quædam tanquam si ex insidijs vapulassent, commemorant. Hoc sane pato illi, quibus primò id malum incidit, decipiuntur. Quibus verò familiare & consuetum est, simul atque morbus in digitum impetum dedit, aut alicunde exortum est, usitatos, qui adsunt, adjuutores inclamant, futuramque ab experimento calamitatem prospiciunt : obsecrant quoque, ut membra, unde oritur, constringant, reflectant, dirigant. Quin etiam ipsimet sibi ipsis affecta membra, tanquam inde morbum eximentes trahunt, velluntque : atque ita sibi met auxiliantes, nonnunquam & nos ad ægritudinis notitiam impulerunt. Nonnullos utique ceu inuadente fera pavor corripuit, aut adumbrationis opinio incessit, atque ita prociderunt. At in ipso morbi insultu sensibus captus homo jacet : manus ipsi nervorum distentione conuelluntur. Crura verò non solum distracta sunt, sed etiam huc atque illuc à tendonibus projiciuntur. Id genus calamitas jugulatis tauris haud absimilis est : ceruix incuruatur, caput variè distorquetur. Siquidem nonnunquam prònum, ceu arcus, inflectitur, quando pectori maxilla adhærescit : nonnunquam verò in scapulas refringitur : veluti his, qui per vim crinibus trahuntur, usu venit, quando modò in hanc, modò in illam partem ad humeros admouetur. Sic laborantes magno hiatus os aperiant : id siccum habent, linguam prælongam : ut periculum sit, ne aut magno vulnere saucietur, aut penitus abscindatur. Interdum conuulsione dentes inter se colliduntur : oculi inuersi sunt : palpebræ cum palpitatione frequenter dehiscunt. Quod

* ἀπειρίας.
 * ἀνακλαίειν
 & ἀνακλαίειν.
 * ἰπὶ τῶ ἡμέ-
 ρω.
 ἔ. σπ.



si quando conuiuere velint, palpebræ non committuntur, sed alba oculorum cernuntur, ac subapparent: supercilia nonnunquam (ut his, qui ad iram concitantur) in glabellam attrahuntur: nonnunquam ad tempora vehementer admodum reuelluntur: ut cutis circa frontem valde prætenta sit, atque in superciliarum medio rugæ euanuerint. Malæ rubentes palpitant. Labiâ interdu quidem in acutum clauduntur: interdum verò ad obliqua dilatantur: quando in ridentiſ speciem dentibus circumtenduntur. Malæ rubent quidem; ſed cum morbus increuit, & faciei liuor accedit: ceruicis vaſa diſtenduntur: vox, ut in ſtrangulatu, aufertur. Etiamſi vehementer in clamet, non ſentiunt. Eorum vox nihil niſi gemitus & ſuſpirium eſt. Reſpirationo verò ſuffocatio quædam eſt, veluti in his, qui laqueo ſtrangulantur. Inter initia arteriarum motus vehementes ſunt, & celeres, & parui: in fine verò magni, tardi & languentes: in uniuerſum autem ordine carentes. Penis quoque arrectio ſequitur. Hæc utique circa acceſſionis finem patiuntur. At ubi ad mali remiſſionem perueniunt, tunc ſponte urinam reddunt, alius fluit: nonnullis etiam adſtrictis comprefſiſque vaſculis genitura excernitur. Id verò & dolore irritante, & humiditate erumpente accidere poteſt: Si quidem & iſtis neruorum dolores fiunt. Ad hæc os vehementer humidum habent: pituitam multam, craſſam & frigidam: eam ſi trahas in longum, veluti filum, ipſius multitudinem diduces. Porro temporis longitudine, & laboris vehementia, quæ intra peccus ſunt, feruent.

μῶ. ἢ δὲ ἐπιμύσαι κοτὲ ἐθέλοιεν, ἐξυμβάλλασαι τὰ βλέφαρα, ὡς καὶ τὰ λυκά ὀρεῖας δὲ ὑποφάσι. ὀφρύες, ἄλλοτε μὲν ἐς τὸ μεσόφρουον ἀνιψύραι, ὅπως τῖς χαλεπαίνεσι· ἄλλοτε δὲ ἐς ὄφρυ κροτάφους ἀπηνύραι, πολλὸν τι μάλλον, ὡς τὸ δέρμα παρὰ τὸ μέτωπον σφόδρα παρῆται, καὶ τὰς τῆ μεσοφρύου ρυτίδας ἐξηλιθίφθαι· μῆλα ἐρυθρὰ, παλλόμενα χάλεια, * κοτὲ μὲν ἀμφω * ποτὲ ἐς ὄξυ μεμυκότα, ἄλλοτε δὲ ἐς τὰ πλάγια ἀπηνύραι, ὅτε τῖσι ὀδοῦσι παρῆται τῖσι μεθῶσι ὁμοίως ἐρύθημα μῆλων. ἐν αὐξῇ δὲ τῆ κακοῦ, καὶ πελιδνότης τῆ προσώπου προσγιγνέται ἀγρίων τῶ ἐν τῷ αὐχένι διάτασις, ὡς ἐν πνιγί ἀφωνή, ἀναισθησί, καὶ εἰ μέγα ἐμβοῆς. νυγμός ἢ καὶ σφραγμός ἢ φωνή, καὶ ἢ ἀπνοή, καὶ ἢ πνιξ ὡς ἀπαγχομῶ· σφυγμοὶ σφοδροὶ, καὶ ταχέες, καὶ μικροὶ ἐν τῆσιν ἀρχῆσι. μεγάλοι δὲ, καὶ βραδέες, καὶ ἠσθητοὶ ἐπὶ τῷ τέλει, ἀτακτοὶ δὲ ἐς τὸ ξυμῶλον· αἰδοίων ξύντασις. τὰ δὲ μὲν οὐκ εἰς τέλος τῆσ σημασίας πάχασαι. ἢ δὲ ἐς ἀφειν ἀφικνέον τῆ κακῆ οὐρα αὐτῶμα, κοιλίης παρῆται. μετεξέτεροι ἢ καὶ γονῆσ ἀπόκρσις τῆ δλίψη καὶ πῆσι τῶ ἀγρίων, ἢ γαργαλισμῶ ἢ πόνου, καὶ ὑγρασίης παρῆται. γίγονται ἢ ἐν νύκτι πόνου καὶ τῖσδε. σόμα δύστρον, φλέγμα πολλόν, παχύ καὶ ψυχρόν, καὶ εἰ ἐλκοὶσ αὐτῶ, ἐπὶ μάλλον αὐτῶ πλῆθος αὐτῶσ μηρύσαιο. * ἢ δὲ χροῖω μακρῶ καὶ πόνω πολλῶ βραδῆ μὲν τῶ ἐνδόν ἢ θώρακος, * ἐν ὄφρυ



πνύμα δὲ ἐνκάτερχθ' ἐν τῷ παύσει. σπασμὸς ὃ καὶ τῶν αἰπίων ἐπὶ κλύδων ὃ ὑγρῶν ἀναπνέει ἐς τὰς διαπνοὰς, σῶμα καὶ ῥίνα, σὺν ὑγρῶ τὸ πνύμα, ἀνεσις * δὴ τῆς πρῶ-
 δ' ἐν πνίξι. ἀπᾶντων ἔοικε. ἀφρον-
 δ' ἐλποπίεσι ὡσπερ ἐπὶ τῆσι μεγά-
 λοισι πνύμασι, ἢ θάλασσα τὴν ἀχ-
 νῶν. εὔτε καὶ ἔξαιέσαντα δὴθεν ὡς
 τελευτήσαντες τῆ κακῆ. ἐπὶ δὲ τῆ
 ἐλποπαύσει, νωθροὶ τὰ μέλη ἀπώ-
 ται, καρθεακοὶ, διαλελυμένοι,
 παρερεῖ, ὠχροὶ, δύσθυμοι, κατηφέ-
 ες, καμάτω καὶ αἰχμῶν τῆ δεινοῦ.

ΠΕΡΙ ΤΕΤΑΝΟΥ.

Κεφάλ. 5.

Σπασμοὶ οἱ τέτανοι, κατὰ μὲν
 ἐπίπονοι, ὀξύτατοι ὅτι κτεῖναι, ἀτὰρ
 ἐδὲ * ῥηίδιοι λυθῆναι. μὴ τῶν ἐν
 γνάθοισι καὶ τενόντων τὰ δὲ πάθη α-
 ξυδιδοῦτε τὸ κακὸν εἰς τὸ παῦ. ἀ-
 παύται γὰρ συμπαθῆα τῆσι δ' ἐχθῆσι γί-
 γνε'. ἰδέαι ὃ τ' ἐξωλοκῆς ἔασι τρεῖς.
 * ἐς δὴθῦ, ἐς τὸ κατόπιν, ἐς τὸ ἐμπε-
 ρθεν. ἐς εὐθὺ μὲν, ὁ τέτανος, εὔτε ἀ-
 στραβῆς ἀνθροπος καὶ ἀκαμπῆς ἐπὶ ἐ-
 τῶν. καὶ ὃ εἰς τὸ πῶσω, ἢ εἰς τὸ ἐμπε-
 ρθεν ἐξωλοκῆς, ἐξὼ τῆ πάσι καὶ τῶ χω-
 ρίω ἰαχουσι τὴν ἐπὶ κλησιν, τὴν μὲν
 γὰρ κατόπιν ἐνοσέοντες ἀνάκλισην, ὁ-
 πιώθονον καλέομεν, τῆ τῆδε πε-
 πορθότων νεύρων. ἐμπερθεθόθονον ὃ,
 καὶ ἐς τοῦ ἐμπερθεθῶν καμπῆλη' ἀν-
 θροπος ἐπὶ τῆσι πρῶθεν νεύροισι.
 τόνος γὰρ νεύρων καὶ ἐντάσιος οὐνομα.
 πρῶφάσιες δὲ τῶν δὲ μυρία. καὶ γὰρ
 ἐπὶ τρώματι φιλέουσι γίνεσθαι,

Spiritus verò intus coërcitus omnia
 concutiet. Eorundem quoque & con-
 uulsio & perturbatio sequitur. Inter
 respirandum præterea humores & os
 & nares inundant. Spiritus cum hu-
 more effertur. Cum præcedens verò
 strangulatio remittit, omnia item re-
 mittere videntur. Quin etiam, ut ma-
 gnis procellis concitatur mare, spu-
 mam ore profundunt: quando & tan-
 quam jamdudum expulso morbo re-
 sipiscunt, & resurgunt. Cæterum cum
 à morbo quiescunt, ab initio, mem-
 bris segnes sunt: capitis grauitate præ-
 muntur: dissoluti sunt, languidi, pal-
 lentes, consternati animo: ob lassitu-
 dinem morbiq; verecundiam contri-
 stantur.

DE TETANO SEV

RIGORE.

Caput VI.

Tetani musculorum, qui in maxil-
 lis sunt, & tendonum distentiones
 sunt, dolorem quidem magnum infe-
 rentes, celerrimè verò necantes, haud
 facile quoque sanabiles. At noxæ ab
 hoc malo cum omni corpore commu-
 nicantur: omnia enim cum principio-
 rum vitijs consentiunt. Species verò
 conuulsionis tres sunt, cum rectum
 corpus rigit, aut retrorsum flectitur,
 aut prorsum uersus incuruatur. Re-
 cto quidem corpore Tetanus dicitur,
 cum neutram in partem detortus ho-
 mo, atque inflexilis contentus est. At
 conuulsiones, quæ retrorsum, aut in
 priorem partem fiunt, à tentione & lo-
 co nomenclaturam accipiunt. Nam in
 auersam partem ægrotantis reclinati-
 onem opisthotonon vocamus, neruis,
 qui eb loci sunt, male affectis. Empro-
 sshotonon autem, si in priorem par-
 tem homo deflectitur, neruis antè
 positis laborantibus. Tonus enim ner-
 uorum, tentionisq; vocabulum est.
 Causæ autem istorum infinitæ sunt.
 Nam ob vulnera fieri solent, mem-
 brana,



brana, aut musculis, aut nervis punctis, ex quo plerunque moriuntur. A vulnere enim conuulsio lethalis est. Conuellitur autem ex abortu mulier: verum & hæc rarò admodum euadit, & ab aliquo vehementi ceruicis idu nonnulli conuelluntur. Et frigus *asperissimum* horum vitiorum causa esse potest. Quapropter hyems omnium maximè horum vitiorum ferax est, secundo loco ver & autumnus, æstas autem minime, nisi vulnus præcesserit, aut peregrini morbi grassentur in vulgus. Mulieres sane magis, quàm viri, neruorum distentione tentantur: frigidæ enim sunt. Verum ipsæ frequentius liberantur, quoniam humidæ sunt. Quantum ad ætates attinet, pueri assiduè hoc morbo vexantur: sed non admodum pereunt, quod illis usitatum & familiare id vitium sit. Iuuenes autem rarius, quàm pueri, id patiuntur: sed crebrius intereunt: viri minimè. At senes inter omnes magis & eo vitio corripiuntur, & eo necantur. In causa est frigiditas & ariditas senectæ, *qua etiam est mortis natura*. Cæterum si frigiditas cum humido coniungatur, minus noxiæ sunt conuulsiones, minusque ab ipsis discrimen impendet. Affectum hunc ista comitantur, *ut in summa de omnibus dicam*, labor & intentio tendonum adest, & dorsi, & musculorum, qui in maxillis & pectore sunt. Inferiorem enim maxillam superiori annectunt adeo, ut neque vectibus, aut cuneis facile deduci possint. Quod si quis videntes abducens humorem instilla-uerit non demittunt, sed effundunt, aut ore continent, in nares uè retrudunt. Isthmus enim simul inhærescit, ac tonsillæ duræ atque intentæ eius,

ὑμῶν, ἢ μυῶν, ἢ νεύρων νυγέντων. εὔτε τὰ πολλὰ θνήσκουσι. Ἐπὶ τρωματι γὰρ σπασμὸς θανάσιμος. σπᾶται δὲ καὶ Ἐπὶ *ἀμβλώματι ἢ γυνή. ἀτὰρ ἢ ἡδὲ οὐ μάλα πειγίνεται. καὶ τὸ πατάξαστος μεγάλως τὸν αἰχένα μετεξέτεργι σπῶνται. καὶ φύξις δὲ κάρτα ἰσχυρὴ γίνεται αἰτίη. διὰ τὸ δὲ χεῖμα μὲν μάλιστὰ πάντων πίπτει τὰ δὲ τὰ πάθη. δευτερον δὲ ἦρ, σὺ τῷ μετοπώρῳ. φέρει δὲ, ἢ κίσα, εἰ μὴ κατὰ ῥῆξιν τρωμα, ἢ νούσων ἀλλοδαπῶν Ἐπιμημί. γυναῖκες δὲ ἀνδρῶν σπῶν μὲν μάλλον, ὅτι ψυχραί. ἀτὰρ αἰδὲ περιγίγνου μᾶλλον, ὅτι ὑγραί. ἢλικία δὲ παῖδες μὲν ξυνεχές, ἀλλ' ἔ μᾶλλον θνήσκουσι, ὅτι ξυῖθες ἢ οἰκείον πάθος. νέοι δὲ ἰουτέων ἦσαν πάχουσι, μᾶλλον δὲ θνήσκουσι. ἀκμάζοντες ἢ κίσα. γέροντες δὲ πάντων μᾶλλον ἢ πάχουσι ἢ θνήσκουσι. αἰτίη γὰρ φύξις καὶ ξηρότης γήρα, καὶ θανάτε ἢ φύσις. καὶ δὲ ἢ φύξις ἐπὶ σὺ ὑγρῷ, ἀσυνέεροι τε καὶ ἀσφαλέτεροι εἰς κίνδυνον οἱ σπασμοί. ξυῖσι μὲν αὐτέοισι, ἀθρόον μὲν ἅπασι *εἰρή-
 ας, πόνου ἢ ἐντασις τενόντων ἢ ῥάχε, ἢ μυῶν τῶν ἐν γνάθοισι καὶ θώρηκι. ἐρείδουσι γὰρ τὴν κάτω γένυ πρὸς τὴν ἄνω, ὡς μηδὲ μοχλοῖσιν ἢ σφλωὶ διὰ ῥηθίως σῆσαι δυνάσθαι. καὶ ἢ βίη διαγωγῶν οὐδὲ ὀδόντας ἐν σάξιν πῖς ὑγρὸν, ἔ καταπίουσι, ἀλλ' ἐκχέουσι, ἢ ἐν τῷ σώματι ἰσχυροῖσι, ἢ ἐς τὰς ῥίνας ἀνακόπτει. ὅ, τε γὰρ ἰσθμὸς συνερειδέ, ἢ τὰ παρῖσθμα σπληνὸς ἢ ἐπιεταμένα ἐόντα,



ἐξυμπίπτει τῶ ἐνθλιψιν ἔκαστα-
 πνομήν. πρὸς ὄψα * ἐρυθρὰ, πε-
 ποικιλμένη, ὀφθαλμοὶ μικρὰ δὲ ἴ-
 ἀτενέες, μὲν τῶ ἐιδινέμενοι. πνίξ
 ἰσχυρὴ, ἀναπνοὴ κακὴ, χειρῶν ἢ σκε-
 λέων τῶσι, μύες παλλόμενοι, πρὸς
 ὄψα ποικίλως διάστροφα, μῆλα
 ἢ χεῖλα τσομάδεα, γῆρας παλλο-
 μένη, ὀδόντων ἀραβες. ἐπ' ἄλλω δ'
 δὴ πνι, ἢ τῶ ὄψα. ἐγὼ ἢ ἐθνεύμεν,
 ἢ ἐθνώμαζον, ἔρα ἔπιχόρμα μέ-
 γρε δυσχερὴς καρτερεῖς, ἢ αὐτμά-
 τως ἐκχεόμενα θλιβομένης τῆς κύ-
 σεος. τῶ δὲ μὲν ἐν ζωὴ πάση ἰδέη
 * σπασμῶν. ἰδίη ἢ * ἐκείνης, τετάνε
 μὲν ἢ ἐς εὐθὺ ἀπότασις * ὅλα ἀσρα-
 βῆς πάντη ἢ ἀκλινῆς. εὐθὺ ἢ καὶ
 σκέλεα, ἢ χεῖρες. ὀπισθότροπος ἢ κα-
 τόπιν ἀγκύλλει τὸν δὴ ἄρρωπον, ὡς
 τὴν κεφαλὴν ἀνακεκλασμένην μεσο-
 στήν τῶ ὠμοπλατέων κέεας. βρο-
 χος ἔξέχεται, γῆρας τῶ πολλὰ δῖσα).
 σπᾶνιον ἢ, εὐτε ξυνερείδεται τῆ ἀνω.
 ῥωχμὸς ἢ ἀναπνοή. πρὸς πετέες κοι-
 λίν ἢ θώρηκα. ἔργον τετέοισιν μάλ-
 λον ἀκρατές. ἔπιχόρμα ἔπιχόρμα
 γυμνοί, ἢ εἰ ἐπιχέοις ἐνηχῆν. χεῖ-
 ρες ἐν ἐκείνῃ κατόπιν κεκλασμένοι,
 σκέλεα * ξυγκεκαυμένα. ἐναντίως
 γ' ἰγνύϊ κακόντι κάμπι). ἢ ἢ ἐς τὸ
 ἐμπροσθεν ἐλκῶν), κυρτοί μὲν τῶ νῶ-
 τα, ἐπ' ἰσοντοῖσι μεταφρένοισι τῶ ἰσχυ-
 ῶν ἔξωθλυμένων ῥάχιδι * ἐλκῆς εὐ-
 θύ. κορυφή, κεφαλὴ πύλων, ἐς θώ-
 ρηκα συνενευκῆα. γένεα ἔπιχόρμα
 σπᾶνοισι * πεπηγῆα, χεῖρες συνηρισ-
 μέναι, σκέλεα ἐπτεταμένα. πόνοι ἀ-
 πάντων καρτεροί, φωνὴ ἀπάντων
 κλαυθμώδης. σενάξισι ἢ μύζοιες

quod deuoratur, impressioni non ce-
 dunt. Facies est rubida, variegata, o-
 culi ferme rigentes, qui vix circum-
 uoluantur, strangulatio vehemens,
 spiratio vitiosa, manuum crurumque
 distentio, muscoli palpitantes, facies
 varijs modis distorta, buccæ & labia
 tremunt, maxillæ quatiuntur, dentes
 strident. In alio verò quodam & aures
 mouebantur. Ego sanè vidi, & mira-
 tus fui, lotium supprimi usque ad in-
 signem mejendi difficultatem, aut
 sponte effundi, cùm vesica premere-
 tur. Hæc utique omnibus conuulsio-
 nis generibus communia. Propria ve-
 rò cuiusque hæc sunt. Tetani quidem
 in rectum totius distentio, nullam
 prorsus in partem detorta, neque de-
 clinans. Recta quoque sunt crura &
 manus. Opisthotonus verò retrosum
 incuruat hominem, ut reflexum ca-
 put inter scapulas locetur, guttur ex-
 tat: maxilla inferior plerunque dehi-
 scit, & rarò cum superiore committi-
 tur. In respirando stertunt, venter &
 pectus prominent, lotium his minus
 contineri potest: abdomen intentum
 est, & si percutias, resonans, manus
 retrosum extentione detorquentur,
 crura inflectuntur. E contrario popli-
 tes vitiosè curuantur. At si in priorem
 partem contrahuntur, conuexa qui-
 dem his terga sunt æqualiter cum par-
 te pectori opposita, quam Metaphre-
 non Græci appellant. Coxendicibus
 extra pulsus, dorsum totum rectum est:
 vertex, caputque in pectus vergunt:
 mentum ossibus pectoris affigitur:
 manus confertæ sunt, & cohærentes:
 crura extenta. Dolores omnium a-
 troces, vox omnium flebilis. Su-
 spirant autem mussantes profun-

dius.



dius. Si pectus & spiritum morbus occupauerit, facile migrant e vita. Bonum quidem aegrotanti, quod laboribus distorione, turpitudineque liberatur: praesentibus quoque hominibus minus triste, seu filius, seu pater sit. Verum si in vita adhuc perdurent, spiritu licet vitiato, nihilominus permanente, prorsum versus non arcus modo instar, verum & orbis incuruantur, ut caput genibus adnexum habeant, cruraque ac terga in priorem partem refracta sint adeo, ut genu articulus in poplitem depulsus esse videatur. Inhumana calamitas, iniucundus aspectus, triste intuenti spectaculum, & malum insanabile. Ob inuersionem autem vel ab amicissimis hominibus non agnoscuntur. Votum quoque illis, qui adsunt, prius impium, nunc honestum efficitur, aegrum vita defungi, quo una cum vita doloribus & acerbis malis liberetur. Quin etiam neque Medicus praesens atque aspiciens, ad vitam, aut ad doloris leuamen, aut ad figuræ emendationem quicquam opis afferre potest. Nam si membra dirigere velit, uiuentem sanè hominem distraxerit discerpseritque. Igitur victis à morbo nihil ultra subueniens contristatur duntaxat. Hæc verò est Medici magna infelicitas.

Εὐθιόν. ἢν μὲν ἐν θλώρηκος καὶ τῆς ἀναπνοῆς λάβῃ τὸ κακόν, ῥηϊδίως τὸ ζῆν ἀπήγαγῃ· ἀγαθὸν μὲν τῶ νοσέοντι ἐς πόνων, καὶ διαστροφῆς, καὶ αἰσχύνης ἀπαλλαγὴν. ἀλυπότερον δὲ καὶ τοῖσι παρεῖσι, κἢν ἑὸς, ἢ πατὴρ *ἐν· ἢν δὲ *ἴλω ἐς τὸ ζῆν ἐπιδιαρκέη τῆ ἀναπνοῆς, εἰ καὶ κακῆς, συνελκεμύνης δὲ ἐν, ἐς τὸ πρόσθεν ἐξῆν) μόνον, ἀλλὰ καὶ σφαιρῆν), ὡς τὴν κεφαλὴν *ἐπὶ τοῖσι γένυσι ἐχόν, καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὰ νῶτα ἐς τὸ πρόσθεν κεκλάδως, ὡς δοκέειν ἐς ἰγνύην κατὰ γόνυ τὸ ἄστρον Ἰξῶδως. Ἰξάνδρωπος ἢ συμφορῆ, καὶ ἀτερεπῆς μετὰ ἠόψις, ὀδυνηρῆ δὲ καὶ τῶ ὀρέοντι θέναι ἠήκεσον δὲ τὸ δένον· ἀγνωσία δὲ ὑπὸ διαστροφῆς καὶ τοῖς φιλοῦσι ἀνδρώποισ· εὐχὴ δὲ τοῖσι παρεῖσι ἢ πρὸς τὸν ἐχόσι, νῦν ἀγαθὴ γίγνεται), ἀπελθόμενοι τῶ βίε τὸν κάμνοντα, ἐς ἀπαλλαγὴν ξυτῶ ζῆν, καὶ τῶ πόνων, καὶ τῶ ἀτερεπέων κακῶν. ἀτὰρ οὐδὲ ἰητρός παρεῶν ὀρέων οὔτε ἐς ζῶν, οὔτε ἐς λυπὸν, ἀτὰρ οὔτε ἐς μορφῶν ἐπιπαρκέει. εἰ γὰρ καὶ ἐπιδρωσάμενοι τὰ μέλη, ζῶντα ἀνδιατμηξάμεν καὶ *κατάξαι τὸν ἀνδρώπον. τοῖσι ἐν κεκρατημύνοισι δοκέει ἐγχειρέων, ξυτάχθαι) μούνον. ἢ δὲ ἐπὶ τοῦ ἰητροῦ μεγάλη συμφορῆ.

*m. f. ἐπὶ τοῖς γένυσι ἐχόν.



DE ANGINA.

Caput VII.

Angina peracutus affectus est. Spiritus .n. cōpressio est. Duæ verò eius species sunt: aut enim instrumentorū spirandi phlegmone est, aut solius

ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΓΧΗΣ.

Κεφάλ. ζ.

Ἡ σπαστική κατὰ ξυμὴν τὸ πάθος· ἀναπνοῆς γὰρ ἢ πίεσις· δύο δὲ τὰ εἶδη. ἢ γὰρ τῶ ὀργάνων πᾶν τῆς ἀναπνοῆς ἐστὶ φλεγμονή, ἢ μούνον τοῦ



κῆ πῆδους m.f.
* αἰτέου m.f.
* αἰτίαν m.f.
* ἐπιγλώττι-
δος.
* προσβάλλει
m. f.

* ἰσθμῶς

ρῆ

φαι. m.f.
νῆρῶν.

τῆ πνύματος * πᾶθῶ, ἐφ' * ὠντέα
 τὴν * αἰτίαν ἰσθμῶς. ὀργανῶν ὅ, πα-
 ρειδμίων, * Ἰπυγλωσίδος, Φαρυγ-
 γέδρα, κίονος, ἀκρης δρετηρίας. ἡ δὲ ὅ
 Ἰπινέμη) ἢ φλεγμονή, κὲ γλώττης,
 κὲ γνάθων τῶ εἰσω. εὔτε * πρῶθάλ-
 λασι τῶ ὀδόντων τῶ γλώττιαν ἰσ-
 ερβολῆ μεγέθεος. πῆμπησι γδ τῶ
 χῶρην Ἰσώματος, κὲ τὸ πρῶτον ταυ-
 τῆς * ἰσθμῶς ὀδόντας ἐκχῆται.
 σινάγχη κὲ κινάγχη τῶδε καλέεῖ),
 ἢ τῶ ξυνεχῆι πάθει τῶ δὲ τῶ ζώ-
 ων, ἢ τῶ ξυνήθει τῆς πρῶθολῆς τῆς
 γλώσσης κὲ ἐν ὑγείῃ. τῶ ἑτέρῳ ὅ εἶδει
 τὰ ἐναντία ξύνεσι. ξύμπλωσις τῶ ὀρ-
 γανῶν, κὲ ἰσθμῶς Ἰπὶ μᾶλλον τ' ἐ-
 κάσθ φύσιος, κὲ πῆξ καρτεροῖ, ὡς
 δοκέειν σφίσι αὐτέοισι ἐς θῶρηκα ἐς
 τὸ ἀφανῆς ἐγκεκρύφθαι τὴν φλεγ-
 μονὴν ἀμφὶ καρδίῳ κὲ πνεύμονα.
 σινάγχῳ τῶδε καλέομεν, οἷον
 σινεύσαν ἐνδον κὲ ἀγχασαν. ἐμοὶ
 ὅ δοκέει αὐτέα Ἰ πνύματος μένθ τὸ
 κακὸν * ἐμῶναι, πρῶπῆν * πονηρῶν
 ἐς τὸ θερμότατον κὲ ξηρότατον πρῶπο-
 μῶναι, ἀνευθεν Ἰ σώματος ἰνος φλε-
 γμονῆς. ἐστὶ ὅ ἐ μέγα τὸ θῶμα. καὶ
 γδ ἐν χαρῶνῆσιν αἰ πῆξῆς οὐ σω-
 μάτων πάθει * ὀξύτα) γίγνον), ἀλ-
 λα κὲ μᾶ εἰσπνοῇ θνήσκουσι * ἀνδρω-
 ποι, πρῶν τὸ σῶμα κακὸν πῆ παθῆν.
 ἀτῆρ καὶ δὲ πῶ * γλώσσης κινῶς εἰς
 πνύσαντος μένον ἐς τῶ ἀναπνοῶν,
 οὐ πῆ μῶ ἐνδιακόντῶ, λυοσῶ ὀ ἀν-
 δρωπος. τῶ δὲ ἐν τῆς ἀναπνοῆς
 τὴν πρῶπῆν σῶκ ἀδύατον γίγνε-
 σθαι ἐνδραθεν. ἐπεὶ καὶ ἄλλα μῶ-
 ρία τῶ ἐν ἀνδρῶπῳ τὴν αὐτὴν

spiritus in se ipso causam habentis af-
 fectus. Instrumentorum quidem, ton-
 sillarum, epiglottidis, faucium, colu-
 mellæ, summæ arteriæ. Quod si depa-
 scitur phlegmone, etiam linguæ &
 maxillarum interius : cum ob phle-
 gmones excellentem magnitudinem
 linguam extra dentes proferunt. Oris
 enim cavernam implet, & ipsius quod
 abundat, extra dentes exeritur. Hoc
 malum Synanche Græcè, Angina La-
 tinè, & Cynanche, id est, canina an-
 gina nominatur: aut quoniam huius-
 modi animalia assidue hoc malo ve-
 xantur, aut quòd etiam sana linguam
 exerere consueverunt. Alteri autem
 generi contraria eueniunt, instru-
 mentorum collapsio, *gracilitas quàm
 pro cuiusque natura maior*, & strangula-
 tio vehemens : ut ipsimet in pectore,
 latentioribusque partibus circa cor
 atque pulmones abdita esse inflam-
 matio videatur. Anginam hanc ap-
 pellamus, quasi interius urgentem, at-
 que angentem. Ego verò existimo i-
 psius solius spiritus id vitium esse, pra-
 ua conuersione ad calidissimum sic-
 cissimumque conuersi, nulla corporis
 parte inflammatione laborante. Id
 autem mirandum non est : nam in
 Charonæis strangulatus, citra ullum
 corporis affectum acutissimi contin-
 gunt: imò vel unica inspiratione pri-
 us, quàm corpus aliquod maleficium
 contrahat, homines moriuntur. Quin
 etiam & à rabido cane, qui in faciem,
 dum spiritus adducitur, tantummodo
 inspirauerit, & nullo pacto momor-
 derit, in rabiem homo agitur. Talem
 igitur respirationis mutationem inte-
 rius fieri haud est ex his, quæ fieri ne-
 queant: quandoquidem & alia infinita
 eorum, quæ in homine sunt, eandem

* spe-



Speciem cum exterioribus causis obtinent. Succiperdentes intra corpus sunt, & exterius morbi quoque medicamentis perniciosissimas affimiles, & à medicamentis talia vomunt, qualia ob sepres vomere solent. Quocirca neque à ratione alienum est in pestilentia, quæ Athenas afflixit, nonnullos existimasse in puteos Pyreæi à Peloponnesibus venena fuisse coniecta. Homines enim pestilentis morbi cum lethalibus medicamentis similitudinem ignorabant. Adest sanè canis angina laborantibus tonsillarum, faucium, totius oris inflammatio: lingua extra dentes & labia prominens: saliva effunditur, pituita crassissima ac frigida defluit: facies rubicunda & inflata est: oculi exerti, patentes, valde rubent, potus in nares refunditur: dolores acerbi sunt, sed strangulatione vexatos obscurius sentiunt: pectus & cor ardent: frigidi aeris desiderium adest, & admodum exiguum inspirant, consueque donec demum intercluso ad pectus aeris transitu strangulentur. Nempe quibusdam cum pulmone vitium facile communicatur. Hi vero permutatione moriuntur, febres ignavæ oriuntur, molles, nihil proficientes. At si alicui in bonum res vertitur abscessus secundum aurem hinc atque inde exterius, aut interius in tonsillis fiunt. Quod si cum torpore non admodum tardè fiant, euadunt quidem, sed cum dolore atque discrimine. Sin autem morbo in abscessum mutato tumor maior subest, in acutum

ιδίω τῶν ἐξώθεν αἰτίοις ἴχει. χεῖ-
λοι φθείροντες ἔσωθεν καὶ ἐξώθεν·
αἰτὰς καὶ νοῦσι φαρμάκοισι δηλητη-
εῖοισι * ἱκελαι, καὶ ἀπὸ φαρμάκων ἐ-
μέσει ὁ κοῖα πυρετῶν εἴνεκα. ὄθεν ἐ-
δὲ ἀπεικὸς ἐν τῷ λοιμῶ τῷ ἐν Ἀ-
θῶναι, μετεξετέρους δοκέειν εἰς τὰ
φρέατα ἐν τῷ πειραμαί, ὑπὸ Πελο-
ποννησίων ἐμβεβλήσθαι φάρμακα. καὶ
ἔξω κίνησαν αἰθρωποι τὸ ξυμὸν τῆς
κακῆς τῆς λοιμώδεος πρὸς τὰ δηλη-
τήρια. ξυῖεσι δὲ τοῖσι μὲν κυναγ-
χικοῖσι φλεγμονὴ παριῶμιων,
φαρυγγέδρου, παντὸς τῆς σώματος.
γλῶσσα πρὸς πητῆς ὑπὲρ ὄδου ὀδόν-
τας καὶ τὰ χεῖλα· συλοχοῖσι φλέγ-
μα παχύτατον, ἀπὸρρέον καὶ ψύχρον.
ἐρηθροὶ τὰ πρόσωπα καὶ ἐπηρεθροὶ,
ὀφθαλμοὶ δὲ ἰσχυροὶ ἀναπετέες,
δέρματα ἄπο τὸν ἐστασ ρίνας ἀ-
κόπιετα· πόνοι καρτεροὶ, ἀλλὰ καὶ
ὑπὸ τῆς κτηγὸς στυδιωκόμοι ἀ-
μαυρεῖν). θώρηξ καὶ καρδίη φλέγε-
ται· ποθὴ ψυχρῆ ἢ ἐστῶ. εἰσπνεύουσι δὲ
μικρὸν πᾶν, ἐστὶ τε καὶ ἀπεπνίχθη-
σαν, ἐμφραγείσης τῆς ἐς τὸν θώρηκα
διόδου. ἐπίοισι δὲ ἐς πνεύμονα ἢ
ξυμῶσις ρηθίως· οἱ δὲ μετὰ σάσι
θνήσκουσι, πυρετοὶ νωθροὶ, μαλα-
κοὶ, ἐσθὲν ἀφελόντες. εἰ δὲ ἐτῶ ἐς ἀ-
γαθὸν ἀπέποιο, ἀποσάσιες γίγνον-
ται ἐνθά * παρ' οὗς, ἐξω ἢ ἐνδον, ἐς
τὰ παριῶμια· καὶ μὲν ξυμὸν νάρεκα,
μὴ κακῶς βραδείως, πρὸς γίγνεται
μὲν, ξυμὸν πόνω δὲ καὶ κινδυνῶ. ὑπὸ
δὲ τρεπομῶν ἐς ἀπέσασιν ὄγκου
μέζων ὑπογίγνη), ἐς κορυφῶ τῆς
ἀπο-



ἀποσάσι. αἰσάμδης, ἀθρόον
 πύγονται. τὰ δὲ μὲν τὰ κυνάγχης
 εἶδη. ξυνάγχης δὲ, σύμπτωσις,
 ἰχνότης, ὠχρώτης σώεσι. ὀφθαλ-
 μοὶ κοῖλοι, * εἶσω δεδυκότες, φά-
 ρυγξ καὶ γαργαρέων ἀνεσασμέ-
 νοι, παρίσθμια ἐπὶ μάλλον πορσί-
 ζοντα, ἀφωνή· πύξ ἢ τοῦδε τοῦ εἶ-
 δεῖ τῆς πορσίθεν πολλόν τι κρα-
 ταιότερη, ἐν θώρηκι ἐόντ· τοῦ κα-
 κοῦ, ἐνθα ἢ δρχή τῆς ἀναπνοῆς. οἱ
 δὲ ὀξύτατι θνήσκουσι αὐτῆμαρ·
 ἐδ' ὀπη καὶ πρὶν καλέσασθ· τὸν ἰ-
 τρον, οἱ δὲ καὶ ἐσκαλεσάμδμοι οὐδὲν
 ὦναντ· ἀπέθδνον γδ πρὶν ἢ τὸν ἰ-
 τρον ἐπὶ τέχνη χεῖσαδς. * ὀκόλον δὲ
 ἐς ἀγαθὸν τρέπεται, ἐπιφλεγμά-
 ρια πάντα, ἀπερ' ἐς τὸ ἔξω ἢ φλεγ-
 μονὴ ἔξω κείλει, ὡς σινάγχην ἀπὸ
 κυνάγχης γίγνεαδς· ἀγαθὴν δὲ καὶ
 ἐν θώρηκι οἰδημα καρετερόν, ἢ ἐρυ-
 σίπελας ἐμφανέως. καὶ ἰητροὺς δὲ ἀ-
 γαθὸς, ἢ σικύη εἰς τὸν θώρηκα τὸ
 κακὸν δύηγαγε, ἢ σίνηπι ἐς τὰ σέρνα
 καὶ ἐς τὰ πορσίθμια γνάθους μέρεα ἐπι-
 θεῖς, * εἰλκυσε ἔξω καὶ διέπιδυσε·
 μετεξετέροισι δὲ, ἐς μὲν βράχυν τὸ
 κακὸν ὑπὸ τούτων ἀπετάθη ἔξω.
 ἀπλυθέν δὲ, ἀθρόως ἐπαλινδρό-
 μησε, καὶ * ἐπανῆξε. πορσίθμια ὅ
 μυρία, ψύξιες μάλλον, ἥσων ἐκ-
 καύσιες, πληγαὶ, ὀσέων ἰχθύων δια-
 πάρσιες ἐς τὰ παρίσθμια, ψυχο-
 ποσία, μέλαι, πλησιμοναί, καὶ τὰ
 ἀπὸ τῆς ἀναπνοῆς κακά.

γ. γαργαρέων.

ὀκόλον δὲ.

πμ

εἰλκυσε.

abscessu infurgente repente strangu-
 lantur. Hæ sunt planè caninæ anginæ
 species. Anginam autem collapsio,
 gracilitas, pallor comitantur, oculi
 caui, interius demersi, fauces & gur-
 guliò retracti, tonsillæ multò magis
 subsidentes, vocisque priuatio. Hu-
 jusce speciei strangulatus longè, quàm
 prioris, violentior. Quippe cum in
 pectore malum sit, ubi spirandi initi-
 um ponitur. eodem die moriuntur,
 quorum acutissimum malum, nonnun-
 quam & ante, quàm Medicum accer-
 fuerint. Nonnulli & accersito Medi-
 co nihil profecerunt, mortuus est e-
 nim æger ante, quam Medicus arte u-
 teretur. Quod autem in melius verti-
 tur, inflammat omnia, quæcunque ex-
 trorsum phlegmone impulerit. Quare
 ex Synanche, id est, angina, fit cynan-
 che, id est, canis angina. Bonum quo-
 que est, si in pectore magnum ædema
 oriâtur, aut insigne Erysypelas. Egre-
 gius verò Medicus aut cucurbitula in
 pectus malum detrahit, aut sinapim
 ossibus pectoris, aut partibus iuxta
 maxillas imponens extrinsecus attra-
 hit, difflationemque molitur. Quibus-
 dam sanè breui tempore vitium his
 auxilijs exterius tractum fuit, absolu-
 tum verò subito recurrit, & suffocavit.
 Causæ utique infinitæ sunt, refrigera-
 tiones magis, exustiones minus, pla-
 gæ, ab ossibus piscium penetrationes
 in tonsillas, frigida potus, ebrietates,
 saturitates, & mala à respiratione pro-
 deuntia.

DE



Caput VIII.

Κεφάλ. ή.

Corpus calidum ex palato pendens, inter tonsillas positū, Columna & Gurgulio nominatur. Vua enim affectionis nomen est. Columella natura nervus est, sed humidus. Nam in humido loco situs est. Iste itaque gurgulio pluribus incommodis afficitur. Etenim phlegmone crassescit, æqualisque à basi usque ad extremum terminum efficitur in longum protentus, ac rubore suffusus. Columna huiusce vitij appellatio est. Si in extrema tantum parte rotundatur, & *in crescendo, vel, & in illa amplitudine* liuet, atque subnigricat, Vua huiusmodi affectus nominatur: omnia enim uux similia sunt, & figura, & color & magnitudo. Tertius affectus est membranarum ab utraque parte jacentium, quæ veluti squamæ latæ, aut vespertilionum alæ conspiciuntur: id genus morbi Lorum vocatur: loris enim similes sunt membranarum in latum explicationes. At si in tenuem & oblongam membranam columella desinat, veluti urinaculum in extremis habens, Craspedon Græci hunc affectum nominant, quod montis radicem vel pedem significat. Latino caremus vocabulo. *Nascitur autem istud sponte quidem ex fluore*, quemadmodum & alia vitia. Fit verò & per abscissionem obliquè factam ab uno tantum latere membranam relinquente medico. Sin autem bicornis columella reddatur, geminis membranis hinc atque inde pendentibus, nomen quidem nullum obtinuit, verum affectus ipse perspicuus est. Omnia

Τὸ λοιπὸν τῆς ὑπερώης * ἐκκε- * ἐκκερμαίς.
 μέν σῶμα θερρὸν μεσιγυ τῆ παρ-
 ιδμίων, κίων κὶ γαργαρεῶν κα-
 λές). σαφυλή γδ πάθος ἐστὶν οὐνο-
 μα. νεῦρον δέ ἐστι ἡ κίονιστὴ φύσιν,
 ἀλλ' ὑγρὸν. ἐν γδ ὑγρῷ κέε) χωρίῳ.
 ὅθεν ἐν ὁ γαργαρεῶν πλέθνα πάχῃ
 πάθεα. κὶ γδ ἐπὶ φλεγμονῇ παχύ-
 νε), ἴθις δὲ τῆς βάσιος ἀχρεῖ τῆ πέ-
 ρατος ἀκρε, ἐπιμήκης γιγνώμνος,
 κὶ ἐρύθημα ἴχει. κίων δέ τῆ δέ τῆ
 πάθος ἡ ἐπικλήσις. εἰ κατὰ πέρας
 μούνον σρογγύλε), κὶ μεγέθει πε-
 λιδιγὸς γίγνε), καὶ ὑπομελανίζει,
 σαφυλή ἐπώνυμον τὸ δέ τὸ πάθῃ.
 πάντα γδ ἴκελα αὐτέη, κὶ χῆμα κὶ
 χροίη κὶ μέγεθος. τρίτον πάθος ἐστὶ ὑ-
 μένων, ἐνθα καὶ ἐνθα, οἷον πὶ λέπεα
 πλατέα, ἢ νυκτερίδων πέρυγες
 ἐκφαίνον). ἱμαίπον τὸ δέ καλέε).
 ἱμάσι γδ ἴκελαι αἱ τῶν ὑμένων εἰς
 πλάτος ἴξαπλώσιες. εἰ δέ ἐς λε-
 πτόν κὶ ὀμῆκη ὑμένα τελουτῶ κιο-
 νις, οἷον πὶ οὐραχόν κὶ πέρας ἴχα-
 σα, κρεῖσσεδοντὴν ἐπώνυμιον ἴχθ.
 γίγνεται * καὶ τὸ δέ καὶ αὐτομάτως * καὶ
 μέν ἐκ ρέυματος, ὅκωσπερ κὶ ἕτερα·
 αἰτὰρ κὶ δὲ τὸ τομῆς ἐπικαρσίης, ἐγ-
 καταλιπόντος τοῦ ἱατρῆ ὑμένα
 κατὰ μίαν πλευρῆν. ἢν δέ δικροῶ
 ὑμέσι δημοσίοισι ἐκκερμαίσι ἐνθα καὶ
 ἐνθα γίγνεται, οὐνομα μὲν ὁδὸ ἴχθ,
 τὸ δέ πάθος ἐκδηλον· ἀπαντα ὅ
 ρηίδιον θεοσάμνον γιγνώσκειν. πύξ
 δέ

δὲ ἐπ' αὐτέοισι πᾶσι, καὶ ἤκιστα ῥηϊδίως κατὰ πίνεσι. βῆξ δὲ πᾶσι μὲν, μάλιστα δὲ πᾶσι τοῖσι μαντιόισι, καὶ πᾶσι τοῖσι κρεαστέοισι. γαργαλισμὸς γὰρ τῆς δρετρείης ἀπὸ τῶν ὑμένων γίνεσθαι. ἐὰν ὅπῃ δὲ καὶ ἐν ἀσθενείᾳ τῆς ὑγρῆς λάβρη ἐς τὴν δρετρείω, ὅθεν ἀναβήσασσι. πᾶσι δὲ τῆς σαφυλῆ καὶ τῶν κίονι δὴ σπασμοῖσι πᾶσι μᾶλλον, καὶ καρταπονηρῆ κατὰ ποσὶς. καὶ γὰρ ἐς τὰς ῥίνας πᾶσι τῶν δὲ τὸ ὑγρὸν ἀναθλίβεσθαι, συμπαθῆναι τῶν παρειωμίων. γηραιόισι δὲ κίονι συνηθῆς, σαφυλῆ δὲ νεοῖσι καὶ ἀκμάζουσι. πολὺ αἵμοι γὰρ, καὶ πᾶσι φλεγμαίνει μᾶλλον. ἢ βία σκασί δὲ καὶ *παισὶ, τὰ ὑμνῶσθαι. τὰ μὲν δὲ πᾶσι, ἀσινέα. πᾶσι δὲ τῆς σαφυλῆ ἐπὶ ἐρυθρίωσι, αἱμορραγίᾳ, καὶ πόνου, καὶ φλεγμονῆς ἐπίδοσις.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΙΩΜΙΑ ΕΛΚΩΝ.
Κεφάλ. θ.

Ἐλκεα ἐν τοῖσι παρειωμοῖσι γίνεσθαι, τὰ μὲν ξυμῆθεα, ἐνθήθεα, καὶ ἀσινέα. τὰ δὲ ξένεα, λοιμώδεα καὶ κτείνοντα. ἐνθήθεα μὲν ὁκοῖα καθαρά ἐστὶ, καὶ σμικρὰ καὶ ἀβαθῆ, ἐδὲ πᾶσι φλεγμαίνει, καὶ ἀνώδυνα. λοιμώδεα δὲ ἐστὶν ὁκοῖα πλατέα, κοῖλα, λεπρά, πᾶσι πάγω λυκῶ, ἢ πελιδινῶ, ἢ μέλανι συνεχόμενα. ἀφθαί τοῦνομα τοῖσι ἐλκεσι. ἢν δὲ καὶ ὁ ἐπίταγος ἰσχυρὸς βάθος, ἐχάρη τὸ πάθος καὶ ἐστὶ καλέσται. ἐν κύκλῳ δὲ τῆς ἐχάρης ἐρυθρῆμα γίνεσθαι καστερόν, καὶ φλεγμονή, καὶ πόνος φλεβῶν ὡς ἐπὶ ἀνδρακῶ, καὶ μικρὰ διεξαι-

verò hæc facillè fuerit introspicientem dignoscere. Omnibus ipsis stragulatatus accidit; & ægrè cibum potumq; deuorant. Tussis quoque omnibus adest, sed præcipuè Loro vexatis, & Craspedo. Quædam enim arteriæ titillatio à membranis oritur: nonnunquam verò & aliquid humoris in arteriam clanculum instillatur, unde ad tussim prouocantur. Vuam autem & Columnam maior spiritus difficultas sequitur, & magis impedita deuoratio. In his enim humor in nares repellitur, tonsillis ex consensu dolentibus. Senibus Columna accidere consuevit. Iuuenibus autem ac viris Vuam, siquidem hi sanguine referti sunt, & magis sit inflammator, uua scilicet. Pubescentes & pueros membranarum vitia sæpius infestant. Secari autem omnia citrà noxam queunt: sed in uua adhuc rubentibus locis sanguinis effluuium & dolores, & phlegmones incrementum superueniunt.

DE TONSILLARVM
VLCERIBVS.

Caput IX.

Ulcerata in tonsillis sunt aliqua mitia, familiaria, non lædentia: Aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidem sunt munda, exigua, non altè descendunt, non inflammata, dolorem non excitantia. Pestifera sunt lata, caua, pinguis, quodam concreto humore albo, aut liuido, aut nigro fordentia. Id genus ulcera aphthæ nuncupantur. Quod si concreta illa fordes altius descenderit, affectus ille Eschara est, atque ita Græcè vocatur, latinè Crusta. Crustam verò circumueniunt rubor excellens, & inflammatio, & venarum dolor, quemadmodum in carbunculo, & exigua rarè; pustulæ



Itæ, quas Græci Exanthemata vocant, orientes, hisque aliæ superuenientes in unum coalescunt: atque inde latum ulcus efficitur. Id si *exterius* in os depascendo serpit, ad Columellam usque peruenit, ipsamque excedit, & linguam etiam occupat, & gingiuas, & frena, id est, dentium alueolos, dentesque inde labefaciuntur, & denigrescunt. In collum etiam phlegmone erumpit: atque isti haud ita multis diebus post phlegmone, febribus, febre, inediaque consumti intereunt. At si in pectus per arteriam id malum inuadat, illo eodem die strangulat. Pulmo enim & cor neque talem odoris foeditatem, neque ulcera, neque saniosos humores sustinent: sed tussis spirandi que difficultas enascitur. Causa maleficij tonsillarum est frigidorum, asperorum, calidorum, acidorum, adstringentiumque deuoratio. Quandoquidem hæ partes pectori ad vocem spiritumque edendum inferuiunt: & ventri ad alimenti transmissionem, & gulæ ad eiusdem deuorationem obsequio sunt. Internis verò partibus si quod contingat incommodum, ventri videlicet, gulæ & pectori, ad isthmum & tonsillas, & loca ibi posita mali consensus & eruclationes perueniunt. Quapropter pueri usque ad pubertatem maximè hoc morbo tentantur. Præcipuè nanque pueri multum frigidumque aërem inspirant. Quoniam in his plurimum caloris inest, & ad cibos intemperantes sunt, & varia concupiscunt, & frigidam potant, & excandescunt ac ludentes altius vociferantur. Puellis quoque usque ad menstruæ purgationis tempora hæc vitia usitata sunt. Regio Aegypti horum affectuum planè foecunda est. Aër enim spirando siccus adducitur. Varios præterea cibos suggerit. Radices enim, herbæ atque olèra

θήματα, δραστὰ γιγνώσκειν. ἔπειτα
 αἰσθητικὰ γιγνώσκειν, συνήθη τὰ αὐτῶν,
 ἢ πλατὺ ἕλκος ἐγγύς. κὴν μὲν ἕξω
 ἐστὶ τὸ σῶμα * νέμη), Ἐπι τῷ κιονίδα * νεμῆται.
 ἤκετὲ μὲν, ἢ τῷ ἀπέταμν, καὶ ἐς
 τὴν γλῶσσαν ἐσπεδάσθη, ἢ ἐς ἔλα, ἢ
 ἐς χαλινὸς. ἢ ὀδόντες ἐκινήθησαν
 ἢ ἐμελαίνθησαν, ἢ ἐς τὸν τράχηλον
 ἢ φλεγμονὴν ἔξωκειλε. ἢ οἶδε μὲν
 ἢ πολυήμεροι θνήσκουσιν φλεγμονῇ,
 ἢ πυρετοῖσι. * κακῶδιν ἢ ἀποσιτή * κακῶδιν
 ἢ ἐς τὸν θώρηκα νέμη) διὰ τῆς ἀρ-
 τηρίας, ἢ αὐτῆμαρ ἀπέπιξε. πνύ-
 μων γὰρ ἢ καρδίῃ, ἔτε ὀδμῆς τοῖς δε,
 ἔτε ἐλκείων, ἔτε ἰχώρων ἀνέχων),
 ἀλλὰ βήχες ἢ δύσπνοιαί γίνονται
 αἰτή μὲν ἐν τῷ ἔργῳ τῷ παροσμύ-
 ων, κατὰ ποσὶς ψυχρῶν, * τρηχέων, * τρηχέων.
 θερμῶν, ὄξεων, συφόντων. τὰ δὲ γὰρ
 τὰ μέρεα, ἢ θώρηκι, εἰς φωνῶν καὶ
 ἀναπνοῆν, ἢ κοιλίῃ ἐς τροφῆς δια-
 πομπῆν, ἢ σωματῶν ἐς κατάποσιν
 * διακονεῖ). εἰ γὰρ ἢ τῶν ἐνδον πὶ συμ-
 βῆθι πάθος, κοιλίῃ, ἢ σωματῶν, καὶ
 θώρηκι, ἐς τὸν ἰσθμὸν ἢ τὰ παρίσ-
 μα, ἢ τὰ τῆδε χωρία τῷ κακῷ ἢ ἀ-
 ναφορῇ ἢ ἀπερδίξις. διὰ τὸ δὲ παι-
 δία μάλισα παρὰ ἄλλοις ἢ βῆθι. μάλ-
 ισα γὰρ παιδία ἢ * μεγάλα ἢ ψυ- * μέγα.
 χρὸν ἀναπνεῖ. πλείστον γὰρ τὸ θερμὸν
 ἐν ταῖς τοῖσι. ἀκρατέα γὰρ ἢ ἐδωδῆς, ἢ
 ποικίλων ἔπιθυμία, ἢ ψυχοποσίη
 καὶ βοῆσαι μέγα καὶ ἐν ὀργῇ, καὶ ἐν
 παιδίῃ. ἢ κέρησι γὰρ, μέχρι καθάρσιος
 ἔπιθυμίων τὰ δὲ ξιωνῆθα. χῶρη γὰρ
 ἢ πικτεῖ Αἰγυπῖος μάλισα. ἢ γὰρ ἐς ἀ-
 ναπνοῶν ἐπὶ ξηρῇ, ἢ ἐς ἐδωδῶν ποικί-
 λη. ῥίζαι γὰρ ἢ βοτάναι, ἢ λάχανα



πολλά, καὶ σπέρματα δριμύτα, καὶ πο-
 τὸν παχὺ ὕδωρ μὲν, ὁ Νεῖλος, δρι-
 μὺ δὲ τὸ λιπὸ τῆς κριθέων, καὶ τὸ τῆς
 βρυτέων πόμα. τίκτη δὲ καὶ ἡ * Συρίη,
 μάλιστ' αἰκίλη· ὅθεν αἰγύπτια καὶ συ-
 ριακά * ἔλκεα ταῦδε κικλήσκουσι.
 πρὸς τὸ θανάτου, οἰκίλις ὁ πόνος
 μὲν δριμύς ἔσθ' θερμὸς, ὡς ἐπ' ἀνθρα-
 κῶ, ἀναπνοὴ κακὴ. ἀναπνεύουσι γὰρ
 ὀδωδὸς σπυροδύνα καρετρήν. τὸ αὐ-
 τὸ δὲ πάλιν συντόμως τὴν θάλασσαν
 ἐμπνεύουσι ἄσπεροι, ὡς μηδὲ ἐαυτέων
 τὴν ὀσμὴν ἀνέχεσθαι. ὡς οὖν πελι-
 δνοὶ τὰ πρὸς ὄψωπα, πυρετοὶ ὀξέες, δι-
 ψῶ, ὡς ἐκ πυρὸς. τὸ δὲ ποτὸν οὐ
 πρὸς αἴμα, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἐμπόνων. ἀσπον-
 ται γὰρ ἢ τοῖσι παρὰ τὸν ἰσθμὸν ἐπιθλί-
 βουσι, ἢ ἐς τὰς εἴνας ἀναλέχθη. ἔσθ' ἢ
 μὲν κατακένωσι ἀνακαθίζουσι, αἰα-
 κεκλίως οὐκ ἀνεχόμενοι. ἢ δὲ ἀνα-
 καθίσωσι, ὑπὸ * ἀπορίας αἰθῆς
 ἀνακλίνονται. τὰ πολλὰ δὲ ὀρθο-
 στάτην περὶ αἴμα. ἀκρᾶσθι γὰρ ἡ συ-
 χνῆς, τὴν ἡρεμίην φεύγουσι, πόνω πό-
 νον λύσαι θέλοντες. ἀναπνοὴ εἰσὼ
 μεγάλη. ψυχρὸν γὰρ ἡέρα ποθέουσι
 ἐς ἐμφυξίν. ἔξω δὲ σμικρὴ. περὶ
 καυτὰ γὰρ ἔόντα τὰ ἔλκεα, πρὸς
 ἐμπίπτουσι ὑπὸ θέρμης τῆς
 ἀναπνοῆς. βράγχῶ, ἀφωνίη καὶ
 τὰ δὲ ἴππ' τὸ κάκιον ἐπέγει, εὐτε
 ἀθρόον καταπεσόντες εἰς τὴν γῆν,
 ἐξέλιπον.

ΠΕΡΙ ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΟΣ.

Κεφάλ. ι.

ὑπὸ τῆσι πλευρῆσι καὶ τῇ ράχῃ

DE PLEVRITIDE, ID EST,
MORBO LATERIS.

Caput X.

Sub costis, dorso, & internis pectoris
ad

ad jugula usque tenuis membrana robustaque ossibus, inhærens substrata est, cui nomen succingens inditum est. In hac cū phlegmone suborta fuerit, ignis adest cum tussi & sputis uarijs. Pleuritis morbus iste à Græcis appellatur. Opus est autem omnia hæc inter se consonare, atque conspirare ab una causa pendentia. Quotquot enim ex his sparsim alia ab alia causa proueniunt, & si omnia simul ingruunt, Pleuritis non uocatur. Hunc affectum comitatur dolor acutus ad jugula ascendens, ignis acer. Decubitus in latus inflammatum facilis est. In sua enim ipsius *membrana* collocatur. In oppositam uerò partem decubitus dolorem concitat. A pondere enim, & phlegmone, & suspensione in omnes membranæ continuas partes ad humeros usque & jugula, quibusdam uerò & in terga, & in dorso scapulas dolor protenditur. Pleuritida ueteres Græci appellarunt, Latini morbum lateris, uel costarum. Eam uerò sequitur difficilis spiritus, uigilia, ciborum fastidium, malarum rubor hilaris, tussis arida: sputa ægre exeuntia, pituitosa, aut biliosa, aut abundè cruenta, aut subflaua: & hæc ordinem non seruantiâ, sed aliâs alia aduenientia ac recedentia. Ex omnibus uerò peius est, si cruentum sputum desit. Delirant autem & nonnunquã comate occupantur: *in illo sopore iaculantur*. Itaq; si in malū uertatur morbus omnibus in peius uergentibus, intra septimã illi in syncopam lapsi consumuntur. At si in secunda hebdomada educi

ἢ τῶ ἐν δον θώρηκι, ἀρχὴ κλειδῶν, ὑμὴν
 κελὶος κραταῖος ὑπέσρω), τῶσι ὁ-
 σέοισι πρὸς πεφυκῶς, ὑπέσρω τῶ-
 νομα. ὧδε ἐπὴν φλεγμονῆ γενῆ),
 πῦρ ξὺν βηχί, κῆ πύαλοισι ποικίλοισι,
 πλδρεῖπις ὁ πάθος καλέε). ἀρχὴ δὲ
 τῶτα * ἀλλήλοισι ξυνοδέα κῆ ξυμ- ^{κάντα. m. f.}
 πνοια ἔμμεναι, ἀπὸ μῆς αἰτίας ξύμ- ^{κῆ πνοια.}
 παντα. ὁ κόσμα γὰ τούτων ἀποράδην
 ἀλλὰ ὑπ' ἄλλης αἰτίας γίγνε), κῆν
 τῶ πάντα ἅμα ἐπιφοιήση, οὐ καλέε)
 πλδρεῖπις. ξύνεσι δὲ πόνος ὀξύς ἀρχὴ
 κλειδέων, πῦρ δριμύ, καλὰ κλησις, ἐπὶ
 μὲν τὴν φλεγμαίνουσαν πλδρεῖν, ἐν-
 φορος. ἐν ἑδρῇ γὰ ἵζει τῆ ἑαυτέου ὁ ὑ-
 μὴν εἰς τὸ ἐπέκεινα δὲ, ἐπὶ ὄσυνθ.
 ὑπὸ γὰ τῶ ἀχθεθ καὶ τῆς φλεγ-
 μονῆς, καὶ τῆς ἐξαρτήσιθ, ἀποτέτα)
 ἢ ὀδύνη ἀρχὴ τῆς ἀπάσης ξυναφίης
 εὔμένθ, ἐς ὤμους ἐκ κλειδάς με-
 τεξετέροισι δὲ καὶ ἐς νῶτα, κῆ ἐς ὤμο-
 πλάτην τὴν νωπαιήν, τὴν, πλδρεῖπιν
 ἐκάλειον οἱ ἀράδεν. παρῆπε) ἢ δύσ-
 πνοια, ἀγρυπνίη, ἀποσιτή, μῆλων
 ἐρύθημα φαιδρὸν, βήξ ξηρῆ, πύελα
 μόλις αἰαγόμυρα, φλέγμα ἢ χολ- ^{* ἀπὸ}
 λῶδες, ἢ δίαμον κατὰ κορέως, ἢ ὑ-
 πόξανθον. κῆ τῶδε τῶ ξιν οὐκ ἴχοντα,
 ἀλλοιε ἢ ἄλλα ἐπιφοιήοντα κῆ ἀπο-
 γιγνόμυρα. κάκιον δὲ ἀπαίτων, ἢν τὸ
 δίαμον ἐκλείπη. γίγνον) ἢ παρά-
 ληρησι ἐσι δ' ὅτε κῆ κωματώδες, κῆ ἐν
 τῆ κατὰ φορῆ παράφοροι. ἢν μὲν οὖν
 ἐς κακὸν τρέπηται ἢ νοῦσος, πάντων
 ἐπὶ τὸ κάκιον ἐπιδιδόντων, ἐν τῆς ἐβ-
 δόμεης οἶδε θνήσκουσι ἐς συγκοπὴν ἐμ-
 πεσόντες ἢν ἢ ἀπὸ τῆς δουλέραις ἐβδο-
 μάδος ἢ ἀρχὴ τῆς ἀναγωγῆς τῆς
 πύελων



πυέλων γίγνη), κὶ τῷ ξυντεινόντων
κακῶν, ἐς τὴν τεσσαρεσκαιδέκαστην
θνήσκουσι. ἐὰν ὅπη ἢ μεσηγὺ βυλίου
ἔχρονε, ἐς πνεύμονα πάντων ξύνδο-
σις γίγνε). ἔλκει γὰρ πνεύμων ἐς ἐνω-
τὸν κὶ μαλόνε, κὶ θερμὸς ἐὼν, κὶ ἐς ὀλκὴν
τῷ πέλας κινδύμβρος, εὐτε ἀθρόον
ἀπεπιίγη ἄνθρωπος, μετὰ σάσει ἔ-
πάθεος. ἢν ὃ ταύτην ὑπερέλθη ὀνο-
σέων, κὶ ὀλιγὸς εἰκοσῆς μὴ δύποθνήσκη,
ἐμπυε γίγνε). τὰ δὲ μὲν ἐν, ἢ ἐς κα-
κὸν ἐπιδιδῶ, ἢν ὃ ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν τεά-
πη), αἰμορραγίη διὰ ρινῶν λαβρώς,
εὐτε ἀθρόον λυέ) ἢ νῆσος. ἐπειδὴ καὶ
ὑπὸς κὶ ἀναγωγὴ φλεγμάτων, ἐ-
πεί τῷ χολωδέων λεπτιῶν, ἐπὶ ὃ μᾶλ-
λον λεπιοτέρων, αὐθις ὃ διαίμων,
παχέων, σαρκωδέων. κὴν ἐπὶ τῷ
διαίμων παλινδρομῆ μὲν ἢ χολῆ.
ἐπ' αὐτῇ ὃ φλέγμα, ἀσφαλῆς ἢ
ἀποκατάσασις. κὶ τὰ δὲ, ἢν δὲ τρι-
της ἡμέρης ἀρχηται, κὶ ρηιδίως ἀνα-
βήσασι, λεῖα, ὀμαλὰ, ὑγρά, σρογγύ-
λα. ἐς ἐβδόμην γὰρ καθίσαν), ὅτε κὶ
κοιλίης ἐκταραχθείσης χολωδέων,
ἀναπνοῆς κατὰ σασις, γνώμη δὲ σα-
θῆς, πυρετοὶ ἐνδιδόντες, εὐσιποὶ. ἢν ὃ δὲ τὸ
τῆς δὲ βίης ἐβδομάδος (τὰ δὲ ἀρξῆ),
ἐς τὴν τεσσαρεσκαιδέκαστην καθίσαν).
ἢν ὃ μὲν, εἰς ἐμπύημα ἰεπέ), ὅτε ῥί-
γεα ἐνδείκνυ), πόνοι νυγμαλώδεες,
αἰακαθίνουδ) θέλουσι, ἀναπνοὴ κα-
κίων. δέος τότε μᾶλλον μὴ πνεύμων
ἀθρόον τὸ πύος ἐλκυσας, δύποπνίξη
τὸν ἀθροῶπον, τὰ πρῶτα καὶ τὰ μείζω
διαφυγόντα κακά. ἢν ὃ ἐς τὸ μεση-
γὺ τῶν πλωρέων ῥέψη, καὶ διασή-
ση τὰ σάσει, καὶ κορυφὴν ἐς τὸ ἔξω

sputa incipiant, & mala augetur
decimo quarto die pereunt. Nonnun-
quam sanè intra huius temporis spa-
tium omnium in pulmonem transi-
tus est. Trahit enim in se ipsum pulmo
rarus & calidus, & ad proxima trahenda
se se commouens. Tuncque morbi
transitu seu migratione repente homo
strangulatur. Cæterum si diem hunc
ægrotus transierit, atque intra uicesi-
mum non moriatur, in empycum, hoc
est, pectore suppuratum euadit. Hæc
profectò, si morbus ad perniciem ten-
dat, eueniunt. At si in melius uergat,
sanguinis è naribus larga profusio
cum impetu succedit: tuncque repen-
te morbus discutitur. Quandoquidem
& somnus oritur, & pituitæ reiectio
aduenit, postea biliosorum tenuium,
deinde multò tenuiorum, rursus ue-
rò cruentorum, crassorum, carnis for-
mam referentium. Quòd si post cru-
enta iterum exeat bilis, post ipsam pi-
tuita, secuta est hæc in pristinum resti-
tutio. Hæc si tertio die incipiunt, & fa-
cile extullunt, læuia, æqualia, humi-
da, rotunda: septimo die liberantur.
Quando & uenter biliosa exturbat,
spiratio conquiescit, mens ad se redit,
febres decrescunt, ciborum appeten-
tes sunt. Si secunda uerò hebdomada
hæc inchoantur, decimo quarto die
sanantur: sin minus, in empyema, hoc
est, pectoris suppurationem morbus
uertitur. Id uerò rigores indicant, do-
loresque puncturij sedere cupiunt,
spiritus deterius ducitur: tunc metus
maior est, ne pulmo pus multum su-
bitò attrahens hominem suffocet:
qui prima & maiora mala euase-
rat. Verum enim uerò si inter costas
morbus irrepsit, easque disiunxerit
& phlegmones fastigium extorsum
de

κ. πύος, ἄλλως
τὸ πύος.



depromserit, aut uersus intestina eruperit, plerunque homo ad sanitatem redit. Inter anni tempora hyems maximè huius morbi ferax est: secundo autumnus: uer minus, nisi interdum frigidum sit: æstas uerò minimè. Quantum ad ætates attinet, inprimis senes pleuritidi sunt obnoxij: qui etiam sæpius, quam alij, liberantur. Neque enim magna phlegmone in arido corpore excitari potest, neque in pulmonem transitus facilis est. Quippe quæ est in senecta, quàm in alia ætate frigidior: quando & spiratio parua est, & omnium attractio imbecilla. Iuuenes autem & uiri haud ita frequenter in hunc morbum incidunt: uerùm neque admodum frequenter euadunt. Nam neque ab exigua causa, neque ob exiguam phlegmonem ægrotant. In magnis autem maius inest periculum: & pueri minimè pleuritide corripiuntur, minusque ab ea periclitantur: quandoquidem puerilia corpora rara, humida, fluxaque sunt, ac multa est in eis diflatio atque *exhalatio*. Quo circa neque magna contrahitur phlegmone. Ea est huius ætatis in hoc morbo felicitas.

προβάλη), ἢ ἐς ἔντερον ἐν ῥαγῇ, (αὐτὰ πολλὰ φειγίγνε) αἰθρωπος. φέρεται ἢ τὴν νεῦρον ἄρη μὲν, χαιμῶν μάλιστὰ πάντων, δεύτερον φθινόπωρον, ἢ ἢ ἡσόν, ἢν μήκοτε ψυχρόν γίγνοιτο. θερος δ' ἤκιστα. ἡλικίη, πρῶτον τῶ ἄλλων πάχουσι γέρουτες, οἱ κ' μάλλον ἐτέρων τὸ πάθος διαδιδράσκουσι. ἔτε γ' μεγάλη αὖ γίγνοιτο φλεγμονὴ ἐν ξηρῶ τῷ σκήνει, οὔτε ἐς πνεύμονα ἢ μετὰ σάσις. ψυχρότερος γ', ἢ ἐπὶ ἄλλης ἡλικίης κ' ἀναπνοῆ σμικρῆ, κ' ἢ ὀλκῆ ἀπάντων ὀλίγη. νέοι δ' ἢ οἱ ἐπὶ ἀκμῆς, ἔ μάλλα μὲν πάχουσι, ἀτὰρ οὐδὲ μάλλα φειγίγονται. ἔ γ' αὖ πάθοιεν ἐπὶ σμικρῇ αἰτίῃ οὐδ' ἐσμικρῇ φλεγμονῇ. Ἐπὶ δ' τοῖσι μεγάλοισι μείζων ὁ κίνδυνος. παῖδες ἢ κ' σα νοσέουσι πλῆθυσιν. ἀτὰρ κ' ἡσόν θνήσκουσι. τότε γ' σώματα μακρὰ, κ' τὰ ὑγρά εὐργα, κ' πολλὴ ἢ διαπνοὴ κ' ἀποφορῆ. ὅθεν ἔδ' ἔ μεγάλη ξυρίζεται φλεγμονὴ. ἢ ἴσεται τῆς ἡλικίης ἐντυχίη ἐν τῷ ὅτε τῷ πάθει.

ARETÆI CAPPADOCIS de causis & signis acutorum morborum

LIBER SECVNDVS.

Hæc insunt in secundo libro.

De pulmonaria. Cap.
De sanguinis reiectione. cap.
De Syncopa. cap.

I. Περὶ πνευμονίης.
II. Περὶ αἵματ^ο ἀναγωγῆς.
III. Περὶ συγκοπῆς.

B 5 Περὶ

ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ, * περὶ αἰτίων καὶ σημείων ὀξείων παθῶν, βιβλίον δευτέρου.

Τὰ δὲ ἔνεστι ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ:



Περὶ καύσων.	δι.	De caufa, id est, febre uistoria, Cap.	IV.
Περὶ χολέρας.	ε.	De cholera, cap.	V.
Περὶ εἰλεῦ.	ς.	De uoluuulo, cap.	VI.
Περὶ τῶν κατὰ τὴν παρ' ὀξέων παθῶν.	ζ.	De jecinoris acutis morbis, cap.	VII.
Περὶ τῆς κατὰ τὴν κοίλῳ φλέβα ὀξείης * νόσου.	η.	De caua uena acuto morbo, cap.	VIII.
Περὶ τῶν κατὰ τὰς νεφρὰς ὀξέων παθῶν.	θ.	De renum acutis affectibus, cap.	IX.
Περὶ τῶν κατὰ τὴν κύστιν ὀξέων παθῶν.	ι.	De uesica acutis affectibus, cap.	X.
Περὶ ὑστερικής πιγιδί.	ια.	De uteri strangulatu, cap.	XI.
Περὶ σατυριάσεως.	ιβ.	De satyriasi, cap.	XII.

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΟ-
ΝΙΗΣ.

Κεφάλ. α.

Δυοῖσι τοῖσι πρώτοισι, πνεύματι καὶ
πνεύματι, τῷ ζῷα ζῆ. τριτέων δὲ πολ-
λὸν ἴστικαιρὸν, ἢ ἀναπνοή. καὶ δὲ
ἴστικαιρὸν αὐτῶν, ἐκείσ μακρὰν δι-
αρκέσει, ἀλλ' αὐτίκα θνήσκει ὠ-
θρῶπος, ὄργανα δὲ μυεῖα. δέχθη μὲν
ῤῥῖνες, ὁδὸς δὲ δέσπειν, χῶρη δὲ πνεύμων,
θῶρηξ δὲ * πνεύμονος ἔρυμα καὶ δοχή.
ἀλλὰ τὰ γὰρ μὲν ὅπως ὄργανα με-
νον διακονέει τῷ ζῷα. πνεύμων δὲ
καὶ τὴν αἰτίαν ἔχει τῆς ὀλκῆς.
ἐνίξει γὰρ αὐτέου μέσον ἀπλάγ-
χρον θερμὸν ἢ καρδίαν, ζωῆς καὶ
ἀναπνοῆς δέχθη. ἢ δὲ καὶ τῷ πνεύ-
μονι τῆς ὀλκῆς τοῦ ψυχροῦ ἢ ἐξ
τῶ ποθῶν ἐνδομοῖ. ἐμφλέγει
(γὰρ) αὐτὸν, ἔλκει δὲ καρδίαν.
πρώτον τοιγαροῦν καὶ μὲν ἢ καρ-
δίαν πᾶσθ, ἐκείσ * μακρὰν τοῦ

DE PULMO-
NARIA.

Caput I.

OB duo potissimum uiuunt anima-
lia, escam uidelicet & spiritum. Ex
his multò magis uitæ conducit spira-
tio. Hanc enim si quispiam suppri-
mat, non diu fuerit incolumis: sed
protinus interibit. Huius instrumeta
multa parata sunt. Initium sunt
nares: uia est arteria: locus continens
pulmo. Petus autem pulmonis est ual-
lum & conceptaculum. Verum cæ-
tera ut instrumenta solum animali
subseruiunt, pulmo uerò attrahendi
causam in se continet. Namque in
ipso medio calidum uiscus sedet cor
uitæ spirandique principium. Id
pulmoni quoque attrahendi fri-
gidi aëris cupiditatem inijcit: si-
quidem ipsum incendit, uerum cor
est, quod attrahit. Imprimis igitur si
cor affectum est, non diuturna est
mortis



mortis dilatio. Si pulmo malè habet, pusillam quidem ob causam difficulter spirat, *miserè uiuit*, mors tardissimè aduenit, si quis medelam adhibet. Si uitium insigne fuerit, qualis est phlegmone, strangulatus sequitur, uocis spiritusque sublatio: subitanea perniciès imminet. Hæc est ægritudo ea, quam Græci peripneumoniam. Latini pulmoniam dicunt, *inflammatio* sc: pulmonis. *Quam* febris acuta comitatur, quibus accidit thoracis grauitas, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur. Quippe qui naturaliter *doloris* immunis sit, ob corporis raritatem lanis assimilis. Asperæ arteriæ in ipso insertæ sunt, cartilaginosa, & ipsæ dolorem non sentientes. Musculorum pulmo expers est: neruos habet exiguos, graciles, ad motum ciendum opportunos. His de causis pulmo dolorem non percipit. At si quæpiam ex membranis eum ambientibus & ad pectus deligantibus inflammatur, adest tunc & dolor, spiritus est deprauatus calidus, *sedere capiunt in rectum habitum ad respiracionem*, ad id enim hic est situs aptissimus: rubescit facies, sed malæ præcipue, oculorum album nitidissimum ac pingue est: summæ nares simæ sunt: uenæ temporum, uel etiam colli elatæ apparent, cibos auersantur, arteriarum pulsatus initiò magnos habent, inanes, creberrimos perinde, ac si festinare coacti sint, calor in exterioribus membris modicus humectusque est: in inferioribus ingens aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, linguæ

θανάτου ἢ * ἀμβολή. καὶ δὲ πνεύμων, ἔπι μὲν σμικρῇ τῇ αἰτίῃ δύσπνοια, ζῶει κακῶς, θάνατος μάλιστα, ἢν μὲν πρὸς ἀκέραια. ἔπι δὲ μεγάλῳ πάθει, ὀκοῖον ἢ φλεγμονῇ, πνιγμός, ἀφωνία, ἀπνοια, ὀλεθρὸς αὐτίκα. ἢ δὲ ἐστίν, καὶ καλέουμιν περὶ πνευμονίαν, φλεγμονὴν τῆς πνεύμονος, ἕως ὅξει πυρετῶ, ὅτε ξυῖεςιν αὐτέοισι βάρῳ τοῦ θώρηκος, δύσπνοιαν ἢν μοῦσος φλεγμῆν πνιγμῶν. ἀπνοίαν γὰρ ἢ φύσις αὐτέου. μανὸς μὲν γὰρ πνιγμῶν, εἰρήσιον ἵκελ. δύσπνοιαν δὲ διελήλανται τρηχῆαι, χονδρῶδες, καὶ αἰθερῶν ἀπνοια. μύες δὲ ἐσθλαμῆ, σμικρὰ δὲ νεῦρα, λεπία, ἐς κίνησιν ἐπίκαιρα. ἢ ὅτι πρὸς δύσπνοιαν αὐτῆς αἰτίαν. ἢ δὲ ἢ πρὸς τῷ ἀμφὶ αὐτὸν ὑμῶν ἔπι φλεγμῆν, οἷσι περὶ τὸν θώρηκα περὶ ἕρεχεται, ξυῖεςι καὶ πόνος, ἀναπνοὴ κακῇ, θερμῇ, ἀνακαθίνουσαι ἐθέλουσι χῆμα ὀρθιον ἐς ἀναπνοὴν. τὸ δὲ γὰρ ῥήσιον τῶν χημάτων. ἐρυθροὶ τὰ πρόσωπα. ἔπι δὲ μάλλον τὰ μῆλα. τὰ λυκατῶν ὀφθαλμῶν λαμυρώτατα καὶ πύονα * εἰς ἀρκῆ σιμῆ, φλέβες ἐν κροτάφοισιν, ἢ καὶ τρηχῆλαι διεμῆσαι, δύσπνοιαν, σφυγμοὶ τὰ πρῶτα μεγάλοι, κενοὶ, πυκνότετοι, ὀκοῖον πνευμονία μύες. θερμότης ἢ μὲν ἐς τὸ ἔξω, ἀμυδρῆ, ὑγροτέρη, ἢ δὲ ἐς τὸ ἔνδρον, ξηρῆ, θερμότερη. ἐφ' ἢ ὅτι ἀναπνοὴ θερμῇ, δίσπνοια, γλώσσης ξηρότης,

* ῥίσι
σιμῆ



ξηρότης, ἄπθυμίν ψυχροῦ ἠέρος, γνώμης ἄπορῆς, ἐξ ἕξαστα πολλά. ἡ δὲ πᾶν ἀγνή), φλέγμα ἀφρωδῆς, ἢ ὑπόχολον κατακορῆς, ἢ δαιμον ἀπθυρόν σφόδρα. τόδε ἐστὶ τὸ δαιμον τῶν ἄλλων κάκιον. ἡ δὲ ἄπθυ τὸ θανατῶδες ἄπθυδοῖ, ἀγρυπνίη, ὑπνοι μικροί, νῶθροι, κωματώδεις, φαντασίαι ἀξιώεσι. ἄδελφοὶ τὴν γνώμην, ἐκ σαρκῶν ἢ μάλα, ἀγνώσι τῶν παρεόντων κακῶν. ἡ γοῦν ἐπανείρη ἄπθυ τῆς νούσης, ἐδὲν ὁμολογῆσαι δεῖον. ἀκρα ψυχρὰ, ὄνυχες πελιδνοί, ἀγρυπνοί, σφυγμοὶ μικροί, πικρὸν ἄπθυ, ἐκλείποντες, ὅτε ἀγχοῦ τείλες ὁλεθροῦ ἐβδομαῖοι γὰρ πλέον θνήσκουσιν. ἡ δὲ *κοτε ἐπαναφῆρη ἢ νῆσος, ἢ πῆς ἀγαθὸν *τέπη), αἰμορραγίη λάβρος ἐκ ρινῶν, *κοιλίη ἐκ τὰραξίς πολλῶν χολωδῆων, ἐκ ἀφρων οἷα διοκῆν δὲ πνεύμονος εἰς τὴν *νειαιρὴν γαστέρα ἐξεῶδες, ἡ ἀγάγη πολλὸν ὑγρότερον ρηιδίως. ἐστὶ δὲ ὅτε ἐς οὖρα ἐτραπέε. ὁπόσοι δὲ πᾶν ἄπθυ οὐκ ἐπιπτεῖ, οἱ δὲ ὀξύτατοι ρηίζουσι. μετεξετέροι δὲ *πύος πολλὸν γίγνη) ἐν πνεύμονι, ἢ μετὰ σῆς δὲ πλδρῆς, ἡ μέζον τὸ ἀγαθὸν ὑπογίγη). κῆν μὲν ἐς ἔντερον, ἢ κύστιν τὸ ἄπθυ τῆς πλδρῆς παρῶχε τεύθη πύος, ἐς μὲν τὸ ἄπθυ τῆς κα ἐρήσαν δὲ τῆς ἀπθυμονίης. ἐκ τῆς δὲ μακροχρόνιοι ἰχουσι ἐν τῇ πλδρῆ. ἀλλὰ ἀπθυ γίνεται. ἡ δὲ ἐς τὸν πνεύμονα ὁρμήση τὸ πύος, εἰσὶν οἱ ἀπεπίγησαν, καὶ ἀπθυ ἐκχύουσι, καὶ ἀναγωγῆς ἄπορῆς. ὁπόσοι δὲ διαδιδράσκουσι τὴν ἐκ τῆς

siccitas, frigidi aëris auiditas, mentis ambiguitas superuenit: tussis adest plerunque sicca: sin aliquod sputum mouet, id uel spumans pituita est, aut aliud exquisitè biliosum, aut cruentum, floreo colore ualdè perfusum. Id uerò cruentum alijs perniciosius est. Quod si mortifera magis ægritudo redditur, uigiliæ augetur, somnus paucus, torpidus, haud absimilis sopori, qui à Græcis Coma nominatur: cogitationes uanæ insurgunt: mens alienatur: non admodum ecstasi corripiuntur, præsentia maligna ignorant. Nam eos si de morbo interrogas, nihil periculi instare respondent: eorum algent extrema: liuescunt ungues *uigilant*: motus articularum parui, frequentissimi que sunt, & deficientes: quando ipsis proxima mors est. Nam septimo die plerunque moriuntur. Porro si nonnunquam morbus subsistit, & aliquantulum in melius uergit, uehemens de naribus sanguinis cruptio conspicitur: aut per aluum cum perturbatione multorum biliosorum & spumantium succorum deiectio: qui ex pulmone in *intum* uentrem depulsi fuisse uideri possunt, si multi liquidiores & facile deiciuntur. Nonnunquam uerò & per urinarias semitas euocantur. Cæterum quibuscunque hæc simul eueniunt, hi quàm primum ægritudine subleuantur. Quidam utique sunt, quibus magna uis puris in pulmone procreatur, aut ex pleuritide fit permutatio, si maius bonum suboritur. Quod si ad intestina aut uescicam ex lateris morbo sanies deriuata sit: tunc quidem continuè pulmonis uomica liberantur: sed diuturnum ulcus, quod demum sanescet, in latere patiuntur. Quibus uerò in pulmone pus irrumpit: nonnulli ob subitanæam & copiosam effusionem, & rejiciendi infirmitatem suffocantur. At quicunque suffocationis periculum ex tumoris erupti-

* ποτε.
* κολίης.
* κηρ.
* πύον.



eruptione subterfugiunt : hi longo tempore pulmonis ulcere cruciantur, & in phthisin prolabuntur. Verum ex abscessu & phthisi pauci admodum senes liberantur, sicut neque à pulmonia iuvenes & florentem ætatem agentes.

ἀπορρήξεως πύργα, ἔλκος οἴδη πολ-
λὸν ἰχθυσίον ἐν πνεύμονι, καὶ ἐς φθόλω
μεθίσαν). ἢ ἀπὸ μὲν τῆς ἀποσάσιος
ἢ τῆς φθόσης γέροντες ἔπάνυτοι ᾤει-
γίγον). ἀπὸ δὲ τῆς ᾤειπυμονίας,
νεοὶ ἢ ἀκμάζοντες.

DE SANGVINIS REIECTIONE AB ORE.

ΠΕΡΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ.

Caput II.

Κεφάλ. β'.

Sanguis ab ore duobus modis emit- titur, primò ex ipforum ore, capite & uasculis, quæ ibi sunt, via est palatum & fauces, ubi est gulæ & arteriæ prin- cipium. Screantes uerò & cum parua tussi uel etiam citatiore in os sangui- nem eructant. Nam cum ab ore fertur, neque screatu opus est, tum *exputio di- citur. Quod si amplius eiectetur sanguis guttatim*, aut etiam si copiosus de ca- pite, uel ab ore eruperit: nondum re- iectio est appellanda, sed idem uel *sputio*, uel sanguinis eruptio, Græcè hæ- morrhagia dicitur. Sin ab inferioribus ascendat à pectore uisceribus que ibi latentibus, pulmone, aspera arteria, lo- cisque spinæ finitimis: huiusmodi non sputum, sed reiectio latinè, Græcè anagoge uocatur, ascensionis, acuiæ, per quam fertur, nomen habens. Si- gna uerò utriusque communia exigua & pauca sunt, quantum & locus per- mittit, in quem reiectio & sputum con- ueniunt. Singulorum autem propria, magna, & multa, & periculosa sunt: quibus utranque effusionis sanguinis speciem internoscere leue est. Igitur si à capite sanguis decurrit, ubi multus est, plura maioraque adcrunt:

Αἵματος φορῆς τῆς διὰ σώματος, ἰδέαι δύο. ἢ μὲν ἀπὸ σώματος, καὶ κε-
φαλῆς, ἢ τῶ τῆς ἀγγείων. ὁδὸς δὲ
ὑπερώη, φαρυγγέτρον, ἔνθα ἢ δε-
χαὶ σομάχευ ἢ δευτέρως. * ἀναχρέμ-
ψις δὲ ἢ βηχὶ σμικρῇ ἢ προχρηδέ-
ρη ἐς τὸ σῶμα ἀπερρεύγον) τὸ αἷμα,
ὡς τῆγε ἀπὸ σώματος, εἶδὲ * ἀνά-
χρεμψις παρομαρτεῖ, * ἐμπύσις ἢ δε
καλέε). * Ἐπὶ δὲ μάλλον ἢ βραχέη
ἔσται αἵματος, ἢ σάγγω ἢ ἀφροὶν ἀπὸ
τῆς κεφαλῆς, ἢ ἀπὸ τῆς σώματος * ἔη,
ἐκοτὲ ἀναγωγὴ καλέεται, ἀλλ' ἢ τὸ
αὐτὸ, ἢ πύσις, ἢ αἱμορραγίη. ἢν δὲ νέ-
θεν ἀνήη ἀπὸ τῶς ἰσθμοῦ καὶ τῶ τῆς
σπλάγχων, πνεύμονος, τρηχέως
δευτέρως, τῶ τῶ τῶ τῶ τῶ τῶ τῶ τῶ
τετέων φορῆ, ἐ πύσις, ἀλλ' ἀναγω-
γὴ καλέεται, τῆς ἀνω ἰξίος τῆς ὁδὲ
τῶ ὄμα ἔχεσα. σημεῖα δ' ἀμφοῖν,
τὰ μὲν ξυμὰ, σμικρὰ ἢ ταῦρα, ὀκό-
σα ἢ τὸ χωρίον, ἔνθα ἢ ἀναγωγῆς
ἢ πύσιος ἢ ξυαγωγῆ. τὰ δὲ ἐκάστης
ἴδια μεγάλα καὶ πολλὰ, καὶ ἔπι-
καιρα, οἷσιν ἐκατέρω ῥηίδιον
διαγνώσθαι. ἢν οὖν ἀπὸ κεφα-
λῆς * ἔη, ἔπι μὲν πολλῶ τῶ αἷμα-
τι, μέζω καὶ πλέω τὰ παρόντα.

* ἀναχρέμψις.

* ἀναχρέμψις.

* ἐμπύσις.

* ἐπὶ δὲ ἀλλοῦ ἐπὶ δὲ.

* βραχέη.

* ἢν οὖν.

πύσις

ἢν.

σμικρὰ



σμικρὰ ὅ ἐν ὀλίγη κ' σμικρῇ τῇ πύ-
 σι. βάρθ' αὐτέοισι, πόνθ', ὠτῶν * ἡ-
 χοι, ἐρύθημα πρῶτου, φλεβῶν
 διασάσεις, * σκοτόδιμος. κ' πρὸ τού-
 των ἡ αἰπὴ εὐσημῶς, πληγῆ, ψύξι-
 ες, ἐγκαύσεις, οἶνοφλυγίη. ἡ δὲ γὰρ
 ἄρρον πίμπησι τῷ κεφαλῷ, ἀ-
 ρρόου * κ' ἐκχέει ἐκραγέτω ἀγ-
 γείου. Ἐπὶ ὅ σμικρῇ μέθῃ, πύσις ἐξ
 ἀραιώσιος. * ἰχνηλαί ποτε διαρίων
 αἰμορραγίη ξυμῆθης. εἰς ὑπερώλιον ὅ
 πρῆπορρη, ἀναγωγῆς φαντασίω
 παρέχθ'. ἢ οὐκ ἀπὸ κεφαλῆς * ἔη.
 γαργαλισμὸς ὑπερώης, ἀνάχρεμ-
 ψις πυκνῆ, κ' ἐπὶ τῇδε ἡ πύσις βύζι-
 θυμὸς ἐγγίγνε', κ' δὲ μάλα * βήσασ-
 σι. ἢ ὅ ἐς τῷ ἀρτηρίω ἀπὸ τῆς ὑ-
 περώης ἐκρυῆ, τότε βήσαστες ἀνά-
 γουσι. κ' ἡδὲ ἐσὶν ἡ ἀπάτη τοῖσι ἡ γυ-
 μῆροισι ἀπὸ σπλάγχων τῶν κάτω-
 θεν ἀνάγεαθ' ἐσρέθ' ὅ κ' ἐστὸν σόμα-
 χον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς διτεξὼ αὐ-
 τῇ ἐμέουσι. ἐσὶ ὅ κ' ἡδὲ ἀπάτη, * ὡς
 ἀπὸ σωμαχῆ φέρεαθ' ὁκείν'. ἢ ὅ
 τὸ ἀπὸ τῆς * πύσιος αἷμα, παχὺ μῆν
 ἐκάστα, χροῖη ὅ μέλαν, λεῖον ὀμα-
 λόν, ἀμιγῆς ἐτέρης εἰσῆς. χρεμπλο-
 μῆροισι γὰρ διθύς ἐπὶ τῷ γλῶσσαν
 ἐκχεῖ) σρογγύλον, ῥηιδίως ἀπολυό-
 μῆρον. ἢ ὅ κ' τῷ ὑπερώλιω καθο-
 ρῆς, δασυτέρω, κ' ἐλκώδεα ὄψαι,
 κ' ἄπολλα ὑφαίμων. ἰητεῖα δὲ ἄρ-
 κέσθ' ἀπὸ σμικρῆ, σόματα μῆν ἐς
 τῷ ὑπερώλιω, καὶ τὰδε ψυχρὰ.
 Ἐπὶ γὰρ τοῖσι θερμαίνουσι, καὶ
 τοῖσι δρασσι καὶ ἐυρεῖουσι, ἡ φο-
 ρῆ μέζων. καὶ τὸδε τὸ τέκμαρ,

pauca minoraque, ubi raro paucusque
 expruitur. Caput graue est, dolet: so-
 nant aures: facies rubet, uenæ distentæ
 sunt, uertigo infestat. Et ante hæc
 causa euidentis fuit percussus, frigora,
 calores ingentes, uinum largius epo-
 tum. Quippe id subito ac ualdè caput
 implet, repenteque multum sangui-
 nis effracta uena profundit. Modica
 ebrietas rarefacta uena sanguineum
 sputum mouet. Interdum per nares
 sanguinis consuetum profluuium fi-
 stitur. Ad palatum uerò conuersum
 reiectionis imaginem præbet. Igitur si
 de capite profluit, titillatio in palato
 gignitur, creber screatus fit, post quem
 sputum erumpit: inde irascuntur, tuf-
 sique magnoperè agitantur. Si ex pa-
 lato in arteriam defluit, tum pertuf-
 sim sanguinem extrudunt: idque mul-
 tos falsos habuit, ex profundis uisce-
 ribus reiectionem fieri suspicantes.
 Nonnunquam & ex capite decurrit in
 gulam, sicque cum nausea euomitur,
 falsoque multis ita persuasit, ut ex gu-
 la ferri sanguinem crederent. *Quod si
 ex sputo sanguis sit, haud sane crassus est,
 uerum colore ater, leuis, æquabilis, alienæ
 materiæ non permixtus: screantibus
 enim confestim in linguam cadit, ro-
 tundus auullioni que obediens. Tu
 uerò si palatum etiam introspicias, id
 sordidum, asperius, ulceratum & sæpius
 cruentum uidebis. Huic simplex cura-
 tio breuisque suffecerit, adstringentia
 uidelicet medicamēta palato adhibita,
 & ea frigida. Siquidem calefacientia, &
 quæ rara faciunt corpora, & quæ dila-
 tant, fluxum maiorem citant. Ea que sit
 à capi-*



à capite cadentis sanguinis coniectura. At caput quoque uel per uenæ sectionem, uel per nares, uel per aliam diffilationem euacuandum est, & hæc maturè facienda sunt. Nam si diutius sanguis feratur, quædam erit eius cursus exercitatio, eiusque loci membra suscipiendo sanguini affuescent. Ulceratur autem & arteria: *tussumtque profcreatione* atque inde fit *eruptionis* initium. Si uero à pectore inferioribusque uisceribus sanguis effluxerit, reiectio latine, Græcè anagoge nuncupatur. Vtique ualdè mortifera est, si ab aliquo principe membro effracto sanguis manuerit: aut à concaua cordis uena sanguinem abjecore illi suggerente, aut à magna arteria secundum dorfi spinam discurrente. Nam erumpente sanguine perinde ac si juguletur homo ac stranguletur, mors instat celerissima. Quibus autem ex pulmone, aut costa, aut aspera arteria profunditur, non æque cito intereunt, ueruntamen in suppurationem pectoris, Græcè empyema dicitur, & in phthisim incidunt. Minus periculi ab aspera arteria protenditur. Si gula aut uentriculus sanguinem uomunt, *neque admodum letalis est affectus*, & si ualdè copiosi sanguinis uomitus est, neque longa curatio est neque uaria. Si à jecore aut liene prodeat, non facilè id fit, neque continenter. Namque in uentriculum & in testina expeditius hæc uiscera sanguinem propellunt. Haud ita tamen, quin credendum sit, hæc eadem ad superiora, uidelicet, pulmonem & arteriam posse retrudere. Si quidem in febribus à liene & jecinore *per nares sanguinem emittunt, ex fluente nare, qua*

τῆς ἀπὸ τῆς κεφαλῆς πύσιος. ἐς δὲ τὴν κεφαλὴν, κενώσεις, ἢ διὰ φλεβῶν, ἢ διὰ ρινῶν, ἢ δι' ἐτέρης διαπνοῆς. καὶ τὰςδε χρὴ ταχέως ὄρεω. ἡ δὲ γὰρ τὸ αἷμα ἔπι πολλὸν χρόνον ἴη, μελέτη μὲν ἐγγίνε τῆ φορῆ. ἔσθ' δὲ τοῖσι τῆδε χωρίοισι ἐς ὑπόδειξιν τῶ αἵματ'· ἐλκοῦται δὲ καὶ δερτηρία, καὶ βήσουσι αὐτὴ τῆς χρέμψιος. τοῦτ' οὖν φεν δε* φορῆς γίνε' ἢ δερτῆ. ἢ δὲ ἀπὸ τῶν φλέγων καὶ τῶν νέφθεν σπλάγχων αἵματος φορῆ ἀνάγωγὴ καλεῖται. ἔστι δὲ κάστα μὲν ὀλεθρία, ἡ δὲ ἀπὸ τούτων ἔπκαίρων ἐκτραγέντων * ἔη, ἢ κοίλης φλεβός τῆς ἐν καρδίῃ, ἀπὸ τοῦ ἥπατ' * διακονδυμῆς τὸ αἷμα, ἢ τῆς τῆ ράχι, ὡς αὐτὴ παχέης δερτηρίας. αἱμορραγίη γὰρ ὄκωσπερ ἐν σφαγῆ καὶ δυσανοῆ, ὡκίς ὀλεθρος· οἷσι δὲ ἀπὸ πυθμόνος ἢ πλυθῆς, ἢ δερτηρίας τ' τρηχέης, ἢ οἷ μὲν ὀξέως θνήσκουσι, ἔχ' ἡκίσα δὲ ἐμπυοὶ καὶ φθίσιες γίνου'· τρετέων δὲ ἀδενεσέρη, ἢ ἀπὸ τῆς τρηχέης δερτηρίας· ἡ δὲ ἀπὸ σωμαχου, ἢ κοιλίης ἐμένη, οὔτε κάστα ὀλεθρία ἴχασι, καὶ πάνυ πολλὴ αἱμορραγίη ἔη, ἔτε ἢ ἀλθεις μακρὴ καὶ ποικίλη. ἡ δὲ ἀπὸ ἥπατος καὶ σπληνός, ἐρῆιδίη μὲν, ἐδὲ ξυεχής. ἐς γὰρ τὴν κοιλίαν καὶ ἔντερα τρετέων ἢ ἀπόκρσις ἐπιμοτέρη. οὐ μὲν ἐδὲ ἢ ἀνωθεν διὰ πυθμόνος καὶ δερτηρίας, ἀδύατος ἢ ἀπιος. καὶ γὰρ ἐν πυρετῆς, ἀπὸ σπληνός καὶ ἥπατος διὰ ρινῶν αἱμορραγέσσι, κατ' ἔξιν τῶ σπλάγχων τῶ μυκτῆ-

ε



ρ^ορέοντες. ἔποι μὲν οὐκ ἀφ' ὧν-
 περ· ἢ ἀγωγή, οἶδιε· καὶ ἢ ἐς κίνδυ-
 νον * ἢ ὄλεθρον διαφορή. οἱ δ' ἐς τρεῖς τοῖς
 τρεῖς ἕασι· ἢ γὰρ ἀπὸ ῥήξι^ο ἀγγεία,
 ἢ διαφορῶσι^ο, ἢ δρασῶσι^ο ἀνάγε-
 ται. ῥίγνυ^ο μὲν οὐκ ἔξ * ἀπιναίως,
 ἢ πληγῆ, ἢ ἐντάσι ἀχθε^ο, ἢ δύα-
 θείσι, ἢ ἀπὸ ὑψους ἄλματι, ἢ κ^ο βοῆ,
 κ^ο ὄργῆ μεγάλη, ἢ τ^ο ἄλλῃ ὁμοίᾳ
 αἰτίᾳ, εὔτε αὐτίκα ἐπὶ τῆ δρασῆα
 λάβρως τ^ο αἶμα * ἐκχέεται· κ^ο ἵ
 ἀπὸ * βρώσι^ο, χρεῖ ἐπανερωτῶ, εἰ
 κοτὲ π^ορ^οθεν ἔβηξε ἀνδρῶπι^ο, ἢ
 δύσπνοους γέγονε, ἢ ναυτίη, ἢ ἔμετος
 ἢ γχε πάρε^ο. ἐκ γὰρ τῶνδε πολυ-
 χρωτίων διεωδέτε τα ἀγγεία ῥά-
 ματι ξυεχέει, καὶ πολλῶ καὶ δριμεί.
 ἐπὶ οὐκ πολλὸν ξυτάκέντα, κ^ο λε-
 πιωθέντα ἐς τέλος * ἐπαναλωθῆ τα
 ἀμπέχοντα ὑμῖα, τὸ αἶμα ἐκχέει
 ἢ ἵ * ἔξ αραίωσις, δρασῆς μὲν, διὰ
 τὸδε ἔτε πολλή, ἔτε ἀδρόη, ἔτε πα-
 χέ^ο αἷματ^ο. δρασῶσι δὲ τῶ ἀγ-
 γείων, τὸ λεπτόν * ἀποπιθέε^ο. κ^ο δὲ
 πολλὸν αὐλιωθέν ἐν κοίλῃ χώρῃ αὐ-
 θις ἀνάγῃ), παχυτέρην μὲν ἐωυτῆ
 γίγνε^ο, ἔ μὴν παχὺ κάρτα, οὐδὲ μέ-
 λαν, ὁκοῖον ἀμάλωψ. πλείον δὲ τῶ
 πλήθει, ὡς ἀπὸ ἀδροῖσι^ο. οἷσι δ' ἀ-
 θύς ἀναφείροῖ τὸδε τὸ εἶδι^ο τῆς
 ἀγωγῆς, γυμαιξὶ ὡς ἐπιπ^οαν, οὐ
 καθαρομῖησι, τὰδε ἐπιμήνια γί-
 γνεται, κ^ο ἐν τῆσι αὐτῆσι πειόδοισι τ^ο
 καθάρσι^ο ἐπιφαίνεται, κ^ο ἐπι τῆσι
 πειθεσμίσι τ^ο ἀποπ^οάσι^ο ἴαξ^ο.
 κ^ο ἢ μὴ ἰθὺ ἢ γυμῆ, ἐς πολλὰς πειό-
 δος * ἀντιπείοισι ἢ ἀναγωγή. με-
 τεξετέρησι δὲ κ^ο ἀπερράγη τα ἀγ-

recta visceri respondet. Locos, unde fit
 exitus, jam recensuimus : eorumque
 periculi vel mortis discrimina. Effu-
 sionis autem sanguinis tres sunt mo-
 di, vel rupta vena aliqua, vel excisa, vel
 rarefacta. Rumpitur quidem repente
 vel icu, vel contentione oneris gerendi,
 vel eius impositione, vel ab edito loco
 defiliendo, vel clamore, vel magna
 excandescencia, aliave id genus causa,
 cum subito in arteriam copiosus san-
 guis effunditur. Si ab erosa parte, ho-
 minem interrogare opus est, num
 prius tussierit, difficulter spirauerit,
 nausea vomitusve antea infestauerit?
 In his enim diuturnis affectibus copi-
 osa & acri fluxione perseverante va-
 scula exeduntur. Vbi igitur detrita &
 attenuata, & ad extremum consumpta
 fuerint ambientes membranulae, hac
 atque illac sanguine perfluunt. At ra-
 refactio citra rupturam est, proinde
 non subitanea, neque cum multi aut
 crassi sanguinis exitu. Nam cum rare-
 scunt venarum corpora, tenuis pars
 excernitur. Quod si multus in cana ca-
 pacitate sanguis collectus rursus emit-
 titur, crassior seipso redditur : non ta-
 men multo crassior, neque ater, quale
 concrementum, aut grumus est : sed
 copiosior, utpote qui unum in locum
 prius confluxerit. Id genus autem re-
 pentini exitus plerunque foeminis,
 quibus menstrua non respondent, e-
 uenire solet: idque singulis mensibus
 euenit: iisdemque menstruae purgati-
 onis circuitibus apparet: nec non iis-
 dem stasis cessationis diebus suppri-
 mitur, ac nisi mulieri laboranti suc-
 curratur, per multos circuitus sangui-
 nis emissio reuertetur. Nempe quibus-
 dam vasa rupta sunt, sed multitudine

n. n.

* ἀπιναίως.

* ἀπὸ τῶνδε.

* ἀπὸ βρώσι^ο.

* ἀπαναλωθῆ.

* ἔξ αραίωσις.

* ἀποπιθέε^ο.

* ἀντιπείοισι.



reclio euariat. Et ab arteria, an à uena feratur, interest. *Quoniam* ater est sanguis, crassus, & facile spissescens, si è uena manet minusq; periculi adfert, celeriusq; compescitur. *Si* arteria flauus tenuisque prolabitur, haud ita cogitur, citius hominem perimit, & maiori negotio supermitur. Nam arteriæ agitatio sanguinis fluorem mouet, uulnusq; frequenti concussione dehiscit. *Curatio, si ex erosione nascitur, longa est, difficilis & periculosa: ideoq; propter defectiōnem ad cicatricem ulcus non perducitur.* Ulcus n. non uulnus efficitur. Rupturæ uerò facilior solidatio, quia uulneris oræ se contingunt. Et hæc secundo periculi ordine consistit. Minimus in rarefactione metus subest. Spontè enim sanguis conquiescit, & astrictio refrigeratioq; in medendo satis est. Cæterùm & sedes, unde sanguis proficiscitur, obseruandæ sunt. Siquidem multa sunt communia indicia, & erroris occasio in promptu est, curatioq; diuersa. A gula igitur haud ita sæpe per rarefactionem solet sanguis effluere, cum ob cibos potionesque refrigeratio & astrictio eius partes condenset. *Quin* etiam rofiones haud frequenter fiunt, ac minùs, quàm rarefactio, gulam infestant: quippe fluxiones erodentes non multum temporis in ea subsistunt: sed aut expuuntur, aut ad inferiora pelluntur. *Frequentiùs* gulæ incidit ruptio. Itaque si interdum rupta est, non tam magnæ, sicuti à pectore, sanguinis profusiones fiunt. *Illic enim graciles uenulæ sunt, & minuta arteria.*

γεία, τῶ πλήθει ἢ διαφορῇ τ' ἀναγωγῆς, καὶ εἰ ἐξ ἀρτηρίας, ἢ φλεβῶς ἀνάγοιτο. μέλαι μὲν γὰρ καὶ παχὺ, καὶ ῥηιδίως πηγνύμενον, ἢν δὲ τὸ φλεβῶς, καὶ ἥσων ἐς κίνδυνον ῥέπει, καὶ ἐπίχευθ' ἰσασον· ἢν δ' ἀπ' ἀρτηρίας, ξανθὸν καὶ λεπτόν, καὶ ἔμάλια πηγνύει, καὶ ὁ κίνδυνος ὠκύτερος, καὶ ἡ ἐπίχευσις ἔμάλια ῥηιδίη. αἱ γὰρ διασφύξεις τῆς ἀρτηρίας, αἰμορραγίας παρόκλησιν ποιεῖν, καὶ τὸ πρῶμα ἔμφορῆ τῆ πολυκινήσει. ἀλθεξίς δ' ἢν μὲν δὲ τὸ διαβρώσει κακόν, καὶ ἔρηιδίη, καὶ σφαλερή. ὑπὸ γὰρ ἐλλείψεως ἐς σύμφυσιν τ' ἔλκεται ἔκ ἀφικνέει. ἔλκεται γὰρ, ἔμπρωμα γίνεθ'. ἐπὶ δὲ τῆσι ῥήξεισι ἡ σύμφυσις, ἐτοιμοτέρη. ψάει γὰρ ἀλλήλων ἔμπρωμα τὰ χεῖλεα. ἐσι δ' ὧν ἡ διαφορῇ δυνάτη ἐς κίνδυνον. ἀνεσάτη δ' ἢ ἐπὶ τῆσι δρασίωσι, ἰσχεῖ γὰρ αὐτομάτως, καὶ ἰητείας εὐψίς, καὶ ἐκψυξίς ἰκανή. σημαῖοι δ' καὶ οἱ τόποι, ἀφ' ὧν περ ἀνάγει. ξυμὰ γὰρ πολλὰ σημεία, καὶ ἡ ἀπάτη ῥηιδίη, καὶ ἰητεῖν ἐτέρη. δὲ τὸ σωμαχῶ μὲν οὐδ' οὐτε λίω ἐξ ἀραιώσιος ἀνάγει. ἢ γὰρ τῶ βρωμάτων τὲ καὶ τῶ πομάτων ψυξίς τε καὶ εὐψίς ἐς πύκνωσιν ἀγει τὰ μέρεα. ἀτὰρ οὐδὲ διαβρώσεις ξυμωχέες εἰσὶ, καὶ μᾶλλον τ' παρόλης. τὰ γὰρ ἀναδάκνοντα τῶ βρωμάτων, ἔμφορῆ πολυλὸν χρονον. ἀλλ' ἢ ἀπεπίυθη, ἢ διηλάθη κάτω. συνηθεσέρη δ' ἰσμάχω ἐσὶν ἡ ῥήξις. εἰ οὐδ' ἀπορραγῆ κοτὲ, αἰμορραγία ἔκαρτα μεγάλα, ὁκοῖαι δὲ τὸ φώρηκα. ἰσχνὰ γὰρ τῆσι τὰ φλεβία. σμικρὰ δ' καὶ ἀρτηρία.

* συμφορῆ.

* μακρῆ.

καὶ φικνέειται.

* ἐκψυξίς.

C ιδίη



ἰδίῃ ὃ τὸ αἷμα οὐ κίρτα μέλαν, ὑ-
 πόξανθον, οὐ κατακορέως λεῖον, ἢ
 σιάλοισι μεμιγμένον, ξυνναυτή
 καὶ ἐμέτω ἀναφερόμενον. βήξι-
 κρη, ἄλλοτε μὲν ξυῶ τ, ἄλλοτε
 ὃ μοιῶν ἀνδρῶν ἀναγωγῆς. ξυ-
 ταλαιπωρεῖ γὰρ ἡ δρετηρὶ τῶ σο-
 μάχῳ ὡσαύτε λαμψῆ καὶ ξυνημψῆ.
 δῆξις, ἢ σύψις ἔλκεος ἐπὶ τοῖσι κα-
 ταπινομοῖσι. πολλὸν ὃ μάλλον, κί-
 ψυχρὰ κίρτα ἢ θερμά, ἢ σφυρὰ ἔξ.
 ἐγγίγνε) ὃ καὶ πόνος τοῦ σομάχου
 μετεξέτεροι. οἶδε μέσφι μέλα-
 φρένῃ ἐμετοι, φλεγματοῦδες. ἐ-
 παναφέρουσι ὃ κοτὲ, ἐπὶ ἰώ ἐς μῆκος
 ἢ νοῦσος Ἰπταθῆ, καὶ μέζων ἔη του-
 τέων * ἀποσιτή, πληθῶ πολὺ. πυ-
 ρετοὶ ἔμαλα ξυσεχῆς, ἀλλὰ ῥεμ-
 βώδες, ἀπὸ ὃ κοιλῆς ἀνάγοιτο μέ-
 λαν καὶ πηγνύμενον, κίω ἀπὸ δρετηρῆς
 ἢ. κίω ὃ ἀπὸ φλεβῶς, πολλὸν π με-
 λάντερον, πολλὸν τε καὶ παγετώτε-
 ρον. ναυτή πολλὴ καὶ ἐμετος φλεγ-
 μάτων καὶ χολωδέων, τοῖσι σιτιίοισι
 συμμιγνύμενον τὸ αἷμα, κίω προ-
 βερῶκη ὄνθρωπος. ἐν γὰρ τῇ αὐτῇ χώ-
 ρῃ ἀμφω (αἷμα) ἀλίζε) καὶ ἡ τροφή
 καὶ τὸ αἷμα. ἐξερδύξις πολλαὶ, βρο-
 μώδες. κίω μὲν πολλὴ ξυλλεγῆ, ἀ-
 πορίη, σκοτόδιον. κίω ὃ ἐμεθῆ τὰ δε,
 ῥηίζουσι, ἐκλυσι, καυσώδες ἰὸ σύμ-
 παν, πόνος ξυσεχῆς τ κοιλῆς. ἀπὸ ὃ
 τῆς * τσηχῆς δρετηρῆς, μικρὸν καὶ
 σφόδρα ξανθὸν τὸ αἷμα καὶ ξυῶ
 βηχὶ ἀνάγουσι. κίω μὴ ἀνάγουσι ὃ,
 διλυκέως βήσουσι. ἀθησις δὲ καὶ
 πόνος, ἐνθα ὁ βρόγχος, μικρὸν πνε-
 ρθεν ἢ ὑπερθεν. φωνὴ βραγχώδες,

Sanguis uerò exiens non magnopere
 nigricat, subflauus est, non exadè, læ-
 uorem habet, aut saliuæ permixtus
 est, cum nausea & uomitu reijcitur,
 leuis tussicula citatur, modò humi-
 dum quippiam mouens, modò arida.
 Id euenit, quoniam gulæ affectum ar-
 teria quoq; participat, secundum illam
 extenta & adhærescens: morsus uel ad-
 strictio ulceris inter deuorandum per-
 cipitur: idque præsertim, si benè fri-
 gida, aut calida, aut acerba sunt, quæ
 deglutias. Nonnullos autem & gulæ
 ipsius ingeneratur & nonnullis dolor sto-
 machi, uomitus dorsotenus pituitosi. Vo-
 munt pituitosa, nonnunquam si mor-
 bus producitur & inualefcit, cibum
 reijciunt, cibos summopere fastidiunt.
*Regerunt autem aliquando plurimum, ubi
 morbus in longum abit, estq; maior inedia.*
 E uentriculo niger concretusque san-
 guis euomitur, etiam si ab arteria flu-
 xerit. Si à uena, multò nigrior, compa-
 riorque est, nausea multa adest: pitui-
 tosus, biliosusque uomitus. Si prius
 homo comedit, cum cibis mixtus san-
 guis eijcitur. In eodem enim loco ci-
 bus sanguisque colligitur. Ructus
 crebri fiunt, & uirus olentes. Quod
 si multa materia collecta est, angor
 animi uertigoque sequitur. *Si uerò
 hac euomuerint* subleuantur. Refol-
 uuntur tamen, penitus exæstuant, as-
 fidueque dolet uentriculus. Ab aspera
 autem arteria paucus sanguis, uehe-
 menter flauus, per tussimq; expellitur:
 qui nisi expellitur, continens tussis in-
 hæret. Sensus uerò & dolor in gutture
 est, paulùm suprà aut infrà: uox rauca

&c



& obscura fit. Si à pulmone, repente uberiorque sanguis emanat: idque magis, si erosio in causa sit, cum magna tussi sanguis affatim rutilus, spumans, rotundus sic, ut pars cicta à parte distincta sit. Cæterum & in communi uase corruptio eorum, quæ de pectore exeunt, alia est. Comparatione autem permixta discernas: alioqui pectoris partes specie carnosas pulmonis esse partes censueris. Verùm pectoris grauitas, indolentia, ruborque in facie multò magis in pulmonis uitio reperitur. Sin à thorace hauriat, in parte priori, secundùm os pectorale, quod uocant, dolor laceratam partem ostendit. Ingens tussis adest, uix aliquid extrudens. Sanguis non multùm flauus est, modicè crassus, spuma carens. Quod si & pulmone in transitu noxam impertiat, aliquid etiam spumæ consequitur. Quandoquidem ex pectore in arteriam per pulmonem iter datur. Sed si à latere cum tussi, per tussim quidem sanguis funditur: sed niger, leuis, tetri odoris uirosique, qualis ex putridis rebus exhalat, lateris dolor acutus uexat. Multi ex his cum febre, ut pleuritici solent, intereunt. Tempus anni humidum calidumque sanguinis emissionem maximè procreat. Tale est humidum & calidum Ver, secundo loco æstas, Autumnus minùs, Hyems minimè. Æstate maximè moriuntur ob sanguinis effluuium: quo tempore haud ita magnæ phlegmonæ oriuntur. Vere secundo phlegmonis & urentibus febribus consumuntur. Autumno plurimum tabes, quas Græci Phthoas dicunt, eueniunt. Vt semel autem dictum sit, omnem sanguinis reiectionem quantumuis modicam, quamuis iam

ασαφές. ἢ ἰσχυρὸν πνέμονος ἢ ἀ-
 θρόως ἢ ἀναγωγῆ, ἢ πρὸ ἰσχυροῦ,
 εἰ ἐκ διαβρώσεως. Ἐπιβηχὶ πολλῆ
 ξανθὸν κατακορέως, ἀφρώδες,
 εὐρογγύλον, ὡς ἄλλω ἀλλης ἀνα-
 γωγῆ διακεκρίσθαι. ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν
 ξυμῶ ἀγγείῳ φθορῆ τῆς εὐρώσεως
 ἀναγομένη, ἀλλή. διατήσεως ἀντὶ
 συμμεμιγμένα ὡς ἐκ πύθουσι,
 ὡς ὄντα μέρεα εὐρώσεως. τὴν δ' ἰδέτω
 σαρκοειδέα δοκοῖς ἀπὸ πνεύμονος
 ἐμυδαίμερα. εὐρώσεως βάρος, ἀ-
 πονίη, ἐρυθρία προσώπου πολλὸν π
 μάλλον τετέοισι. ἢ ἰσχυρὸν εὐρώσεως
 καταπίνη, ἐστὶ πύθου κατατῶ
 εὐρώσεως πόνος διασημαίνει εὐρώσεως
 τὸς μέρεος. βῆξ συμῶ ἢ μόλις
 ἀνάγουσα. τὸ ἰσχυρὸν ξανθὸν ἐκάρ-
 τα, μέσως παχὺ, ἀναφρον. ἢ καὶ
 πνεύμων ἐκτὸς παρόδου συμπαθή-
 ση, πύθουσι εὐρώσεως. ὁδὸς γὰρ
 θώρηκος ἐστὶν ἀπὸ πνεύμων. ἢ ἰσχυρὸν
 ἀπὸ πύθου, ἢ ἰσχυρὸν μὲν, μέλαν
 ἢ ἢ λείον, κάκομον, εὐρώσεως, ὁ-
 κοῖον τὸ σηπεδόνος, πόνος τὸ πύθου
 ἢ ἰσχυρὸς. πολλοὶ γοῦν εὐρώσεως
 πύθουσι πόνον εὐρώσεως. ὡ-
 ρη ἢ φέρει, ὑγρὴ ἢ θερμὴ. τοῖον ἢ τὸ
 ὑγρὸν καὶ θερμὸν ἔαρ. δεύτερον τὸ θέ-
 ρος, μετόπωρον ἢ ἴσον, χαιμῶν δὲ
 ἢ ἴσα. εὐρώσεως δὲ, εὐρώσεως μὲν μά-
 λιστα αἰμορραγίη. φλεγμοναὶ γὰρ ἐ-
 κάρτα μεγάλαί γίνονται τότε. ἔαρ
 δεύτερον, φλεγμονῆ καὶ πύθουσι
 καυσώδεσι. φθινοπώρῳ ἢ, ὡς εὐρώ-
 πανρῆιδως φθόναι γίνονται. ἀθρόον
 δὲ εὐρώσεως, ἢ πᾶσι αἵματι
 ἀναγωγῆ, κῆν μικρὴ ἐπὶ, κῆν ἢ δὴ
 C 2 μεμύκη



μεμύκητα ῥα γένετα, ἔπεται δυο-
 μίη, δησελπίση, ἀπογνώσι ἔβις. τίς
 γὰρ ἔτως δίσταθης, ὡς ὄρεῖν μὲν ἐπιόν
 σφαγῆ ἱκελον πεπονθότα, μὴ ὄρω-
 δεῖν ἢ ἀμφὶ θανάτου. καὶ γὰρ τὰ μέζω
 τῶν ζώων, καὶ τὰ ἀλκιμώτερα, ὁκοῖ-
 ον οἱ ταῦροι, αἰμορραγίη θήσκεισι
 ὤκισα. ἀλλὰ τόδε μὲν οὐ μέγα τὸ
 θωῦμα. θωῦμα ἢ μέγα τόδε. Ἰππὶ
 γὰρ τῆ ἀπὸ πνύμονος φορῆ μοῦνῃ
 χαλεπώτατη ἐστίν, ἐκ ἀπογνώσ-
 κουσι ἐωυτῶν οἱ ἀνθρώποι, κῆν ἐν τῷ
 ἐσχάτῳ ἔωσι. δοκέω δὲ ἐγωγε τῷ
 ἔπνύμονος ἀπὸ πνύμονος αἰπύω ἐμμε-
 ναί. πόνος γὰρ κλυὲ σμικρὸς ἐστίν, θά-
 νατον ὄρω δέξει. καὶ ἐστὶ ἐν τοῖσι πλεί-
 σοισι φοβερώτερος ἢ κακίων. ἀπὸ πνύ-
 μωνος ἢ ἐν τοῖσι μεγάλοισι κακοῖσι, ἀφο-
 ρῆ θανάτου, καὶ ἐστὶ κακίων ἢ φοβε-
 ρώτερος.

rupta uasa coiuerint, comitatur maror
 diffidentia, uita desperatio. Quis enim
 est adeò firmo & constanti animo,
 qui se iugulationi simile quiddam
 passum esse conspiciens, non futuram
 mortem uereatur, & perhorrescat?
 grandiora nanque animalia & robu-
 stiora, quales tauri sunt, sanguinis pro-
 fusione celerrimè perduntur. Verùm
 hoc haud magnopere mirandum est.
 illud summa admiratione dignum,
 quòd in sola ex pulmone reiectione,
 quæ omnium sæuissima est, homines
 animum non despondent, cùm tamen
 in extremo discrimine uersentur. Pul-
 monis indolentiam huiusce rei cau-
 sam ego statuo. Quilibet enim dolor,
 quamuis exiguus, interitus metum
 iniicit, & plerunque terribior est,
 quam infestior. Contrà indolentia in
 plurimis uel magnis morbis à morte
 securitatem præstat; damnosiorque est,
 quàm terribior.

ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΟΠΗΣ.

DE SYNCOPA.

Κεφάλ. γ.

Caput III.

Εὐγεόςθε ὁ ἱππεὺς, ἠδὲ ὁ δη-
 μότης, εὐγε Ἰππικλήσιθε ἴσδε ἔπα-
 θεθε. ὠκύφων, ἐκακῆ ἐστὶ οὐδύμα.
 τί μὲν γὰρ μέζον, ἢ ὠκύτερον συγκο-
 πῆς δυνάμιθε; τί ἵουδύμα ἔτερον
 εἰς Ἰππικλήσιν τῆδε τῆ * πρᾶγμα-
 τος μᾶλλον εὐσημον. τί δὲ καρδίας
 ἄλλο καειώτερον ἐς ζώω, ἢ ἐς θά-
 νατον. οὐδέ τί τὴν συγκοπὴν ἀπὸ
 τῆς καρδίας νοῦσον ἐμμεναι, ἢ αὐτὴν
 οἶνον τῆς ἐν αὐτῇ τῆ ζῆν δυνά-
 μιθε. τόσον τε ἄχθε τοῦ ὀλέθρου,
 τοιήδε καὶ ἰδέη. ἐστὶ γὰρ τὸ πάθεθε,

REcte planè medicus & uulgus, re-
 ce, inquam, huic affectui nomen
 indiderunt. *Dij uestram fidem*, cuius
 mali est nomen? Ecquid enim ma-
 ius, ecquid celerius syncopæ *ni & po-
 tentia*? Ecquòdnam aliud nomen ad
 hanc rem appellandam significanti-
 us? quid uerò corde ad mortem ui-
 tamie *capitalius*? Neque syncopam
 cordis ægritudinem esse, aut uitalis in
 eo potestatis detrimentum, non cre-
 dendū est. Tanta est mortis celeritas, &
 talis morbi species. Quippe is affectus
 uinculo-



vinculorum potestatis uitam fouentis dissolutio est, hominis constitutio ni aduersarius. Hanc enim tenaciter corripuens non dimittit, sed dissoluit ac dissipat. Neque id magnum est miraculum. Nam & alij affectus quorundam membrorum, quibus inhærescunt, indeque accenduntur, proprii sunt & periculosi. Inguinum quidem tumores pestiferi & permaligni (Bubonas Græci nuncupant,) jecoris soboles sunt, nullaque alia ex parte procedunt. Tetanus autem neruorum labes est. Comitialis morbus caput obfidet. Pari igitur ratione & syncopa cordis & uitæ ægritudo est. Quicunque uerò stomachi affectum syncopam esse opinantur, quoniam cibus uinoque, in nonnullis & frigida uires refectæ sunt, & ægritudo sublata: ijdem mihi uidentur capillorum capitis, & cutis affectum esse phrenitin *opinari*, quoniam capillorum detensione, & *iporum* irrigatione phrenitici releuantur. *Sed enim stomachi uicinitas cordis permagni interest.* Vnde in cor tam noxia, quàm utilia deriuantur. Etenim per pulmonem etiam, ut speret, aërem cor accersit: *ueruntamen* pulmo haud ex æquo spirandi facultatis particeps est. Cum facultates non instrumentis, sed ubi est uitæ fons atque roboris, statuuntur. At stomachus uitæ neque principium, neque sedes est: aliquis tamen ab eius inuicillitate lædi potest. Nam & cibi cordi nocentes non stomacho officiant, sed cordi per eum noxam infligunt. Siquidem & ab illi orientes cordis affecti notas repræsentant, arteriarum motus

λύσις τῶν δεσμῶν τῆς εἰς ζωὴν δυνάμει, ἀντίζωον τῆ συσάσει τῆ ἀνθρώπου ἐόν. τῆς δὲ γὰρ ἀπέξ λαβόμενον, ἐμείησι, ἀλλ' ἐς διαλύσιν τρέπει καὶ οὐ μέγα τὸ * θῶμα. καὶ γὰρ καὶ ἕτερα πάθρα ἰδία καὶ ἑπικαιρὰ πινῶν * μερέων ἐς, οἷσι * περὲμφύνει, καὶ τριτέων ἐξάπλεται, βιβῶνες μὲν οἱ λοιμώδεες ἤπατ, καὶ σφόδρα κακοήθεις, ἄλλου ἢ γίνονται ἐδενός. νύρων δὲ τέταν, ἑπληψία δὲ κεφαλῆς. * τῷ δεοῦ καὶ ἡ συγκοπή καρδίας ἐς τὴ ζωῆς νοῦσ. ὁκόσοι δὲ σμάχε ἡγέονται τὸ πάθρα ἐμῆραι, ἕνεκα σιτίοισίτε καὶ οἶνω, μετεξετέργισι δὲ καὶ ψυχῶ, ἡ δυνάμεις ἐτάθη, ἡ τὸ κακὸν ἐξελάθη, οἱ δὲ μοι δοκέσαι καὶ τὴ φρενίτην τριχῶν τῆς κεφαλῆς, καὶ τῆ δέρματ νοῦσον ἡγέεας, οὐνεκεν κουρη καὶ τέγγει αὐτέων ρήζουσι οἱ φρενιτικοί. ἀλλὰ γὰρ τῆς καρδίας γαιτόνημα καμειὸν ἐς τὸ σμάχ, ἄλλ' οὐ περ ἐλκε * ἡ καρδίη οἰκείον ἡ ἀξύμφορον. καὶ γὰρ ἡ διὰ πνεύμονος ἐλκε πνεῦμα εἰς ἀναπνοὴν ἡ καρδίη, ἀλλ' οὐχὶ πνεύμων ἄλλ' ἰσῆς δερχῆς ἀναπνέει. οὐ γὰρ ἐν τοῖσι ὀργάνοισι αἱ δυνάμεις, ἀλλ' ἐνθα ἡ δερχῆ ζωῆς ἡ καὶ ἰχύ. * σμάχος ἢ, οὔτε δερχῆ, οὔτε * χῶριον (ζωῆς. βλαβήσε) δὲ πρὸς διὰ ἀτονίω. ἡ γὰρ ἡ τὰ καρδιόβολα βρώματα, οὐ τὸν σμάχον σίνε), ἀλλὰ δι' αὐτέσ τὴν καρδίην. ἐπεὶ ἡ οἱ ἐπὶ τοῖς ἡ θνήσκουσιν, σημεῖα ἰχουσι καρδίας πάθρα, σφυγμοὺς



μικρὰς, ἀδρανείας, πᾶσι γὰρ τῆς
 καρδίας, ἐπιπλησίκαρτεσιν. σκο-
 τόδιον, λεπτοθυμίαν, νάρκη, καὶ πα-
 ρέσιες μελέων, ἰδρῶς ἀχρεῖα που-
 λῆς, ψύξις, ὄλου ἀναισθησίη, ἀφωνή.
 πούδῃ τὴν σῶμα χον πᾶσαι τὰς δε-
 ἄπια δὲ αὐτέου ἰδία, ναυτίη, ἔμε-
 τος, ἀποσιτίη, λυγξ, ἐρεύξιες, ὄξυ-
 ρεγμίη. Ἐπι τῶσι καρδιώσους, καὶ
 ἀναισθησίη ὄξυτεροι, ὡς ἰδίαι καὶ ἀκῶ-
 σαι μᾶλλον ἢ πρὸς ἄλλοι. καὶ γνώμη
 δις ἀθέστροι, καὶ ψυχῆ καθαρῶ-
 τεροι, καὶ τὰς δεξὶς εἰς τὰ παρῆοντα
 μῦνον, καὶ ἐς τὰ μέλλοντα μακρὰς
 ἀπεκείες. μὴ οὐδὲ καὶ αἰδέσονται
 (αἰ) δυνάμεις, ἀλλὰ καρδίας, ἐν-
 θαλῆ καὶ ψυχῆ, καὶ φύσις αὐτέης ἦν,
 εἰς ἦν καὶ τὸ πάθος ἢ τῶν τῆς δεξ-
 ῆς ἀμέων. ἐσι δ' ἡσ τῆς νόσου ἡδὲ ἢ
 ἔκλυσις τοῦτόν τῆς φύσιος ἐπὶ
 αἰτίη ψύξι καὶ ὑγρότητι. καὶ γὰρ
 ἀθερμοί, καὶ τὰ εἰσὼ καὶ τὰ ἔξω, καὶ
 ἀδύψοι, καὶ ψυχρὸν ἀναπνεύσαι,
 κῆν ἐκ μεγάλων καὶ καυσωδέων
 ἐσι πυρετῶν, ἔξ ὧν περὶ ἐξάπτεται
 ἡ ξυγκοπή. εὐτε μὲν γὰρ ἐρρώται
 ἡ φύσις, καὶ ἐστὶν εὐκρατος, πάντων
 μὲν κρατέει, πᾶσι δὲ σημαίνει, καὶ
 ὑγρῶ, καὶ πνεύματι, καὶ σερεοῖσι, καὶ
 τῆ τούτων εὐταξίη, καὶ ξυμμετεσίη,
 ἐς ζωὴν διέπει τὸν ἄνθρωπον. ἦν δὲ
 τῆς φύσιος ὀδυσμός, τούτῃσι ὁ τό-
 νος λυθῆ, τότε γίγνεται τὸ πάθος.
 κατὰρχαι δὲ αὐτέες καῶσος, ὅς ἐστι
 τοῖός δε.

paruos debilesque, cordis concussio-
 nem cum uehementi palpitatione,
 uertiginem, animi deliquium, torpo-
 rem membrorum, resolutionemque,
 copiosum sudorem, qui supprimi ne-
 queat, refrigerationem in toto corpo-
 re, sensus uocisque priuationem. Di-
 cendumne est hæc stomachum per-
 peti? Sed quæ nam ei propria? Nausea,
 uomitus, cibi fastidium, singultus,
 eructatio simplex, uel acida. Illi præ-
 terea, quibus cor laborat, sensus aci-
 em exquisitiorem habent, ut uideant,
 ut exaudiant plus, quàm antea. Men-
 te etiam sunt firmiore, & animo pu-
 riore. Proinde non tantum præsentia
 declarant, uerum etiam futura ueris-
 sima diuinatione prædicunt. Numne
 igitur & hæ stomachi potestates sunt?
 hercule minimè, sed cordis, ubi & ani-
 ma & eius natura inhabitat, ad quod
 & uirtutum ibi sitarum calamitas per-
 tinet. Huius uerò morbi est tenoris
 naturæ destructio, autore frigido hu-
 midoque. Quippe hoc oppressi intus
 & in cute refrigescunt; non sitiunt:
 frigidum spirant; quamuis magnis
 ac perurentibus febribus, unde ipsa
 syncopa dependet, affligantur. Natu-
 ra enim robusta & probè temperata
 omnia superat, omnibus dominatur,
 ac per humorem & spiritum & solida,
 horumque omnium conuenientem
 ordinem & modum hominis uitam
 administrat. Quod si naturæ nexus
 tenor dissolutus sit: tunc affectus ori-
 tur, cuius prægrediens causa est com-
 burens febris, quæ Græce causus di-
 citur. Ea uerò huiusmodi est.

DE



DE CAUSO, IDEST, ΠΕΡΙ *ΚΑΥΣΩΝ.

febre uftoria.

Caput IV.

Κεφάλ. δ.

Ignis passim & acer & tenuis est: sed intus maximè. Spiritus tanquam ab igne, calidus. Aëris uehemens attractio. Frigidi cupiditas. Lingua arida. In labijs & cute squallor. Algent extrema. Lotium quàm biliosissimum. Infomnietas. Arteriarum motus crebri, parui, imbecilli. Oculi puri, lucètes, subrubri. Facies benè colorata. Quod si morbus ulterius crescit, omnia maiora & sæuiora fiunt. Arterix minimis motibus & creberrimis agitantur. Ignis aridissimus & acerrimus. Mens delirat, *neminem agnoscit*. Siticulofi fiunt. Omnia frigida attractare cupiunt, parietem, uestem, pauimentum, humorem. Manus frigent, sed palmæ perquàm calidæ. Ungues liuent. Spiratio crebra est. Roscidus humor circa frontem & jugula. Cùm ad summam ariditatem caloremque corporis natura peruenerit, tum calidum in frigidum, squallor in imbrem conuertitur. Rerum namque ad maximam molem incrementa in contrarium statum prolabantur. Vbi ergò naturæ nexus soluti fuerint, ea syncopa est. Tunc sudor ingens toto corpore funditur, & nullo pacto compescitur. Spiratio frigida est, *magnam nares uolunt anhelitum*, id est, siti non uexantur. Cætera enim exaruerunt: quin etiam alia instrumenta, sitiunt os & gula: urinæ tenuis & aquea redditur. Alius plurimum astricta est: nonnunquam tamen pauca quædam biliosa descendunt copiosa & *mador ingens* redundat: ossa quoque tabescentia diffuunt: & undique, ut in

Πῦρ μὲν πάντη κῆ δριμύ κῆ λεπτόν. μάλιστ' ἴστω. ἀναπνοὴ θερμῆ, ὡς ἐκ πυρός. ἤερθ' ὀλκὴ μεγάλη, ψυχροῦ ἐπιθυμίη, γλώσσης ξηρότης, αἰασμὸς χειλέων καὶ δέρματος, ἀκρεα ψυχρὰ, ἔρα χολόβαφα *κα-
 τακορέως, ἀγρυπνίη, σφυγμοὶ πυκ-
 νοὶ, σμικροὶ, ἐκλύοι. ὀφθαλμοὶ ἐυα-
 γέες, λαμπεροὶ, ὑπερυδροὶ. πρῶ-
 τῶπε εὐχεοίη. ἠὲ ἴστω μᾶλλον αὐ-
 ξητὸ πάθος, μέζω τὰ πάντα κῆ κακίω. σφυγμοὶ σμικροτάτοι κῆ πυκνότατοι, πῦρ ξηρότατον κῆ δριμύτατον, γνώμη πῶδ' ἀφορθ', πάντων ἀγνωσίη, διψώδεις, ψαύσαι ψυχροῦ ἐπιθυμίη, τοίχε, ἐδῆτος, ἐδάφους, ὑγρὰ χεῖρες ψυχρὰ, θέναρα θερμότατα, ὄνυχες πελιδνοὶ, ἀναπνοὴ πυκινὴ, νοτὶς πῶδ' ἐμέτωπα κῆ κληίδας. ἠὲ ἴστω ἀκρον ξηρότης κῆ θερμοσίης ἠκὴ φύσις, τὸ μὲν θερμὸν ἐς ψυχρὸν, ὃ δ' αὖχμὸς ἐς *ἐπομβρίνην τρέπε'. αἰ γὰρ τῷ πρηγ-
 μάτων ἐς τὸ ἔλατν ἴστωσίης, εἰς τὴν ἐναντίην *μέταβαίνουσι ἰστέν. *ἐπὶ τὴν ἐν λυθῆ τὸ φύσιος τὰ δεσμα. τὸ δ' ἐς ἠ συγκοπή. τότε ἰδρὼς *ἀχρεθ' πάντα τὸ σῶμα, ἀναπνοὴ ψυχρῆ. αἰτμὸς ἀνὰ ρῖνας πελὺς, ἀδιψοὶ. ἐξήσαν γὰρ ἄλλα. ἀτὰρ κῆ τὰ ἄλλα διψαλέα ὄργανα, σῶμα, σῶμαχος. ἔρα λεπτὰ, ὑδατώδεια, κοιλίη τὰ πολλὰ μὲν ξηρῆ. ἐστὶ γὰρ οἷσι ὑποφέρεται βραχέα χολώδεια, πουλὺς πλάσθ'. διαρρέη δὲ καὶ τὰ ὄσα λυόμενα. κῆ γὰρ πάντων ὡς ἐν ποτα-

* καυσῶν

* κατακορέως

* ἐπομβρίνην.

* μεταβαίνουσι.

* ἐπὶ τοῦ.

* τοῦ σῶματος πάντα ἀχρεθ'.



ποταμῶ ἐς τὰ ἔξω ἢ φορῆ. Ψυχῆς
κατάστασις, αἰσθησις σύμπασα κα-
θαρή, διανοία λεπτή, γνώμη μαν-
πική. προγνωστικοὶ μὲν οὖν πρῶ-
τα μὲν αὐτέοισι ἔβίε τιμὴ με-
ταλλαγῶ. ἔπειτα τοῖσι παρεούσι
προλέγουσι τὰ αὐτοῖς ἐσόμματα. οἱ
δὲ αὐτέοισι μὲν ἔσθ' ὅτε, καὶ ἄλλο
φασὶ δοκέουσι. τῇ ἀποβάσει δὲ τῶν
εἰρημῶν * θωμάζουσι ὡν ἄνθρωποι.
μετεξέτεροι δὲ καὶ προσλαλέουσι
τῶν κατοικομῶν πρὸς, τάχα μὲν
παρέοντες * ὀρεοῦντες αὐτοῖς μῦ-
νοι, ὑπὸ λεπτῆς καὶ καθαρῆς αἰσθη-
σις. τάχα δ' αὐτοῦ τῆς ψυχῆς
προγνωσκῶντες, καὶ διηγουμένης
τοὺς ἀσθενεῖς οἷσι ξυνέσονται. προ-
σθεν μὲν γὰρ ἐν ἰλύϊ τοῖσιν ὑγροῖ-
σιν ἔλω καὶ ζόφω. ἐπεὶ δὲ τὰς ἐ-
ξωτλήσει ἡνοῦσθαι, καὶ ἀπὸ τῶν
ὀφθαλμῶν ἰκνῶ ἀχλὺ ἐλεν, ἐρέου-
σι τὰτε ἐν τῷ ἥερι, καὶ γυμνῆ τῇ
ψυχῇ γίνονται μαντικῆς ἀπεκείεσ.
οἱ δὲ ἐς τοσόνδε λεπτότητ' ὑγρῶν
καὶ τῆς γνώμης ἀφιγμένοι, οὐ μά-
λα τοῖς προγίνονται. * ἐξηρω-
μένης ἡσθητικῆς ζωτικῆς δυνάμιθαι.

flumine, ad exteriora omnia dilabuntur. Animus stabilis & constans est, sensus omnis purus & integer: subtile ingenium. Mens uaticinando idonea. Primum quidem seipfos de uita migraturos presentunt, deinde presentibus futura denunciant. Nonnulli uerò interdum eorum dictis fidem non habendam putant, sed dictorum euentus homines in eorum admirationem concitat. Aliqui præterea ex his cum quibusdam uita defunctis sermonem habent: fortasse quidem ipsi soli presentibus acumine & puritate eos adesse cernentes: aut fortè ipsorum animo uiros, cum quibus uersaturi sunt, presentente atque enarrante. Quippe antea in lutulentis humoribus & caligine demersus erat: quos ubi morbus exhausit, & ab oculis tenebras deterfit, quæ in aëre fiunt, prædicant, ex utroque sordibus animo ueracissimi uates efficiuntur. Sed quorum succi & ingenium adeo extenuati sunt, hi non diu admodum solent esse superstites, cum eorum uitalis potentia iam quasi consecrata & non iam humana sed diuina abierit.

* θωμάζουσι.

* ὀρεοῦντες.

* ἐξηρωμένης.

* χολέρας.

ΠΕΡΙ * Χ Ο Λ Ε Ρ Η Σ. DE CHOLERA.

Κεφάλ. ε.

Caput V.

Ἡ χολέρα, παλιννοσός ἐστι φορῆ
τῆς ὑλης τῆς ἐν τῷ παντὶ ἐς τὸν σόμα-
χον, καὶ τὴν κοιλίην, καὶ τὰ ἔντερα, ὁξύ-
τατον κακόν. διεκθέρει ἢ ὑπερθεν μὲν ἐς
ἔμετον τὰ ἐν τῷ σωματικῷ ἀλιζόμε-
να. διὰ ἢ τῆς κάτω διεξόδου τὰ ἐν τῇ

Cholera est materiæ à toto corpore
in gulam, uentriculum & intestina
retro fluēs motio, uitiū acutissimū. Su-
pra enim per uomitum erumpunt, quæ
in ore uentriculi & gula congesta fue-
rant. Infra deijciuntur humores in
uentri-



uentriculo intestinisque natantes. In primis quæ euomuntur, aquæ similia sunt : quæ anus effundit, stercorea, liquida, tetriq̃ue odoris sentiuntur. Siquidem longa cruditas id malum excitauit. Quod si per clysterem eluantur: primò pituitosa, mox biliosa feruntur. Initio quidem facilis morbus est, dolore uacans : postea uerò tentiones in ore uentriculi & gula : tormina in uentre nascuntur. Si magis sæuiat morbus, & tormina augetur : anima deficit, membra resoluuntur, cibos exhorrent, animus consternatur. Si quid acceperint, cum magno tumultu nauſca & uomitus inuadit, tum syncerè flaua bilis expellitur: deiectiones quoque similes sunt. Nerui tenduntur, tibiarum brachiorumque musculi conuelluntur, digiti incuruantur. Vertigo oboritur, singultiunt, ungues liucent, algent extrema. Totum corpus rigore concutitur. Si malum ad ultimum uenit, *tunc uero egrotus* sudore perfunditur, bilis atra supra infraque prorumpit. Conuulsione impedita uesica lotium cohibetur: quod tamē, cum in intestina humores deriuentur, abundare non potest, uoce priuantur, arteriarum pulsatus minimi sunt ac frequentissimi: cuiusmodi in syncopa proposuimus. Conatus ad uomendum perpetui ac inanes fiunt, inclinatio ad deiciendum prompta, quam tinesimon Græci uocant: sicca tamen, nihilque succi egerens. Mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per conuulsionem, strangulatum, & inanem uomitum. Id genus maximè ætate grassari consuevit, secundo per autumnum, minus uere, hyberno tempore minimè. Inter ætates autem iuuenta, & ea, quæ robustior est, hoc ferè

κοιλίη καὶ τοῖς ἐντέροις ὑγρὰ, ἰδίω δὲ τὰ πρῶτα μὲν ὑδατώδεια τὰ δὲ ἐμέτε. τὰ δὲ δὲ ἕδρης, κόπρωνα ὑγρὰ, δυσώδεια * ἀπέψιες γὰρ ξυνεχές καὶ τῆς δευτεροβάσιες. καὶ δὲ τὰ δευτεροκλυθῆ, φλεγματοῦδεια, ἔπειτα χολώδεια. τὰ πρῶτα μέρη, * ῥιπίδιως ἀπονθ. ἔπειτα δὲ ξὺν ἐντάσει μὲν ὁ σόμαχθ, γαστρὸς δὲ μετὰ σφόδρον. καὶ δὲ ἐς τὸ κάκιον Ἰπιδιθῶ, καὶ σφόδρι * μείζονες, λειποθυμία, ἐκλυσις μύρων, * ἀπορίη, ἀποσιτίη. καὶ δὲ καὶ πωροσενέγκωνται, πολλῶ ῥοίζω ζὺν ναυτή ἐς ἐμέτον διεκτέει ξανθὴ χολὴ κατακορέως καὶ τὰ διαχωρηματῶ ὅμοια. σπασμοὶ, ξυνοληκαὶ μυῶν τῶ ἐν τῇ κνήμη, καὶ βραχιόνων. δάκτυλοι καμπύλοι, σκοτόδρινοι, λυγξ, ὄνυχες πελιδνοὶ κατὰ ψυξίς, ἀκρεα ψυχρὰ, καὶ τὸ ὅλον ῥιγώδεις. καὶ δὲ ἐς τελευτὴν ἦκη τὸ κακὸν, ἀταξίδηροὶ ὁ ὄνθρωπθ, χολὴ μέλαινα ἀνω καὶ κάτω. ἔρα * χεθεῖσα κύσις ὑπὸ σπασμοῦ. ἀλλ' οὐδὲ οὖρον ἀλιζεται ὑπὸ τῆς ἐς τὸ ἔντερον τῶν ὑγρῶν μετοχευθῆσεως. ἀφωνίη, σφυγμοὶ σμικροτάτοι καὶ πυκνοτάτοι, ὀκόσοι Ἰπὶ ξυγκοπή. ἐντάσεις ἐμέτε * ξυνεχές, κενεαί, πωροθυμία τεινεσμάδεις, ξηραί, ἀχυλοὶ. θάνατθ ἐπόδυνθ καὶ οἰκτιςθ, * σπασμῶ καὶ πινγι, καὶ ἐμέτω κενῶ. φέρε μὲν τὸ πάθθ, * ὥρη μὲν θέρεθ, δευτεροδὲ φθινόπωρον, ἤρῃσσον, χιμῶν ἠκίσα, ἠλικίαι δὲ, αἱ τῶν νέων καὶ * ἀκμαζόν-

* ἀπέψιες.

* ῥιπίδιως.

* μείζονες.

μελέων

* ἀποσιτίη.

ἀπορίη.

ὄνθρωπος

* χεθεῖσα κύσις.

* ξυνεχές κενεαί.

* σπασμῶ.

* ὥρη μὲν θέρεθ.

* ἀκμαζόντων.



μαζόντων, γῆρας ἥκιστα, παρσία
δὲ, τουτέων μᾶλλον, ἀλλ' οὐ θανα-
τώδεια.

corripiuntur : senecta rarissime:
pueri magis, quàm senes, sed non mor-
tiferè.

Π Ε Ρ Ι Ε Ι Λ Ε Ο Υ .

D E I L E O G R Æ C E

uocato, latine uoluulo.

Κεφάλ. 5.

Caput VI.

Εντέροισι γίνεταί μὲν φλεγ-
μονή, ὁδύνην ὀλεθρίην ἐμποιῶσα.
θνήσκουσι γὰρ μυεῖοι σφόδρῳσι καρτε-
ροῖσι. ἐγγίγνεται ἢ καὶ πνεῦμα ψυ-
χερόν, δέρον, οὔτε κάτω περῆσαι ῥή-
διον, οὔτε ἀνω ἀπιδέσθαι. μίμ-
νει δὲ ἴσχυρὸν ἐλισσόμενον, ἐν ὀ-
λίγησι τῷ ἀνω ἐλίξει. τουτέων καὶ
τὸ πάθος ἴσχυρῶν ἔχειν εἴλεον.
κῆν πρὸς τοῖς σφόδρῳσι ἢ καὶ πίεσι,
καὶ μάλθαξις τῷ ἐντέρων ἔη, καὶ
πουλὸν τὸ ὑπογάστριον ὑπερείχει
χολοδαψὸς * τῷ ἰσχυρόν ἐστι. ἔνομα δ'
ἐψησὶς μὲν γὰρ ἡ μάλθαξις. χολο-
δὴ δὲ ἐντέρων ἐπώνυμον. καὶ γὰρ καὶ
ἴσχυρῶν τὸ μεσεντέριον ἐκί-
κλησκονοί πρὸθεν, τὰ μεσηγυ νεῦ-
ρα καὶ τὰ ἀγγεῖα, καὶ τοὺς ὑμέ-
νας τοὺς ἀνοχῆας τῶν ἐντέρων. ἀ-
πὴ τῆ εἴλεου, συνεχῆς μὲν διαφ-
θορῆ σίτων πολλῶν τε καὶ ποικί-
λων καὶ οὐ * ξυνηθέων, καὶ ἄλλη ἐπ'
ἄλλη ἀπεψίη, μάλισα δὲ ἴσχυρῶν τοῖ-
σι εἰλεώδεις, ὁκοῖόντι μέλανι * ση-
πίης. ἐκ ἀδόκητῳ ἢ * πληγῆ, ἢ ψύ-
ξις, ἢ ψυχροποσίη ἐφ' ἰδρωτί, * ἀδ-
δίω ἢ χανδίον. καὶ οἷσι ἢ ἐντέρον ἐς τὸν
ὄρχεον ξὺν κόπρω κατέβη, καὶ οὐκ ἀ-
νώδην ἐς τὴν κοιλίην, ἀλλ' ἀνελήφθη

P Hlegmone in intestinis gignitur
perniciosum dolorem mouens:
quippe innumeri torminibus acer-
bissimis necantur. In hisce & frigidus
flatus & lentus colligitur: nec infra,
nec supra facile penetrans. Commo-
ratur autē diu, perq; superiorum inte-
stinorum angustos anfractus reuol-
uitur. Vnde & affectus ilei Græcè,
Latine uoluuli nomen accepit. Quòd
si ad tormina compressio & remolli-
tio intestinorum accesserit, multum-
que imum uentrem superauerit, id
uerò iam chordapsus est, quod nomen
ultima parte elixationem, remollitio-
nem ué significat. Chorde autem in-
testinorum uocabulum est: Laetes
enim Epicordida Græci ueteres no-
minarunt, neruos sc. interiacentes,
& uascula, & membranas: quæ inte-
stinorum stabilimenta & fulcimina
sunt. Voluuli causa est perpetua cibo-
rum multorum, diuersorum, inusta-
torumque corruptio: & alia super
aliam cruditas, præcipuè ab esu ci-
borum, qui uoluulum excitare con-
sueuerunt. Quale est sepia atramen-
tum in ferculis sumtum. Idem exi-
stimandum de plaga est, de frigore,
defrigidæ potione: si, dum quis sud-
dat, eam largè abundèque ingurgita-
uerit. Ad hæc his uoluulus accidit,
quibus intestinum cum stercore in
scrotum procidit, neque in uentrem
repulsus, sed per uim retentum
fuit,

* δι.

* ξυνηθέων.

* σηπίης.

† οὐδε.

* ἀδδίω.



fait, his inferiora intestina phlegmo-
ne uexari solita sunt. Pucros hic affe-
ctus crebrò malè habet: ut pòte quos
sæpè cruditas infestat. Hi tamen sæ-
pius etiam sanescunt cum ob consue-
tudinem, tum ob humiditatem in-
testinorum, lubrica enim sunt. Senes
rarò afficiuntur, sed multò pernicio-
sius. Æstas magis, quam Ver huius
mali referta est: Autumnus, quam
Hyems. Æstas utrunque superat. Mul-
ti quidem ui torminum repentè inte-
recunt: alijs intestinum suppurat, de-
inde nigricans tunc, & putrefactū ex-
cidit, atque ita deficiunt. Mediocrem
uoluulum hæc symptomata comi-
tantur, dolor oberrans in stomacho,
mador, exolutio, mollitia, ructus ina-
nes, nihil proficientes. Aluus flatibus
perstrepens, qui ad podicem usque
properant, sed ibi exitus intercluditur.
Sin autem ex toto voluulus occupet:
omnia sursum petunt flatus, pituita,
bilis, hæcque uomitu prodeunt. Fi-
unt perpallidi: frigent toto corpore:
acerbo dolore cruciantur, malè spi-
rant: sitiunt. Quibus uerò iam iam
mors instat, gelidus sudor emanat:
urina difficulter exit: anus tam ar-
ctè clausus est, ut neque uel tenuem
acum possis adigere: sterCUS per os
redditur, uox aboletur. Arteriæ ra-
rò inter initia & parum micant: in-
stante morte minimè, creberrimè,
tandem micare desinunt. Hæc sunt,
quæ tenuibus intestinis affectis

βίη. τουτέοισι ἔσθ' Ἰπιφλεγμαί-
νειν ἡ κάτω έντερα. ξυνηθες δὲ τὸ
πάσθ' παιδίοισι, * οἷσι περ ἀν καὶ * οἷσι περ.
ἀπεψίη ἢ, καὶ τὸ βλάβ' διαδι-
δράσκουσι. μάλλον δὲ, διὰ τὸ ἔ-
σθ', καὶ τὸ ὑγρότητα τῶ έντέρων.
ὀλιγὰ γὰρ. γέροντες δὲ, οὐ μά-
λα μὲν πάχουσι, ἀεὶ γίνονται
δὲ ἥκιστα. ὡρὴ θέρει τίκτει μάλ-
λον ἥρ', φθινόπωρον δὲ χειμῶ-
ν', ἀμφοῖν δὲ Ἰπιμᾶλλον θέρει.
πολλοῖσι μὲν οὖν Ἰπι * τουτέοισι * τοῖσι τοῖσ'
σφόφοισι. θνήσκουσι αὐτίκα. μετε-
ξέτεργισι δὲ καὶ * πύ' ἐγγίγνε-
ται, καὶ αὐθις μελανθὲν τότε τὸ έντε-
ρον καὶ διασαπὲν ἐξέπεσε, καὶ οὕτως
ἐξέλιπον. ξυνηθες δὲ αὐτέοισι, εἰ μὲν
Ἰπιεικῆς εἰλεὸς εἴη, πόν' ἐλιωσό-
μην', σομάχου πλάσθ', ἐκλυ-
σις, μαλακίη, ἐρεύξιες κεναὶ καὶ
οὐδὲν ὠφελοῦσαι, κοιλίη ὑπο-
βορβορίζουσα φύσησι, ὀλοιοπο-
εἴη * μεσφί ἐδρησι, διεξοδοῖ δὲ
ἀτελέες. καὶ δὲ Ἰπι πᾶσιν ἰχνη ὀει-
λεὸς, πάντων ἀνω ἢ φορῆ, πυθμά-
των, * φλέγματος, χολῆς * ἐμοῖσι * φλέγματος
γούν τάδε. ἔξωχοι, ψυχροὶ τὸ πᾶν * ἐμοῖσι
σκῆν'. πόν' πουλὺς, ἀναπνοὴ
κακὴ, διψαλέει. καὶ δὲ καὶ θνήσκου
μέλλωσι, ἰδρωῶς ψυχρὸς, δυσου-
εἴη, ἐδρη ἀπολελημμένη, ὡς μηδὲ
ἰχνην ἔλασμα διελάσαι. κόπρων
ἔμετοι, ἄνθρωποι ἀφωνοί, σφυγ-
μοὶ πρόσθεν μὲν δραστοί, σμικροί.
πρὸ θανάτου δὲ σμικρότατοι, καὶ
πυκνότατοι, καὶ ἐκλείποντες. τάδε
μὲν οὖν τοῖσι λεπτοῖσι έντέροισι
ξυνημ-



* ξυμπέσει. * ξυνεμπίπει, ἀτρε καὶ κώλωτα αὐ-
 τὰ πάθεα γίνονται, καὶ τὰ ξυνόνα
 ὁμοια, καὶ ἡ αὐτὴ συμμορφή. τρετέ-
 ων δὲ μετέξετεργι διαδιδράσκασί
 κότε, καὶ * πύθ* ἐγγένητε τῷ κώ-
 λω. αἰτή τὸ βάρθ* τὸ σαρκοειδές
 * πύθ. * ἐγγένηται. * ἰχνός.
 ἔντερον. πόνθ* δὲ * ἰχνός μῦ, ἢ ὃ
 ὄξυς ἐπὶ τοῖσι λεπτοῖσι ἐντέροισι (πλά-
 δος ἢ καὶ βάρος ἰχνόν ἐπὶ τῷ κώλω. δι-
 άσει δὲ ὁ πόνος, ἄλλοτε μῦ ἐπὶ τῆσι
 πλδρησι) ὅτε φαντασίη ἐγγίγνε)
 πλδρείθ*, καὶ γδ καὶ πυρεταίνεσι
 οἴδε. ἄλλοτε ὃ ὑπὸ τῆσι νωθῆσι ἐν-
 θάσει καὶ ἔνθα, ὡς δλοκείν τλω ὀδυ-
 νλω ἢ πάτος ἢ σπληνός ἐμμενα, αὐ-
 θίς κότε ἐν τοῖσι κενεῶσι. πολλὸν γδ
 τὸ κώλωψ ἢ παντὶ ἰλικας ποιούμε-
 νον. μετεξετέροισι ὃ, καὶ ἐς τὸ ἰερόν ὀ-
 σέον ἐρείσει, καὶ ἐς μηρούς, καὶ διδύμων
 κρεμασῆρας. ἐπὶ δὲ τοῖσι κωλικοῖσι,
 ἔμετοι πλεῦνες κενοί, τῷ ὃ ἐμδίμῳ,
 λεπία, χολώσια, ἐλαμοειδέα. ἔσι
 δὲ ὁ ἐντεῦθεν κίνδυνθ* τσονδρε
 αἰσίνεσεργς ὀκόσον καὶ τὸ κώλον τῷ
 λεπίων ἐντέρων σαρκοειδέσεων, καὶ
 παχύτερον, καὶ ἀεξικακώτερον.

incidunt. Verum & in pleniore inte-
 stino, quod Græci Colon uocant, ij-
 dem affectus oriuntur, eademque
 symptomata eandem formam reti-
 nentia. Sed nonnulli, quibus colon
 suppurat, huiusce morbi discrimen
 effugiunt. Causa est huius modi affe-
 ctus carnosa intestini crassitudo. Do-
 lor autem in gracilibus quidem inte-
 stinis tenuis est & acutus: in pleniore
 uerò intestino est redundans humidi-
 tas, & incumbens grauitas, dolorque
 modò ad costas usque superiores af-
 cendit, quando & speciem lateralis
 morbi præferet, siquidem & isti fe-
 bricitant: modo sub spurias costas in
 dextram aut in læuam partem ascen-
 dit sic, ut jecur aut lien dolere uide-
 antur, item & ilia nonnunquam do-
 lore torquentur. Colon namque præ-
 grande est, & quoquouersum se cir-
 cumuoluens. Quidam sunt etiam,
 quibus & in sacro osse dolor inhæret
 cit, & in femoribus & illis in locis,
 quibus testes appenduntur, Græci
 Cremasteras appellant. Qui hoc gene-
 re tentantur, uomitione plerunque
 inani laborant. Quod siquid rejece-
 rint, id est subtile, biliosum, olei simile.
 In hoc malo periculum tantò leuius
 est, quanto laxum intestinum tenui-
 bus corpulentius, pinguius, & noxæ
 tolerantius est.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ
 ἥπαρ ὀξέων παθῶν.

Κεφάλ. ζ.

* αἷμαθ.
 Τῶν ἀπὸ καρδίας οἱ ἀπὸ ἥπατος,
 οὐκ ὠκύτερον μῦ, ἔπιπνονώτερον ὃ
 θνήσκασι. ἔσι γδ * αἷμαθ* πάγος
 τὸ πλείστον ἥπαρ. καὶ ὃ ἐν τῆσι πύλῃσι
 αὐτέου ξυμπέση πὲρ θανάτου αἰτή,
 ἐμείον ὀξέως ἢ οἱ καρδίας θνήσκασι.
 ὑμέσι γδ καὶ τόνοισι ἔπιπκάροισι καὶ

DE ACUTIS IECO-
 ris affectibus.

Caput VII.

Quibus jecur malè habet, ἢ non ce-
 lerius, quàm qui corde ægrotant, sed
 maiore cruciatu perimuntur. Maxima
 enim jecoris pars sanguinis concre-
 mentum est. Si in huius autem uif-
 ceris portis aliqua incidat causa mor-
 tifera, æquè, ac si corde laborant,
 celeriter consumuntur. Ratio in
 promptu est, quia uidelicet hæ
 partes membranis, tonis gracilibus
 &



& magni ad uitam momenti, grandioribusque uenis contexitur. Præterea, ut sapientū quidam prodiderunt, hoc loco appetitricis animæ domicilium est. Sanguinis utique profluvia è jecore omnium maxima fiunt: neque ab re: uenarum enim radicatio jecur est. Itaque in ipso magna uomica haud ita frequenter, neque in particulis magis præcipuis oritur. Homo enim uita excedens præuenit. At exiguæ frequentius eueniunt. Inde fit, ut mortem quidem euadant, sed longinquo morbo impliciti crucientur. Ipsius enim functionis, qua sanguinem condit, cessatio non conceditur, neque dilatio: atque hinc ad cor & ad uiscera *intra septum* sanguis diffunditur. At si qua magna injuria, ut puta uerbere, longa ciborum multorum uitiosorumque corruptione, ebrietate, uehementi refrigeratione phlegmone in portis jecoris excitatur, tunc ægrotus celerrimè jugulatur. Ignis enim in profundo corpore depascitur, obscurus, acer. Venarum motus torpent. Doloris species uariæ & diuersæ sunt. Nonnunquam enim dextra in parte defigitur adeo, ut acutum telum adactum esse uideatur. Interdum torminibus similis est. Rursum uerò interdum dolor cum summa grauitate coniungitur: atque inter dolendum uirium debilitas uocisque casus incidit. Transuersum septum, & interna costarum tunica inferius detrahuntur. Quoniam inde jecur suspensum onere suo degrauat. Proinde ad jugulum è regione oppositum uehemens dolor peruenit. Tussicula quædam imperfecta, seu potius tantum ad tussim conatus est. Si quando uerò tussunt, nihil reddunt, uitiosè spirant: neque enim pulmōni transuersum septum opitulatur, ei ad constringendum ac dilatandum morè

λεπτοῖσι, καὶ φλεψὶ μεγάλησι ἐξυφανται. τὰ δὲ τὰ μέρεα. ὡς δὲ καὶ τῶ σοφῶν ἀφηγέονται πνευ, καὶ ψυχῆς ἐπιθυμίη * πῶς ἐγκάθη). αἰμορραγίη μὲν γὰρ ὑπερβαίνει πάντα πολλόν. ῥίζωσις γὰρ φλεβῶν, ἥ παρ γίγνεται. ὡν ἐν αὐτῷ μεγάλη μὲν φλεγμονή, οὐκ ἀεὶ ξυνεχέως, οὐδὲ ἐν πῶν ἐς τὰ ἐπικαυρα χεῖρα. φθάνει γὰρ ἐξελθὼν ἔζην ὄνθρωπος. σμικροτέρη ἢ θάμινα. τὺνεκεν διαδιδράσκει μὲν τὸν ὄλεθρον, μακρότερα ἢ νοσήουσι. ἐργου γὰρ αὐτῆς ἔκατὰ τὴν ἐξαιμάτωσιν, οὐκ ἐστὶν ἀνάπαυλα, οὐδὲ ἀμβολή. ἐπὶ δὲ πρὸ καρδίου, καὶ τὰ ἐν ἔρθεν ἔδιαφραγματῶ. ἐντεῦθεν γὰρ τὰ αἵματῶ ἀφῆσιες. καὶ ἐπὶ * μείζονι αἰτίη πληγῆ, ἢ διαφθορῆσι ξυνεχέσι πολλῶν καὶ κακῶν σιτιῶν, καὶ οἰνοφλυγίη, ἢ ψυξι καρτερῆ, καὶ ἐν τῆσι πόλησι γίγνεται φλεγμονή, ὡκίσιος ὄλεθρος. πῦρ μὲν γὰρ ὑποβρύχιον, ἀλαμπῆς, δριμύ, σφυγμοῖνωδροί. πόνου ἰδέη ποικίλη καὶ παντοῖη, ἄλλοτε μὲν ἢ ὀδύνη ἐπὶ (τὰ) δεξιὰ διεληλαμμένη, ὡς δοκίειν ὄξυ βέλος ἐγκέεας. ἄλλοτε ἢ, εὐρόφω ἰκέλη. αὐθις ἢ κοτε, πόνῶ βαρῆς, βαρύτατῶ, μεσηγὺ ἢ τῆς ὀδύνης, ἀτονίη, καὶ ἀφωνίη. διάφραγμα καὶ ὑπερζωκὸς ἐλκοντα. ἀπὸ τῶ δὲ γὰρ ἀχθῶ τῆ παρῆρησι. διὰ τὸ δὲ ἐς τὴν κατ' ἴξιν κληῖδα ὀδύνη καρτερή. βῆξ δὲ ἀτελής. πνευμίη ἢ μόνον κῆν ἐς τέλῶ κοτῆ ἀφίκη), ἔρη. ἀναπνοὴ κακή. εἰ γὰρ ξυμπωρῆει τῶ πνεύμονι τὸ διάφραγμα, ξυνομαρτέον ἐς ξυναγωγὴν καὶ διάσασιν.



διάσασιν. πνεῦμα σμικρὸν ἔλκυσσι, ἐκπνέουσι μέζον. χροὶν μελάγχλωροι, μολιβοειδέες, δπόσιτοι. ἢν ὅ πωροσενέγκων) φουσώδεες τῶ ὑποχονδρίῳ. ῥάξιες χολώδεες ὀξίζυσαι, βρομώδεες. ναυτίη, διάσασις κενή, γαστήρ ἀπολελυμένη τὰ πολλὰ χολώδεα, γλίχρα βραχέα. αἰεὶ ὅ ἐπαυξία γίγνετ) τὰ πάθεα. γνώμη ἐκέρτα ἀθάφορθ, νωθρή, μετέωρος, τετυφωμένη, ἠόκνος πουλὺς, ψύξις ἀκρέων, τρέμοι, ῥίγεια, λυγξικενή, σπασμώδης, ἰκτερος, χολή ἀκρητός, χολόβαφοι τὸ πᾶν. καὶ ὅ καὶ πωρὸ ἐβδόμησ φανή, καὶ ἄλλους ἐκλεινε συχνούς. ὀκόσοι ὅ ἢ αἰμορραγίη, ἢ κοιλίης ταραχῶ πολλοῖσι χολώδεσι, ἢ οὔροισι ἀκρητοῖσι συχνοῖσι, τὸν ὀλεθρον διήλαντ, τυλίοισι (ὅ) μετὰ τρεῖς ἐβδομάδας ἐς δπόσασιν πύξ τὸ ἦπαρ τρέπετ). καὶ ὅ ἐπὶ πολλὸν ὑπερβάλλη χρονον αἰδὺ δπόσασιθ, ἐς ὑδρωπα ἀφυκτον τελευτᾷ. διψαλέοι, βραχυπότ), ξηροὶ τὸ σῆνος, ἀλιπέες. ὀξέων Ἰπθυμίν, ἀποιοσ ἢ γδύσις. πίκτηι ὅ τὸδε τὸ πάθος φθινόπωρον σὺν πλῆθος ὠείων, καὶ ποικίλων ἀπεψίη. ἠλικίη δὲ, πασέων μᾶλλον ἀκμή.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ

τὴν κοιλίην φλέβα ὀξείης νόσου.

Κεφάλ. η.

Ἀπὸ τῶν πυλέων Ἰ ἦπατθ δὲ εἰα φλέψ διαίεται μέση τῶν τῶδε περάτων. αἰεὶ γδ ἐς λεπία καὶ πλεῦνα χιζομένη, Ἰπὶ τέλος ἐς ἀφανέα τῆσι ὄψιαι πάντα Ἰ ἦπατθ σκίονα).

gerens, paulum aëris adducunt, plus expirant, colore ex atro uiridique permixto infecti sunt, plumbea sc. specie, cibos oderunt. Quod si quid sumserint, eis inflantur præcordia, ructus biliosi, acidi, graueolentes exeunt, nauseant, inaniter distenduntur. Venter solutus multa biliosa excernit, uiscida pauca: sed perpetuò auferunt mala. Mens haud ita multum delirat: torpida, suspensa, & attonita est. Magna est in corpore segnitias, extrema frigent. Tremor adest, horrores, singultus inanis, conuulsioni similis, morbus regius: pura bilis, totumque corpus bilioso colore suffunditur. Quin morbus regius ante septimum diem si apparuerit, plurimos sustulit. Quibus autem uel sanguinis profusio, uel per aluum multorum biliosorum exturbatio, uel urina sincera plurima effluens mortem depulit, post tres septimanas jecur his suppurat. Quod si multum temporis citra abscessum prætereat, in hydropem ineuitabilem terminatur. Hi siticulosi sunt, parum tamen bibunt. Eorum corpus squallet, pinguedine carens. Appetunt acida, sed gustatus sapor non percipit. Autumnus hoc malum fert, multorum horeorum uariorumque fructuum esum sequente cruditate. Inter ætates florens ei maximè obnoxia est.

DE VENÆ CONCAUÆ acuto morbo.

Caput VIII.

Ab jecoris portis inter eius extrema magna uena ingreditur: quæ semper in tenues pluresque dum scinditur, denique in tenuissimas uisumque latentes toto jecore dispergitur.

Istarum



Harum summis osculis alix uenarum extremitates committuntur : quæ ex gracilibus & pluribus maiores amplitudine, sed numero pauciores confluantur. Demum in medio jecore in uenam unicam grandem coalescunt. Inde hæc in duas partitur, quæ jecoris extrema petunt. Harum altera superius primam fibram penetrans, in eius conuexa egreditur : mox transfuersum septum perforans, in cor inseritur. Hæc uena concaua nominatur. Altera uerò quintam fibram, quæ inferius jacet, traiciens usque in jecoris *concaua* ad spinam peruenit : & eo loco ad coxendices usque porrigitur. Ea quoque eodem nomine concaua nuncupatur : quoniam una & eadem uena est ab initio de jecore exorians. *Si quis enim uelit, lamellā traiciat à superiore uena caua ad cor pertinente, in eam, quæ per spinam perreptat, & à spina per jecur ad cor. Idem enim ascensus est.* Hæc igitur uena, (ut arbitror) uniuersa ægritudines & acutas & ualidas patitur. Nam tota una est atque continua. A nonnullis autem Medicis ea pars duntaxat, quæ secundum dorsum discurret, ægrotare creditur : quoniam eius, quæ cor intrat, notæ obscuræ sunt. Intra pectus enim rei nulli adhærens, sed in pectore subleuata protenditur : donec transfuersum septum egressa cordi inseritur. Igitur si quod ingens malum hanç

ὅτι δὲ τούτων πέρασι * ἄλλων
φλεβῶν περατώσιες κατὰ τὸ σῶμα
ξυγκέονται, ἅπερ ἐκ λεπτῶν καὶ
πλύνων, μέζονες ἢ ἐλάσσονες γίγ-
νονται, Ἐπιτελέως δὲ ἐν μέσῳ τῶ
ἥπατι, ἐς μίαν φλέβα μεγάλην
συναγείρονται. Ἐντεῦθεν δὲ δοιαὶ εἰς
δύο χίσιθ γιγνώσκειται, πέρην τῆ
πατῆ ἀφικνέονται. ἢ μὲν γὰρ αἰὼ
τὸν πρῶτον λοβὸν διαπερήσασα, ἐς
τὴν κερτῆ αὐτῆς εἰσφαίθη. ἔπειτα
περήσασα τὸ διάφραγμα * ἐμφύνη
τῆ καρδίῃ. κοίλῃ φλέβῃ ἦσθε καλέε-
ται. ἢ δὲ ἐτέρη, τὸν κάτω λοβὸν τὸν
πέμπτον διαπερήσασα μέχρι τῶν
κερτῶν. Ἐπὶ τὴν ράχιν * ἔξεισι, καὶ
τῆδε * περατέταται, μέχρι τῶν ἰχί-
ων. αἰὼς καὶ ἦσθε κοίλῃ. ἔνομα γὰρ τὸ
αὐτὸ, ἔνεκεν μία καὶ αὐτὴ ἐστὶν ἡ
φλέβῃ τὴν δὲ χιλῶν δὲ τῆ ἥπατῆ
ἰχουσα. εἰ γὰρ πρὸς ἐθέλει, διελά-
σαι ἂν ἔλασμα καὶ δὲ τῆς ἀνω-
θεν τῆς Ἐπὶ τὴν καρδίαν κοίλης
φλεβὸς ἐς τὴν αἰὼν τὴν ράχιν,
καὶ δὲ τῆς ράχεος διὰ τοῦ ἥπα-
τῆ Ἐπὶ τὴν καρδίαν. ἀνοδῆ
γὰρ ἡ αὐτὴ. ἦσθε οὐκ ἡ φλέβῃ, ὡς
ἐγὼ δοκέω, ἢ ξύμπασα νοσέει ὀξέ-
σι πᾶσι, καρτεροῖσι. μία γὰρ
ἐστὶ πᾶσα. μετεξετέροισι δὲ ἰητροῖσι
μούνη δοκέει αἰὼν τὴν ράχιν νο-
σέειν, οὐνεκα τῆς ἐς τὴν καρδίαν
τὰ σημεῖα οὐκ ἐμφανέα. ἐν τὸς
γὰρ εἰς τὴν ἥπατῆ διατέταται αἰὼς
ἐπὶ τὸν πρῶτον λοβὸν, ἀλλ' ἐν αἰὼν τῆ
κερτῆ τῶ θώρηκι, ἐστὶ ἂν δὲ τῆ δια-
φράγματος ἐμφύνη τῆ καρδίῃ. ἢ
οὐκ ἔστι μὲν μεγάλων κακῶν ἰχὴ τῆνδε



τῷ φλέβα, ξυνέκρυψε ἀμπέχων
 ὁ θώρηξ. γίνεται δ' οὐδ' ἀμφι
 τῷ δε τὴν φλέβα καὶ κέσματα.
 εὔτε ῥηγνυμένη αἰμορραγίη ὤκιστα
 κλείνει. ὑπερθεν μὲν, διὰ πλούμο-
 νος καὶ ἀρτηρίας ἐκχεομένη, καὶ ἐν
 τῷ θώρηκι ῥαγῆ. καὶ δε πῶσα τῷ
 ἀρχῶν, ἐς τῷ κάτω κοιλίω τῶσι
 ἐντέροισι περιέχεται, ὡς ἐμπλείεν
 τὰ ἔντερα, εὔτε πρῶτω κατ' ἐν ἐν-
 φανῆναι τὸ αἷμα, θνήσκουσιν οἶδε.
 ἦν δε ἡ κοιλίη πληροδμήνη αἵματος.
 γίνεται δε καὶ φλεγμονὴ ἀμφι
 τῷ φλέβα, ἀτὰρ καὶ ἡ δε οὐδέως
 κτείνει, ἦν μεγάλη ἔη. πῦρ μὲν γὰρ
 θερμὸν, διακνῶδες, ἐν τῆσι κοιλίησι
 ἀμφοῖν ἐγκαταεργαζόμενον, βραχὺ
 δε μόνον ὑπερέχον, ὡς διακείεν
 ἀπιομένη λεπτῶν ἐμμετρῶν θερμῶν.
 ὁ δε ὠνθρωπος καίεται διακείει.
 σφυγμοὶ μικροὶ, πυκνότατοι, ὀ-
 κοῖοντι πεπεσμένοι, καὶ δεστωγ-
 μένοι. ψύξις ἀκρέων, διψῶν καρτε-
 ρὸν, * σῶματ' ἕρπης, πρῶτω-
 πα ἐρύθημα ξὺν ἀρτηρίῃ. ὑπερ-
 θροὶ δε τὸ ξύμπαν σῶμα. ὑπο-
 χόνδρια σκληρὰ, ἀνεσπασμένα,
 ὀδύνη ἐπὶ δεξιὰ μάλλον, καὶ παλ-
 μὸς τῆς δε πῶσα μήκης μέχρι (τῆς)
 λαγόνος. μετεξέτεροισι δε καὶ τῆς
 ἀρτηρίας τῆς πῶσα τὴν ῥάχιν, καὶ ὁ
 σφυγμὸς ἐς τὸ ἔντερον ὑποχόν-
 δριον διασημαίνει. ξυμπαθῆς γὰρ
 καὶ ἡ δε γίνεται παρ' αὐτέλω ἐπ'
 ἀριστερὰ κειμένη, ὡς τῆς ἐπὶ τῷ
 παντὶ ἐδὲν ἐπικουφίζουσι, ἀλλ'
 ἐδὲ τὸ δέρμα μαλθακίζουσι

* σῶματ'.

uenam corripit, pectore ambiente
 delitescit. In hac itaque uena Cedma-
 ta oriuntur, (sunt autem Cedmata
 diuturni affectus ex defluxu materiæ
 prouenientes) quando sanguis copi-
 osus erumpens citissimè uitam de-
 let. Per superiora quidem per pul-
 mones & arteriam effluens, si in pe-
 ctore fiet effractio: Si iuxta princi-
 pium, in imum uentrem descendens
 in intestinis continetur, atque adeò
 intestina replentur. Cum prius, quàm
 dejectus sanguis in conspectum de-
 tur, homines intereunt. *Quod si uenter san-
 guine plenus sit, in inflammatioq; nascatur,
 circa uenam, si magna sit, ipsa celeriter ho-
 minem tollit.* Ignis enim acer mordax-
 que in ambabus cauitatibus inclusus
 accenditur, paucusque duntaxat fo-
 ris apparet, ut tangenti calor tenuis
 esse uideatur: æger uerò sese combu-
 ri existimat. Pulsatus arteriarum exi-
 gui sunt, creberrimi ac ueluti oppres-
 si, atque repulsi, frigus adest extre-
 morum, sitis aspera, oris siccitas: fa-
 cies decolor rubet: omne corpus sub-
 rubidum est: præcordia dura sunt
 atque reuulsa, dolor in dextra parte
 maior. *Et palpitatio ipsius uena in por-
 rectum ad ilia usq; perueniens: nonnullis
 etiam arteria secundum spinam: quod
 pulsatio in alteris præcordiis manife-
 stat.* Nam & ipsa uenæ cauæ morbo-
 rum particeps efficitur iuxta illam in
 sinistro latere posita, ut potè ea, quæ in
 omne corpus diducitur, nihil leuami-
 nis afferente, neq; cutim emolliente.

Cutis



Cutis autem sic affectorum squalida, rugosa, atque aspera est, sed in partibus prominentibus atque osseis, ut in cubitis, genibus, digitorumque articulis magis talis conspicitur, somni tumultuosi fiunt, alius quibusdam nihil reddit, quibusdam exiguum, acre, biliosum. Lotium flauum mordaxque est, mens utique his constat, sed quadam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur. Tum quotquot hunc habitum uiderunt, cum causi, id est, ardoris speciem appellarunt, quandoquidem quæ adsunt, sub ardoris genere collocantur. Per autumnum hæc labes exoritur, quoniam & quod ferum & immane est adolescentem & florentes occupat, quibus mala uiuendi ratio, laboresque tenuem corporis habitum compararunt. Decimo quarto die hi plerunque moriuntur, quibus morbus diutius trahitur, duplo longiori tempore pereunt. Quotcumque autem aut ab initio pusillam phlegmonem habent, aut magnam paulatim remittentem, mortem quidem euadunt, sed nondum morbo liberantur. Hi longo sanè tempore causo laborant, uerum omnia periculosa jam desinunt, dolores, præcordiorum distentiones, & pulsuum mallitia, & mentis ignauia. Adhuc tamen fastidiosi sunt, languentes, consilij inopes, simulque & ardor, & sitis, & linguæ orisque siccitas ægrum discruciant, multum diuque trahentes spirant, & subito totum ærem una spiratione refrigerandi causa adducunt. Verum si frigidam quam plurimam affatim bibunt, breui interuallo molestia leuantur, postmodum ipsis sitis accenditur: rursusque uberrimè

ξηρὸν δὲ τόδῃ, καὶ ῥυσοῦν, καὶ περ-
χύ. καὶ ἐπὶ δὲ μάλλον ἐν τοῖσι
ἐξίχουσι ὁσώδῃσι. οἷον ὀλεκρῶν,
γουνάσι, ἢ κονοδύλοισι. ὕπνοι * ταρα-
χώδῃες, κοιλίῃ τοῖς μὲν ἔδῃεν ἐκ-
διδοῖ, τοῖς δὲ σμικρὸν, δριμύ, χολ-
ωῶδῃες. οὖρα ξανθὰ, διακνώδῃα.
τιλὴ γνώμην ἔσφραφορῃ μὲν, νω-
θροὶ δὲ καὶ μαρμασμάδῃες, εὐτε
ὀκόσοι τὴν δε τιλὴ κατὰ σπιν * εἶδον,
καῦσον ἐκάλειον: καὶ γὰρ καὶ ἔ γέ-
νουσ ἔ καύσε τὰ παρόντα, καὶ ἐν φθι-
νοπῶρῳ γίγνεται, ἐπεὶ τὸ θηριῶδες,
καὶ ἀκμάζουσι καὶ νέοισι, οἷσι ἰχνη
ὑπὸ διαίτης πονηρῆς καὶ ταρακτω-
εῖης ἢ ἐξίς. τεσσαρες καὶ δεκαταῖοι
οἷδε τὰ πολλὰ θνήσκουσι, * οἷσι δ'
αὐτὸ ἐς μῆκα ἢ νοῦσθ ἀφίκτηται, ἐν
διπλασίοισι * ὀλλυνται. ὀκόσοι δὲ,
ἢ σμικρὴν δὲ χηθὴν ἰχασί τὴν φλεγ-
μονὴν, ἢ τῆς μεγάλης κατὰ βραχὺ
διαλυομένης, διαδιδράσκει μὲν τὸν
ὀλεθρον, οὐδὲ κωδὲ ἀφίεν) ἔκακοῦ.
οἷ δὲ μακρὸν μὲν τὸν χρόνον τὸν καῦ-
σον νοσέουσι. λαοπάνε) δὲ τὰ κινδυ-
νώδῃα, αἷ ὀδύναι καὶ ξυντάσιες τῶν
ὑποχονδρίων, καὶ ἢ κακοσφυξίη, καὶ
τῆς γνώμης τὸν νοθῃς. ἐπὶ δ' ἔμπης ἔα-
σιν ἁσώδῃες, ἀλύοντες ξυν λαορείη.
ξύνεσι δὲ ὅ, τε καῦσος, καὶ τὸ δίψος καὶ
τῆς γλώσσης καὶ ἔ σόματος ἢ ξηρότης.
ἀναπνέουσι πολλὸν, μακρὸν ἔλκουτες
καὶ ἀθρόον, ὄλον τὸν ἡέρα, ἐς ἔμψυξιν
* ἔπασσώμενοι. ἀτὰρ εἴτε πίνουσι
ψυχρὸν χανδὸν πολὺ πλείον, καὶ ἐς
μὲν βραχὺ ἀνεκουφίσθησαν, εἴτ' αὐ-
τοῖς ἐξάπτεται τὸ δίψθ, αὐτῆς



* ἄδδλω πίνουσι ἢ ἥδε ἢ διαδροχῆ
 τῆ κακοῦ. καὶ ἰντερός δε ἀγαθός,
 ψυχρὸν αὖ δλω πολλὸν ἀσινέως,
 ὅκως ἐν τῆσι ἀλλησι καί σεσι. ἀσφα-
 λές ερρον δε τῶσι δπὸ τῆς κοίλης φλε-
 βὸς νοσέουσι τὸν καῦσον. κῆν μὲρ ἢ
 γαστήρ. ἢ ἡ κύστις τὸ ποτὸν ὑποφέρη,
 οὐ δε ἐμέτου δε εἶ. εἰ δε μὴ, ἴπὶ πολλῶ
 τὸ πολλὸν τῶ ψυχρῶ ἐμέσαι χεῖ. ἐκ
 βραγείν γὰρ αὖ ἀνδρωπῶ, εἴ τσονδε
 πίνων, μηδὲν διαχωρῆ, ἢ ἰδρωσι, ἢ
 ἔργισι, ἢ κοιλίη.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ
 τοὺς Νεφροὺς ὀξέων παθῶν.

Κεφάλ. θ'.

Νεφροί, τῶ μὲρ τῆ σῶματῶ
 ἰδέλω, οὐ κάρτα ἴπικαιροί ἐς κίν-
 δυνον, κὺ ἢ πάθωσι ὀξέως. ἀδε-
 κῶδες γὰρ τῶ φύσιν, ἐς δε * ὄλε-
 θρον ἐνήθεες. ἴπικαιρον δε αὐτέων
 τῆ εργον, * ἢ τε διάκεισις τῶ οὐρων
 δπὸ τῆ αἵματῶ, καὶ ἢ δπὸ κεισις.
 ἐπέχει δε τῶ δε, ἢ λίθῶ, ἢ ἐγ-
 γινομένη φλεγμονή, ἢ αἱμάλωψ,
 ἢ τῶ ἰόνδε. εὔτε ξυπαθίης μὲρ τῆς
 δια τῶ ἰδέλω ἴ σῶματῶ κακὸν
 γίγνεται οὐδέν. ἢ δε ἴπικεσις τῶ
 οὐρων, πάντα τὰ δε ἀπείσσει. πῆρ
 μὲρ γδ δριμύ, ἀσῶδες, ὀδύνη κατ'
 ὄσφον ἴπὶ βράχι βαρεῖα, διατασις
 τῶ μερῶν, μᾶλλον ἢ τῶ ἀμφὶ * τὸ
 ὑποχόνδριον. οὐρου * ἴπικεσις,
 ἐκ ἐς τὸ πάμπαν, ἀλλὰ σάγδλω
 μὲρ οὐρέσι, ἴπθυμὴ ἢ πολλὸν ἐκ-
 χέαι. πλημύρης γδ αἴσθησις. κὺ ἢ
 καὶ τὸ οὐρον δριμύ καὶ δακνώδες

aquam ingurgitant, & hæc est mali
 successio & reciprocatio. At egregius
 medicus, frigidam liberaliter citra
 noxam propinare potest: ut in alijs ar-
 doribus asolet, sed longè tutius ardo-
 re à uena caua oriente laborantibus
 eam concesserit. Quod si uentriculus
 aut uesica potam aquam expellant:
 neque uomitione opus est: sin id face-
 re nequeant, à multa frigida epota
 multum uomendum est. Homo enim
 disrumperetur, si tanto bibito humore
 nihil aut per sudores, aut per urinam,
 aut per uentrem effunderet.

DE RENVM ACV-
 tis affectibus.

Caput IX.

RENES quantum ad corporis speci-
 em attinet, haud ita multum perit-
 culis patent, tametsi in aliquod acu-
 tum uitium incidant: glandulosa
 enim ipsorum natura est. Ad mortem
 uerò inferendam bene habiles sunt:
 ipsorum enim actio peropportuna est,
 urinæ uidelicet à sanguine secretio,
 eiusdemque expulsio. Sed eam cohi-
 bet aut calculus, aut ingenita phleg-
 mone, aut sanguineum concrementū,
 aut id genus. Quandoquidem ex con-
 sensu affectionis ob formam corpo-
 ris prouenientis nulla creatur offen-
 sio. Vrinæ autem interclusio omnia
 sæua & acerbata facit, ignem acrem &
 fastidium inferentem, dolorem gra-
 uem secundum lumbos in dorso, par-
 tium distentionem, sed magis circa
 præcordia. Suppressio autem lotij
 non ex toto fit, sed stillatim quidem
 mejunt, multum uerò effundere cu-
 piunt. Redundantiam enim sentiunt.
 Quod si & acre mordaxque lotium
 inest.



Inc̄, frigent, tremunt, conuelluntur, distenduntur p̄cordia & replentur. Hęc morbi forma perceptioq̄ue doloris alui inflationi à ciborum multitudine corruptioneq̄ue prouenienti similis est. Pulsus initio rari sunt ac segnes: si malum plus urgeat, parui fiunt, crebri, turbulenti, inordinati, somni tenues dolore uexati, non continui: sed repente à somno perinde ac si quis pupugerit, prosiliunt: postea in soporem tanquam lassitudine oppressi delabuntur, mentis alienatio haud ita magna est: nugantur, facies liuet. At si quando rursus meiendi auiditas redeat, cum *convulsionibus* magnisq̄ue doloribus modicum quiddam, idq̄ue stillatim eijciunt, tum paulum cruciatibus leuantur, postmodum in eadem relabuntur. *Celerissime qui moriuntur pereunt, qui nihil prorsus emittunt. Plures enim liberantur, aut calculo in uesticam per urina semitas delapso, aut phlegmone suppurante, paulatimue per difflationem exhalante.* Quamquam enim paulatim & auarè effundatur urina, mortem tamen facile effugiunt: at longo temporis curriculo eorum habitus contabescit, atque iure ista ægrotantes patiuntur, in peiusq̄ue labentes ad colliquationem deuoluuntur. Anni uerò tempora, loca, ætates hunc morbum ferunt, quæ & in uena caua laborante ferebant. Nonnunquam è renibus sanguis multus subitaneus erupit, multisq̄ue diebus continenter effluxit. Verum nemo ex huiusmodi profluuio moritur:

ἐγγίνηται, ψύξιες, πτόμοι, σπασμοί, διατάσεις ἢ πληρώσεις τῆς ὑποχονδρίων. ἰκέλη ἢ συμφορῆ ἢ δὲ καὶ ξυναλωθῆσις γίνεταί, τοῖσι δὲ πὸ πλῆθει σπύων ἢ διαφθορῆς ἐμφυσθῆσι τὴν κοιλίαν. σφυγμοὶ τὰ πρῶτα μὲν ἀραιοὶ, κωθροὶ. ἰὼ δὲ ἐπὶ μᾶλλον τὸ κακὸν πύζει, σμικροὶ, πυκνοὶ, ταραχώδεες, ἀτακτοὶ, ὑπονολεπτοὶ, ὀδυνώδεες, ἔδινηκέες, καὶ Ἰξαπίνης ἐκδορῆνύμφοι ὡς ὑπὸ νύξι, ἔτα ὑποφέρονται ἐς κῶμα, ὡς ὑπὸ καμάτῃ. ἰὼ γνώμην ἔκάρτα πρῶτα φορῆ, ληρώδεες, πελιδνοὶ τὰ πρῶτα σώπα. ἰὼ δὲ ἢ κῆ αὐθις κοτὲ τῆς οὐρῆσι, ἢ πρῶθυμῆ, ἐπὶ σπασμοῖσι καὶ μεγάλῃσι ὀδύνησι βραχὺ αὐτῆ, σάγδην Ἰξέκενε, εὐτε σμικρὸν ἐπανῆκε τῆς πόνων. ἔτα ἐστὰ αὐτὰ παλινδρομέες. ὀξύτατα (δὲ) θνήσκουσι τῶν δὲ οἴσιν ἔσθῃ ἐκκρίνει, ὀκόςοι δὲ θνήσκουσι. οἱ πλεῦνες * ἢ περὶ γίγον, ἢ ἔλιθῃ ἐστὶν κύσει δια τῆς οὐρῶν ἐκπεσόντ, * ἢ τὸ φλεγμονῆς ἐς πύον τεροπομῆς, ἢ κατὰ βραχὺ διαπνεομῆς. ἰὼ ἢ ἐπὶ σμικρὸν ἐκδύειως διεξίεναι ῥηθιδίως τὸ οὐρῶν, διαδιθρήσκουσι τὸν ὀλεθρον. χροῶν δὲ μακρῶ φθίνουσι τὴν ἔξιν. ὀρθῶς τὰ δὲ οἱ νοσέοντες πάχουσι, καὶ καταγίνονται ἐς σύντηξιν ὑποφερῶμοι. ὡρα δὲ καὶ χῶραι, καὶ ἡλικία φέρουσι, * αἴπερ ἢ τὰ κατὰ τὰς κοίλας φλέβας. Ἰξερράγη κοτὲ αἵμα δὲ τῆς νεφρῶν πολλὸν ἀδρόν, ἢ πολλῆσι ἡμέρησι ξυνεχῆς ἄρρεν. ἀλλ' ἔτινες αἱμορραγῆ θνήσκουσι.

αἱμ.



ἀλλ' ἢ φλεγμονῇ τῇ ἐν αἰμορραγίῃ γιγνομένη, ἡ ἀπαχέθη τὸ αἷμα. τὰ πολλὰ δ' ἐξ ἀπαχέσεως, ἐπὶ μεγάλῃ φλεγμονῇ θνήσκουσι.

sed ex phlegmone, quæ cum profusio sanguinis coniuncta sit, si retentus sit sanguis. Plerumque autem ex retentione, quam ingens phlegmone facit, moriuntur.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΣΙΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΘΩΝ.

DE ACUTIS IN VESICA ægritudinibus.

Κεφάλ. ι.

Caput X.

Κύσις χαλεπὴ μὲν ἐν νόσοισι *ὀξείαισι πονησαί. κἢ ἄλλοις συμπεπόνθη. χαλεπωτέρη δὲ ἐν θανατωδέςεσσι, ἢ ἀφ' ἐωλύης, ἀρξῆς). κἢ γὰρ κἰ δυνάτωτάτη πάντα συμπαθέα ποιῆσαι, κἢ νεῦρα, κἢ γνώμην. νεῦρον γὰρ ἡ κύσις ψυχρὸν καὶ λευκόν, ἀταξὺ κἢ πορρωτάτω ἔοικει. θάλαπεθ. ἐγγυτάτω δὲ τῆς ἐξω ψύξεως. ἐν γὰρ τῇ * νειαιρῇ γαστρὶ κατωτάτῳ * ἴζει * προσωτάτω ἔθωρηκεθ. ἀλλὰ κἢ ἐργὸν αὐτέης ἀπαχέρον, ἢ τῶν οὔρων ἐξοδθ. κἢ ὡς μόνον ἢ δε ἀπαχέθη λίθοισι, ἢ θρόμβοισι, ἢ τῶν ἄλλῃ ἰδίῃ, ἢ ἄλλοτρῆ * συμφορῇ, θανατωδές. ἐπὶ γυναικῶν μὲν γὰρ αὐτέων κἢ ὑσέρων φλεγμονὰς ἀναπέζει. ἐπ' ἀνδρῶν δὲ, τὸ ἔξατον, τὸ διθύ, τὸ πρῶτον ἐντερῶν. ἐν πολλοῖσι ὃ ἐκκαρτερῆς ἀεκουσίαι ἔσσι * αἰδοῖς ἐν ξυλλόγοισι, ἢ ξυνδείπνοισι πληρουμένης, διατέτα), ἀδρανῆ τὲ πεισολῆς, οὐκ ἐπιμεδίνοισι. ἐπὶ οὖν ἀπαχέθη τῶν οὔρων, πληρώσεις καὶ τῶν ὑπερθεν μερέων, νεφρῶν, οὐρητήρων διατάσεις, λαγόνων ὀδύνη βαρεῖν, σπασμὸς, πρῶμθ, ρίγες, γνώμην πρῶταφορῆ. ἡ δὲ δὲ πρὸς

VESICA difficiles in acutis morbis dolores patitur, & cum ab alijs uitium participat: sed difficiliores, magisque mortiferos, si per se laborare inceperit. Quandoquidem omni corpori & neruis & menti labem communicare ualentissime potest. Quippe vesica neruis frigidus albusq; est, & ab innati caloris fomento quam longissime, quam proxime uero externo frigori posita. Nam in imo uentre ad aures thoracis sita est, nobili quoq; munere fungitur, urinæ uidelicet emissionē. Hæc porro si tantum calculis, aut sanguinis grumis, aut qua alia propria, peregrinaue calamitate interclusa fuerit, perniciosum est. In mulieribus enim ipsis & uteri phlegmonas comprimis, in uiris autem extremum rectum prælongumque intestinum est. In plerisque uero ob inuoluntariam præ uerencia retentionem. in catibus hominum, aut in conuiujs repleta distenditur, constringereque non ualens nihil amplius excernit. Igitur ubi urina suppressitur, superiores quoque partes, renes uidelicet, replentur: urinæ ductus (Græci ureteras appellant) distenduntur, ilia dolor ponderosus infestat: nerui conuelluntur: tremunt: horrent: desipiunt.

Verum



Verum si ad hæc & ulcus accedat, aut inflammatio, multa sanè damna eueniunt: Sed mors ab ulceribus sanè quam *celerrima* inuadit. Cæterum de ulceribus, abscessu, suppuratione, & idgenus alijs, quæcunque non acutissima sunt, in libro de *diuturnis* morbis tractabitur. Quæcunque uerò peracuta sunt, & intra quatuordecim dies, aut paulò citius feriusue hominem perimunt, qualis phlegmone est, aut grumi sanguinei, aut calculus in ceruicem delapsus, de istis in præsentia sermonem faciam. Quapropter si quid horum inciderit, urina retinetur: abdomen intumescit: dolor acutus totum uentrem occupat, uesica turgēt: decimo die luteus sudor exit: pituita uomitur primò, deinde bilis: uniuersum corpus friget, sed pedes uehementius. Si malum uires maiores acquirat, tum febres cum singultu hominem corripunt: micant arteriæ inordinatis, frequentibus, ac pusillis motibus: rubida facies est: sitiunt: animo ancipites sunt: mens non constat: nerui contrahuntur. Medicamentis præterea uenenosis, & cantharidibus, aut bupreste & pneumatibus uesica deurit, & tota alius maiorem uim patitur: ac prorsus in peiorem statum delabatur: neque longa mortis mora interponitur. Nonnunquam & sanguinem uesica effundit. Flauus autem ac tenuis uesicæ sanguis est. Sed perrarò hac de causa homines pereunt, quamuis haud facilè sanguis supprimitur. Grumi uerò & phlegmonæ minantur interitum. Refrigeratio enim & extinctio caloris ingenti sequitur, quæ Necrosis Græcè dicitur, & Gangræna, & quæ eam comitantur mala. Id genus facile hominem tollit. Hac uitia hyeme & autumnò grassantur.

Τοῖσι καὶ ἔλκεθ' πεπόνθη ἢ φλεγμονὴν, πολλὰ μὲν τὰ κακά, ὅλεθρον δὲ πολλόν τι ἐλκῶν ὄκισθ'. ἀλλ' αἰμφί μὲν ἔλκεθ' καὶ δύσασπιθ', καὶ πυώδεσθ', καὶ τῶν ὀκόσα * μὴ ὀξύτατα ἢ, ἐν τοῖσι χρονίοισι λελεῖξεται. ὀκόσα δὲ κατόξεα, καὶ * ἐνιοὶ ἡμέρησιν, ἢ ὀλίγω θάσσον, ἢ βράδιον κτείνει, ὀκοῖον φλεγμονῆ, ἢ θρόμβοι, ἢ λίθ' ἐς τὸν τράχηλον ἐμπεσῶν, καὶ τῶν δὲ νῦν ἐρέω. ἡ οὖν π' αὐτῶν ζυμῶν, ἄρων ἰππὸν χέσιες, * ὄγκ' ἐν τῷ ἰππὸν γαστρίῳ, ὀδύνη ὀξείη, πᾶντι τῆς κοιλίης. * ἄρτασις τῆς κύσειθ', ὁ ἄχρὸς ἰδρῶς τῆ δεκάτη, ἔμετοι φλεγμάτων ὄλεθρον δὲ μάλλον. ἢν δὲ ἰππὸν * μέσον τὸ κακὸν ἔρη, πυρετοὶ λυγρῶδεσ, σφυγμοὶ, ἄταξι πικνοὶ, καὶ μικροὶ, ἐρύθηματ' ἄρρωστα, διψῶδεσ, δύσασπι, γνώμην ἄρρωστων, πασμοὶ. ἰππὸν δὲ φαρμάκοισι δηλητηρίοισι καὶ κενθαρίοισι, ἢ βεπρήσει καὶ πνεύμασι, ἐμπιπῶνται ἢ κύσις, καὶ ἢ ζύμπασα κοιλίη βιαιτέρη καὶ πᾶντα κακίων, καὶ οὐκ * εἰς μακρὸν ἢ ἔθανάτε ἀμβολή. αἰμορραγεία κατὰ κύσις. ξανθόν τε καὶ λεπτόν τῆ δὲ τ' αἷμα. ἀλλ' οὐδὲν τι διὰ τήνδε θνήσκουσι, καὶ μὴ ῥηϊδίη ἢ ἰππὸν χέσις. ἀλλ' ἐπὶ τοῖσι θρόμβοισι καὶ τῆ φλεγμονῆ ὀκίνδυνθ'. ψύξις γὰρ καὶ νέκρωσις, καὶ γαγγραινώσις, καὶ τὰ ἐπὶ τῆ δεκάτῃ ῥηϊδίως κτείνει. φέρει δὲ τὰ νόσους, χεῖμα, καὶ μετόπωρον.

ἡλικίη

καὶ ὀξύτητα
& οὐ.* οὐδεκάτη δ' ἡμέρα
εἰ ἰδ' ἡμέρα

* ὄγκ'.

* κενθάρια.

ἴλου, ποδῶν δ'

* μέσον.

ἰδ' ἡμέρα



ἡλικίῃ δὲ, ἀκμῇ, ἔπι δὲ μᾶλλον γῆ-
ρας. αἱ δὲ ἄλλαι ὥραι, ἢ αἱ ἡλικίαι,
ἔτε ξυνεχέως, καὶ ἡκιστα κτείνουσι.
ἀσινέστατα δὲ πάντων, τὰ παιδία.

In ætate uirili, magis etiam in senectia
uigent. Reliqua anni tempora & æta-
tes neq; assidue hos morbos ferunt,
minimeq; mortiferi sunt. Pueri omni-
um maxime his calamitatibus uacant.

ΠΕΡΙ ΥΣΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΝΙΓΟΣ.

DE VVLVÆ
strangulatu.

Κεφάλ. ια.

Caput XI.

Εν τῆσι λαγόσι τῶν γυναικῶν
μέσσησι ἐγκέε^ε) ἡ μήτηρ, σπλάγχνον
γυναικῆιον ἀγχις α ζωῶδες. κινέε-
ται γὰρ εἰς ἐσωτέρης ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐπι τὰς λαγόνας. ἀτὰρ καὶ ἐστὰ
ἀνω, κατ' ἴξιν μὲν, ὑπὸ τὸν χόνδρον
τοῦ θώρηκος ἐστὰ πλάγια δὲ, ἐπι
δεξιᾶ, ἢ ἐς ἀριστερά, ἢ ἐς ἥπαρ, ἢ
σπλάγχνα, γίγνεται δὲ καὶ περ-
πετεσερῆ ἐστὰ κάτω, ἢ ἐξυλλήθδην
εἰπω μὲν, πάντῃ ἐσὶ πλανώδης. καὶ
ἐνώδῃσι ὁσμῆσει τέρπεται, καὶ ἐπ'
αὐτὰ ἴεται. ἀχθεταὶ ὅ τοῖσι κακόδ-
μοισι, καὶ αὐτὰ φθύγει. ἢ τὸ ξύμ-
παν ἐν τῇ * ἀνώ ἐσὶ ἡ ὑσέρη, ὁ κοῖον π
ζῶον ἐν ζῶῳ. ἢ δὲ ἐν ἡν εἰς ἀπίνης ἀ-
νώϊστος γένῃ), ἢ ἐπι πολὺ ἀνώ μείνη,
καὶ ἐκβιάσπται τὰ σπλάγχνα ἀ-
πεπνίχθη κοτὲ ἢ ἀνδρωπ^ο, τρόπον
τὸν ἐπιληπτικόν, ἀνδθεν σπασμῶν.
ἐπιέζετο γδ * ἀκέως σενοχωρεῖ ἡ-
παρ, διάφραγμα. πνεύμων, καρ-
δίη. τὸν κεν ἀπνοίη ξυνεῖναι δοκεῖ ἢ
ἀτνίη. ἀτὰρ ἢ αἱ καρωτίδες ξυμ-
παθίη τῆς καρδίης πίζονται. διὰ
τόδε καρθεραεῖαι τὲ καὶ ἀναμνη-
σία ξύνεσι κοινῶ κάρω. γίγνεται
δὲ καὶ ἄλλο πάθ^ο αὐτέσοι ἴκε-
λον τῆδε ξυμμορφῆ, ξὺν πνιγί καὶ

IN medijs ilibus mulierum Vulua
posita est, muliebri uiscus, animalis
fermè naturam adeptum. Si quidem
per se huc atque illuc uersus ilia mo-
uetur: quin etiam ad superiora è regi-
one pectoris cartilaginem subit, in la-
tera quoque in dextram uidelicet, aut
læuā partē, aut ad jecur, alia uē intestina
mouetur: & ad inferiora natura procli-
uior est, utq; paucis absoluam, penitus
errabūda est, & jucundis odoribus dele-
ctatur, ad ipsosq; se recipit: contra
foede olentibus contristatur, & ab
ipsis longius se proripit, ac profus est
in homine uulua perinde, atque in
animali quoddam animal. Hæc itaq;
si repente superiora petierit, ac diu-
tius ibi commoretur, uisceribusq; ue-
uolenter incumbat, interdum homo
ueluti comitiali morbo correpta ci-
tra neruorum distentiones strangula-
tur. Angustijs nanque jecur, trans-
uersum septum, pulmones, cor cele-
riter opprimuntur. Qua de causa spi-
ritus priuatio, imbecillitasq; adesse
uidentur. Præterea & uenæ somnife-
ræ (carotidas Græci uocant) cordis
uitium participant, affliguntur.
Vnde capitis grauitates & sen-
suum abolitio cum nouo quo-
dam sopore adueniunt. Incidit
etiam ipsis aliud uitium proxime
dicto non absimile: in quo spiritus &

uox



uox auferuntur: sed à uulua non pro-
uenit, quippe & uiros infestat instar
morbi, quem Catochon nominant.
At mulieribus à uulua malè habenti-
bus tetra odorama naribus subie-
cta, iucunda uerò naturalibus apposi-
ta opitulatur. Altero autem affectu
laborantibus hæc frustra adhibentur:
nihilque opis afferunt. Præterea mem-
bra in uulua morbo agitantur, in al-
tero affectu quiescunt. Amplius tre-
mores spontini, & non spontini, sed
ex abortini causa. Vulua refrigerationes
uehementes, copiosæ sanguinis pro-
fusionis retentio, & id genus alia in
causa sunt. Itaque si in superiora sub-
eunte uulua uexari mulier inceperit,
ad obeunda negotia pigrior redditur:
exoluitur: infirmatur: genua labant:
uertigo infestat: extrema debilitan-
tur: caput dolet, grauescitque. In ue-
nis ab utroque nasi latere jacentibus
dolorem mulier percipit: quòd si ce-
ciderit, stomacho mordetur. Iuxta
præcordia ilia, ubi uulua domicilium
est, inania sunt: motus arteriarum
intermittunt, ordine carent, defici-
unt, spiritus magnopere angitur, uox
intercipitur, sentiendi facultas impe-
ditur, spiratio ignota obscuraque est.
Celerrima nec opinatò mors aduenit.
Nihil enim adest, quod mortem in-
stare significet. Color namque uiui-
dus est, ac multo post mortem tem-
pore magis rubent. Oculi parum ad-
modum extantes fulgent, haud ita
remissi & conuiuentes. Cæterum si
prius, quàm malum ad extremum
uenerit, aliquando uulua in pro-
priam sedem migret, à strangu-
latione liberantur, quando alius
submurmurat, humiditas adest

ἀφωνίη, ἀλλ' οὐκ ἀπὸ ὑσέξης. καὶ
γὰρ τόδε καὶ ἀνδράσι γίγνεται
*κατοχώδεια πρόπον. ἀλλὰ τῆσι
μῦρ' ἀπὸ ὑσέξης κακώδεις ἐπαρή-
γασι ὀδμαὶ, καὶ βυωδέων πρὸς τὰ
γυναικῆια ὑποθέσιες. τῆσι δὲ ἐτέρη-
σι τὰδε οὐδὲν ἐπαρήγει, καὶ τὰ μέ-
λεα κινέονται ἀπὸ ὑσέξης, ἀπὸ δὲ τῶ
ἐτέρω πάθει, ἥκιστα. ἐπὶ δὲ πτόμοι
αὐτόματι, καὶ ἐκ αὐτόματοι. ἀλλ'
ἔξ ὑποθέσι' ἀμβλωθριαίου. ψύ-
ξιες καρτερεῖαι τῆς ὑσέξης, αἰμορρα-
γίης ἀδρόης Ἰππικῆσι, καὶ ὀκόσα
τοιάδε. ἢ οὐδ' ἀρξεται πάχειν
κινδύμην ἀνώτης * ὑσέξης, ὅκν' ἔργων
πρήξι', ἐκλυσις, ἀτονίη, γέ-
νάτων ἀκρασίη, σκοτόδην', καὶ τὰ
γῆα * λύονται, κεφαλῆς πόν',
καρθηβαρίη, τὰς φλέβας τὰς ἐκα-
τέρωθεν τῆς ῥινὸς ἀλγείη ἢ γυνή. ἢ
δὲ καταπέσωπι καρδιώσουςι, ἐν
τοῖσι ὑποχονδρείοισι λαγάνες κε-
ναὶ, ἐνθα ἠέδρη τῆς ὑσέξης, σφυγ-
μοὶ διαλείποντες, (ἀτακτοὶ, ἐκλεί-
ποντες,) πνίξ καρτερεῖ, ἀφωνίη,
ἀναισθησίη, ἢ ἀναπνοὴ ἀσημ', ἀ-
σαφής, ὠκισ' καὶ ἄπς' ὁ θά-
νατ'. οὐδὲν γ' ἴχουσι νεκρωδεις.
ἐς χροιλὸν, * ζωώδεις ἐρυθρότεραι
μᾶλλον μέχει πολλοῦ τῶ θανάτου.
ὀφθαλμοὶ μικρὸν π' ἔξίχοντες,
λαμπεροὶ, οὐκ ἀεὶ τὰ μὲν ἀτενέες, ἀ-
τὰρ οὐδὲ κἀστα * κεκαμυμένοι. ἢ
δὲ μετακινέται, κοτε ἐς ἔδρη ἢ ὑσέ-
ξη, πρὶν ἐς τέλος ἵεναι τ' παθ', δια-
ιδράσκεισι τὸ πνίγα. εὔτε κοιλίη
ὑποβορβορῶζει, ὑγρότης τῶν
γυναι-

τὸ, κατοχώδεια τῶ
ουε, ὀρεκτικῆ
καὶ γινώσκου

*κατοχώδεια

*κινδύμην

γῆα
*λύονται

*ζωώδεις

*κεκαμυμένοι



* ήμισα.

γυναικηίων τόπων, ἀσπυοή διασπυοή κη σαφεσέρη. * ωκίση εκ τού πάθεο ή έγεροισ, όκως και ό θάνατ ο ωκίση κη γρηιδίως τοισι ανω προχωρέει. αλαρ ή γρηιδίως αφίσα). ακρόπλοός τε γρη υσέρη. υγροί ή και οι υμφοές οι * οχνης αώτης. υγρόν δε και τ χωρίον, ένθα κέεται ή υσέρη. ωρος ή φυγητεκ όρμη χεεί) ή δέων τε και ανδένων ρηιδίως ουν νεύει όκως προεμνός ένθα και ένθα ανωτε κη κάτω πλώει. δια τόδε ρένιαι τό πάθεο γίγνε). γεραμτέρησι δε ήκισα. ήσι γρη ήλική τε κη βιοτή κη γνώμη πλανωδισέρη, ήσι και υσέρη έσι ρεμβώδης. πηλικωτέρησι ή διασθέα και ήλική κη βίω, κη γνώμη, κη ή υσέρη. ή δε μω έν ή άπο υσέρης πιξ, μύνησι γυναίξι παρομαρτέει. γίγνε) δε κη ξυνά ωρος άνδρας πάθεα ή υσέρη φλεγμονή, αιμορραγη. ξυνά ή κη παρόντα σημεία, πυρετοί, ασφυξία, ψύξις, αφωνία. ή ή ή αιμορραγη, και όξύτεροι ό θάνατοι, όκοίον π εν ζω σφαγή.

ήμισα
* ανόχισ
αίπυος.

locorum muliebrum : spiritus asperior manifestiorque redditur. Nequaquam tamen ab affectu excitantur, aut subleuantur, tam celerrime ex hac ualitudine reficiuntur : quam celerrime moriuntur. Nam facile superiora uulua petit : facile quoque inde recedit. Quippe uulua suapte natura superfluitat. Membranæ uerò eam sustinentes humidæ sunt: humidus est & locus, ubi reconditur. Amplius fuga & appetentia tristium iucundorumque mouetur, quocirca labascit facile, ac ueluti arboris ramus huc & illuc, susque deque impellitur. Propterea & iuuenes fæminæ id uitij patiuntur, seniores immunes sunt. Quibus enim ætas & uita & mens uaga magis & erratica, est, his uulua quoque errabunda instabilisque sit necesse est. Quibus uerò firma ac stabilis ætas, & uita, & mens fuerit, his & uulua similiter afficitur. Hæc utique à uulua proueniens ægritudo (strangulatus uidelicet) mulieribus duntaxat infesta esse potest. Verumtamen communes uulua uiris quoq; ægritudines oriuntur : phlegmone uidelicet, & sanguinis profusio. Communes etiam sunt, quæ comitantur, notæ: ut pote febres, pulsus abolitio, refrigeratio, uocis amissio. In sanguinis autem profusione & maturius mors ingruit, quemadmodum cum quis animal jugulat.

ΠΕΡΙ ΣΑΤΥΡΙΑΣ
Σ Ε Ω Σ.

DE SATYRIAS I.

Caput XII.

Κεφάλ. ιβ.

Οι σατυρι ή Διονύση ιεροί, εν ήσι γραφήσι, κη τοισι αγάλμασι, όρθια ισχισα τα αιδούια, ξύμβολον τε θείς πρήματ ο. έσι δε κη πάθεο ιδίην, ανίχοντος όρθια τε πάχοντος τα αιδούια, ή ή κη σατυρίαις ές όμοιότητα, τε θε ή χήματ ο όρμη δε έσι άχετ ο ές όμιλίω. ατάρ εδ' αν ήσι ωροσόλοισι ουδέν.

Satyri Baccho sacri, qui pictura, quiq; staturis exprimuntur, arrectio pene figurantur, quod diuinæ rei signum est. Est uerò & affectus species, qui laborantis penem excitat erigitq; atq; ob DEI figuræ similitudinē Satyriasis nuncupatur. Est autem inexplibilis coeundi appetitus. Verum neque si ad Veneris opus accedant, quicquam iuuan-



juuantur: neque multo asiduoque concubitu sedatur arreatio. Conuulsiones autem omnium neruorum fiunt, & tendonum dissentio, & inguinum, partisque eius, quæ inter inguina & femem est, Plechada Græci nominant, genitalium præterea inflammatio & dolor. In facie rubor inest, & uapor quidam roscidæ humiditati similis. Porro ipsi ægri sese incuruant & comprimunt: quiescunt tristes, demissæ, utpote calamitatem suam grauatim ferentes. Quod si hominis uerecundiam id malum superet, turpiter admodum lingua intemperantes efficiuntur. *Neque uerò sibi moderari queunt, quin propalam rem habeant,* menteque indecenter titubantes. Nam se continere nequeunt, siti laborant, pituitam largius euomunt. *Quoniam* labris spuma, quemadmodum hircis in libidinem ruentibus, insidet. *Quin* etiam haud absimilis odore est, lotium post longam retentionem effunditur album, crassum, genituræ simile, alius resoluitur, costæ & axillæ sponte pruriunt ac titillantur, conuelluntur: à cibis abhorrent: sed cum eos assumunt, rapaciter assumunt, conturbantur. Sin ad interitum ægritudo spectat, inflantur, uenterque in tumorem effertur. Tendones & lacerti omnes contenduntur, ægrè admodum corpus mouetur, membra contrahuntur, arteriæ paruo motu, debili, inordinatoque agitantur. Hæc omnia quandoque discutuntur, si alius perturbata multas biliosas pituitosasque humiditates eiecerit: easdem quoque uomitus non absque discrimine effuderit. Nempe medela non uacat discrimine, ea per somnum profundum longissimumque præstatur. Siquidem refrigeratio & resolutio stuporque neruorum multus somnus est: stupor uerò ac refrigeratio satyriasm medicatur. Id morbi genus uere potissimum atque æstate sæuere consuevit. Inter ætates autem adolescentia iuuentusque ei

ώφελείοναι. οὐδὲ ἐπὶ πολλοῖσι καὶ συνεχέσι ὁμιλίῃσι πρηύνονται τὸ ὄρθιον. *πασσμοὶ δὲ πάντων τῶν νδύων, καὶ ἐντασις τενόντων, καὶ βουβώνων, καὶ πληχάδου, φλεγμονὴ τῶν αἰδοίων καὶ πόνου, ἐρύθημα πρὸς ὄπισθεν, καὶ ἰκμὰς νοτίδι ἰκέλη. πρὸς ἐλλόμβροι, ἡσυχῆ ἐπίλυτοι, κατφῆες, ὡσπερ ἀχθόμβροι τῆ ξυμμορφῆ. καὶ ἡ ὑπερείχη καὶ τὴν αἰδῶ δὲ ἀνθρώπου τὸ πάθος. ἀκρατεὲς μὲν γλώσσης ἐς τὸ ἀκοσμον. ἀκρατεὲς δὲ ἐς τὸ ἀμφοδόν καὶ τῆς τῆ ἐργου πρηξίου, ὡσὰ φερεῖ τὴν γνώμην ἐς τὸ ἀχρημον. κατέχεν γὰρ οὐ δύναται. διψώδεις, φλέγμα πολλὸν ἐμέσαι. ἐπειδὴ τοῖσι χείλεσι ἀφρὸς ἐφίζαναι, ὅκωσπερ τοῖσι ὄργωσι τῶν τεύγων. ἀτὰρ ἡ δὲ ὁσμὴ ὁμοίη. οὐρὸν δὲ ἐπιχέσει πολλῆς, ἀλλ' ἐς λευκὸν, παχὺ, γονοφθές, κοιλίην ἀπολελυμένην, γαργαλισμοὶ αὐτόματοι πρὸς ἄνω καὶ μαχαλῶν, πασσμώδεις, ἰσχυροὶ, εἰδὲ πρὸς φερεῖν, ἀρπάγδην ταραχώδεις. καὶ ἡ ἐς ὄλεθρον ἡκῆ τὸ κακόν, φουσώδεις. κοιλίην ἐπιπρηξί, τενόντων καὶ μυῶν τῶν πάντων ἐντασις, δυσκίνησις. ξυνολκαὶ μελέων, σφυγμοὶ μικροί, ἀσθενεῖς, ἀτακτοί. ἐλυσέκοτε τῶνδε, πάντα κοιλίην ἐκταραχθεῖσα πολλοῖσι φλεγματοῦδεσι, χολώδεσι, ἔμετοι ὁμοίως. ἐκ ἀνδθεν κινδύνα ἡσις, ὑπὸ βαθὺς καὶ μήκιστος. ψύξις γὰρ καὶ πάρεσις καὶ νάρκη νδύων, ὑπὸ πούλης. νάρκη δὲ καὶ ψύξις, σταυρείσιν ἴηται. γίγνετο δὲ τὸ πάθος, ἢ ἐξ ἡμάλισα καὶ φέρετο. ἡλικίῃσι δὲ μεираκίοισι καὶ νέοισι.*

E μάλισα



μάλινα δὲ ὀκόσοις ἢ φύσις ἐς ξυ-
 νοσίην ἐτοίμη. ὄξυτατον ἢ δὲ ἀ-
 τερες, ἢ δὲ ἀκοσμον κακόν. Τα
 πολλά γὰρ ἐν ἐβδόμη θνήσκουσι.
 λόγῳ δὲ ὅτι καὶ γυναῖκες πάχισσι
 τούτο τὸ πάθος, (καὶ) ἢ τε ἐς τὰ
 ἀφροδίσα ὀρμὴ ὁμοίη, καὶ τὰ λοιπὰ
 ξύμπαντα τὰ αὐτά. ἐγὼ δὲ μα-
 χλοσύνην μὲν γυναίξει ὑγρῆσι πεί-
 θουμαι γίνεσθαι, ἐς ἐκχυσιν ἔπι-
 δεῖ τούτων. σατυρίων δὲ ἦκιστα.
 οὔτε γὰρ ἡ φύσις αὐτέων ἐτοίμη.
 ψυχὴ γὰρ ἀλλ' ἐδὲ μόρια ἐς ὄρ-
 θήσιν, ὅπως περὶ σάτυρον, ἰχθυο-
 νή, ὡς περὶ τὸ πάθος ἐπώνυμον. οὐδὲ
 γὰρ ἐδὲ πνίγα τὴν ἀπὸ ὑέ-
 ρους νοσέουσι ἀνδρες, οὐνε-
 κεν ἐκ ἰχθυὸς ὑσέρω.

ἀνῆς.

maximè patet: præcipueque illi o-
 mines, quorum natura in Venerem
 propensior est. Acutissimum id ma-
 lum, tristefædumque est. Nam ple-
 runque in septima die hominem con-
 sumit. Memoria proditum est mulie-
 res etiam in hanc labem incidere, &
 eundem in libidinem impetum, ac cæ-
 tera omnia similia perpeti. Verum ego
 impudicum quendam libidinis ardo-
 rem mulieres invadere mihi persua-
 deo, mulieres inquam humiditate af-
 fluentes, ut ipsius redundantia pro-
 fundatur: sed satyriasim id esse mini-
 mè concesserim. Neque enim ipsarum
 natura atque temperies, cum frigida
 sit, huic uitio habilis atque exposita
 est. Præterea neque partes ad arrectio-
 nem idoneas, quemadmodum satyrus,
 unde affectui nomen est inditum,
 mulier obtinet. Quandoquidem neq;
 viri strangulatione ab utero ue-
 rantur, quoniam viro ute-
 rus datus non est.

ΑΡΕΤΑΙ



ΑΡΕΤΑΕΙ ΑΡΕΤΑΙΟΥ

CAPPADOCIS DE ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ (ΠΕ-

causis & notis diuturnorum
affectuum

εὐ αἰτίων ἢ * σημείων) χρονίων
παθῶν

α σημειωτικῶν
ἄλλως σημειω-
τικῶν.

LIBER PRIMVS.

βιβλίον πρῶτον.)

De diuturnis affectibus, cap.	I.	Περὶ χρονίων παθῶν, αἴτια ἢ ση- μεῖα, Κεφάλ.	α.
De Cephalæa, cap.	II.	Περὶ κεφαλαίας, κεφ.	β.
De vertiginosis, cap.	III.	Περὶ σκοτωματικῶν, κεφ.	γ.
De morbo comitali, cap.	IV.	Περὶ ἄπληψις, κεφ.	δ.
De melancholia, cap.	V.	Περὶ μελαγχολίας, κεφ.	ε.
De furore, cap.	VI.	Περὶ μανίας, κεφ.	ς.
De resolutione neruorum, cap.	VII.	Περὶ ἀδελύσιθ, κεφ.	ζ.
De phthisi, cap.	VIII.	* Περὶ φθίσιθ, κεφ.	η.
De suppuratione in pectore, cap.	IX.	Περὶ ἐμπυϊκῶν, κεφ.	θ.
De uomica pulmonis, cap.	X.	Περὶ τῆ * ἐς τὸν πνύμονα ἄποστα- σεων. κεφ.	ι.
De Anhelitu, cap.	XI.	Περὶ ἀσμάτου, κεφ.	ια.
De pulmonarijs, cap.	XII.	Περὶ πνυμωδῶν, κεφ.	ιβ.
De jecore, cap.	XIII.	Περὶ ἥπατος, κεφ.	ιγ.
De liene, cap.	XIV.	Περὶ σπλινός, κεφ.	ιδ.
De morbo regio, cap.	XV.	Περὶ κίτρου, κεφ.	ιε.
De cachexia, id est, malo corporis ha- bitu, cap.	XVI.	Περὶ καχεξίας, κεφ.	ισ.

α μετὰ τὸ πρῶ-
τον φάλακρον ἢ τῆ
ἀλλο, περὶ πνε-
υμοκαπνί, κεφ.
ι οὐ ἐξ ἰφείθ
ἀδελύσιθ
τιμ.
α κατὰ.

DE DIVT V R N I S
affectibus proæmium.

ΠΕΡΙ * ΧΡΟΝΙΩΝ χρονίων.
παθῶν, αἰτίων ἢ σημείων

Caput I.

Κεφάλ. α.

Diuturnarum ægritudinum dolor
multus est, tempus colliquationis
longum, & medicatio instabilis. Vel
enim haud ex toto deleti sunt, uel ex
qualibet leui offensa morbi deleti
reuertuntur. Nam laborantes æquo
animo ferre usque in finem
non audent. Quin etiam si æquo
animo ferunt, in uictus ratione
nimis longa delinquant. Si uerò
& dolor adest, laboriosa curatione

χρονίων νόσων, πόνος μὲν πελὺς.
χρόνθ ἢ μακρὸς συντήξιος, ἢ ἀβέ-
βαιθ ἢ ἀλθεξίς. ἢ γὰρ εἰς ἄξηλαθη-
σαν ἐς τὸ * πᾶμπαν, ἢ ἐπὶ σμικρῆ ἐξέμακρ.
ἀμαρτωλῆ παλινδρομέουσι αἰ νό-
σοι. οὔτε γὰρ ἀτρέμειν οἱ νοσέοντες
τολμέουσι ἐς τέλος. ἀλλὰ ἢ δὲ ἀμαρ-
τάνουσι ἐν τῆσι μακρῆσι διαίτησι, κἠν
ἀτρέμειν. καὶ ἢ ἢ πόνος ἐξ ἄπληψις



2 ιδιαιτων.

ἰησιϑ, διψης λιμοῦ, φαρμάκων
 πικρῶν καὶ * ὀδυνωδέων, ἢ ἄσπις, ἢ
 κωσιϑ. ὧν περὲς ἐν τῆσι δολιχῆ-
 σιν οὐσίοισι χρέϑ, ὡς ὑποδιδρῆσου-
 σι οἱ κάμνοντες, θανάτῳ δὴθεν αὐ-
 τέσ ὀρεγόμενοι. ἐνθα δὴ δρετὴ διαεί-
 δεται ἀνδρὸς ἰητροῦ, καὶ μακροθυ-
 μίας, καὶ ποικιλίας, καὶ χάριτϑ ἀ-
 βλαβοῦς τῶ ἡδέων, καὶ παραφάσι-
 ος. ἀτὰρ καὶ τὸν νοσούντα χρεῖ ἀλκι-
 μὸν ἐλθεῖν, καὶ ξυνίστασθ τῶ ἰητρῶ
 κατὰ τὸ νοσήματϑ. ἐγὼ τὸ σώματϑ
 μόνον ἀπειξ λαβομένη, * τυχὸν
 ἀνασπύχει τὴν ἀπεί, ἀλλὰ ἐς
 πολλὰ καὶ τὴν αἰσθησίω ἐκτρέπει.
 ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν ἐκμαίνει. ἀ-
 κρασίη τὸ σώματϑ τὴν ψυχὴν
 μανίην καὶ τὴν μελαγχολίην ἰσχυρῶ
 ὡς ὧν αὐτὸς ἐρέω. τανῦν δ' ἀμφὶ
 κεφαλῆσ φράσω.

* τυχὸν

ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΗΣ.

Κεφαλ. β.

Ἦν ἀλγὴν κεφαλὴν χροῖως ἐπὶ
 πρῶσ καίρω αἰτῆ, κὴν ἐπὶ πλεῦνας,
 κεφαλαλγίη καλεῖται. Ἦν ὅ διεθίξῃ
 χρόνω μακρῶ τὸ ἀλγῆμα, καὶ πρῶ-
 δοῖσι μακρῆσι καὶ πολλῆσι, καὶ πρῶσε-
 πιγνῆ) μεζῶν καὶ πλεῦνον δυσάλ-
 θη, κεφαλαίω κικλήσκοντο. ἰδέαι
 δὲ μυσία. πῶσι μὲν γὰρ αἰδιϑ ὀπό-
 νϑ καὶ μικρῶσ, ἀλλ' ἐδιδείπων. πῶσι
 ὅ, ἐς πρῶσ δὸν πρῶσ πλεῖ, ὅκωσ τῶσι πυ-
 ρεταίνοσι ἀμφιμερινὸν παρ' ἡμέ-
 ρῶν. ἀλλοῖσι δ' ἀπὸ * δύσιϑ ἐς με-
 σσηβείω, καὶ τῆδε ἴελεον ἀπὸ πᾶνϑ).
 ἢ ἀπὸ μεσηβείωσ ἐς ἑσπέρω, ἢ ἐπὶ
 πρῶσ ἐν ἐσ νύκτῳ. ἢ δὲ ἢ πρῶσ δϑ

επίσϑ.

per sitim, famem, amara medicamina,
 & dolorem excitantia, aut per sedo-
 nem aut unctionem, quibus in diutur-
 nis morbis egemus, miseri agrotu-
 ciantur: ut mortem, quam iam pri-
 dem appetebant, effugiant. Vbi me-
 hercule in magna constantia animi
 diu præstanda, auxilijs uariandis, ju-
 cundis citrà noxam ægro conceden-
 dis, ipsoque decipiendo Medici uirtus
 atque excellentia dignoscitur. Cate-
 rum & æger fortis sit, & cum Medico
 aduersus morbum conspiret, necesse
 est, qui non solum corpus tenaciter
 arripiens ipsum celeriter tabefacit &
 exedit: uerum etiam sensum magno-
 perè subuertit, animamque insanam
 reddit. Namque ab intemperie corpo-
 ris id genus furorem, atque insaniam,
 quam Græci Melancholiam uocant,
 proficisci nouimus, de quibus in se-
 quentibus dicam: in præsentia de Ce-
 phalæa, id est, de uetere capitis dolore
 sermonem instituem.

DE CEPHALÆA.

Caput II.

SI caput repente obuia quaque de
 causa per plures etiam dies dolorem
 patitur, hic affectus Cephalalgia Græcè
 nominatur: si multo tempore dolor
 infestare assueuit, & per longos, fre-
 quentesque circuitus, ac indies maior
 uiolentiorque insultat, difficulter sa-
 nationem admittens, id genus Ceph-
 alæam Græco uocabulo appellamus.
 Eius formæ infinitæ sunt: quibusdam
 enim perpetuus dolor inhæret, exi-
 guus quidem, sed non intermittens.
 Nonnullis per circuitus reuertitur, ut
 his, qui quotidiana intermittente fe-
 bricitant. Nonnullis ab occasu solis
 usque in meridiem: & tunc ex toto
 remittitur: uel à meridie in uesperam
 aut etiam ulterius usque in no-
 ctem permanet: sed non multum
 hæc



hæc durat circuitio. Præterea dolor modo est in toto capite, modo in dextra magis, modo in sinistra, modo circa frontem, aut synciput, hæcque eodem die incerte & erraticè fieri solent. Quidam dextra tantum parte dolent, quidam leua: qua tempus: uel auris, uel supercilium unum, uel oculus ad medium usque terminatur, uel quanafus in æquas partes diuidit, ultra quem terminum dolor non progreditur, dimidium tantum capitis occupans. Id uitium solum Heterocraniâ dicitur, haud leue malum: quamuis intermittit, quamuis exiguum esse prima specie uidetur. Nam si acutè interdum impetum faciat, facta atque atrocía detrimenta affert, nerui distenduntur, facies obtorquetur, oculi uel contenti instar cornu rigidi sunt: uel huc, atque illuc interius conuoluntur, ac uertiginosè agitantur: in ipsisque dolor profundus usque ad intimas tunicas descendit, sudor ex tendonibus immodicus effluit repente: neque cohiberi potest: neque ulla causa præcessit, perinde ac, si quis ligno plagam inflixerit, nausea & uomitus biliosus comitantur: homo consistere nequit, sed in terram delabitur. Quod si uitium quandoque increfcit, de hominis uita adum est. At si debilius est, & citrà uitæ periculum, diutius permanet, pigritia multa adest, & capitis grauitas: animi pendens, uitam ægrè ferunt. Fugiunt enim quodammodo lucem, tenebræque his ægritudinem solantur, neque quicquam iucundi, aut intueri, aut audire sustinent. Olfactorius in ijs sensus infectus est, neque quicquam eos bene olens oblectat, pariter quoque graueolentia detestantur. Vita ipsis inuisa est, mortemque discipiunt. Harum calamitatum fons & origo est

οὐκ ἄρα δηθύνει. καὶ τοῖσι μὲν ἡ κεφαλὴ ἀλγείει πᾶσα. καὶ ἥδε ἄλλοτε μὲν ἐπὶ δεξιᾷ. ἄλλοτε δὲ ἐπὶ ἀριστερᾷ. ἢ μέτωπον, ἢ ἕρεγμα καὶ ταῦτα ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρῃ ῥεμβώδεα τρόπον. τοῖσι δὲ καὶ δεξιᾷ μόνον, ἢ ταλαγιά μόνον. ἐς ὅσον ὄρων κρεῖττα φθῶ, ἢ ὡς, ἢ καὶ ὄφρυς μία, ἢ ὄφθαλμὸς ἐς μέσφι μέσθ, ἢ εἰς ἐς ἴσα τέμνει μῆνον, ἐπέκεινα δὲ τὸ ἄλγημα οὐ περῆ. ἐν ἡμίσει μίμνει τῷ τῆ κεφαλῆς χωρίῳ ἕτεροκρανίῃ τὸ δὲ μόνον καλεῖται. ἐκ ἐυθες κακόν, κῆν διαλείπη, κῆν σμικρὸν ἐμυδραὶ δοκῆ. καὶ γὰρ ἐμπέση κοτὲ ὀξέως, αἰχρὰ καὶ δεινὰ πρῆσαι. πασσμός καὶ διαστροφὴ τῆ πρὸσώπε γίγνεσθαι. ὀφθαλμοὶ ἢ ἀτενέες κέρας ἰκελοὶ πεπήγασι, ἢ τῆδε κακείσε πασσμώδεες ἐνδον εἰλῶν) σκοτοδίνως. ὀφθαλμῶν ἰσοβρύχι φόνος ἀχει μινίγγων. ἰδρῶς ἀχρὸς τενόντων Ἰξαπίνης ἀλογος, ὡς περὶ πινος παλάξαντος ἐύλω. ναυτῆ, ἐμετος χολωδέων, κατὰ πλωσις τῆ ἀνθρώπου. καὶ δὲ Ἰπλείνη καὶ τὸ πάθος, ὡν ἄνθρωπος ἐτελεύτησε. καὶ δὲ σμικρότερον ἢ, καὶ ἐς ὄλεθρον ἀσινές, χροίζει, ὄκνη παλὺς, ἀσπρῆ βαρίν, ἀστορίν, ζῶν δύσφορος. καὶ γὰρ πῶς φεύγσει τὴν αὐγλήν. σκότος δὲ πρῆναι τοῦ τοῖσι τὴν νῆσον. οὐδὲ ἐσιδεῖν πῆ ἀκῆσαι τερπνόν, δύσφορι. κακοδμοὶ τὴν ὄσφρησιν, καὶ οὐτέ πῆ εὐώδες αὐτέους τέρεπαι. ἐκτρέπονται δὲ καὶ τὰ κακώδεα. ἀχθονται τῷ βίῳ θανατῶσιν ὡν ἄνθρωποι. αἰτίη δὲ τούτων



τουτέων ξὺν ξηρότητι ψύξις. ἢν δὲ
δηθύνῃ καὶ ἐς μέζον ἐρεπῆ ἔπ' τοῖσι
πόνουσι τὸ πάθος, σκότωμα γίγνεται.

ΠΕΡΙ ΣΚΟΤΩΜΑ-
ΤΙΚΩΝ.

Κεφάλ. γ.

Ἡν ζόφου τὰς ὄψιας αἰσθητικῶν δυνάμεων
ἀμφὶ τὴν κεφαλὴν ἐλίσσεται, καὶ
ἴσως * βομβέη ὅπως ρεόντων καναχη-
δῶν ποταμῶν, ἢ οἶον ἀνεμοῦ ἰσίοισι
* ἐγκυβερενέη, ἢ αὐλῶν, ἢ καὶ σειγ-
γων ἐνοπή, ἢ τρισμαῖ ἀμάξης ἰαχῆ,
ὀνομάζουσι σκότωμα τὸ πάθος,
κακὸν μὲν, κὴν σύμπτωμα κεφαλῆς.
κακὸν δὲ, κὴν ἐκ διαδέξιου κεφα-
λαίης, ἢ ἔξ ἐωυτέως χρονίου νέου φύη.
ἢν γὰρ τὰδε μὲν μὴ ἀπογίγνεται,
μίμνη δὲ ἢ σκοτῶν, ἢ χρονω μακρῶ
τελεωθῆ τοῖσι ἰδίοισι σύμπτωμασι
ἐπὶ πρὸς ἀκεομῶν, πάθος τὸ σκότω-
μα γίγνεται. ἐπὶ αἰτῆ ὑγρῆ τε καὶ ψυ-
χεῖ. ἀλλὰ καὶ ἀρχὴ πάθων ἄλλων,
ἢν ἐς ἀνήκεσον τραπῆ, μανίας, με-
λαγχολίας, ἔπληψις, πρὸς ἐπι-
γνηνομῶν ἐκαστῆ τῶν ἰδίων συμ-
πτωμάτων. σκώματος ἢ ἰδέα, βά-
ρος τὸ κεφαλῆς, ὀφθαλμῶν μαρμα-
ρυγαὶ ἔπ' πολλῶ τῶ σκώδει. ἀ-
γνωστῆ ἐωυτέων τε καὶ (τῶ) πέλας. * καὶ
ἢν ἐπὶ αὐξήσει ἢ νοῦσθ' γίγνη, τότε
γῆα λυόν) καὶ ἔρπον) χαμαὶ. ναυτίη
καὶ ἔμετος φλέγματος, ἢ χολωδέων,
ξανθῶν, ἢ μελανῶν. εὐτε ἐπὶ μὲν ξαν-
θῆ χολῆ, μανίαί γίγνον). ἐπὶ ἢ τοῖσι
μέλασι, μελαγχολία, ἐπὶ δὲ τῶ
φλέγματι, ἢ ἔπληψι. πασῶν γὰρ
ἢ δὲ νοσῶν τροπή.

cum ariditate frigiditas. Si diu teneat,
magisque inualefeat ægritudo, post
id genus dolores uertigo subsequi-
tur.

DE VERTIGINE.

Caput III.

Si tenebræ oculis prætententur, &
caput in turbinis modum circumduci
uidetur, & auribus murmur ueluti de-
labentis cum strepitu fluminis inso-
nat, aut tanquam uentus flatu uela
percutiens, aut tibiæ fistularum-
que cantus, aut ueluti stridor plaustris
currentis obstrepit, uertigo huic uitio
uocabulum est, malum quidem, si ca-
pitis symptoma est, malum quoque,
si cephalæ successit, aut ex ea uetusta
ægritudine ortum est. Nam si priora
uitia non recesserunt, sed remanet
Scotodine, id est, tenebræ oculorum,
& apprensus motus in orbem, aut lon-
giori tempore cum proprijs sympto-
matibus nulla adhibita curatione ad
summum peruenit, uitium, quod à
Græcis Scotoma dicitur, à Latinis
uertigo, procreatur. Causam habet
frigidam & humidam: aliorumque
sæpe morborum, cum insanabilis
enafit, initium est, ut furoris, *melancho-
lia*, morbi comitialis cuique suis sym-
ptomatibus accedentibus. Vertiginis
autem forma ita se habet, grauitas
adest capitis, splendida quædam oculo-
rum inter multas tenebras sese offerunt,
sui metæger propinquoque igna-
rus est. Cumque morbus augetur,
tunc tibiæ soluuntur, atque humi re-
punt. Nausea fit, atque uomitus pitui-
tæ, bilis uel tam atræ, quam flauæ,
quando flaua per uomitum rejecta
furor enafitur: atra uero, melancholia:
ac pituita exeunte, morbus comi-
tialis efficitur. Omnium quippe mor-
borum talis conuersio est.

DE



Caput IV.

Κεφάλ. δ.

VARIUM ac portentosum morbi genus est epilepsia, quæ dicitur à Græcis, latinè Comitialis morbus. *Efferatus* utique in accessionibus, & peracutus, & perniciosus: quandoquidem nonnunquam accessio una hominem rapuit. At si diligenti cura uim morbi sustinet laborans, ægrè tamē uitā ducit inter fæditates, ignominias atq; dolores. Morbus autem non facilè recedit, sed ætatibus melioribus, & pulchriori tempore uiget. *Et pueris etiam, adolescentibusq; contubernalis est.* Interdum secunda fortuna euenit, ut per succedentem prouectiorem ætatem abigatur, quando simul cum *forma dignitate* euanescit. Sed & tum quosdam abiens deformes efficit, pueros quoque pulchritudinis inuidia perdit, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquem profusus auferens. Quod si malum hoc penitus infederit, atque radices altius egerit, neque ipsum Medicus, neque ætatis mutatio submouent, sed cum ægrotante uiuit atque commoritur. *In super* morbus iste membra oculosq; conuellens ac distorquens, dolores ciet: interdum & mentem in furorem adigit. Triste mediis fidius est ipsius inuasionis spectaculum: turpis & eius desinentia cum stercore, & lotio, & spontina uentris solutione. *Sed & ignominiosa quoq; species est.* Quippe nonnulli flagitiosis hominibus à luna immitti existimant: cuius rei causa & sacrum morbum hunc nominant. Verum & alijs rationibus id nomen ei fuit impositum: aut ob magnitudinem: omne enim magnum, sacrum dici consuevit: aut quod non humana ope tolli queat, sed diuina: aut quoniam dæmone correptus esse homo uideatur: aut ob hæc simul omnia sacer morbus appellatus est.

Ποικίλον, ἢ δ' ἀλλόκοτον κακόν, ἢ ἐπιληψίην, θρηῶδες μὲν ἐν παροξυσμοῖσι κατόξυ, καὶ ὀλέθριον. ἐκτείνει γὰρ κοτε παροξυσμὸς εἰς. καὶ δὲ μελέτησι φέρη ἄνθρωπον, ζῆ μὲν, αἰχρα καὶ ὀνείδεα, καὶ ἀλγεα φέρων. ῥηϊδίως ᾗ ἐκ ἀπεισὶ ἡ νοῦσος, ἀλλὰ ἐν ἡλικίῃσι τὲ πικρέησι ἐνοικεῖ. καὶ ὦρη τῆ ὥρα. ξυδριατᾶται τε παισὶ καὶ μειρακίῃσι. ἐξηλάθη δὲ κοτε ἰσ' εὐτυχίης, δι' ἄλλης ἡλικίης μέζονος, οὗτε τῷ κάλλει συνέξεισι τῆς ὥρης. ἀλλὰ καὶ τότε μετεξέλερας αἰχροῦς ἀποδείξασα, ἀπόλλυσι τοὺς παῖδας φθόνῳ ἔκκαλλεσθ, ἢ χειρὸς ἀκρωσὶ, ἢ παροξυσμῶν διασροφῆ, ἢ πηρῶσεί πινσ αἰδήσεισ. καὶ ᾗ φωλεύση τὸ κακόν ἐς *ρίζην, οὔτε ἰητρῶ, οὔτε ἡλικίης μεταβολαῖς ἐξοδον πείθεσ. ἀλλὰ ξυμβιοῖ μέσφι θανάτου. ποτὶ, καὶ ἐπιπινσ ἡ νοῦσος, πασμοῖσι καὶ διασροφῆσι μελέων τε καὶ ὄψισ. ἔτρεψε ᾗ κοτε καὶ γνώμην ἐς κακίην. ἀτερπῆς μὲν ἢ παροξυσμῶ θέν. αἰχρῆ δὲ καὶ ἡ ἀπόληψις αὐτέα, ἐπὶ ἀφώδω καὶ ἔροισι, καὶ αὐτριάτω κοιλίῃ. ἀλλὰ καὶ ἀδοξος ἢ ξυμμορφῆ δοκέει γὰρ τοῖσι ἐς τὴν σελήνην ἀλητροῖσι ἀφικνεῖσθ ἡ νοῦσος. τὸν κεκεν ἰερίω κικλήσκουσι τὴν πάθην. ἀτὰρ καὶ δι' ἄλλας, παροξυσμῶ, ἢ μέγεθος ἔκακῶ. ἰερόν γὰρ τὸ μέγα. ἢ ἴστος ἐκ ἀνθρωπίνης, ἀλλὰ θείης, ἢ δαίμονος δοξῆς ἐς τὸν ἀνθρώπον εἰσόδου, ἢ ξυμπάντων ὀμῶ, τὴν δὲ ἐκίκλησκον ἰερίην.

ὀκόσα



ὀκόσα μὲν οὕτως ἔπι ὀξείῃ γίνεῖται
 τῆ νόσῳ, πρὸθεν μοι λελέκ). ἡ δὲ
 ἐν χρόνῳ μίμνη, οὐδὲ ἔπι τοῖσι δια-
 λείμμασι ἀσπίνες, νωθροὶ, ἄδυμοι,
 κατηφέες, ἔξ ἀνδρωποὶ, ἀμικτοί, ἔ
 ἡλικίῃσι μελίχιοι, ἀγρυπνοὶ, δυσό-
 νειροὶ πολλοῖσι ἀλλοκότοις, ἀπόσιτοι,
 πέψαι κακοί, ἀχρσοὶ, μολιβδῶδες,
 δυσμαθέες * νωθεῖν γνώμης τὲ καὶ
 αἰσθήσεως, βαρυνήκοοι, ἥχοι, βόμβοι
 ἀνά τινὲ κεφαλῇ. γλώσσα ἀσα-
 φής καὶ ἀσάφορος ἢ ὑπὸ τ' διαθέσιος
 τ' νόσου, ἢ ὑπὸ * πνευματικῶν ἐν τῆσι
 κατὰ λήψει, ἀσασμῶδες. γλώσσα
 μὲν σροφαῖ) ἐν τῷ σώματι ποικίλως.
 ὑποτείνε) δεχομένη τὴν διάνοιαν ἢ
 νῆσος, ὡς τὰ πάντα * μωραίνε. ἀτὰρ
 καὶ τοῖς δεξιῇ ξὺν ὑγρότητι φύξις.

* πνευματικῶν.

* πνευματικῶν.

* πνευματικῶν.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ.

Κεφάλ. ε.

Μέλαινα χολή, ἐν μὲν ὀξείῃ ἀνω-
 θεν φανείσα, κέρτα ὀλέθριον. κάτω
 δὲ ἔξισσα ἔκέρτα ἀνώλεθρον. ἐν δὲ
 τοῖσι χρόνιοις, ἡ μὲν * ὑπὸ κατὰ
 ἐς δυσεντερίην καὶ ἥπατος πόνον τε-
 λωταῖ. γυναῖξιν δὲ καθαρσις ἀπὸ τῆς
 ἑπιμυωίων, ἢ τὰ ἄλλα ἀνώλεθροι
 εἴωσι. ἡ δὲ ἀνωρέπη ἐς σόμαχον, ἢ
 (ἐς) φρένας, μελαγχολίῳ τῷ χῆ-
 φύσιν τὲ γὰρ ἐμποίει, καὶ ἐρυγὰς
 κακῶδεις, ἰχθυώδεις.

* ἐπίη.

* ἐπιμυωίων.


διαπέμπει δὲ καὶ κάτω φύσας
 ψοφώδεις, συντέπει δὲ καὶ
 τινὲ γνώμην. διὰ τὸ καὶ μελαγ-
 χολικοὺς καὶ ψοφώδεις τὰς δὲ
 ἐκίκλησκον οἱ πρόθεν. μελεξετέροις

Quæcunque sanè huic tanquam ac-
 to morbo symptomata eueniunt, su-
 perius memorauimus. At si diu per-
 manet, neque per intermissiones ci-
 tra noxam degunt torpentes, abieci
 animo, mæsti, hominum aspectum
 consuetudinemque uitantes, neque
 ætate procedente mitiores fiunt, uigi-
 lant, per quietem multis formidolosus
 imaginibus terrentur, cibum sumere
 fastidiunt, sumtum malè conficiunt,
 decolores, facieque plumbea sunt, ob
 ingenij sensusque tarditatem ægrè
 discunt, auditus hebet, aures tinniunt,
 capiti bombi ueluti quidam insonant.
 Lingua in sermone perplexa est ac-
 tubat, aut ex uimorbi, aut ex accessio-
 num uulneribus: tunc enim ob con-
 uulsionis neruorum motum lingua
 in ore uarijs modis torquetur. Ratio-
 nem quoque usque eò morbus con-
 turbat ac deijcit, ut profus denique
 infatuentur. Atque horum omnium
 causa est cum humiditate frigiditas.

DE MELANCHOLIA.

Caput V.

A Trabilis in acutis ægri-
 tudinibus si in superioribus apparet, oppidò
 quàm mortifera est: si ad inferiora
 descendens exijt, non ualde uacat
 discrimine. In tardis autem longis-
 que morbis, si ad aluum bilis atra de-
 currit, in tormina jecorisque dolorem
 finitur. Mulieribus uerò purgatio ui-
 ce mensium aduenit, si in cæteris ab-
 est mortis periculum. At si superius,
 ut puta stomachum, septum uè tran-
 uersum petit, insaniam parit, quam
 Græci Melancholiam nominant. Fla-
 tum nanque gignit, & rucius fetidos
 piscium odorem exhalantes. Infra
 uerò & flatus cum crepitu transmittit:
 nec nō & mentem simul alienat. Pro-
 inde melancholicos iuxta & flatuosos
 Medici ueteres sic affectos appellarūt.
 Porro quidam reperiuntur, in quibus
 neque



neque flatus, neque bilis atra colligitur: sed ira immoderata, & mæror & ingens animi consternatio. Hos quoque nihilominus Melancholicos nuncupamus. Quippe cum *ὄργη*, id est, ira significetur per *χολήν*, per *μέλαιναν αιτέμ*, id est, atram, πολλή *κ* θηριώδης, id est, permulta & efferata. Testis autē Homerus est, ubi inquit. Inter hos autē surrexit heros Atrides late imperans Agamemnon tristis, furore autem ualde præcordia atra circum oppleta erant, eiusque oculi igni fulgenti similes erant. Tales euadunt Melancholici, cum ab hoc malo interimuntur. Est autem animi angor in una cogitatione defixus atque inhærens absque febre. Mihi profecto Melancholia Maniæ (quæ latine furor dicitur) initium atque pars esse uidetur. Siquidem furentibus animus modo ad excandescentiam, modo ad uoluptatem conuertitur: At melancholici in tristitia & animi angore duntaxat uersantur. Furentes (etiam) plurimum uitæ sic transeunt desipientes, & foeda atrociasque committentes. Melancholici uerò non una tantum insanias specie laborant: sed aut uenenum ne sibi detur, suspicantur: aut hominum consuetudinem perosi, in solitudinem aufugiūt: aut ad superstitionem religionem conuertuntur: aut lucem hanc uitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio uoluptasque plurimis aduenit. Hi uerò in furorem præcipitant. sed quomodo quibusque sedibus affectis in uitium plerunque contrahitur, subiiciam. Porro si in præcordijs residet, causa

ἢ εἰ δὲ φύσα, ἔτε μέλαινα χολή ἐγγίγνε). ὄργη ἢ ἀκρητος ἢ λύπη, καὶ κατὰ φεῖν θνή. ἢ ἰσὸς δὲ οὐδὲ μελαγχολικὰς καλέομεν, χολῆς μὲν τὸ ὄργης συμφοραζομένης. μελαίνης δὲ πολλῆς ἢ θηριώδους. τέκμαρ δὲ ὄργης ἐνθά φησὶ.

Τοῖσι δ' ἀνέστη ἦρωσ ἀτρείδης θυρυκρείων ἀγαμέμνων
 Ἀχνύμεν. μὲν εὖς ἢ μέγα φρένες ἀμφὶ *μέλαινα
 *Πιμπλάντ', ὅσπερ ἢ οἱ πυρίλαμπετόων πείκτω.

Τοιοῖδε γίγνεται οἱ μελαγχολώδεις, εὐτ' αὖ ὑπὸ τῆς κακῆς κλεινῆς, ἔστι ἢ ἀθυμίας ἐπιμῆ φαντασίῃ, αἰδοτέ πύρεξ. δοκέει τὸ ἢ μοι μανίας τὸ ἔμμεναι ἀρχὴ καὶ μέρος ἢ μελαγχολία. τοῖσι μὲν γὰρ *μαινόμενοι, ἀλλοτε μὲν ἐς ὄργην, ἀλλοτε δ' ἐς θυμηδίῳ ἢ γνώμῃ τρέπε). τοῖσι ἢ μελαγχολώσι, ἐς λύπην καὶ θυμηδίην μένον. αὐτῶ καὶ μαινόμεναι μὲν ἐς τοῖ πλείστα τῶ βίῃ, ἀφρονέοντες ἢ δεινὰ ἢ αἰχρὰ πηήσοντες. μελαγχολώσι δὲ ἐκ τῆς ἐν εἰδέει ἕκαστοι, ἀλλ' ἢ πρὸς φαρμακίαν ὑποπίοι, ἢ ἐς *ἐπιμῆν φεύγεισι μισανθρωπίῃ, ἢ ἐς τῆ σιδαμονίην τρέπον), ἢ μίσος ἐστὶ τῆ ζῶντατέοισι. ἢ ἢ ἢ ἀθυμίας ἀλλοτε ἢ ἀλλοτε διάχουσις γίγνε), ἢ δονῆ πρὸς γίγνε) ἐπι τοῖσι πλείστοισι. οἱ ἢ μαινόμεναι. ὅπως δὲ καὶ ἀπὸ κοίων χυμῶν τὰ πολλὰ γίγνεται, φράσω. καὶ μὲν ἐν τοῖσι ὑποχονδρείοισι μίμη, ἢ αἰτή ἀμφὶ

* μέλαινα
 * πριμπλάντ

πρὸς φαρμακίαν

* μαινόμενοι
 νόσος

πρὸς φαρμακίαν
 * ἐπιμῆ



ἀμφὶ τὰς φρένας εἰλέεται, καὶ διεξίει
 χολὴ αὐθην, ἢ κατῶθεν μελαγχολ-
 λῆσιν. καὶ ἢ κεφαλῶν ἐς ξυμπα-
 θείην ἀγῆ, καὶ ἀμείβεῖ) τὸ πῶδ' αὐτοῦ
 τὸ ξυθυμίας ἐς γέλωτα καὶ ἠδονῶν ἐς
 τὰ πολλὰ τῆ βίου. οἱ ἢ μαίνον) αὐξῆ
 τ' νοῦσα μάλλον, ἢ ἀλγεί παθεῖ.
 ἐπ' ἀμφοῖν δὲ ξηρότης αἰτίη. αὐδρες
 μὲν οὐκ μαίνονται καὶ μελαγχολ-
 λῶσι, ἢ καὶ αὐδρῶν ἐλάσσους. κακίον
 δὲ αὐδρῶν * αἱ γυναῖκες ἐμπαί-
 νον). ἠλικίη, πρὸς ἀκμὴν, καὶ οἱ ἀκ-
 μαζόντες, ὡς * θέρως μὲν καὶ φθι-
 νωπὸρ πικτεῖ. ἔαρ ἢ κρῖνει. τεκμηρί-
 ων μὲν οὐκ ἐκ ἀσημα. * ἢ γ' ἠσυχου,
 ἢ συγνοί, κατηφέες, νωθροὶ ἔασι ἀλό-
 γως, οὐ πνὶ ἐπ' αἰτίη, μελαγχολίας
 δεχθῆ. ἐπ' ἢ καὶ ὀργίλοι πρὸς γί-
 γονται, δυσθυμοί, ἀγρυπνοί, ἐκ τῶ
 ὑπνῶν ἐκ θυροβούμυροι. ἔχει δὲ αὐ-
 τέους καὶ τὰρ βῶ ἐκ τῶν, καὶ ἐς αὐ-
 ξησιν τὸ νόσημα φοιτῆ, εὐτε καὶ ὄνειρι
 ἀληθῆες, δειμαλώδεις, ἐναργώδεις,
 ὀκόσα γ' ἠπὲρ ἐκ τῶν) οὐ πω οἱ
 κακῶ, τὸ δὲ ἐνύπνιον ὀρέεσι ὠρμησε.
 πρὸς * τὰ ρηίδιον μελαγχολῶναι εὐκο-
 τοί, αἰχρῆ, σμικρολόγοι, ἀδωροί, καὶ
 μετ' ἐ πολὺ ἀπλοῖ, ἀσώτοι, πολὺ δω-
 ροί, καὶ δεσπῆ ψυχῆς, ἀλλὰ ποικιλίη
 νοσημάτων. καὶ ἢ ἐπὶ μάλλον τὸ κακὸν
 πέζι, μίσθ, φυγανθρωπία, * ὀλό-
 φουροί ἐς κενεὰ, ζωῆς κακήγορῆ.
 ἔραυται ἢ θανάτου. πολλοῖσι δὲ ἐς
 ἀναμνησίν καὶ μίσησιν ἢ γνώμη ῥέ-
 πει, ὅπως ἀγνώτες ἀπάντων, ἢ πη-
 λήσμονες ἐαυτέων, εἶον ζωῶσι ζωῶ-
 δεα. ξυμπεπέεται δὲ καὶ τὸ σπινθῆρος


circa septum transversum immoratur
 bilisque supra infraue melancholicis
 prorumpit. Si caput etiam per consen-
 sum afficitur: & excandescentiæ deli-
 rium in risum hilaritatemque per lon-
 gum uitæ spatium commutatur: hi
 uerò morbi potius magnitudine,
 quàm affectus dolore in furorem pro-
 labuntur: In utrisque nimirum ari-
 ditas *causanda*. Viri sanè & furore & me-
 lancholia corripiuntur, aut etiam ui-
 ris juniores: Sed deterius mulieres
 quàm viri furij agitantur. Ætas, quæ
 prope statum est & ipse status huic
 malo subijciuntur. Æstatis tempus &
 autumnus hunc morbum procreant,
 uer autem iudicat. Inter notas cui-
 dentiores hæ sunt, quòd uidelicet,
 quieti aut tristes, abieci, torpentēque
 sunt absque ratione: nullaque de
 causa melancholia initium sumit:
 præterea in iram facillè incidunt, malè
 sunt animati, uigilant, ex somnis tu-
 multuosè excitantur. Ingenti quoque
 pauore trepidant, cum morbus cre-
 mentum sulcipit, quando & insomnia
 uera sunt, terribilia atque euidentia.
*Quæ enim cumque refugiunt & auersan-
 tur, nondum in malo, prouident insomnia
 occurfu: ad mutandam sententiam faciles
 sunt, turpes, parci, non munifici: sed non
 ita multo post simplices, prodigi, mul-
 ta largientes, non uirtute animi, sed
 morbi uarietate. Quòd si malum ex-
 asperatur, homines oderunt, ab eisq;
 fugiunt, de inanibus conqueruntur,
 uitæ maledicentes, mortem experunt.*
 Atque istorum multis sensus ac mens
 usque eo stupore fatuitateque capi-
 untur, ut omnium ignari, sui que met
 immemores in morem bestiarum ui-
 tam degant. Corporis quoq; habitus

α. β.

α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. κ. λ. μ. ν. ξ. ο. π. ρ. σ. τ. υ. φ. χ. ψ. ω. α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. κ. λ. μ. ν. ξ. ο. π. ρ. σ. τ. υ. φ. χ. ψ. ω.

α. β.

α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. κ. λ. μ. ν. ξ. ο. π. ρ. σ. τ. υ. φ. χ. ψ. ω.



In peius labitur : colore fædo, & ex atro uiridique commixto tinguntur: nisi inferius bilis descendat atque exeat, sed quoquouersum per corpus cum sanguine diffundatur, multi cibi capaces, nihilominus tamen extenuati sunt, quoniam somnus in eis neque potu neque cibo membra confirmat, sed uigilia ad exterius mouet, ac dissipat. Proinde & alius arida est, nihil deiciens. Nonnunquam uerò deijcit sicca, rotunda, atro quodam biliosoque circumfusa. Urina pauca redditur, acris, biliosa; multum flatuosi spiritus in præcordijs est, ructus patridi feruntur, graeolentes, perinde ac si ex maris lacuna exhalarent. Nonnunquam & humidum quoddam acre cum bile reijciunt, arteriarum motus ferè parui sunt, pigri, frigori similes, inualidi, crebri. Fama est, ex his quem piàm insanabiliter se habentem, cum puellam deperiret, medicis nihil proficientibus ab amore fuisse sanatum. Ego uerò suspicor, cum ab initio in puellam exarsisset, indetristem & languenti animo, quod ea non potiretur, euasisset, suisque popularibus melancholicum uisum esse. *Hic uero nec amorem in se nouerat.* At (iste) ubi puellæ amatæ se conjunxit, mæstitia recessit: ira, & animi languor discussus est: gaudium tristitiam deleuit: & mens amore medico prorsum sanata est.

ἐς πονηρόν ἢ ἕξις. χροίη * μελαγχλωρος, ἢ μὴ διεξίη κατὰ τὴν χολήν, ἀλλὰ ἀναχέη) ξύν τῷ αἵματι ἐς τὸ πᾶν. * βοροὶ μὲν, ἰσχυροὶ δ'. * ὑπὸ τῷ γαστρῷ αὐτέοισι, ἔτε πόσει, ἔτε βρωτῷ συγκρατεῖα τῶ μελέα. ἀγρυπνίη δ' οὐκ ἵσχυροὶ ἐς τὸ ἐξω φρενῶ. τῶ γὰρ ἐν κοιλίᾳ ξηρῇ ἔσθ' ἐν δεισῶ. ἢ δ' ἐκότε ἐκιδῶ. ξηρῶ, σφύγγυλα, ξύν ἀειρήνῳ μελάνῳ. * χολώδεα, ἔρασιμι κρεῖα, δριμέα, χαλόβαφα, φυσώδεσκαθ' ὑποχόνδριον, ἐρυγαὶ κακώδεες, βρομώδεες, ὡς ἔξ ἀλός * ὀρεγμίη. αἰετῶ κοτὲ καὶ ὑγρὸν δριμύξυν χολῆ. σφυγμοὶ ὡς ἑπίπαν σμικροί, νωθροί, ἀδρανῆες, πυκνοί, ἰκελοὶ τῷ ψύχει. λόγος * ὅτι τῷ τῶν δὲ πρὸς ἀνηκέστως ἔχων, κούρης ἢ ἔρατὲ καὶ τῷ ἰητρῶν ἔσθ' ἐν ὠφελούντων, ὁ ἔρωσ μιν ἴσαστο. δοκέω δ' ἔγωγε ἐρᾶν μὲν αὐτὴν δεχθῆναι. κατὰ φεῖα δ' ἐκὶ δὴ σφαιρῶν, ἢ ὑποατυχίης τῆς κέρησι. ἐμμεναι, καὶ μελαγχολικὸν δοκέειν τῶσι δημότησιν (ἔτε) οὗτος οὐτὲ μὲν ἢ ἔρωτα ἐγγιγνώσκων. ἐπεὶ δ' ἐκὶ τῶν ἔρωτα ξυνήψθη κούρη, πάντ' ἔρα κατὰ φεῖα, καὶ διασπίδνησι ὀργῶτε καὶ λύπην. χάσμα δ' ἔξ ἐνηψετ' δυσθυμίας. καθίσταται γὰρ τῶ γνῶμῶν ἐρωπιητῶν.

* μελαγχλωρος
* δεξή.
* ὑπὸ τῶν.
* χολώδεα
* ὀρεγμίη.
* ἴσαστο.

DE FVRORE.

Caput VI.

FVroris modi specie permulti sunt, genere tantū unus. Est enim ex toto mentis alienatio diuturna, uacās febris. Etenim si febris quādoq; cōjūgitur, id

ΠΕΡΙ ΜΑΝΙΑΣ.

Κεφαλ. 5.

Μανίας τρεῖς ποιοὶ, εἰδῶσι μὲν μιν οἱ γίνεαι δὲ μοῦνος εἶς. ἕκαστος γὰρ ἐς τὸ σὺμπασι χροῖη. αὐτὸ δ' ἐν πυρετῷ. εἰ γὰρ κοτὲ καὶ πυρετὸς ἑπιλάβοι,

εἰκ



ἐκ δὲ τοῦ μανίης αὐτοῦ γίγνεται, ἀλλ' ἐκ συντυχίας ἄλλης. ἐκφλέγει γὰρ καὶ οἶνον εἰς πᾶσα φρονεῖ ἐν μέθῃ. ἐκμαίνει δὲ καὶ τῶν ἐδρεσῶν μετεξέτερος, ἢ μακροβραχέου, ἢ ὑοσκύαμου, ἀλλ' οὐ πῶς μανίη ἰαθεῖ κικλήσκου. Ἐπι γὰρ σχεδὸν γιγνώσκου, καθίσταται θάπτον. τὸ δὲ ἐμπεδόν ἢ μανίη ἔχει τῶν τῆ μανίη, ἐδέειν πικελόν ἢ λήρησις, γήραος ἢ ξυμφορῆ. αἰσθησι γὰρ ἐστὶν ἀρεκῆ, καὶ γνώμης νάρκωσις ἢ δὲ τοῦ νοῦ ὑπὸ ψύξει. μανίη δὲ θερμὸν καὶ ξηρὸν τῆ αἰτίη, καὶ ταραχῶδες τῆσι περὶ ξέσι. ἢ μὲν γὰρ λήρησις ἀρχομένη ἀπὸ γήραος, ἔτε διαλείπει, καὶ ξυναποθνήσκου. μανίη δὲ καὶ διαλείπει καὶ μελεδῶν ἐς ἔλθου ἀποπαύει. διαλείπει δὲ ἀτελής ὑπὸ τῶν μανίης λόγῳ γίγνεται, ἐκ εἰκότως ἀκεομένης ἢ κακῆ ἰητησίη, ἢ τῆς ὥρης θύρασις. μετεξέτερος γὰρ διοκῆουσις ἀσινέας ἐμμελαι, ἢ ὥρη τὸ ἔαρ, ἢ ἀμαρτωλὴ διαίτης, ἢ ὄργη ἐκ συντυχίας ἐς ἀνάκλησιν. καὶ γὰρ δὴ νοσήουσι οἱ φύσι ὄργιλοι, ὄξυθυμοι, ῥέκ, ἔυμαρέες, ἰλαροί, παιδιώδες. ἄταρ καὶ οἱσι ἐς ἐναντίην ἐδέειν ἢ φύσις ῥέπει, ὄκοσοι νεοτροί, Ἐπίλυτοι, βραδεῖς μὲν ἐκ μαθεῖν. Ἐπίμονοι δὲ ἀποσκαμῖν, ποτὶ καὶ μαθόντες, ἀμνήμονες, οἱ δὲ καὶ μελαγχολῆσαι ἐτοιμότεροι. οἱ δὲ καὶ παρῶθεν ἐκμαίνου, ἄταρ καὶ ἡλικίας οἱσι τὸ θερμὸν καὶ αἶμα πολὺ, οἱ δὲ μαίνονται, τοῖσι ἀμφὶ ἡβλιω καὶ νέοισι, καὶ οἱσι πάντων ἢ ἀκμή. ὄκοσοισι δὲ τὸ θερμὸν ἐκ μελαίνης χολῆς ἐξάπτεται,

non ratione furoris propriè, sed alio quouis casu, incidit. Nam & uinum in ebrietate ad mentis perturbationem accendit. Præterea quædam esculenta amentiam pariunt, ut mandragora, & altercus. Sed neutiquam hi inter furentes numerandi sunt. Nam repente hæc adueniunt, & celeriter conquiescunt: *Temere enim orta facilius consistunt*, furor autem stabilis ac permanens est. Furori autem nihil simile delirium habet, quod senectæ calamitas est. Est enim sensus, mentis, rationisque marcor & ignauia ex refrigeratione proueniens. At furor ex calida siccaque causa exoritur, fundionescq; tumultuosas præstat. Deliramentum autem à senectute incipiens, nunquam per interualla desinit, *sed simul commoritur*. Furor uerò & intermittit, & diligenti curatione radicitus euellitur. Sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit: cum non congruenter aut medela, aut temporis anni clementia curatur. Nonnullos namque, qui penitus soluti morbo uidebantur, aut ueris tempus, aut error in uictu, aut ira casu aliquo proritata denuo ad furorem reuocauit. Porro illi huic uitio facile patent, qui natura sunt iracundi, acriter excandescetes, negotiosi, faciles, hilares: qui jocosis, puerilibusque delectantur. Illi etiam, qui contrario his sunt ingenio, quicumque uidelicet stupidi sunt, tristes, tardi in discendo, in laboribus perseverantes, & qui cum demum quid didicerunt, facile obliuioni tradunt: hi & melancholia promptius capiuntur, qui & antea in furorem procidunt. Verum & in ætatibus, quibus calor & sanguis multus est, hi furore exagitantur, ut puberes, iuuenes & quibus omnium uigor est. In quibus autem calor ex atra bile accenditur,



corporisque habitus ad ariditatem vergit: his in melancholiam cadere facillimum est. Item uicis ratio, multi cibi assumptio, saturitas immodica, ebrietas, luxuria, Venereis appetentia hanc ægritudinem concitant. Nonnunquam & mulieres, nisi mundetur corpus, furor infestat: cum ipsarum uteri ad uirilem congressum apti euaserunt. Aliæ uerò haud ita facile, sed admodum acerbè in furorem aguntur. Causæ tales sunt. Vir nimirum furiosus fit, si consuetus sanguinis exitus, aut bilis, aut sudoris, aliqua de causa repressus est. Et quibus furor uoluptati est, rident, ludunt, saltant die noctuque: irascuntur palàm: nonnunquam coronati incedunt; ac si ex aliquo certamine uictores redeant: quibus obuiam fiunt, non sunt infesti, *Non tristis est presentibus species.* Alij uerò ab ira furentes nonnunquam sibi uestes prosciderunt, & seruos interfecerunt, & sibi ipsis manus intulerunt, & obuios quoque malè habuerunt. Species utique infinitæ sunt. Ingeniosi nanque ac dociles Astronomiam *discunt* sine doctore: philosophiamque possident à nemine traditam: Poëticam quoque ueluti à Musis infusam norunt. Aliquid enim & in morbis emolumentum præbet docilitas. Rudes autem atque indocti homines hoc malo circumuenti graui pondera ferunt: figulinam exercent, aut fabrilem: aut lapides cælant. Præterea & uisa quadam aliena ipsis *gignuntur*. Timebat enim quispiam ne uasa olearia prociderent. Alius non bibebat, se laterem esse existimans, ne humore dissolueretur, pertimescens. Idetiam fama diuulgat. Carpentarius quidam olim fuit, qui cum domi esset, prudens operator erat, ligna benè metiebatur, scindebat, complanabat, clauis iungebat, aptabatque, in domo extruenda sobrius cum exactoribus operum uersabatur,

τό, τε εἶδος ἐς ξηρὸν τρέπεται, τούτῃ οἱσι μελαγχολῆσαι ῥήϊσον. διαίτῃ ἡ ἀγία, πούλυφαγία, πλησμονὴ ἀμετρεῖται, μέθη, λαχρεία, ἔρωτες ἀφροδισίων. ἐμάνησαν καὶ γυναικες ὑπὸ ἀκαθαρσίας ἔσκήνεος, οὕτε αὐτέσι ἀπνηδρῶθησαν αἱ μήτρας, ἀλλὰ ἡ μάλλον ἡ ῥηϊδίως ἐκμαίνονται. μάλα ἡ χαλεπῶς ἐκμαίνονται. αἰδέαι παροφάσιες. καὶ γὰρ ἀνδρα ἔξάπλουσι, ὑὸ ξυνήθη αἵματῷ ἐκκρυσιν, ἢ χολῆς, ἢ ἰδρωτῷ ἐπίχρη πῖς αἰτή. καὶ οἱσι μὲν ἡδονὴ ἢ ἡμανία, γελῶσι, παίζουσι, ὀρχῶνται νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ ἐς ὄργην ἀμφαδίον, καὶ ἐσεμμενοὶ κοτὲ ὄκως ἔξ ἀγωνίης νικηφόροι ἐασιν. ἀλυπτοῦτοῖσι πέλας ἢ ἰδέη. μετεξέτεροι δὲ ὑπὸ ὀργῆς ἐκμαίνονται. ἔσθ' ὅτε ἐσθῆτας τὲ ἐρρήξαντ, καὶ θεράποντας ἀπέκλειναν, καὶ ἐωυτέοισι χεῖρας ἐπήνεγκαν. ἢ δὲ καὶ τῖς πέλας ἐκ ἀκίνδυνῷ ἢ ξυμφορῇ. ἰδέαι ἡ μυρία, τῖσι μὲν γε διφύεσι τὲ καὶ ἔυμαθεσί, ἀστρονομίᾳ ἀδίδακτος, φιλοσοφίᾳ αὐτμάτη, ποίησις δὴθεν ἀπὸ μισέων. ἴχει γὰρ πῆ ἐν νοσοῖσι εὐχρησον ἢ εὐπαίδευσι. τῖσι ἡ ἀπαμδύεσι, ἀχθοφορία, πηλοεργία, ἰέκτρνες, ἢ λιθοξόοι, γίγνοντ) ἢ καὶ ἀλλόκοτοι φαντασίαι. ἐδεδίδ γὰρ πῖς ληκύθων ἐκπίωσιν, καὶ ἄλλος ἐκ ἔπινε, δοκέων * ἐωυτὸν πλίνθον ἔμδραι, ὡς μὴ τῷ ὑγρῷ λυθεῖη. μυθολογέε) ἢ καὶ τῶδε. ἰέκλων ἢ δὴ ἐπὶ οἴκου μὲν, σαόφρων δὲ γάτης καὶ, μερῆσαι ξύλον, κόψαι, ξύσαι, ξυγγομφῶσαι, ἀερισσαι, ξυτελέσαι δόμον νηφελέως, οἱσι * ἐργοδοῖται ὀμιλήσαι, ξυμβλώαι,

F

* ἐωυτῶνα

* ἐργοδοῖται



ξυμβιῶναι, ἀμείψασθαι τὰ ἔργα μὲν δὲ
 δικαίως. ὁ δὲ ἐπιμὴν τοῦ χωρίου ἔξερ-
 γασθὲν εἶχε γνώμης. καὶ δὲ ἐξήκο-
 τῆς ἀγορεύει, ἐπιλατῶν, ἢ πν' ἐτέ-
 ρω ἀνάγκην πθεῖς τὰ ὄπλα πρῶτον
 ἔσειεν. εἴτα ἐπὶ γενῶμω ἐξιών. ἐπὶν
 ἢ ἀπῆλθε πῶστε τῷ οἰκετῷ θένος, καὶ
 τῷ ἔργω πρῆξι. καὶ τῷ χωρίω,
 πάμπαν ἐξεμαίνετο. κῆν παλινδρο-
 μίση τὰ χυ, αὐθις ἐσωφρόνεε. καὶ ἡδε
 ἔχων καὶ τῆς γνώμης ἢ ἀμβωλή.
 ἴχασι ἢ τῷ αἰτίω τῷ νοσήματος, κε-
 φαλή καὶ ὑποχόνδρια, ἄλλοτε μὲν
 ἅμα ἀμφω δρεξάμενα. ἄλλοτε ἢ
 ἀλλήλοισι ξυμπωρῶντα. τὸ κῆρος
 ἐν τοῖσι σπλάγχνοισιν ἐστὶν ἐπιμανή
 καὶ μελαγχολία, ὅπως περὶ ἐν τῇ κε-
 φαλή καὶ τοῖσι αἰσθήσεσι τὰ πολλὰ τοῖ-
 σι φρενητικοῖσι. οἱ δὲ μὲν γὰρ παρα-
 δάνονται καὶ τὰ μὴ παρόντα ὄρεσι
 δῆθεν ὡς παρόντα, καὶ τὰ μὴ φαινό-
 μενα ἄλλω, κατ' ὄψιν ἰνδ' ἄλλω. οἱ ἢ
 μαινόμενοι ὄρεσι μόνως ὡς χεῖρ ὄρη
 ἐγγνώσκουσι ἢ τοῖς αὐτέων, ὡς χεῖρ
 γινώσκουσι. καὶ οὐ μὲν μέγα ἢ τὸ κακόν,
 εὐκείνητοι, ὄξεες τῷ αἰσθησιν, ὑπο-
 πτοι, ὄργιλοι, ἐκ ἐπ' αἰτή πνί, δύσθυ-
 μοι μὲν ἀλόγως, οἱσὶ ἐς σκυθρωπὸν ἢ
 μανίαν πέπε. οἱσὶ ἢ ἐς θυμηδίω, δῆ-
 θυμοι. ἄλλοι ἢ τῷ ἀλόγως ἀγρυπνοὶ
 ἀμφω ἀλλοιῶδες τὰς ὄψιας, κε-
 φαλαγγέες, ἢ πάντως γε βάρος τὸ
 κεφαλῆς ξύνεσι. εὐήκοι ἢ, ἀλλὰ
 βραδύτοι τῷ γνώμω. ἐπ' οἰοῖσι γὰρ
 ἔασι ἰδίη, ἢ χοι ὠτων, καὶ βόμβοι, μέ-
 χει δῆγε σαλπύγων τε καὶ αὐλῶν.
 ἢ ἐς αὐξήσιν ἢ νοῦσθ' ἢ γίγνηται, φυ-
 σάδες, ἀσώδες, βορῆ καὶ λάβροι

pacifcebatur, pro laboribus justam
 mercedem poscebat. Porro iste in loco,
 ubi arte suaungebatur, mente con-
 stabat: at si in forum quandoque
 discederet, ad balneum, aut ad aliud
 quippiam necessarium, instrumenta
 deponens primò suspirabat, deinde
 egrediens humeros constringebat:
 postea cum è seruorum, fabricæ, lo-
 cicque illius conspectu abiisset, tum
 penitus insaniebat, & furore rapieba-
 tur: quod si ad eundem locum celeriter
 recurrisset, iterum ad se redibat.
 Et tantum mentis habebat, quantum
 locus protendebatur. Causa morbi
 huius in capite præcordijsque conti-
 netur: modo utroque membro pari-
 ter laborare incipiente, modo alterum
 altero inuicem lædente. Verum præ-
 cipua furoris & melancholiæ sedes
 viscera sunt: quemadmodum caput
 & sensus in phreniticis magna ex par-
 te laborant, in quibus uis sensoria ob-
 læsa est, & quæ non adsunt, tanquam
 jam præsentia conspiciunt: & alijs
 non conspicua, ipsorum sese oculis re-
 præsentant. At furentes tantum, mo-
 do uident, quæ uidere oportet: sed de
 illis non sentiunt, ut sentiendum est.
 Itaque si magnum est malum, prom-
 tiore ingenio sunt, sensibus acutiores
 fiunt, suspiciosi sunt, iracundi nulla
 de causa, mærentes præter rationem,
 cum in seuerum & tetricum furor uer-
 titur. Cum uerò ad animi hilaritatem
 inclinati, lati & alacres fiunt, prius di-
 ci sine lædente causa uigilant: utrif-
 que uisio deprauata est, capitis dolor
 aut saltem grauitas comitatur: auditu
 prompti sunt, mente tardissimi, in qui-
 busdam sanè peculiariter sonant
 aures, & bombis adeò perstreperunt:
 ut tubarum fistularumque uoces
 audire sese existiment, idque
 fit, cum morbus crementum ac-
 cepit; multo uento inflantur, fa-
 stidiosi sunt, in sumendo cibo uoraces
 atque



atque auidi. Vigilant enim, & uigilia famem suscitāt. Verum neque, ut ægri solent, emaciantur: sed magis peculiaris melancholicis corpulentia est: item pallore quodam suffunduntur. Si quod autem uiscerum phlegmone inuaserit, tunc appetentia nutritatione hebetatur. Oculi caui fiunt, non coniucentes: ob quos caruleæ atræque imagines sese obijciunt, si ad melancholiam affectus uergit: sed rubicundiora & punicea uisa sunt, si ad furorem inclināt. Plerisque etiam tanquam fulgurans ignis apparet, pauorque eos ueluti instantis fulminis occupat. Nonnullis uerò & rubent oculi, & sanguine suffusi sunt. In summo ægritudinis impetu uarijs secundum quietem uisis perturbantur, immoderateque uerem concupiscunt: effrenatus est ad libidinem impetus, ut ne in propatulo quidem uerecundia sit aut cunctatio complexus, ad mutua & familiaria colloquia pigri sunt, commonefacti & increpiti ad iram excitantur, atque furore penitus insaniant. Exinde alius alio modo furit, quidam effrenatè cursu rapiuntur, ignarique eodem reuertuntur: alij longo interuallo se ad suos recipiunt. Item nonnulli uociferantur, latrocinium, aut uim illatam querentes. Alij ab hominum conspectu in solitudines fugiunt: secumque tantummodo uersantur. Cum uerò jam inclinatus est morbus, stupidi, quieti, mæstique sunt: in notitiam enim morbi uenientes, sua calamitate miseriaque tristantur.

ALIA FVRO R I S species.

Alia reperitur furoris species, qua laborantes propria membra dilacerant, pia cogitatione Dijs suis tanquam id postulantibus gratificantes. Id furoris genus à persuasione quadam duntaxat proficiscitur: in cæteris hi temperantes modestique sunt. Excitantur autem tibiæ cantu, alioque animi oblectamento, aut temulentia, aut præsentium hortatu.

ἐν τῇ ἐδωδῇ. ἀγρυπνέσαι γδ. ἀγρυπνίῃ ὁ βόρον. ἀτὰρ ἐξ ἰγχοὶ ὡς νοσέοντες. μελαγχολῶτων μάλλον εὐσαρκίῃ καὶ ὑπώχρῳ. ἢ τῷ σπλάγχων ἐν φλεγμασίῃ ἢ γεγονός, τῷ ὄρεξιν ἢ τὴν ἀρεσκίαν ἀμβλύνη. ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, ἔσκαρδαμύτθινες. πρὸ τῷ ὀφθαλμῶν ἰνδάλματα κυάνεα, ἢ μέλαινα, οἷσιν ἐς μελαγχολίαν ἢ τροπῇ. ἐρυθρότερα ὅς μαίνην, καὶ φοινίκια φαντάσματα, πολλοῖσι μὲν ὡς ἀπασράπιονος πυρὸς, καὶ * τῶρος αὐτέρας ὡς ἀπὸ σκηπῆ λαμβάνει. μετέξετέροισι ὅ καὶ ἐνέρυθροι καὶ ὑφοιμοὶ ὀφθαλμοὶ. Ἰπὶ κορυφῆς ὅ τῶ κακῶ ὄνειρώπησι. ἀφροδισίων ὅ ἀχρεῶ Ἰπθυμῆ, ἀτὰρ ἐδὲ ἐς τὸ ἀμφαδόν * αἰδῶς (ἢ) ὄκνος ὀμιλίας. νεθεσίῃ ὅ καὶ Ἰππλήξει ἐς ὄργην ἐκκριπῶ ἐνίτες, ἐς τὸ πᾶν ἐμαίνον. τῶν τευθεν ἄλλος ἄλλη μαίνε. οἱ μὲν θέεσι ἀχέτως, ἔτε ὅπως εἰδότες ἐς ταυλά παλιθρομέεσι. οἱ ὅ ἐς διηρόν τοῖσι πέλας ἀφικνεόν. ἄλλοι ὅ (αὐ) βοῶσιν ὀλοφρομέμοι ἀρπαγῆν, ἢ βίβω. οἱ δὲ φυγανθροπέεεσι ἐς ἐρημίαν, σφίσι αὐτέοισι ὀμιλέοντες. ἢν ὅ ἐπ' αἰέσιν ἢ κοίεν ἔκακῶ, νεθροῖ, ἢ συχοῖ, Ἰπύλοποι. ἐς Ἰπυασίην γδ τ' νέσσε ἀφικνεόμοι, ἀχθον) τῇ ξυμφορῇ.

ΜΑΝΙΗΣ ΕΙΔΟΣ

ἕτερον.

Τέμνονταί τινες τὰ μέλεα, θεοῖς ἰδοῖς ὡς ἀπαγέσει χαρίζομενοι δισεβεί φαντασίῃ. καὶ ἐς τῆς ἰσολήπιος ἢ μαίνῃ μῶνον, τὰ ὅ ἄλλα σωφρονέεσι. ἐγείρον) ὅ αὐτῶ καὶ θυμηδίῃ ἢ μέθῃ, τῷ παρεόντων ἀποτροπῇ.

F 2 ἐνθε



ἐνθεος ἦσε ἡ μανία. κῆν δ' ἀπομύωσι, εὐθυμοί, ἀκηδέες, ὡς τελεσθέντες τῷ θεῷ, ἀχρσοὶ δὲ καὶ ἰχνοὶ, καὶ ἐς μακρὸν ἀδενέες πόνοις τῶν τραυμάτων.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΩΣ.

Κεφάλ. ζ.

Ἀποπληξίη, παρὰ πηγήν, πάρεσις, παρὰ λυσις, ἀπὸ τῶ γενεῖ τωυτά. ἢ γὰρ κινήσις, ἢ ἀφῆς, ἢ ἀμφοῖν ἐστὶ ἐκλείψις, κοτὲ καὶ γνώμη, κοτὲ καὶ τῆς ἄλλης αἰσθήσεως. ἀλλ' ἀποπληξίη μὲν ὅλα τ' ἀφῆς, καὶ τ' αἰσθήσεώς τε καὶ γνώμης καὶ κινήσεώς ἐστὶ παρὰ λυσις. Ὡς γὰρ ἐν ἀποπληξίῃ λῦσαι, ἰσχυρὴν μὲν, ἀδύνατον. ἀδενῆ δὲ, ἐρηθίδιον. παρὰ πηγήν ὅ, πάρεσις μὲν ἀφῆς καὶ κινήσεως, ἀλλὰ μέρους, ἢ χειρὸς, ἢ σκέλεος. παρὰ λυσις ὅ, ὡς Ἰππικῶν, κινήσεως μόνον, ἐνεργείης τὲ πάρεσις. ἢν δὲ ἀφῆ ἐκλείπη μούνη κοτὲ. σπάνιον ὅ (τὸ) τοῖόνδε. ἀναμῆσις μᾶλλον, ἢ πάρεσις κικλήσκει. ἢν ὅ ἀπόπληκτον ὁ ἰπποκράτης εἶπη σέλος τὸ κατ' ἰξίν, ὡς νεκρῶδες, τὸ ἀχρεῖον καὶ τὸ ἀνελεθες θάλει φράσαι. ὅ γὰρ Ἰππικῶν ἐξυμπαντὶ ἀποπληξίη ἐστὶ ἰσχυρὴ, τὸ δὲ ἐν τῷ σκέλει παρὰ πηγήν φράζει. κύσιος δὲ ἔρων χέσιος ἢ ἀκρασίης, πάρεσις τὸ κυρεον. βλεφάρων δὲ καὶ μῆλων καὶ μυῶν τῶ ἐν γνάθοις καὶ γένυος ἐπιθάτερα παρὰ αἰσθητή, ἢ Ἰππικῶν ἀσσωθῆσας ἐρέφῃ, κυνικὸς ἀσσωθῆσας ἢ κλησίς. ἐκλυσιν ὅ γενάτων καὶ αἰσθήσεως πρὸς * καιρον νάρκην καὶ ἀψυξίην καὶ κατὰ πῶσιν, λυποθυμίην καὶ λέουθρον. παρὰ ἰξίν, ἀλλοῖο μὲν μέρη κατ' ἐν ὀφρύς μύτη, ἢ δάκτυλος, ἢ ἐπιμέζω, χεῖρ, σκέλ. ἀλλοῖο

κοτὲ μὲν

καὶ ἀναμῆσις

καὶ ἰππικῶν

καὶ ἀσσωθῆσας

καὶ ἰξίν

Deorum afflatu hic furor provenit: qui cum remittitur hilares sunt & curis uacui, tanquam Dijs initiati, praeterea decolores & macie affecti sunt, diuque ex uulnerum doloribus infirmum eorum corpus est.

DE NERVORVM resolutione.

Caput VII.

Apoplexia, paraplegia, paresis, paralysis, omnia genere cadem sunt. Aut enim motionis, aut tactus, aut utriusque defectus est: interdum & mentis, interdum & reliquorum sensuum. Sed apoplexia totius quidem corporis & sensus, & mentis, & motionis resolutio est. Proinde apoplexiam fortem soluere nulla facultas potest: debilem uero tollere non facile est. Paraplegia est tactus motusque remissio, sed in membro uno, ut puta manus crureue. Paralysis autem motus tantum fere est actionisque defectio. Quod si nonnunquam solus tactus deficiat (rarò autem id euenit) potius Anæsthesia, id est, sensus abolitio, quam paresis, id est, defectio nominatur. At si Hippocrates apoplexion; id est, attonitum crus secundum rectum dicat: illud tanquam mortuo simile, inutile, & insanabile uult significare. Quod enim in toto corpore, uehementis est apoplexia, illud in crure paraplegiam uocat. Urinæ autem inuesica aut suppressio, aut retinendi impotentia, Paresis proprie est. Palpebrarum uero & malarum, musculorumque in maxillis, & genæ in alterutram partem ductio, si per conuulsionem torqueantur; Canina conuulsio nominatur. Genuum resolutionem, sensusque per aliquantum temporis stuporem, & exanimationem, & casum Lipothymiam, id est, animæ deliquium uocamus. Verum nonnunquam membra singulatim resoluuntur: supercilium, exempli gratia solū, aut digitus, aut majora etiam, ut manus crurū: nonnunquam simul



simul plura : & alias dextra tantum, alias sinistra, aut unum post aliud omnia resolvuntur exquisite, aut debiliter. Neque tantum quæ distantia sunt, & quæ eodem censentur nomine, conjugataque sunt, ut oculi, manus, crura : verum etiam conjuncta cognataque, ut nares usque ad medium, & lingua usque ad fines : qui in ipsa media positi sunt, una tonsilla & illhmus, ipsaque gula dimidia resolvitur. Ego sanè stomachum etiam, & intestina, & uesticam, oblongumque intestinum usque ad principium, id est, anum idem vitium pati existimo. Sed interiora membra resoluta latent, obscuraque sunt. Imperfectæ uerò sunt ac dimidiatæ eorum functiones. Proinde mihi & membra dimidia pati videntur in duas partes à morbo diducta. Hæc res nimirum documento est, quo dextræ partis facultas & natura à sinistra partis natura & facultate differat. Quippe *asidens* causa æqualis est, & utrique communes morbi occasiones : siue frigiditas sit, siue cruditas. Sed utraque haud æquè pati idonea est. Natura uerò æquè ualens est, ubi subiecta sunt æquè ualentia : idem autem inæqualibus inesse nullo modo potest. Igitur si infra caput aliquod principium affectum sit, qualis medullæ dorsi membrana est, quæ nominis ejusdem sunt & contigua, dextra in dextris, & in sinistris leua resolvuntur. Verum si caput primò in dextra patiatur, sinistra; si in leua, dextra neruorum resolutione laborant. Hoc ideo euēnit, quòd neruorum initia permutata sunt. Neque enim dextri nerui in dexteras partes secundum rectum usque ad extremum progrediuntur : sed ab initio enati protinus ad oppositos transeunt, se inuicè in figurâ huius literæ, χ quam Græci chiasmion uocât, permutâtes. Vtq; semel dicâ, siue omne simul corpus resolutionem neruorum patiatur, siue aliqua membra, siue ab alterutra, siue ab utraq; parte; nerui

ἵ ὁμοῦ πλεῦνα, κὶ ποτε δεξιὰ μένον, ἢ δξισερα, ἢ ἰδίη, κὶ ἰδίη ζύμπαντα, ἐπ' ἀκρίβεις ἢ ἡσόν, & τὰ διεσῶτα μένον κὶ ὁμώνυμα, κὶ ὁμόζυγα, ὀφθαλμοί, χεῖρες, σκέλος. ἀλλὰ κὶ τὰ ξυμφυέα, εἰς, ἐς τε ἴσον, κὶ γλῶσσα μέσφι τῶ ὀρίων ἔμέσθ, κὶ παρίσμιον ἐν, & ἰσμός, & καλὰ ποσις ἐς ἡμισυ. δοκέω δὲ ἐγὼ κοίε, κὶ σόμαχον, & τὰ ἐνίερα, καὶ κύσιν, & τὸ πῶδ' ἀμπεκ ἐν τερσον ἀχει τ' δρχῆς τῶν τ' πεπονθένει. ἀλλὰ τὰ μὲν μέρεα τὰ ἐνίος ἐλκείων, νεύκ κρυπία κὶ ἀφανέα. ἢ μετελέες ἵ ἑ αἰ ἐνεργάαι. τῆ ἵ μοι δοκέει & ἡμιπαθεα ἐμρμαί τὰ μέρεα διχῆ ὑπὸ τ' νεσσε τετμημῆα. τὸ δὲ μῆ τὸ πσηγμα, διδαγμα διαφορῆς δυνάμιός τε & κρίσιος πρὸς δξισερα δεξιοίς. ἴση μῆ γδ κὶ ἡ παρσιζασα αἰτή. ζυναὶ ἵ ἀμφοῖν ἑ πάθεος αἰ προσφάσις, καὶ τε ψύξις, ἢν τε ἀπεψή, ἀλλὰ ἀμφοπαθεῖν, ἐκίσα αἰ. ἴσορρόπος ἵ ἡ φύσις, ὡς ἐν ἴσορρόπω. τῶν ὄν ἵ ἐν αἰσίσις, ἀδύνατον. ἢν μῆ οὐ τ' κεφαλῆς κάτω πάθη τις δρχῆ, ὀκοῖόντι τῆ νοπαίε μυελῆ ἢ μιλίγξ, τὰ ὁμώνυμα καὶ ζυναφέα * πῶδ' ἀλύει, δεξιὰ ἐπὶ δεξιοίσι, κὶ ἐπ' δξισεροῖσι λαία. καὶ δὲ κατὰ δρχῆ κεφαλῆ, ἐπὶ μῆ τῶσις δεξιοίσι, τὰ λαία πῶδ' ἀλύεται, δεξιὰ ἵ ἐπ' δξισεροῖσι. αἰτή δὲ τῶ δρχέων τῶ νεύρων ἢ ἐπαλλαγή. & γδ καὶ ἴξιν τὰ δεξιὰ ἐπὶ δεξιὰ ὀδοιπορέει, μέσφι * περα τῶ τε, ἀλλ' ἐμφυέα τῆ δρχῆ, ἐκασα διθύς ἐπ' ἐκείνα φοιτῆ, ἀλλήλοισι ἐπαλλαξάμῆα εἰς * χιασμόν γήματος. ἀπρόον ἵ εἰρηδξ εἰτε ζύμπαντα ὁμοῦ, εἰτε μέρεα παρσίεται, ἢ ζυναμφοίερων. νεύρα ἵ ἄλλοτε μῆ τὰ

τ' ὁμοῦ.

κὶ ἀκρίβεις.

7

* καλίστοι.

* παρὰ τῶν δε.

* χιασμόν γήματος * ἢ.



Δὲ κεφαλῆς πάχει. τὰ δὲ μέρη ἐς
 ἀνααιδῆσι μὲν τρέπονται, ὡς ἐπὶ οὐ
 πείν, ἔκαστα ῥηθίως ἐς ἀκίνησι μ
 ἔξωυτέων ῥέπει τὰ δὲ κῆν μέρη τῶσι
 κινδύμοισι συμπαθήση, πάχει καὶ
 τὰ δὲ μικρὴν ἀκίνησι μ. ἴχει γὰρ καὶ
 τῶ κίνησι μ ἔξωυτέων, εἰ καὶ ἴππῆσιν
 φύσει. ἄλλοτε ὅ τὰ δὲ μὲν ἐς μύ-
 ας* περαινόμενα, τὸ δὲ τὸ* κύρος
 τῆς κινήσι μ ἴχει, καὶ τῶσι δὲ τῆς κε-
 φαλῆς περιδιδόσι. καὶ γὰρ αὐτὰ
 * ἀπὸ ἐκείνων τὸ πλείστον τὴν κινήσι μ
 ἴχει. ἴχει δὲ καὶ ἔξωυτέων καὶ ἑ-
 λάθον. τὰ δὲ μέρη ἀκίνησι μ πά-
 χει μᾶλλον. ἀσάνιον δὲ εἰ καὶ τὸ ἔξω-
 υυτέων εἰς ἀνααιδῆσι μ τρέπονται,
 δοκεῖ καὶ μὴ εἰς τὸ πᾶμπαν. ἡ δὲ
 ξυνηθεσμός τις νύκτων λυθῆ τῶ ἔξ
 ὄτῶν πεφυκοτῶν πνός, καὶ* κραινον-
 τῶν ἐς ὄσέα, ἢ ῥα γένος, ἀκρατέα τὰ
 μέρεα καὶ ἴππυρομῆρα, ἐκ ἀνααιδῆ-
 τῶ γινεῖ. εἰ δὲ αὖτε ὡς ἀπληκτικὰ
 τὰ δὲ, ἄλλοτε μὲν ἐς ἐκτασιν λέλυ-
 τα μέρεα, ἔδὲ παλινδρομεῖ εἰς
 κῆμῶν, εὔτε μακρὰ καὶ ὡς φαίνε-
 ται. ἄλλοτε δὲ κοίλα γινεῖ, ἔδὲ ἐς
 μηκῶ δὲ τῶν εἰνεῖ. εἰ δὲ ἐκτασῶσι
 εἰς, ὅπως ἐξυλαϊκανα καὶ ἔξωυτῶν
 μέρεα βραχυτέρα ἔξωυτέων γινεῖ.
 τὰ δὲ πάχει ἀμφὸς τὰ εἰδεα καὶ ἡ σὺ
 τῶσι ὀφθαλμοῖσι παρθέσι μ. καὶ γὰρ
 ἐκχέεται πολλὸν ἐς μέγεθῶ, εὔτε
 πλατυκορίων ὀνομαζόμενα. αὐτὰς
 * ἡ δὲ ξυναγεται εἰς μικρὸν ἢ κοίτην,
 εὔτε φθισὶν ἡ δὲ μυδρίσι μ ἐγὼ
 κικλήσκω. ἀλλὰ καὶ κύσις παρῆεται,
 ἴππῶσι ἰδιοῖσι ἐργοῖσι. ἡ γὰρ εἰς ἐκτα-
 σιν λυεῖται, ἢ ἀκρατῆ τὰ οὐρα ἐκχέει,
 ἢ ξυνηλεεῖται ἐς ἑαυτὴν, εὔτε ὄταν

de capite fluentes alia ratione patitur.
 Nam sensu quidem, ut paucis di-
 cam, hi priuantur, non admodum au-
 tem facile ex se motum amittunt.
 Quod si per communionem cum his
 qui mouentur, aliquid uitij contraxer-
 rint; paulū & ipsi motus perdidērunt.
 Nam & per se ipsi motum tamen si mi-
 norem naturaliter possident. Nerui
 enim à musculis ad musculos transe-
 untes motionis principatum obti-
 nent, & his, qui à capite manant, im-
 pertiunt. Nerui enim capitis ab illis
 plurimum motus participant: tamen
 ex se quoque, licet minorem, uim mo-
 uendi habent. Atque hi nimirum in
 motu noxam magis patiuntur. Raro
 autem usu uenit, ut per se iacturam
 sensus faciant: neque tunc ex toto
 eam facere uidentur. At si qua copula
 neruorum ab ossē quopiam enato-
 rum, & ad ossa pertinentium, soluta
 aut rupta sit; tum membra proprio si-
 tu non continentur, luxantur, locoq;
 dimouentur: non tamen sensu pri-
 uantur. Hæ sunt autem paraplegiæ
 species. Quandoque enim membra
 resoluta in longum porriguntur: neq;
 quando extrema longissima apparent,
 iterum possunt recuruari. Nonnun-
 quam in orbem flexuuntur, neque in
 longum extenduntur: si quis autem
 ea, ceu ligna adaptans & pollens, uio-
 lenter protrahere nititur, breuiora ea
 se ipsis inueniet. Vtrunque id uitium
 & in oculis pupilla sustinet. Aut enim
 in amplitudinem magnam diffundit-
 tur; idque Platycorien, id est, pupil-
 læ amplificationem appellamus: aut
 hæc eadem in angustum contrahitur;
 idque Phthisis, aut etiam Mydriasis à
 nobis dicitur. Vesica etiam in suis obe-
 undis muneribus deprauatur, & Parc-
 sim quam uocant, patitur. Aut enim
 per extentionem resoluitur, cum reti-
 nendi impotens lotium effundit:
 aut in se ipsam conuoluitur, cum
 urinæ

ἀπὸ κεφαλῆς

καὶ γὰρ

κραινοντων

εἰδ.



urinæ plena reddere nihil potest. Morbi huius, parsis uidelicet, causæ prægredientes sex numerantur; uulnus, percussio, refrigeratio, cruditas, uenus, uinolentia. Cæterum & animi immodicæ perturbationes, ut repente incussi pauores, timores, animi consternatio, & maror: præterea & in pueris terrores: interdum inopinatum atq; ingens gaudium: item risus usque ad mortem implacabilis neruos resolueret consueuerunt. Hæc utique morbi prima initia sunt: sed ultima atque potissima causa est ingenitæ caliditatis refrigeratio, quando ab humiditate aut siccitate injuriam patitur. Ab hac uerò magis, quàm ab illa sanatu difficilis læsio est: nec non & à uulnere, neruique intercisione malum insanabile prouenit. Quantum ad ætates attinet, senes & ipsi uix curationem recipiunt: pueri facile ad sanitatem redeunt. Inter anni tempora hyems hanc ægritudinem gignit præcipue, secundo uer, tertio autumnus, æstas omnium minimè. Habitus corporis pingues natura, humidus, desides, belluini, hoc uitio facile corripuntur. Affectus hi iam perfecti talibus signis deprehenduntur, immobilitate, sensu sopito, qui neque calidum, neque frigidum, neque uellicantes aut scälpen-tes, aut aliter contingentes percipiunt. Rarò euenit, ut istis extremitates doleant: uerum sanitati recuperandæ indolentia non leuiter prodest. Porro morbus hic repente inuadere solet. Nonnunquam tamen etiam prælonga habet initia, grauitatem, motum difficilem, torporem, frigoris sensum, aliàs caloris excessum, somnos breues, cogitationes, siue apparitiones uehementiores, atque tunc subito resoluti sunt. Nèpe in Canino uocato spafmo, id est, neruorum conuulsione, omnes faciei partes conuelli, non magnopere usitatum est. Sed ad dextras partes leuæ, ad leuas dextræ feruntur: quando uuccæ atque os huc aut illuc, tanquàm ex sede propria discedente maxilla longius detorquentur. Lenium

πληθὴ οὐρου ἐδίησιν. αἰτίαι δὲ πα-
 ρεσιος μὲν, ἐξ ἀρχοῦ τῶν πρῶτων,
 πληγῆ, ψύξι, ἀπεψίν, λαγνείη, οἰ-
 νοφλυγίη. ἀτὰρ καὶ * ψυχῆς ἀκρα-
 τία πάθει, ἐκπλήξεις, φοβοί, δυσ-
 θυμίας. ἀτὰρ καὶ παιδοίσι δειμάτα.
 παρέλυσέκοτε καὶ χάρμα ἀδόκη-
 τον καὶ μέγα, καὶ γέλωσ ἀσθεσοσ μέχρι
 θανάτου, ἀλλὰ ἰαδὲ μὲν, δεχῆ πρῶ-
 τη, ὑσάτη δὲ καὶ καιρῆ ψυξίς ἐμφύτη
 θερμῶ. Ἰπὶ ὑγρότητι, ἢ ξηρότητι πά-
 χει ἡδὲ καὶ δυσάλθης τῆς ἐτέρης πά-
 χει μάλλον. ἀτὰρ καὶ Ἰπὶ τρώματι,
 καὶ διακοπῆ νεύρου, * ἀνελθῆς, ἡλικίη,
 γέροντες, καὶ οἷοιε δυσάλθεις. παιδί-
 οῖσι δὲ ἐνανάκλητοι. ὠρη χαμῶν, ἔαρ
 δευτέρου, ἔπειτα μετόπωρον, θερος
 ἡκίστα. ἐξίς, οἱ παχέες κατὰ φύσιν,
 ὑγροί, θεργοί, ζωώδεις. τελεωθέντα
 μὲν οὖν τὰ πάθει, ἐκδηλα ἀκινή-
 σι, καὶ ἀναμῶσι, θερμῶτε καὶ ψυχρῶ,
 ἀτὰρ καὶ πλμῶν καὶ κνησμῶν, καὶ ψαυ-
 οίων, σπάνιον εὐτε τοῖσι τὰ πέρατα
 ἀλγείη, ἀλλὰ ἐς ἀνάκλησιν ἐκακί-
 ων ἡδύτων. γίγνεται μὲν οὖν Ἰξά-
 πινη. ἰω δὲ κοτε καὶ δεχῆς ἰχνη Ἰπὶ
 μήκεας, βαρῆς, δυσκινήσῃ, νάρκη,
 ψύξι, ὁ μῶσις, ἀλλοτε θάλπεος
 ὑπερβολῆς, ὑπνοί σμικροί, φαντα-
 σία μέζονες, εὐτε ἀδρόν παρελθῆ-
 σαι. Ἰπὶ δὲ κωνικῶ σπασμῶ ἀπαν-
 τα μὲν τὰ τοῦ προσώπου μέρεα
 σπασθῆς ἐκάρτα ξύνηθεσ, Ἰπὶ δὲ ξιά
 ἢ τὰ δεξιερῶ, καὶ ἐς δεξιερῶ τὰ δε-
 ξιά φοιτῆ, εὐτε καὶ τὸ γένυος ἐνθα ἡέν-
 θα Ἰπὶ πολλὸν ἢ πῶσαγωγῆ, ὅπως
 Ἰξῆ εὐρησ κινεμῆς τὸ γνάθει. καὶ γὰρ
 τοῖσι

ἀναλθῆς



τοῖσι καὶ ἐξέβη τὸ ἄεθρον, εὐτε μέγα
 χαρότων ἐπὶ τὸ ἕτερον ἢ γένος πα-
 ρήχθη. ἰλωπεξ ὀφθαλμοῦ τῆ σιναρῆ
 * μήλα, ξὺν τῇ ὑποκοιλίᾳ παλμός.
 * πάλμῳ ὅ κ' ἰὸ ἀνώ βλέφαρον, ἄλ-
 λοτε μὲν ξὺν τῷ ὀφθαλμῷ, ἄλλοτε
 ὁμόνον. συνίεινε ὅ κ' χεῖλα ἰδίῃ ἐκά-
 τερον, ἄλλοτε ὁ ἄμφω συμπεσόντα,
 παφλάζει. ἐσι δ' οἷς μέμυκε κάρτα,
 ἀθρόον δ' ἴσα ὅ κ' τὸν ξυνήθεα πυσ-
 μὸν ψοφέει. σπᾶται κ' γλῶσσα. καὶ
 γ' ἡδε μὲν ἐσι κ' νεῦρα. εὐτε πρὸς τὸν
 ἐρανὸν ἐς πλάτος ὅλη ἡ ξύμφυσις ἀ-
 θρόον ἀφήλλατο, κ' κλόνε παταγον
 ἐποίησε. σπᾶται δὲ κ' κίων, κ' εἰ μὲν
 τὸ σῶμα συνάγει τὰνδοθεν, ἀδόκητος
 ὁ παταγος. * κ' ὅ διασήση τὸ σῶμα,
 * ὄψα ἰνὴν κιονίδα, ἄλλοτε μὲν πρὸς-
 φυομένη ἐς πλάτος ἰὸ ἐρανῷ, ἄλλο-
 τε δὲ λατοπαλλομένη ἐπὶ τῷ κέως σω-
 λῶι ὁμοίως, εὐτε κ' ἡδε παταγῆ.
 ἀπάτη δὲ τοῖ ξύνεσι τοῖσι κυνικοῖσι
 σπασμοῖσι. ἀρκέει γ' τοῖσι θεωμῆσι-
 σι τὰ ἀπάθεα, κ' νῆσον ἴχεν. τῇ γ' δὲ
 αἰετῶσι κ' τῇ χροῖῃ, ἐ τῷ ὀφθαλ-
 μῷ μέζονι. ὑγέα τὰ σιναρὰ φαίνε ὅ κ'
 ἐλέγχε ὅ κ' ἐν γέλωτι κ' λαλίῃ ἐ
 κατὰ μύσι. τὰ μὲν γε σιναρὰ, σπᾶται
 πάντα πατάγω, χαίλος ἀμαδῆς, ἀ-
 κινήτον κ' λαλή, βλέφαρον ἐκ ἐπι-
 τροχον, ὀφθαλμός ἀτενής, ἀναίδη-
 τος ἡ ἀφή. τὰ ὅ ὑγέα λαλεῖ, κατὰ
 μύει, ἀφάνεται, γελᾷ.

* ἰππεον.
 * μύλα.
 * σπυλίωτον.

* σι.
* ὄψα ἰνὴν κιονίδα.

* ἡδαι.

* παταγω.

* οἷα.

quibusdam nonnunquam articulus
 luxatus est, cum ualde hiantibus ma-
 xilla ad inferiora delapsa fuit. In laesa
 mala oculi inuersio & strabositas (ut
 ita dicam) fit: in palpebra inferiore
 palpitatio. Palpitat & superior: alias
 quidem cum oculo, alias uero sola.
 Contenduntur & labia seorsum alter-
 utrum: nonnunquam uero & ambo
 collapsa balbutiunt. Quibusdam &
 exacte occluduntur, postea repente ac
 late dehiscunt, & solitum sputum cum
 strepitu eijciunt, conuellitur & lingua,
 siquidem & ipsa musculus est & nerui:
 quando ad palatum secundum latitu-
 dinem tota cohærens subito sese re-
 mouit, & concussionis sonum reddidit.
 Conuellitur & columella: ac si os, quæ
 interius sunt, in unum cogat, inopi-
 natus sonus redditur: si uero dehiscat,
 columellam intueberis nonnunquam
 palato secundum latitudinem adhæ-
 rentem, nonnunquam uiolentia qua-
 dam in longum productam, ac descen-
 dentem, fistulæ persimilem: quando-
 quidem & ipsa sonum edit. Porro can-
 inæ conuulsiones decipiunt, quippe
 integræ ac sanæ partes agrotare spe-
 ctantibus uidentur. Nam in omnem
 partem tentione, colore, oculi ampli-
 tudine, sanæ partes læsionem pati exi-
 stimantur. Deprehenduntur uero &
 ridendo, & loquendo, & conuiuendo.
 Siquidem læsæ partes omnes cum uio-
 lentia & strepitu quodam trahuntur:
 labium risu caret: inter loquendum
 non mouetur: palpebra non uolubi-
 lis, oculus intentus ac rigens est: sensus,
 tangendi nihil percipit. At sana mem-
 bra loquuntur, conuigent, sentiunt, ri-
 dent.

ΠΕΡΙ ΦΘΙΣΙΟΣ.
Κεφάλ. η.

Ην * ἐπὶ τῷ ἄσπασίῳ ἐν τῷ
 πινόμενι γένῃ, ἢ ἐκ βηχὸς χροῖνης,

DE PHTHISI.
Caput VIII.

Si ab externa (interna) cau-
 sa abscessu in pulmonibus fa-
 cto, aut à longinqua tussi
 aut



aut à sanguinis rejectione & puris ex-
tulliant, Pye & phtusis nominatur.
Si pectus autem, costæua suppurauerit,
materiaque per pulmones traduca-
tur, id genus morbi empye, id est, pu-
rulentia vocatur. Quod si & ab his pul-
mo exulceretur à præterlapso pure
corrosus, hoc vitium non ulterius Em-
pyema, id est, purulentia, sed Phthoëm,
id est, corruptionem appellato. Simul
autem adest & ignis assiduus, qui nun-
quam intermittere uideatur, interdum
latens sudore atque corporis frigore,
Hæc enim propria Phthoëm sequun-
tur, quod uidelicet caliditas excitatur,
& in noctem emicat, interdum rursus
in uisceribus delitescit. Patet autem
istorum *fastidium*, & imbecillitas, &
colliquatio. Nam si per diem corpus
ignem euaderet, cur non fieret tunc
homo carnosior & robustior, & mor-
bi tolerantior? Vt enim recessit, gra-
uia magis intenduntur: arteriarum
motiones parvæ & imbecillæ fiunt:
uigilant, color languet; & alia omnia
patiuntur, quotquot febricitantes com-
mitari solent. At species humorum
prope infinitæ sunt, liuidorum, atro-
rum, purorum ac syncerorum, aut
pallido alboque, aut albo & uiridi
mixtorum, latorum, rotundorum,
durorum, glutinosorum, aut rarorum
diffluentium, aut odore carentium,
aut fixè olentium. Omnes autem
hæ puris formæ ac species sunt. Qui-
cunque uerò aut igne, aut aqua hu-
miditates explorant ac notant; hi
haud ita multum phthoëm mihi di-
gnoscere uidentur. Nanque uisio
quolibet alio sensu certior est, non
modo his, quæ reijciuntur, intuendis,
sed etiam ægrotantis specie conside-
randa. Si quis enim uel plebejus ho-
minem uiderit pallentem, imbecil-
lum, tussientem, macie confectum,
hunc uera Phthoëm laborare pronun-
ciat. Quin etiam quibuscunque
quidem ulceratus pulmo non fue-
rit, nihilominus tamen diutur-
nis febribus consumti sunt, sæ-
piusque duriter, & absque affectu

ἢ ἀναγωγῆς αἵματος, καὶ ἀναθήσει
 * πύον, πύη, καὶ φθίσις κικλήσκει, λέω * πύον.
 ἢ θώρηξ, ἢ πλευρὸν ἐμπύηση, ἐπανά-
 γη) ἢ διὰ τῆς πνεύμονος * ἐμπύησιν * ἐμπύησιν οἶδε.
 ἴκνομα. ἢ ἐπὶ τοῖσι καὶ ὁ πνεύμων ἐλ-
 κος ἴσχη, ἀναβρωθεὶς ὑπὸ τῆς διενεχ-
 θέντος πύε, τῆνομα ἐκέπη * ἐμπύη, * ἐμπύη.
 ἀλλὰ φθόνη μετὰ λαμβανεί. ξύνεσι
 δε καὶ πύε ξύνεχες, ὡς μὴ δοκέειν, λή-
 γον μὲν ἔχοτε, λήθον δε δι' ἡμέρης ἰ-
 δρωπὴ καὶ ψύξι τῆς σκῆνεος. καὶ γὰρ καὶ τὰ
 * ἰδία φθόνης ἐσι, ἢ ἡ δέρμη ζωπυρῆ, * ἰδία φθόνης.
 καὶ ἐς νύκτα * ἐκλάμπη, ἡμέρηνη ἢ αὐ-
 θις ἐν τοῖσι σπλάγχχοισι φωλέει. * ἐκλάμπη.
 δῆλη ἢ ἡ δυσφορία, καὶ ἡ ἀδυναμία, καὶ
 αἰξυντήξεις. * ἢ γὰρ ἀπεδίδησκει τοῦ * αἰ.
 σκῆνεος δι' ἡμέρης τὸ πύε, πῶς ἐκ αὐ-
 ἔσαρκῆ τότε καὶ ἡδύνατο, καὶ δι' φόρω
 εἴχεν ὡς νθρωπος. εὔτε γὰρ ἀνάγῃ, ἢ πῆ
 μάλλον ἰαθεῖν ἀ* αὐξέει. σφυγμοὶ
 μικροὶ καὶ ἀμυδροὶ, ἀγρυπνίη, ἀχρῶσια,
 καὶ ἄλλα πάντα ὁκόσα οἱ πυρεταῖνον-
 τες. ἰδέαι ἢ ὑγρῶν μυρία, πελιδνῶν,
 * μελάνων. κατακορέων, ἢ ὠχρῶν λεύ- * μελάνων.
 κων, ἢ λευκοχλωρέων. πλατῶν, σρογ
 γύλων. σκληρῶν, δυσλύτων. ἢ μανῶν
 λυομύων ἢ ἀνόσμων, ἢ κακοστέων.
 ἅπαντα ἢ ἰαθεῖν πύε ἐσσι ἰδέαι. ὁκόσοι
 γὰρ ἢ πυρὶ ἢ ὑδαπὶ ἀύγρατε κμαίρον-
 τ), ἐκάρτα μοι δοκέεσι φθόλω οἶδε
 γιγνώσκην. πισοτέρη γὰρ ἢ ὄψις ἀπά-
 σης ἄλλης ἀπὸ τῆς σίσις, ἐτῶ ἀναγομέ-
 νων μεῖνον, ἀλλὰ καὶ ἢ ἰδέας ἰδνοσέον-
 τος. ἢ γὰρ καὶ δημότις ἰδὴ τὸν ἄνθρωπον
 ὠχρῶν, ἀδρανῆ, ἀναθήσει τὰ ξυνητη-
 κότα, ἀτρεκέα μαλῆνε) φθόνη. ἀτρε
 ἢ δε ὁκόσοισι μὲν ἔλκος μὲν ἐκ ἐσι ἐν
 πνεύμονι, ξυνηθήκασι ἢ πυρετοῖσι χρο-
 νίοισι, πυκνά ἢ καὶ σκληρὰ καὶ ἀτελέα
 θήσασσι,



ἄσκασι, καὶ αἰμάγεσι ἐδέν, καὶ τοῦσδε
 φθισικὰς κικλήσκασι, ἐπὶ αὐτῶν ἀσθή-
 μως. Ζύνεσι ἢ ἔθωρηκος βάρους. πλεῖ-
 μων γὰρ ἀτόνος. ἀσπ, δυσφορή, ἀποσι-
 πη, ἐσπέρη, πέρψυξις, καὶ θέρη ἐστὶν ἰω-
 ἔω. ἰδρωδὲς ἀχρὶ θώρηκος τὸ θέρμησ
 δυσφορώτερος. ἔρηχὸς αἰαγωγὰ
 ποικίλαι, ὁκοίαις ἔλεξα. φωνὴ βραγ-
 χώδης. αὐχὴν ὑποκόλιος, ῥαδινός,
 ἐκ δὲ πρὸ ἀγωγός. ὁκοίοντι ζυντέτα-
 μῆμος. δάκτυλοι ἰχνοί. τὰ δὲ ἄρθρα,
 παχέα. ὁσέων μούνων ἰδέη. σμύχον-
 ἢ γὰρ καὶ σάρες. ὄνυχες γρυποὶ δακ-
 τύλων, αἰκοιλία ῥυσαί, καὶ πλαῖνες.
 ὑπὸ ἀσαρκίας γὰρ, ἐτέλλω πειλαινί-
 ην, ἐτετὲρ σρογγύλον ἰχρῶσι. διὰ τὸ δὲ
 καὶ ὄνυχες γρυποὶ. ἢ δὲ γὰρ ἡ αἰακωχὴ,
 καὶ ἡ ὑπόσασις αὐτέων, ἢ τις ἐν τῆσι κο-
 ρυφῆσι πεπλησμημένη. εἶνεκεν αὐτῆ
 ἐστὶ καὶ ὁ πόνος, ὡσπερ καὶ τὰ* σερέα. ρίς
 ὀξείη, ἰχνη, μήλα ὑπερίχοντα καὶ ἐρυ-
 θρὰ, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, σιλπνοὶ, γα-
 νόωντες, οἰδαλέοι, καὶ ὠχροὶ, ἢ πελιδι-
 νοὶ τὰ πρὸ σῶπα. γνάθων τὰ λεπτὰ
 ποιεῖ ὁδῆσι πρὸσιζάνην. μειθῶσι
 ἰκελοὶ, τὰ πάντα νεκρῶδες. ὡδὲ καὶ τὰ
 πάντα ἰχρῶσι, ἰχνοὶ, ἀσαρκοὶ, βραχιό-
 νων μῦες ἀδῆλοι, μαζῶν ἐπὶ ἰχνη, ἐκ-
 φανέες ἢ μέναι θηλαί. πλυρὰς οὐ
 κατὰ λέξαι μῆνον ἀσσημον, ἀλλὰ καὶ
 ὅπη κραινεσι, ἐσι δὲ ἀνρήθιον. ἐπὶ γὰρ
 πρὸς τὰς σπονδυλάς συναθρῶσιες
 διξυγκρυπτοὶ. δηλαὶ καὶ αἰεὶς τὸ σέρ-
 νον ἐπιβολαί. ἰάμεσα τῆν πλυρῶν,
 κοῖλα, ῥομβοειδέα, ὡς ἐστὶν τῆν ὁσέων
 περιαγωγὴν, ὑποχόνδρια λαγαρὰ
 ἀνεσασμῆρα, ἐπιγάσειον τῆν ῥά-
 χει πρὸσφυές καὶ λαγῶν ἄρ-
 θρα ἐναργῆ, * ἔξαρθρα, ἀσαρκῶ-

* σερέα.

* ἔξαρθρα.

ullo tuffientes nihil reiiciunt: hos quo-
 que Phthificos haud ita multum im-
 propriè nominarunt. Simul uerò & his
 adest pectoris grauitas: pulmo enim
 infirmus est: angor, intolerantia, cibi
 fastidium, uespertina extremorum fri-
 giditas, & matutina caliditas: sudor
 usque ad pectus caliditate molestior:
 pertussim uaria, qualia memorauim-
 us, extruduntur: uox rauescit: cer-
 uix non nihil tortuosa est, gracilis, non
 uersatilis, sed ueluti rigens atq; inten-
 ta: digiti tenues, sed articuli crassi sunt:
 ossium duntaxat species remansit. Si-
 quidem & carnes extabescunt, ungues
 adunci fiunt: digitorum uentres rugo-
 si & lati. Nam præ macie neq; fasciam
 ambientem, neq; rotunditatem obti-
 nent, quamobrem & ungues adunci
 sunt. Ea est enim ipsorum requies &
 fulcimen, quæ ipsorum extremitates
 replet: quoniam & ipsi laborem susti-
 nent, ut pote qui solida membra sunt.
 Item nares ijsdem acuminatæ, graciles:
 malæ extantes & rubidæ: oculi caui,
 lucidi, micantes: tumida, pallida, seu
 liuida facies est. Buccæ graciles faci-
 unt ut dentibus propius admouean-
 tur: ridentibus assimilantur. In omni-
 bus denique cadaueris speciem refe-
 runt. Hunc in modum & cætera sese
 habent: tenues & carnibus priuati
 sunt. brachiorum musculi non appa-
 rent: mammarum neque uestigia ext-
 ant; solæ autem papillæ cernuntur,
 costas non solum dinumerare perspi-
 cuè licet, uerum etiam ubi desinant,
 intueri facilè est. Neque enim cum
 uertebri factæ articulationes occul-
 tantur. Patent etiam in os pectorale
 costarum insertiones: quarum inter-
 fitia inania & caua sunt, Rhombi fi-
 guram secundum ossium circumdu-
 ctum ostendentia. Præcordia uacua
 ad superiora conuulsa sunt, abdomen
 & ilia spinæ dorsi cohaerescunt,
 artus



artus conspicui, prominentes, & ma-
 eri sunt: perinde se habent & tibia, &
 coxendix, & brachium. Spina enim
 vertebrae superextat. à priori parte ca-
 na, utrisque musculis per tabem distri-
 ptis, scoptula operta tota sese conspe-
 ctai offerunt, atque auium alas imi-
 tantur. Huiusmodi ægrotis si alius
 perturbetur, actum est: sin ad sanita-
 tem uergant, perniciosis contraria sig-
 nis adueniunt. Porro senes in hoc ma-
 lum frequenter incidunt, & minimè
 euadunt. Iuuenes autem usque ad
 florentem consistentemq; ætatem post
 sanguinis rejectionem in phthisim
 prolabantur: inde sanescant quidem,
 sed non facile. Pueri assidue tussi usq;
 ad phthoëm nonnunquam diuexati
 facile ad sanitatem redeunt. Habitus
 uerò in id uitium proni sunt graciles
 delicatq; scilicet tabulis similes, ala-
 rû instar habentes, prominèti gutture,
 albidi, rariore pectore. Regiones autè
 frigidae atque humidae huiusce af-
 fectus germanæ sunt.

DE PURULENTIS.
 Caput IX.

Quibus hominibus in cauis locis è
 regione pectoris, aut inferius sub
 transuerso septo puris abscessus fiunt,
 si per os id eijciunt, Empyri, hoc est, pu-
 rulentis uocitantur. Si per alium pus
 deijcitur, Apostematia Græco uoca-
 bulo dicuntur. Ac si in pectore qui-
 dem, cum est ulceratum, in pulmone
 uerò, cum phthoë laborat, aut in sub-
 linente costas membrana circa latus,
 aut os pectoris, quod Græci Sternon
 uocant, aut inferius, ubi pulmo cum
 spina dorsi committitur, cohærescitq;,
 aut si quo alio pectoris loco uitium sit:
 omnibus ad pus excernendum uia per
 pulmonem munita est. Sub intersepto
 uerò in uisceribus, jecore, liene, reni-
 bus per uescicam, in mulieribus etiam
 per uterum transitus datur. Nempe
 cuidam ego aliquando abscessum
 laxioris intestini dextra in par-
 te propè jecur dissecai: mul-
 tumque inde puris effusum est.

δεα, κῆ κνήμη ἰχθύν τε κῆ βράχιον.
 ὑπερῆ γὰρ ἢ ἀκανθα τῶ σπονδυ-
 λων ἢ πρὸθεν κοίλης. τῶ ἐκατέρων
 ἐκλεπκόντων μῶν ὠμοπλάτῃ ἐκφα-
 νῆες ὅλαι, ὅπως πτέρυγες ὀρνίθων. τε-
 τείοσι μὲν κοιλίῃ ἐκλαραχθῆ, ἀνέλπι-
 στος. ἢν ᾗ ἐς ὑγείην πρέπη, ἄ ἐναντία
 τοῖσι ὀλεθρίοισι ἐπιφοιτῆ. γηραιοὶ μὲν
 οὐκ ἔχουσιν παρὰ τὴν διὰ δὲ σπλάγ-
 χων ἢ κῆ ἀκμῆς ἀπὸ αἵ-
 ματος ἀναγωγῆς φθινώδεις γίγνον-
 ται, κῆ ὑγιάζον μὲν ἐρσιδίως δὲ παι-
 δια ξυνεχῶς τῆ * βηχί μέχρι * φθί-
 νης κοίτης ἐρσιδίως ὑγιάζον. ἔξῃς ᾗ, ῥαδι-
 νοὶ, σακιδώδεις, πτερυγώδεις, * ἔξ-
 χέβρογχοι, λυκοὶ, ἀραιότεροι τῶν
 θώρηκα. χῶρα ᾗ ψυχραὶ κῆ ὑγραὶ,
 ὀκόφαι τῶ εἶδει τῆ πάθεος ἀδελφοὶ.

ΠΕΡΙ ΕΜΠΥΡΙΚΩΝ.
 Κεφάλ. θ.

Οἱσι ἐν τῇσι κοιλίῃσι ἔσθαι θρόμβος
 κατ' ἕξιν ἔθώρηκος, ἢ ἄ κατὼ ὑπὸ τῷ
 διάφραγμα πύου ἀποσάσεις
 γίγνονται, μὲν μὲν ἀνάγωσι, ἐμ-
 πυροὶ (οἱ) δὲ καλέον. ἢν ᾗ τὸ πύον διε-
 ξίη κατὼ, ἀποσηματίαι κικλήσκον.
 κῆ ἐν μὲν θώρηκι, ἐν τοῖσι ἐλκεσι, ἢ τῇ ἐν
 πνεύμονι, ἢν ἐκδέχεται φθόν, ἢ ὑπε-
 ζωκόπι ἐν πλοσρῶ, ἢ ἐξενῶ, ἢ κατὼ πῆ
 πρὸς τῆ ξυμφύσι τῆ πνεύμονος κατὰ
 ῥάχιν, ἢ πῆ τῆ θώρηκος ἄλλη ξυμ-
 πάντων ᾗ ἐς ἀναγωγὴν ὁδὸς τῶ πύου
 πνεύμων. ὑπὸ ᾗ τὸ διάφραγμα ἐν τοῖ-
 σι σπλαγχνόισι, ἢ παλῖ, σπλωτῖ, νε-
 φροῖσι * κύσις. Ἐπὶ γυναικῶν ᾗ καὶ
 ὑς ἐξῆ. ἔταμον ᾗ κῆ ἐγὼ ἐν κώλῳ πῆ
 κοτὲ ἀποσάσιν (τα) Ἐπὶ διεξία πρὸς
 ἦπαρ κῆ πολλὸν τι ἐσσύθη ἔξω πύον.
 πολλὸν



πολλὸν ὃ καὶ διὰ νεφρῶν, καὶ κύστιος ἐς
 ἡμέρας πλευνας ἐρρύη καὶ ἀπειργένητο
 ὠνθρωπος. αἰτίαι ὃ ξυναὶ μὲν ἀπάν-
 των, πληγὴ, ἀπεψία, ψύξις, ἢ δὲ ὀ-
 κοῖα τοιάδε. τοῖσι δὲ ἐν θώρηκι, βήξ
 χρονίη, καὶ πλῆθεισι, καὶ ἀπειπιδυμο-
 νίη, καὶ βρεῦμα χρονίον. ἀτὰρ ἢ δὲ ὀξείας
 νοῦσαι ἐς ἐν πεντήκων * ἀπόσκηψις.
 τὸ ὃ ὑγρὸν, ἄλλοτε μὲν ἀεργόν, ἀ-
 δρανεῖς, * ἐγκέεταί τω ἄλλω. ἄλλοτε
 μὲν δριμύδα πῖως, καὶ σπεδόνας ἐμ-
 ποιέων μέσφι θανάτῳ. καὶ γὰρ καὶ ἰδέαι
 μυεῖαι, ὀκόσας αὐθις φράσω. θυ-
 μα ὃ ὀκῶς ὄξ ὑμῶς λεπιοῦ τε καὶ
 ἰχνοῦ βάδῳ ἐκ ἰχοντος ὄξ ὑπεζω-
 κότῳ, τοσοῦδε ῥέει πύον. πολλὸν γὰρ
 πολλοῖσι ξυνελέγη. αἰτία δὲ φλεγ-
 μασίη ἀπὸ πεισσίας αἱμάτος, ἐφ' ἣ
 παχύνη. ἐμὲν ἀτὰρ ἢ δὲ ἐκ πολ-
 λῆ αἱματῳ, πολλὸν γίγνη) ἐν μέ-
 σω πύον. κἢ μὲν εἰσω ῥέπη, αἰ πλῆ-
 ραὶ τὰ ὀσέα κατὰ χώραν τῶ σφῶν
 αὐτέων, φθίσιον ἐλεξα ἀεργάτε-
 τέραν ἐμυρῳα συμβεβῶσαν κατὰ
 φύσιν. καὶ δὲ ἐξω ῥέπη, διίσταται τὰ ὀ-
 σέα. ἐς γὰρ ἐν τῷ μέσων πλῆρων τ'
 ἀπασασι ὃ ἢ κορυφῆ ἐγείρε), εὔτε
 ἐνθα καὶ ἐνθα πλῆρωα παρωθένεται.
 σημεῖα ὃ τὰ μὲν ἀπάντων, ξυναί. τὰ
 ὃ ἐκάστου, ἴδια. βάρεθ ἢ πόνθ γέ,
 ξυνόη. πνεύμων γὰρ ἀπόνθ, πυρετοί
 ἀμυδροί, ὀίγεα ἀεργάτερον, ἰδρω-
 τες ἐπ' ἀλέσι, ἀργυρίη, οἰδήματα ἐν
 ἀκροῖσι ποσὶ καὶ χειρῶν δακτύ-
 λοισι, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καθεσάμε-
 να, καὶ ἐπαιρόμυρα. δυσφορίη, ἀπο-
 σιτή, ἰχνοῦτος ὄλου. καὶ ὃ καὶ μείθ
 ἰχνη μετὰ βολή, ἐξίσι φθινώθη. ἐ γὰρ

α ἀπόσκηψις.
 α ἀπόσκηψις.

Multum quoque per renes & vesicam
 ad plures dies emanavit. Vnde & san-
 nitatem homo adeptus est. Cause
 uero communes omnium hæ sunt,
 plaga, cruditas, frigus, & id genus alia.
 Porro & quibusdam in pectore diutur-
 na tussis incumbens, & lateris inflam-
 matio, & uomica pulmonis, & fluxio
 longinqua, nec non & acuti morbi in
 aliquod istorum decubitus, purulen-
 tiæ originem præbent. At humor aliàs
 iners imbecillusque alij inhæret, aliàs
 acris & mordax, & ad mortem usque
 putrefaciens. Nam & species infinitæ
 sunt, quas suo loco postea memorabi-
 mus. Sed magnum profectò miracu-
 lum est, quomodo id fiat, ut ab exili
 tenuique membrana nihil crassitudi-
 nis habente, membrana inquam co-
 stas interius obtegente, tanta copia
 puris effundatur. Multum enim col-
 ligi in multis deprehensum est. Huius
 rei causa est inflammatio ex sanguinis
 multitudine oriens, ob quam mem-
 brana crassescit: uerum ex multo san-
 guine multum in medio pus contrahi-
 tur. Id si ad interiora subeat, costarum
 ossa suam propriam sedem obtinent,
 sed phthisis altera species superius à
 nobis memorata secundum naturam
 eueniet: sin ad exteriora procurrat,
 ossa disiunguntur. In aliquod enim
 inter costas medium spatium ipsius
 abscessus acies exeritur: quando in
 hanc atque in illam partem costarum
 ossa pelluntur. Notarum autem quæ-
 dam omnium communes, quædam
 singulorum affectuum propria sunt:
 grauitas aut certè dolor, commune
 signum est. Pulmo enim dolorem non
 percipit, febres obscuræ, horrores ue-
 spertini, sudores in remissione, uigilia,
 tumores in extremis pedibus, manu-
 umque digitis subinde consistentes,
 atq; insurgentes: in quibus, cibi abomi-
 natio, totiusque corporis macies. Quod
 si & in longum mutatio producit, ha-
 bitus phthisicus redditur: neque enim
 ultra



ultra in officio natura perseverat: *concoctio enim antea familiaris abest, & bona corporis habitudo*: color, qualis belluæ, efficitur. Spiratio cunctis quidem mala, sed illis pejor, quibus ad superiorem ventrem morbus ascendit. Quin etiam tussis ab initio tantisper uexat, donec inflammatio, quæ urget, perseverat, quando & dolores, & horrores augentur: & caliditas, & uigilia, & spiritus difficultas adhuc magis incrementum. Venarum motus parui, torpentes, imbecilli fiunt: mens delirat, pedus distenditur. Verum enim uero si ad suppurationem inflammatio ueniat, omnia maxima fiunt: sed reiectio parua est cum maiore tussi, & ex uiolento abscessu. Imprimis pituita fertur bile infecta, ad nigritiem uergens, tanquam admixta fuligine, adhuc tamen cruenta ac pinguis pituita est. Quod si proximè rumpenda inflammatio est, quæ reiiciuntur speciem carnis habent, crassioraque sunt. At si iam rupta sit, strangulatus discrimen impendit, si multum subitanè unque pus emanauit: si pedetentim uero emittatur, exactè sanitas aduenit. Porò si ad inferiora pus transire uelit, partes quidem superiores, ubi erat abscessus, acutus dolor occupat: alius uero humida est, primum aquosa cum pituitosis deiciens, deinde cruenta quædam circumfluentia: rursumque carnosam, cum iam effractus abscessus est. Hæc pus sequitur aut per aluum, aut per urinæ uias elabens. Sed materiæ ad renes & uesicam transmutationes meliores omnibus sunt. At si pus infra supraue feratur, eius color uariis est, pallidus, aut albus, aut cinereus, aut fluidus, aut ater, pus item autolidum est, aut odore uacans: crassimum, aut mediocris corpulentia: aut laxæ æquale, aut asperum inæquale. Et frustra cartilaginearum similia in eo fluitantia rotunda, aut lata sunt, quæ facile ueluantur, aut tenacia. Utque in summa de pure dictum sit,

ἐπι φύσιν ἔργον ἔχεται. ἐ γὰρ πέψις οἰκείη παρὰ τὸν ἐκ εὐσαρκίης, χροίης ζωώδους. ἀναπνοὴ πᾶσι μὲν κακὴ, κακίων δὲ, οἷσι ἐς τὴν ἀνω κοιλίαν, ἀτὰρ καὶ ἐν ἑξῆσι πρῶτα, μέσφι αὖ ἢ φλεγμασίη, ἢ πύρεσι, εὔτε καὶ πόνοι μέζονες καὶ ρίγες, καὶ θέρμη, καὶ ἀγρυπνίη καὶ δυσπνοία ἐπι μᾶλλον σφυγμοὶ μικροὶ, νωδροὶ, ἀδρανέες, τὴν γνώμην παρὰ τὴν ἀληθειάν, διάτασις δὲ θώρηκτος. καὶ ἢ ἡδε εἰς γεννησιν ἤκη πύς, πάντα μέγιστα. ἀναγωγὴ δὲ σμικρὴ ἐπι βηχὶ μέζονι, καὶ ἐξ ἀποσάσιος βιαίης. τὰ πρῶτα φλέγμα τῆς χολοδαφῶν ἐπι τὸ μελαντέρρον, ὅπως ἐξ αἰθάλης. ἐπι δὲ διαίμων καὶ παχέων. καὶ ἢ καὶ ῥαγῆσε αἰμέλη, καὶ σαρκοειδέων βαθέων, καὶ καὶ ῥαγῆ, κινδυνὸς μὲν πύξιος, καὶ πολλόν, καὶ ἀρόρον ἐκχυθὴ πύον. καὶ δ' οὐδ' ἐκρέθη χέσθω, ἀτρεκέει. πύον καὶ κάτω περισταθῆ, τὰ μὲν αἰώμερα ἐνθά ἢ ἡπόσασις, ὅξυς πόνος. κοιλίη ὑγρὴ, τὰ πρῶτα ὑδατώδεια ξὺν φλεγματώδεσι. ἐπεὶ τὰ παρὰ τοῖς αἵματωδέων, καὶ αὐθὶς σαρκοειδέων, καὶ ἡδη ῥαγῆ. ἐπεταὶ δὲ τετέροις πύον, ἢ διὰ κοιλίης, ἢ οὐρών. ἀγαθαὶ δὲ πάντων μᾶλλον, αἰεὶ νεφροῦς καὶ κύστας μεταλήψεις. φέρεται δὲ ἢ ἡντὲ αἰώ, καὶ τὲ κάτω, χροίος πύς ποικίλον, ὠχρόν, ἢ λευκόν, ἢ τε φερίζον, ἢ πελιδνόν, ἢ μέλαν, καὶ κακῶδες ἢ αἰόσμον, καὶ παχύτατον. ἢ μέσως ἰσχόν, ἢ λεῖον ὀμαλόν, ἢ τρηχύ, ἢ αἰώμαλον, καὶ σαρκοειδέα τὰ * ἐμπλώοντα, στρογγύλα, ἢ πλατέα, ρηίδως ἰσοπλυνόμωρα, ἢ ἰξώδεια. ἀρόρον δὲ παρὰ πύς εἰρηδῆ,



ὀκόσα μὲν λευκά, πέποννα, ἄνοσμα,
 λεία, σρογγύλα, κὶ ἀναθήσεται
 * περιεσηκόσα. θάσσον, ἢ ὑποφέρε), * περιεσηκόσα.
 ὀκόσα δ' ἔξωχρα, χολώδεα, ἀνώμα-
 λα, μοχθηρὰ. πολλὸν δ' τρετέων κα-
 κίω, τὰ πελιδνά, κὶ μελανὰ. σπεδό-
 να γδ, (κὶ) ἀνεδιόμυρα σημαίνεσι τὰ
 ἔλκεα. * περιεσηκίονα δ' τρετέοισι κὶ τὴν
 * ξυνομαρτέοντα τῆ νύσσω.
 ἦν γδ ἐπὶ τῆ ἐκκρίσει εὐφόρως φέρεται,
 ἄπυρος γίγνε). εὐτε πέσσει, εὐχρως,
 εὐσίτος, ἦν ἀναθήσεται εὐμαρῶς, εὐ-
 σφυκτος, εὐτόνος γίγνε), ἀνώλεθρο
 ἄνοσέων. ἦν δ' Ἰππυρεταιίνη, κὶ παύσα
 ἐς κακὸν τρέπη), ἀνέλπιστος. * περιεση-
 κίονα δ' ἢ τὰ χρωρία, ἐνθα αἰ δπο-
 σάσεις. ὀκόσοισι γδ ἐν τῷ σέριω τὸ
 ἐμπύημα γίγνε), βραδέως ἀφίσα).
 * χονδρῶδη. ψιλὰ γδ κὶ ἄσάρκα κὶ * χονδρῶδεα
 τὰ μέρεα. τὰ δ' ἰσθμῶδες ἐπιθίως διέ-
 χεται φλεγμονῆς περιεσηκίονα. ἀνεκ-
 πύητα δ' ἰμίνε περὶ χρόνον. ψυχρόν
 γδ οἱ χόνδροι. ἀλλὰ τῷ δὲ αἰσινέες
 μὲν αἰ φλεγμοναί. τ' ἔξιθμῶδες κα-
 κὰ συντήξιος. * μικρόν γδ διαπίσει
 χρόνον σπλήν, κὶ ἥπαρ, κὶ πνεύμων, κὶ
 διάφραγμα, ὀξύτερον μὲν ἐς ἐμπύ-
 λω. Ἰππκίνδυνα δ' κὶ θανατώδεα.

quæcunque alba feruntur, concocta,
 inodora, leuia, rotunda, & celerius ex-
 tussuntur, aut per aluum deturban-
 tur, hæc tuta & salutaria sunt: quæ-
 cunque autem per pallida, biliosa, &
 inæqualia sunt, ea praua esse scito: sed
 multo his peiora, liuida & atra. Putre-
 dinem enim & exedentia ulcera signi-
 ficant. Ad hæc & habitum simul
 animaduertere conuenit, & quæ mor-
 bum comitantur: nam si excretio-
 nem bene tolerat, febre uacat, rectè
 concoquit, benè coloratus est, benè
 ad cibos se habet, si facilè extussit, si
 arteriarum motus bonus est, si uires
 firmæ, ægrotus perniciem euadit. At si
 febris superueniat, omnia que in deter-
 rius conuertantur, de salute despera-
 tum est. Præterea & loci abscessibus
 occupati simul noscendi sunt: qui-
 buscunque enim in ossè pectoris,
 quod Æternon uocant, empyema id est,
 purulentia fit; tarde abscedit. Nudæ
 enim & excarnes & cartilagineæ par-
 tes illæ sunt: eiusmodi uerò non fa-
 cilè phlegmones redundantiam susci-
 piunt, & absque suppuratione mul-
 tum temporis permanent. Siquidem
 res frigida cartilaginee sunt, sed earum
 phlegmonæ minimè nocent. Ipsius
 uerò habitus colliquationes prauæ
 sunt: breui enim tempore suppurant.
 Lienis, jecur & pulmo & interseptum
 celerius quidem pus ducunt, sed peri-
 culosa & mortifera sunt.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΕΡΜΟΝΙΣ abscessibus.

Κεφάλ. ι.

Εὐτε ὀκόσοισι περιεσηκίονα,
 ἦν φλέγμα εἴη, ἢ μὴ διαχέη), περι-
 γίγνον). οἱ δ' διαδιθήσονται τὸ κά-
 τ' ἐξυπάρθεθ, ἐμπυοί γίγνον). τὰ
 μὲν οὖν μελλέσσης ἢ τετελεσμένης

Caput X.

Quicunque pulmonia laborant, si
 pituita sit, nisi diffundatur, super-
 stites erunt. Hi uerò morbi primum
 impetum euadentes purulenti fiunt.
 Futuri quidem, aut jam perfecti ab-
 scessus indicia in capite de purulentis



exposuimus. At cum perfectus jam ab-
 scessus est, non ui ac laboribus ad eum
 rumpendum reiiciendumque, quem-
 admodum in alijs corporibus usu ue-
 nit, opus est: sed facile per superiora
 excernitur: cum magis in raritatibus,
 quam in corporis habitu dissentio
 fiat. Rarus enim ac foraminulentus
 pulmo est, spongiæ similis, humorem
 haud moleste ferens: qui aliam post
 aliam inanitatem eoufque, donec ad
 asperam arteriam deueniat, permu-
 tare solet. Circuitus autem humori
 faciles sunt, quandoquidem flexile
 atque lubricum pus est. Respiratio
 etiam sursum spiritum efflat. Sæpius
 autem mortem effugiunt, nisi aliquan-
 do quispiam subitanea ac multi hu-
 midi attractione stranguletur, quod
 arteria puris multitudine obstructa
 aërem non recipiat. Horum nonnulli
 progressu temporis moriuntur, quem-
 admodum phthifici aut purulenti ex-
 tingui solent. Sputa uerò candida
 sunt, spumantia, cum saliuæ permixta,
 aliàs cineracia aut subnigricantia. Et
 bronchia, id est, asperæ arteriæ circuli
 nonnunquam expuuntur ob ulceris
 uarietatem, si altè abscessus penetrat:
 quando & fragmenta uisceris expel-
 luntur. Rauescunt: breue spirant:
 grauem uocem edunt: ipsorum pe-
 ctora latefcunt, & latioribus humidi-
 tatis causa indigent, oculorum nigra
 partes fulgent, albæ uerò albissimæ
 fiunt, ac pingues: malæ rubent: uenæ
 in facie elatæ ac tumidæ sunt. Mirum
 est autem in his, quod tenor, quam pro
 corpulentia, major est, animi uerò
 alacritas & constantia tenore po-
 tentior.

DE ASTHMA TË, SI-
 ue Anheliti.

Caput XI.

SI à cursu, exercitationibus, & quo-
 libet negotio spiritus agrè redditur;

ἀποστάσιος σημεῖα ἐν τοῖσι * ἐμπύοισι
 ἔλεξα. ὡς ἡ τελευτῆς, & βίης καὶ πόνων
 ἐς ἀπορρηξίν καὶ ἀναγωγὴν χρέος, ὁ-
 πως περ ἐν τοῖσι σώμασι. ἀλλὰ γὰρ
 ῥηθιδίως ἀναφέρει, διατάσιος μάλ-
 λον τῷ * ἀραιωσιων γενεθλῆς, ἢ περ
 ἕξιος σωμάτων. μανὸς γὰρ καὶ πολυ-
 τήλιος ὁ πνεύμων, ἀπογγήϊκελθ, &
 χαλεπαίνων τῷ ὑγρῷ, ἀλλήν ἀπ-
 ἄλλης εὐρυχωρίῳ ἀμειβωντῆ μέσ-
 φι τῆς χείρας δεξιῆς ἤκειν. ἀείο-
 δοὶ γὰρ τῷ ὑγρῷ ῥηθιδίαι. εὐκαμπές γὰρ
 ἠδ' ὀλιθῆρον πύον. ἀταξ καὶ ἡ αἰα-
 πνοὴ αἰὼ τῷ πνεύμα φουση. ἀεὶ γί-
 νονται ἵνα πολλὰ εἰ μὴ κοτὲ πρὸ αἰα-
 πνιγῆ ἀθροῖν ἐλκυσί ἔξ ὑγρῶ, τῷ δεξιῆ-
 ῆς & δεχομῆς τὸν ἥερα πληθεὶ τῷ
 πύσ. θνήσκουσι δὲ μετεξέτεργι χρέον
 τὸν φθινώδεα καὶ τὸν ἐμπυϊκῶν πρὸ-
 πον τὰ γὰρ πύα λυκα, ἐπαφρα, * σι-
 ἀλω μεμιγμῆα. ἄλλοτε δ' αἰ τε-
 φροειδεα, ἢ ὑπομελανίζοντα. καὶ
 * ἐρογχιζον κοτὲ ἀνεπίσθη ἐπὶ ποι-
 κίλω ἐλκει, ἢ βάθος ἰαχῆ ἡ ἀπόστασις,
 εὐτε καὶ ἀπορρηγες * ἀναφέροντ) τῷ
 ἀπλάγχνα. βραγχώδεες, βραχύ-
 πνοοι, βαρῦφωνοι, ἵα σῆθεά σφιν δι-
 βρέα γίγνε, καὶ εὐρυτέρων τῷ ὑγρασίης
 δέον. ὁφθαλμῶν τὰ μέλανα, σιλ-
 πνά. ἵα γὰρ λυκα, λυκοβία, ἔπιονα.
 μῆλα ἐξοδθῆς, φλέβες ἐν τῷ πρῶτῳ
 πῶ κυρταί. θῶμα δὲ ἵππ) τετέων.
 τόνος μὲν γὰρ, εὐσάρκῆς μείζων. εὐ-
 ψυχῆ γὰρ τόνος θύνατωτέρη.

ΠΕΡΙ ΑΣΘΜΑΤΟΣ.

Κεφάλ. ια.

ΕΙ ἀπὸ δρόμου, καὶ γυμνασίων, καὶ
 παντὸς ἔργου * δύσπνοοὶ ἢ ἀναπνοῆς,



ἄσθμα καλεῖται κἢ ἡνέσθ^ο δὲ ὀρθό-
 πνοια κἢ ἡδὲ κικλήσκει ἄσθμα. ἐν γὰρ
 τοῖσι παροξυσμοῖσι, ἀσθμαίνουσι καὶ
 οἶδε. ὀρθόπνοια δὲ ἐκάλειον, ἕνεκεν
 ὀρθίῳ γήματι μῆνον ἀναπνεύουσι εὐ-
 φόρως, πνίξι γὰρ * κατὰ κλίσει. εἵνεκεν
 ἔτνε, τὸ ἐπὶ τῷ πνεύματι, ὀρθόπνοια
 τῆνομα. ὀρθίος γὰρ ἀνατέταται ἐς ἀ-
 ναπνοίαν κἢ ὑπὲρ κατὰ κλίσει ὡν-
 θρωπος, κίνδυνος πνιγῶναι. πάχαι δὲ
 πλεύμων. ἕνυπαθείει δὲ κἢ ἄξυνη-
 λῆτα ἐς ἀναπνοίαν, διάφραγμα,
 θώρηξ ἢ δὲ * καρδίη πάθη, ἕκαστε ἐς
 πολλὸν * διαρέσκει. τῆ δὲ γὰρ ἡ ἀνα-
 πνοῆς κἢ τὸ ζῶης δέχεται. αἰτή δὲ ψύξις
 κἢ ὑγρότης τῶ πνεύματος. ὕλη δὲ ὑγρὰ,
 παχέα, * κολλώδεια. εὐπαθείεις δὲ γυ-
 ναῖκες ἀνδρῶν μάλλον, ὅτι περὶ ὑ-
 γραῖτε, κἢ ψυχραῖ. οἱ δὲ παῖδες, τού-
 των ὡς ἐγγύθον ῥηίτερον. ἢ γὰρ φύσις
 ἐν αἰξίσει θερμῆναι δυνάτωται. ἀν-
 δρες δὲ (εἰ) κἢ μὴ ῥηίδιοι παθεῖν, ἀλλὰ
 θνήσκουσι θάσσον. ἀμβολῆ δὲ θανάτω,
 * ὅσοισι ἐν ἔργου πρῆξι, ἢ ἐν εἰρείοισι
 πλεύμων θάλαπτι κἢ * διαίθε, ὁκοί-
 οντι τοῖσι τὸ πλάνθ ἐργάτησιν, ἢ χαλ-
 κεύσι, ἢ σιδηρεύσι, ἢ κἢ λατρῶν πυρ-
 σευτήρι. μελλισμῶ δὲ σημήνια, βάρως
 τῶ θώρηκος, ὄκνος ἐς τὸ ξύνθητες ἔργον,
 ἀτὰρ ἡδὲ ἐς ἀπασαν πρῆξιν, δυσ-
 πνοια ἐν δρόμῳ, ἢ πρὸς ὁδὸν ὀρθίω.
 βραγχώδεις, κἢ βηχώδεις, φύσα ἐν
 τοῖσι ὑποχονδρίοισι, κἢ ἐρυγαὶ ὡς ἀ-
 λογοὶ ἀγρυπνίη, θερμασίη νύκτωρ
 σμικρῆ, ἀσαφής. ῥίς ὀξείη ἐς ἀναπνο-
 ἠν ἐπιμῆ. ἢ ἢ ἐπὶ μείζον τὸ κακὸν ἐρ-
 πη, μῆλα ἐρυθρα. ὀφθαλμοὶ ὡρο-
 πετέεις, ὡς ἐπὶ ἀγχόνῃ, * ῥωγμός, ἐν
 ἐρηγόςσιν. πολλὸν δὲ μέζων τὸ κακὸν

Asthma Græce, Anhelitus Latinè uocatur. Morbus quoque ille, quem Græci Orthopnoiam dicunt, & ipse Asthma nominatur. In accessionibus enim & ipsi anhelant. Orthopnoiam uerò appellabant, quoniam erecto duntaxat corpore faciliè spiritum ducunt. Decumbentes enim strangulantur. Propter extentionem igitur, quæ in spirando adhibetur, affectui nomen Orthopnoia, id est, recta spiratio inditum est. Erectus enim homo ad respirandum extenditur. At si supinus decubuerit, strangulationis instat periculum. Afficitur autem pulmo, simul etiam quæ spirationi conducunt, afficiuntur interseptum & pectus. At si cor uitiatum sit, nunquam diutius uita produci poterit: hoc enim loco spirandi uiuendi quæque initium situm est. Causa est frigiditas spiritus, atque humiditas: materia uerò, *humidi, crassi, glutinosi humores*. Huic uitio mulieres oportuna sunt magis, quàm uiri: quandoquidem & humidæ & frigida sunt. Pueri facilius, quàm hæc, liberantur. Nam ipsorum natura in incremento est, quæ ualentissimè calefacere potest. Viri tamen non faciliè hoc morbo *capitur*, citius tamen capti pereunt. Differtur autem interitus quibuscunque opere conficiendo, aut lanis elaborandis pulmo incalescit, & accenditur: quemadmodum calcis opificibus, aut ærarijs, aut ferrarijs fabris, aut ignis in balneis excitatoribus. Morbi uerò *imminentis* notæ huiusmodi sunt, grauitas pectoris: tarditas ad opus solitum, & ad aliud quodlibet gerendum: in cursu, aut in accliuo itinere difficilis & ægra spiratio: rauescunt, actussunt: flatus in præcordijs, atque eructationes præter rationem excitantur: uigilant: nonnu parù, & obscurè incalescunt: nares acutas & ad spirationem paratas habet. Si malum in peius ruat, malæ rubent: oculi prominēt, ueluti in his, qui strangulantur: stertunt, dū uigilat; multo magis, cum dormiunt:

οὐ κατὰ κλίσει.

καρδίη.

διαρέσει.

κατὰ κλίσει.

κίσει.

κίσει.

κίσει.

κίσει.

κίσει.

κίσει.

κίσει.



dormiunt: humida, obscura, sonoque carens uox est: *multi & frigidi aeris cupiditate commoti, in locum sub dioproficiuntur*: quælibet enim domus ipsis ad trahendum spiritum parua & angusta est. Erecti spirant, tanquam omni aëre attracto potiri cupientes, præaëris autem cupiditate & osaperiunt, patefaciuntque, tanquam eo ampliore indigentes. Ipsorum facies præter malas, quæ rubent, pallida est: sudor circa frontem & jugula emanat: assidua & aspera tussis infestat: reijciuntur pauca, tenuia, frigida, ueluti quædam spumæ efflorescentia: inflante spiritu collum intumescit: præcordia reuulsa sunt: arteriarum pulsatus parui, crebri atque depressi: crura exilia. Quod si hæc ulterius crementum acceperint, instar comitialis morbi nonnunquam hominem strangulant. At si uertantur in melius, tussis al. longior & rarior fiet: plura excernentur saniosa spūta, & humidiora: multa per uentrem aquea exturbabuntur: urina copiosa scaturiet, licet nondum quicquam in ea subsidat: uox sonantior, clariorque reddetur: somni longiores, quantum satis fuerit, efficiuntur: præcordia remittentur: dolor interdum ad scapulas in remissione transiit: anhelitus rarus, lenis, sed cum uocis asperitate fit. Ita sanè mortem effugiunt: sed in morbi cessationibus, licet ipsi non decumbentes obambulent, secum tamen morbi signa circumferunt.

DE PVLMONARIIS.

Caput XII.

Anhelitus species Pulmonarium est, quod Græci pneumodes uocant. Et à pulmone uicium, quemadmodum & anhelitus, oritur. Quæ insunt enim, utriq; communia sunt, & exigua differentia est. Nam spirandi angustia, & tussis, & uigilia & caliditas utrumque uicium comitantur. Itè in cibos odiū, & totius corporis extenuatio. Id enim

ἐν ὑπνώ. ὑγρὴ καὶ ἀήχος ἡ φωνή. πολλὰ καὶ ψυχρὰ ἡ ἕρος * Ἰπθυμίν. ἐς τὸ ὑπαίθρον ἰέν). πᾶς γὰρ αὐτέοισι οἶκος ἐς ἀναπνοὴν ἐ διαρκῆς. ἀναπνεύουσι ὀρθιοὶ ὅπως ἀπαντασπῆσαι τὸν ἐλκόμερον ἡ ἕρος ποθέοντες, ὑπὸ βαρίνης ἢ ἔξ ἡέρος καὶ διοίγσει τὸ σῶμα, ὡς τὰδε μέζονι χρεοῦνδροι. * ὡχροὶ τὰ πρόσωπα. πλὴν τῶν κήλων. τὰδε γὰρ ἐξ αἰθῆ. ἰδρῶς αὐτῶν μέτωπον καὶ κληίδας. ἐπὶ συνεχῆς, βία. ἀναγωγὴ σμικρῆ, λεπτή, ψυχρὴ, ἐκ ἐλη ὁκοῖον καὶ ἀφρᾶ ἐπάνθισμα. τράχηλος οἰδέει πνεύματος πησί. ὑποχόνδρια ἀνεσασμά. σφυγμοὶ μικροὶ, πυκνοὶ, πιαζομῆμοὶ, ἰσχνὰ σκέλεα. κῆν ὑπερταθῆ τὰδε, ἀπεπνιξέκοτε Ἰπληπικῶ τρέπω. καὶ ἢ ἐς ἀγαθὸν τρέπη), ἐπὶ μακροτέρη, καὶ ἀερατότερη. ἀναγωγὴ πλεύνων τὲ πύων ὑγροτέρων. κοιλίης τῶραχος πολλῶν ὑδατώδεων. ἕρων ἐκκρῖσις πολλή, κῆν ἐς ὑπόσασιν μηδέκω ἡκη, φωνὴ γεγωνοτέρη, ὑπνὸ αὐτῶρεες, ὑποχονδρίων ἀνεσις, ἡ κέ * ποτε πόνος ἐς μετὰ φρενον ἐπ' ἀνέσφ. ἀσμα ἀεραμόν, λείον, κερχνῶδες. ὡδὲ μὲρ οὐκ διαδιδρῆσκισι τὸν ὄλεθρον, ἐν ἣ τῆσι ἐπ' ἀνέσει, κῆν περιώσι ὀρθος ἀδῶ, ἔπαθεος φέρεσι ξύμβολα.

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΩΔΩΝ.

Κεφάλ. ιβ.

* Ασθμασος ἰδὲν τὸ πνυμῶδες, καὶ διὰ τῆ πνυμῶδος τὸ πάθος ὅπως ἐπ' ἀσμασι. ἕνα γὰρ καὶ τὰ παρόντα. σμικρὸν ἢ καὶ τὸ διάφορον. δύσπνοια μὲρ γὰρ καὶ ἐπὶ καὶ ἀγρυπνίη καὶ φέρμη ἕνα. καὶ δύσπνοια καὶ ἰσχνότης ὄλα. καὶ γὰρ



αἰσχρὸν ὄν τοῦ κακὸν ἄποτεινε), πλὴν ἔπειτα
 περαιτέρω ἐνὸς ἔτους. ἴσως γὰρ τὸ με-
 τόπωρον ἀρξῆται, εἰς τὸ ἔαρ ἢ τὸ θερινόν
 ἀπογίγνεται) ἢν τε χειμῶν ἐς τὸ μέλι-
 πωρον τελευτῶσι τὸν βίον. καὶ ἡ γέ-
 ροντες ἀλῶναι ῥηίδιοι καὶ ἀπόφριξι, ἀλόντες ὅσον
 βραχείης ῥοπῆς, ἐς δι-
 νυθὸν θανάτου χέεσσι. ἀγχις αὖτε * ἀ-
 πάντες ἀπνοοί, σφυγμοὶ σμικροί, πυκνοί, ἀμυδροί,
 ἀλλὰ τὰ δὲ μὲν ξυ-
 νά τῶν τοῦ ἀδμα. ἰδία ἢ ἀναβήσασ-
 σι ὡς ἀνὰ χροῖα. ματαιοπονεῖσσι δὲ. ἔδεν γὰρ
 ἀνάγκη. * εἶδε πὶ τὸ πλεύ-
 μονος ἀπορραγεῖν βίη, σμικρὸν, λευ-
 κόν, στρογγύλον. χαλαζῶδες. θώρηξ
 εὐεύτερος μὲν, ἀδιάστροφο, ἢ δὲ ἀ-
 νέλκωτος. ἢν ἢ ἀνεκπύητος ὁ πνεύμων
 ἢ ὑγρῶν ἢ ὀκκοίων πῖπεπηγόντων * ἐμ-
 πλωσ, διαλήψεις τῶν παρὰ ξυσμῶν
 τῶν δὲ μέζονες. οἱ μὲν οὖν ἀπεπνίγη-
 σαν θάσσον, πρὶν πὶ κάκιον ἐς τὸ πᾶν
 ἀποσκῆψαι. μελεξείεργισι ἢ ἔς ὑδρον
 πρὶν λαγόναν ἢ ἀνάσαρκα τὸ πάθος
 τελευτᾷ.

ἢ ἀπνοοί.
 ἢ πλεύ-
 μονος.
 ἢ ἀνεκπύητος.
 ἢ ὑγρῶν.

ΠΕΡΙ ΗΠΑΤΟΣ.

Κεφάλ. ιγ.


Ἡπαρ σπλῆνι ἐς γένεσιν μὲν ἰσορ-
 ροπὸν. δεξιὰ γὰρ ἡ δ' ἐπὶ δεξιῆς ἐξ ἑ-
 σωλάγχνα ἰσάειθμα τῆ φύσεως ἀνι-
 σοί ἢ ἐς δύναμιν καὶ ἐν ὑγείῃ καὶ ἐν νό-
 σασι. ἐν ὑγείῃ μὲν ὅππερ τὸ κράτος τῆ
 προφῆς τοῦ ἥπατος ἰσχυρῶς γὰρ φλε-
 βῶν ἥπατος ἀτὰρ (καὶ) ἐν νόσοισι καὶ ἐν ὑ-
 γείῃ πολλὸν πὶ ἰσχυροτέρον ἔχει ἔθλα-
 νά τ' ἢν αἰτίω. ὁκόσον οὖν ἥπαρ ἐς
 ὑγείην κρέσσον, τοσόνδε κάκιον ἐν νό-
 σοισι. καὶ γὰρ ἐπὶ φλεγμαίνεθ' ἄσασόν τε
 καὶ διαίτητον, καὶ ἀφίσα) ξυνεχέεσσι.

malum cum factum sit, producitur,
 neque tamen anni spatium excedit.
 Nam si autumni tempore ægrotare
 quis inceperit, uere, aut æstate futura
 uitam finiet: sin hyeme, sequenti au-
 tumno moriturus est. Si quando senes,
 quos facile hic morbus capit, & horrere per-
 culsi, eo uel leuiter tententur, lecto in quo
 mortem obeant, componantur, mortem non
 euadent, si semel hoc morbo uexati decum-
 bant, omnes simillimè spiratione pri-
 uantur, arteriarum motus parui, cre-
 bri, infirmi sunt. Sed hæc & in anhelitu
 reperiuntur. Priuatim uerò hi tussi-
 unt, tanquam aliquid expulsuri, cum
 tamen irritus eorū labor sit: nihil enim
 reijciunt. Verum si quid ex pulmone
 ui extruditur, illud exiguum, album,
 rotundum, grandinosumque est. Pe-
 ctus in his latius utique est, non obtor-
 tum, non ulceratum. Tametsi autem
 pulmo non suppuret, humorum tamē
 ueluti concretorum plenus est. Tem-
 poris intercapedines inter huiusce
 morbi accessiones longiores sunt. Non
 nulli ex his celerius suffocati sunt,
 quàm aliquid deterius omne corpus
 inuaserit. Nonnullis uerò in hydropem
 circa ilia, aut in eum, qui Anasarca di-
 citur, morbus iste mutatur ac desinit.

DE IECCORE.

Caput XIII.

Ἰεϋρ ἰσχυρὸν ἐν γενεῇ καὶ ἐν ἰσχυ-
 ρείᾳ. δεξιὰ γὰρ ἡ δ' ἐπὶ δεξιῆς ἐξ ἑ-
 σωλάγχνα ἰσάειθμα τῆ φύσεως ἀνι-
 σοί ἢ ἐς δύναμιν καὶ ἐν ὑγείῃ καὶ ἐν νό-
 σασι. ἐν ὑγείῃ μὲν ὅππερ τὸ κράτος τῆ
 προφῆς τοῦ ἥπατος ἰσχυρῶς γὰρ φλε-
 βῶν ἥπατος ἀτὰρ (καὶ) ἐν νόσοισι καὶ ἐν ὑ-
 γείῃ πολλὸν πὶ ἰσχυροτέρον ἔχει ἔθλα-
 νά τ' ἢν αἰτίω. ὁκόσον οὖν ἥπαρ ἐς
 ὑγείην κρέσσον, τοσόνδε κάκιον ἐν νό-
 σοισι. καὶ γὰρ ἐπὶ φλεγμαίνεθ' ἄσασόν τε
 καὶ διαίτητον, καὶ ἀφίσα) ξυνεχέεσσι.



perniciosiusq; abscessum patitur. At duro tumore, qui scirrhus Græce nuncupatur, affectum uelocius, atque dolentius, quàm lienis, interficit. *Cate-rum* quæ ad inflammationem attinent, in libro de acutis morbis proposui. Quòd si in pus conuertitur, dolor acutus ad jugulum usque, aut (&) ad summum humerum pertinet. Nam præ onere interseptum, unde jecur suspensum est, detrahit: interseptum uerò membranam costis substratam degrauat: ipsum enim illa consequitur: quæ planè ad jugulum usq; & ad summum humerum extenta est, atque hæc omnia simul ad inferiora detrahuntur. Ignis acer cum horroribus in suppuratione exoritur: tussis arida non admodum crebra diuexat: colore herbaceo ægri tinguntur, si largius colorentur, in auriginem incidunt in albidum uergentes: somni haud ita uisis imaginibusq; uacant. Prudentes uerò cum sint in omnibus, in aliquo tamen ad tempus oblato repente delirant, ad seque protinus reuertuntur. Tumor sub mammis, aut sub costis oritur: multi autem membranæ Peritonzi tumorem esse falsò crediderunt. Verum si tumor sub spurijs costis fiat, cum premitur, dolor excitatur: jecur intumescit: humiditate nanque refertum est. At si non sub ossè remaneant, inflatur membranæ signum. Et ipsius quidem circumscriptio & fines patent: post enim fibrarum circumductum in uacuum abdomen comprimens manus descendit, ac subsidet. Peritonzi uerò interminata duritia est: & extremitatis processus nequaquam cernitur. Porro si ad interiora subit abscessus, longè Medico natura præstat: aut enim ad intestina, aut ad uesicam pus conuertet. Verum multò innocentior est in uesicam uia. At si extra feratur abscessus, ipsum non secare utique malum est: nam si prætermittatur incisio, à pure jecur eroditur, nullaque mortis dilatio est. Si secare autem malis, profuuij sanguinis

ρόντε κὶ ὀλέθριώτερον. Ἐπὶ οὐρίῳ δὲ ὠκύπερον σπληνός κὶ ὤσειργέστερον κλείνῃ. τὰ μὲν οὐτὶ φλεγμασίνος ἐν τοῖσι ὀξέσι ἐλεξα. ἢν ὅς πύον τέρεπῃ, ὀδύνη ὀξεία ἰχθὺ μέσφι κλαδὸς ἢ ἀκρεῶν ὠμῶν. ὑπὸ γὰρ ἀγθεὸς ἐλκὲ τὸ δι-ἀφραγμα, ὅξ ἔ τὸ ἦπαρ ἢ εἴ. τὸ δὲ δι-ἀφραγμα τὸ ὑπὸ τῆσι πλουρήσι ὑμέ-να βρεθῆ. ξυνέπε) γὰρ αὐτέω. ὀδὲ ἐπὶ τὴν κληίδα * ἢ ἄκρη τῶ ὠμων δπο-τέτα, κὶ τὰδε ξυνεφέλκε) κάτω πύε-δριμὺ ξυν ῥίγεισι ἐπὶ τῆ δποσάσφ, βήξ ξηρῆ, ἔ μάλα πυκινῆ, χροίη * χλοή. βαφοίη ὅ καλακορέως ἔωσιν ἰκτερώ-δες. ἔ λουκοχρόσ εἰσλεος, ὑπνοὶ κα-θαροὶ φαντασίη ἔ μάλα. νηφαλέοι μὲν ἔς πάντα. ἔς ἔν δὲ π τῶ προσκαί-ρων ἔξαπίνης ὠδρακοπαί, κὶ καλεσά-θησαν εὐθέως. ὄγκος (ἔσὸ πτῆσι ἢ πλουρήσι, ἀπάτῃ πολλοῖσι ὄκως) πε-ρίοναίε γίγνε). ἀλλ' ἢν μὲν ἢ ὑποῖα ἔ νόθας ὄγκος ὀδύνη πιέζομενίσι, τὸ ἦ-παρ οἰδέε. ἔμπλεον γὰρ ὑγρασίης, ἔ μὲν ἔσὸ τὸ ὀσέον μίμνωσι οἰδέει, τῆ ὑμῖος τὸ σπικεῖον. κὶ ἔ μὲν ὠειγρα-φῆ κὶ τὰ ὄρεια δῆλα. μεία γὰρ τὴν πε-ριαγωγὴν τῶ λοβῶν ἔς λαγαρόν τὸ ἔπιγαστριον πιέζοσα χεῖρ ἰζαίε. πε-ρίοναίε ὅ ἀόριστος ἢ σκληρὴ, κὶ ἔ πέρ-ραλος ἢ δπόφυσις ἀφανῆς. ἔ μὲν εἰ-σω ἢ δπόσασις ῥέπῃ, πολλὸν τι κρέσ-σον ἢ φύσις ἰητεῖ. ἢ γὰρ ἔς ἐνῆρα, ἢ ἐπὶ κύσιν ῥέψῃ πύον. ἀσινεσέρε ὅ πολ-λὸν ἢ ἔς κύσιν ὀδός. ἔ μὲν ἔξω ῥέπῃ, κακὸν μὲν μὴ τάμνειν. * ἔ μὲν γὰρ ἔ τως ἔη, ἀνεδίεται ἔσὸ τῆ πύε τὸ ἦπαρ, κὶ ἔκ ἔς ἀμβολὴν ὀ θάνατος. ἔ μὲν δὲ δέλης τάμνειν, αἰμορραγῆσαι κίνδυνος,

v. d. d.

v. χλοήκαθου.

v. ὑγρασίης.

v. ἢ δὲ.



ἀόχαιτοι

κίνδυνος, κὶ αὐτίκα τὸν ἀνθρώπον ἐκ-
θανεῖν. ἀχαιτος γὰρ αἱμορραγία ἐφ'
ἥπατι. ἡ δ' οὖν ἐς ἀνάγκην τρυφῆς
κατῆς κοτῆ, καυτῆρος ἐμπυρρον δια-
φανέα πυρῶσαι κὶ διῶσαι μέσφι τῆ
πύρι. τωτ' γὰρ σοι τέμνη τέ κὶ καίφ.
κῆν (φειγίγη), πύον ἐκρεύσθ λου-
κόν, πέπον, λείον, κακῶδες, ὄλιπαχύ.
τοῖς δὲ κὶ πυρετοὶ κὶ τὰ δόνα ξυνδιδοῖ-
ρηιδίως (εἰ ἀθέλξει) πάντα. ἡ δ' ἐς ἐν-
τερρον τὸ πύον ἐγχείη), ἠ γαστῆρ πρῶ-
πια μὲν ὑδατώδεια διαρρείη. ἐπειτα
κρεῶν πλύμασι κέλα. αὐθις αὐδυ-
σεντερωθῆσα ὀκοῖα ἐφ' ἔλκεσι. ἀτῆρ
κὶ * αἰμῶλωψ κῶλε κὶ θρόμβος ἠνεχ-
θη. φέρε) κὶ χολῆ ξανθῆ, κατακορῆς,
ἠ πρῆσσοφθῆς, κὶ ὑσάπῆ ἐς ὄλεθρον μέ-
λαινα. ἠν δ' ἀνεκπύητον τ' ἔλκος γίγ-
νη), κὶ κακῶδες ἠ γαστῆρ ὀκοῖον πιση-
πεδῶνα ὑπάγφ, τρῶφῆ ἀπεπίος διεκ-
θῆει ὑπ' ἀκρῆσις κοιλίης τῆ κὶ ἐντέ-
ρων. εἰ * πέπῆι γδ αὐθις εὐ ἔχον τ' ἠ-
πάρ. πύρι ἐπὶ τοῖς δὲ θριμύ, κὶ * πάλ-
τως ἐς κακὸν ἠ τρῶπῆ. σαρκῶν ξυνπῆ-
ξιες, σφυγμοὶ μικροὶ, δύσπνοοι. εὐτέ
ἐκ εἰς μακρὸν ἐτελεύτησαν τῶν βίον.
μετεξέτεροι σὶ ἠ δυσεντερῆ μὲν κὶ τ'
ἔλκος ἠθῆ, ἐς ὄθρῶπα δ' κατέσρεψεν
ἠ νῆσος. ἠν δ' ἀπαντα ξυνδιδοῖ, πύον
λ. λουκόν, λείον, ὄμαλόν. ἀνοσμον γὰρ
ἐκρεῖφ ἠ γαστῆρ. πέπῆι δ' τῶ σπία, εὐέλ-
πῆς ὠνθρῶπος. ἀρισον δ' δι' ἔρων κερρί-
δῆ. ἀσφαλεσέρη δ' κὶ αἰσινεσέρη ἠ τῆ-
δε ἔπύρι ὄδός. ἡ δ' ἄπο τ' φλεγμο-
νῆς ἀνεκπύητον ἠ τ' ἠπάρ, ἀπόρον μὲν
εἰ γίγνη), τὸν ὄγκον τέλον σκληρὸν ἴζον
* εἰς σκίρρον ἰδρῶε). εὐτε πόνος μὲν εἰ
ξηνεχῆς. νωθῆς δ' κῆν παρῆ ἀραῖη δ' κὶ
θερμῆ. ἀποσιτή, πικρῶν * γδίματα

κῆν κῶλε

πύρι

εἰ

κῆν κῶλε

periculum instat, statimque hominem
perdi contingit. Nam sanguinis e jeco-
re profusio coërteri nullo modo po-
test. Igitur si aliquando necessariò ad
secationem uenire cogeris, ustoriũ fer-
ramentum candens perspicuumq; ab
igne accipito, & usque ad puris locum
intradito. Idem enim tibi & secat & cõ-
burit. Quod si homo periculũ euadit:
tum pus album effluet, concoctum,
læue,OLIDUM, quoniã crassum est. Istis
febres & acerba remittunt, omniaque
facile mulcebuntur. Verum si in inte-
stinum pus effunditur, ex aluo primũ
aquea feruntur, postea humori, in quo
sint lotæ carnes, similia: item qualia
in torminibus, ubi ulcerata intestina
sunt, exire solent. Interdum cruentum
uitus, interdum concretus sanguis ef-
funditur. Fertur & bilis flaua, sincera
aut porracea, & postrema interitum
afferens nigra bilis. Si non *suppurat* ul-
cus, & mali odoris quædam ueluti pu-
tredinem uenter expellit, crudum ali-
mentum præterfluit ob uentriculi in-
testinorumque intemperiam: neque
enim bene se habens jecur iterum ea
concoquit. Postea ignis acer subori-
tur, omniaq; in malum prolabantur,
carnes colliquatione tabescunt, mo-
tus arteriarum parui sunt, & ægra spi-
ratio. Vbi haud ita multò post uitæ fi-
nis imponitur. Cæterum quibusdam
difficultas quidem intestinorum, ul-
cusq; sanata sunt, morbus tamen in
aquam intercutè desijt. Quod si omnia
remittantur, pus album sit, læue, æquã-
le, inodorum: uenter deijciat, & ciba-
ria concoquat; homo in bona spe est.
Optimum uerò est per lotium crissim
fieri: hac enim securior est, minusque
maleficus puris transitus. Verum si à
phlegmonè jecur non suppurat, nemi-
ni dubium fuerit; tumorem durum
subsidentem in scirrhum mutari ac sta-
biliri: quando continuus dolor non
infestat: cumque adest, obrusus
intersque sentitur; rara uerò & ca-
lidas: à cibis alienatio, ab amaris
delecta-



delectatio, à dulcibus cōtristatio: hor-
tore afficiuntur: subalbicant, uirent:
lumbi ac pedes tument: facies corrugatur: *alius sicca est*: dejectiones crebræ fiunt. Malorū autē colophon aqua *intercutem*. Post aquā intercutem si multa urina & crassa feratur, multumq; in ea limosi subsideat, & cum impetu erumpat: humorem illū intercutaneū effluere posse sperandum est: si tenuis autē, subsidencia carēs, paucaq; urina exeat: aquā intercutē auget fouetq;. Quod si pristinās uires natura recipiat, & quandoq; per uentrē cum imperu materiam deturbet, post multorum, crassorum, aquosorumq; depulsionē & ipsum hydropicū morbum tollere cōsuevit. Vetus id genus auxiliij cum periculo est: post enim subitas & copiosas inanitiones, extremosq; casus prostratis interdum uiribus, quæ admodū in sanguinis profuuiio accidere solet, ægri interierunt. Cū minori autē noxa morbū sudor, si liberalius effluat, dissoluit. Hydropici nanq; haud ita multū, in summa cute humectari solēt, atq; morborū jecoris hic finis est. Quando in jecore pus nascitur. Adolescentes, & qui usq; ad consistentem ætatem peruenerunt, his uexantur morbis: mulieres minus his patiendis expositæ sunt. Hujusmodi uictiorū causæ numerantur, uictus intemperatā, & longa ualetudo: præsertim post difficultatē intestinorum, & colliquationes. Quādoquidem & eos syntecticos, i. e. colliquatos nominarūt; qui post ulcera jecoris tabefacti moriūtur.

DE LIENE.

Caput XIV.

Lieni familiaris longus morbus est, quem Scirrhum nominant. Purulentia uerò haud ita facile, quandoq; tamen efficitur: cum dolor non asper, tumor autē ingēs spiratione major exoritur. Siquidem in dextram partem ad jecur usque tota communione *intumescente* uisus est. Vnde multi ut fallerentur in causa fuit: tanquam non lienis, sed membrana affecta esset. Nam peritonæon, quod Græci

ήδονή, γλυκέων αήθιη, ριγώδεες, υπόλοικοι. χλωροί, οίδαλοί οσφύνη και πόδας. παρσώπα ρυσά, γαστήρξηρη, διαχωρήσεις πυκιναι. κορυφή γδ τῶ κακῶν ὑδρωψ. ἐπὶ τῶ ὑδρωπι, ἡ μὲν ἔρα πολλὰ, παχέα, ἐπίδοσιν ἔχοντα πολλήν, ἰλυώδεα κατὰ ῥαγῆ, ἐλπίς ἐκρεῦσαι τὴν ὑδρερν. ἢν ἴλεπία κὺ ἀνυπόστα κὺ ὀλίγα, τῶ ὑδρωπι πμωρέει. ἢν ἴμεταβάλλη εἰς τὸ δὲ χαῖονή φύσις, κὺ κατὰ ῥαγῆ κατὲ εἰς κοιλίην, ἐπὶ πολλοῖσι πάχεσι, ὑδαλώδεσι, κὺ τὸν ὑδρωπα ἴσα τὸ σφαλαρῆ ἴη τοιαύτη ἐπικουρίη. ἐπὶ γδ τῆσι ἀθρόοσι κενώσεσι, ἢ δὲ τῆσι ἐχάτησι ξυμπλώσεσι, ἐξέθανόν κοτε ὑπ' ἀδυναμίας οἰκάμνοτες, ὅπως ἐξ ἀμορράγης. ἀσινές ερρν δὲ λυεῖ ἰδρῶς, ἢν πολὺς ἐκρεῦῆ. ἐπ' ἀνυ γδ ἰμαλαῖοι οἰ ὑδρωπώδεες. ἢ δὲ τῶ ἐν ἡπαπαθέων ἡ τελευτή γίγνε). ἢν ἴ ἐμπύη τὸ ἡπαρ, μείρακες, κὺ οἰ μέσφι ἀκμῆς, ἢ ὅσον γυναικες. πρὸ φάσις ἴ ἀκρῶσι κὺ νῆσος μακρῆ, μάλισα ἐπὶ δυσεντερίη ξυνηξέσι. κὺ γδ δὲ ἢ κὺ τῆσδε ἐκίκλησκον ξυνηκτικῆς, τῆς ἐπὶ ἔλκεσι ἡπατος ἰχνῆς ἀποθνήσκοντας.

ΠΕΡΙ ΣΠΛΗΝΟΣ,

Κεφάλ. ιδ.

Σπλινὶ ξύνηθες χρόνιον νόσημα σπῖρρος. ἐμπυος ἴ ἐ ρηιδίως. γίγνεται δ' οὐδ', εὔτε πόνος μὲν ἐ τρηχύς, ὅγκος ἴ πελὺς τ' ἐπὶ πνοίης μέζων. ἐπὶ δεξιᾷ γδ ὠφθη μέσφι ἴ ἡπατος ὀλητῆ κοινωνίη ἐποιδέων. ἴνεκεν πολλοῖσι ἀπάτη γίγνε), ὡς τοῖς δε ἐκ ἐόντος σπλινός, ἀλλὰ τῆ ὑμῶς πα-
 ρ. τὸ γὰρ παρῖτόναμον φλεγ-
 μαῖνον.




μαῖνον σφίσι δοκέει. ἀπηνής δὲ καὶ
 ἀτέραμν[⊙] ὄκως λίθος. τοῖος δὲ τὰ
 πολλὰ Ἰππὶ σκίρρω γίνε[⊙] σπλην, δι-
 τεκλῶ πορὴν ξύνεσι παλιελής. ἡ δὲ
 κῆμπύσκη εὐαφής μὲν εἰκων Ἰππὶ τῇ
 θήξει κατὰ κορυφὴν, ἐνθα ἡ ἔπις
 γύνα. ὅπη ἢ ἀνεκπύητος, ἔκ εἰκει. ἄλ-
 λοτε δὲ τῇ κοιλίῃ ἅπας ἐπαιώρηται
 τῆδε κακείσε πρὸς τὰς ἀπίσας φε-
 ρόμενος, ἐστ' αὖ σμικρότερος[⊙] ἔων,
 χρώσει ἐς τὸ ἐμπλῶειν ἴχη ναυτίη,
 ἀπορὴν μάλιστα πρὸς τῆσι ρήξεσι.
 Ἰππὶ ἴσσιος σημήια, πυρετοὶ, πόνοι κῆ
 ρίγεια. τὰ πολλὰ γὰρ ἔασι. ἀριγοὶ δὲ
 ἐπι βραχίη θέρμη, κῆ ἀνώδυνοι. τῆ δὲ
 κῆ λέληθέ κοτεῖς σπλην^{*} ἀπίσας-
 σις. μακρὸν γὰρ καὶ ἐπαναμῶθη καὶ ἐν
 ὑγίῃ τὸ σπλάγχνον. οἰδαλέοι, ὑδρε-
 ρώδεες, μελάγχλωροι, ξύν δυσφο-
 ρίῃ, ἢ δύσπνοια ὡς ἀπὸ βαρέος ἔθω-
 ρηκος. ἐπίσθλον γὰρ τὸ κακόν. ἀχρὶ τῆ
 αἰώ γαστῆρ πύμπλα[⊙] ἰσὸ πνεύμα-
 τος παχέος, ὀμιχλώδεος, ὑγρῆ, ὡς
 (μὴ) δοκέειν, ἔκ ἐτ' ἐόντος ὑγρῆ. ἐθῆξ,
 πολλὸν θυμὸς ἐγγίγνε[⊙], κῆ βραχέα
 ξηρὰ ἐήσασσι, κοιλίη ἡ δὲ κάτω φέ-
 ρη ὑδατώδεα, τὸ πρῶτον σμικρόν ἐ-
 πικρὸ φίζεσσα. εἰ ἢ Ἰππὶ μᾶλλον ἐκδι-
 δῶ, ξυνήκη μὲν τὸν ἄνθρωπον, ὠφελὲς
 ἢ ἔστιν ἡ πον. ἢ ἢ κῆ ἐκκραγῆ, πύον μὲν
 καθ' αἶρον πέπον, ἔκ κοτεῖς εὐθύθῃ, ἰσὸ
 λυκὸν ἢ τὸ τε φροειδές, ἄλλοτε δὲ
 πρυγῶδες ἢ πελιδνόν. ἡ δὲ καὶ βα-
 θυτέρη ἢ ἀπίσας γένηται, κῆ μέλαν
 τὸ ὑγρὸν. εὔτε καὶ τῆ χυμοῦ π τῆ
 σπληνὸς ἔξασσι. συντακέντ[⊙]. μετε-
 ξετέργισι ἢ κῆ ὅλα μέλα εἰσὶ σπληνὸς
 ἢ νέχθη. εὐλύτος γὰρ κῆ φύσει σπλην.

* ἀπίσας.

uocant, inflammatione occupari isti existimant. Contumax autem atque indomitus instar lapidis tumor est, talis plerunque à Scirrho lienis efficitur: quando & ambiguitas difficultasque maxima simul adest. Verum si forte suppuret, tractabilis est utique: & in parte summa, ubi puris quoque creatio est, tactui cedit. Quando uerò pus non ducit, tactui omninò resistit. Porro nonnunquã scirrhus totus super uentrem suspensus est, in hanc atque in illam partem, prout impellitur, delabens: donec, pusillus eum sit, locum ad fluitandum habet. Adest nausea & anxietas: maximè cum inslat eruptio. Incremèti autem notæ sunt, febres, dolores & horrores: multoties enim horrent: nonnunquam uerò non horrent, cum breui caliditate, & dolore uacant. Hac de causa interdum & in splene abscessus oriens latuit. Rarum enim, & sensu carens in sanitate quoque uiscus est. Turgent isti, atque humoris, tanquam hydro-pici, pleni sunt, atro colore uiridi admixto suffusi, ægrè omnia patientes, pectore ueluti pondere oppresso gra- uiter spirantes. Euidens enim malum est, usque ad superiora spiritu uenter impletur crasso, caliginoso, humido quidem ad speciem, cum tamen non sit humidus. Tussis adest, multumque irritantur, sed pauca sicca extruduntur. Venter si quæ infra depellit aquosa, primò paulum subleuat, deinde si largius deijcit, hominem quidem tabefacit, sed nihilominus iuuat. At si & abscessus ruptus fuerit, pus utique purum & concoctum nunquam excernitur, sed subalbidum & cinereum, quandoque fæculentum, aut liuidum. Quod si & profundior abscessus fuerit, nigra etiã fertur humiditas: quando & aliqua succi lienis, qui simul tabescit, particula exprimitur. Quibusdã præ- terea & integræ lienis partes exierunt: si quidè & natura dissolubilis lienis est.

Cæterum



Ceterum si morbus ulcere non substitit, sed in longum tempus extrahitur; cibos auerfantur, malo sunt habitu, tumidi, aspectu fædi, multis ulceribus toto corpore, sed maximè in cruribus scatent: rotunda, liuida, concaua, sordida, ægre sanabilia ulcera sunt, sicque demum tabefacti interiере. At in exiguo tumore cum duritia & renixu indolentia est. Vnde fit, ut isti longiorem uitam ducant. Verùm si ab affectu superentur, aqua *inter cutem*, aut phthisis necessariò sequitur: & corporis eliquatio superuenit. Atque iste sane perniciosi modus ipsos è uita migrare compellit. Pueri ac iuuenes faciliè calamitatem hanc patiuntur, facileque inde liberantur: senes uerò non faciliè utique læduntur, sed affecti eua-dere interitum nequeunt. Quin etiam seniores quidam nescientes ipsi uitio lienis absumti sunt: nam & pusillus tumor ipsis causa interitus fuit. Longa quoque ægrotudo tabidos facit: & iuuenibus otium maximè nocet, quicumque à certaminibus exercitationibusque corpus quieti desidiaque tradunt: loca palustria, aquæ exuberantes, falsæ, uirosæ: inter anni tempora ferinus autumnus.

ὡς ἢ κὴ μὴ καθίστη) τὰ ἔλκει, μίμνη ἢ ἐς πολλὸν χρόνον, ἀπόστοι, καχέκ), οἰδαλέοι, ἰολεῖν ἀπρεπέες, πολυελκέες πάντη. μάλισα δὲ ἐς κνήμας σρογγύλα, πελιδνά, κοῖλα, ῥυπαρά, δυσάλθεα τὰ ἔλκεα. τῆδ' Ἰππικῶν τὰ κέντες ὠλοντο. Ἰππὶ ἢ σμικρῶ ὄγκῳ μετὰ σκληρίας, αἰτυπίας, ἀπεινῆ. διὰ τὸ εἶναι πολλὸν χρόνον ζῶσι οἶδα. εἰ δὲ ἔπαθε ἢ ἢ τοῖς, χρεῶν ὑδρωψ, ἢ φθίσις κὴ ἔσκηνε ἢ τικεδῶν Ἰππικῶν). ἀτὰρ ἢ * τὰ τε ὀστέα τὰ ὀλέθρα σφέας ἔζην ἔξαγι. παιδία μὲν ἐν κὴ νέοι παθεῖν ἰε ρήιτεροι κὴ ἀπαλλαγῆναι ρήιτεροι. γέροντες ἢ ἐκ εὐπαθῆες μὲν, διαδρῆναι ἢ ἀδύνατοι. ἀτὰρ κὴ πρεσβύ) ἔλαθόν πινες ἐπὶ σπληνὸς διαφθαρέντες. κὴ γὰρ ἔσμι κρῶ ὄγκῳ τοῦ ὀλέθρα σφισιν ἢ ῥοπή. φέρεται ἢ κὴ νῆσ ἢ μακρῆ, φθινώδης, κὴ νέοισι δὲ γῆ μάλισα, ὁκόσοισι ἀπ' ἀγωνίας ἢ γυμνασίων πολλῶν, ἀπονον τὸ σῶμα. χρεῖα * ἔλκώδεια, ἔδατα πλάγια, ἀλμυρὰ, βρομώδεια, ὠρῶν τὸ θηριώδες μετόπωρον.

DE MORBO REGIO. Caput XV.

ΠΕΡΙ ΙΚΤΕΡΟΥ. Κεφάλ. ιε.

Sibile flaua, uitellina, aut crocina, aut nigra cum uiridi mixta omne corpus à uiscere suffusum sit; affectus hic à Græcis Icterus, à Latinis Regius morbus, siue Arquatus, siue Aurigo dicitur. Difficile utique in acutis malum est: quia non solum ante septimum apparens, sed etiam post septimum infinitos necauit. Rarò autem ad extremum febrem benè iudicauit: ipse uerò haud faciliè discutitur. Neque uitio jecoris tantummodo prouenit, ut nonnulli Medicorum existimant:

Ἦν χολῆς ξανθῆς λεκιθώδους ἢ κροκοειδέος ἢ τ' μελαγχλῶρος. ἐστὶ παθηλές ἀνάχυσος ἀπὸ τῆ σολάγχης γένη), τὸ πάθος ἰκτερος κικλήσκεται, χαλεπὸν μὲν ἐν ὄξεσι. ἐ γὰρ μόνον πρὸ ἐβδόμης κλείνει φανέν, ἀλλὰ κὴ μετὰ ἐβδόμην ἐκίφνει μυρίας. σπανίως ἢ εὐτε ἐκρινε πυρετὸν ἐς τέλος τὸ πάθος ἀλλ' αὐλὸς ἐ ρηιδίως λύει). ξυνίσταται δὲ ἐκ ἐπ' αἰτίη μῆνον ἢ πατος, ὅπως πρὶ τῆς ἰκτερῶν ἀποκεί, ἀλλὰ κοιλίη, κτλ



κὺ σπληνί, κὺ νεφροῖσι, κὺ κώλω & ἐφ'
 ἥπατι μὲν * ὁδῶ. ἡ δὲ φλεγμάνη ἢ
 μὲν ἢ σκίρρον ἴαχῃ τὸ ἥπαρ, ἀτρεπίον
 ἢ τὸ ἐς ἐργασίω ἐπὶ, πίκτει μὲν ἐν τῷ
 ἥπατι χολήν, κὺ διακρίνει τὴν δὲ ἐν
 ἥπατι οὖσα κύσις. ἀλλ' ἡ δὲ αἰ φέρει-
 σαι ἐς τὸ ἐντερον τὴν χολὴν ὁδοῖ
 ὑπὸ τῆς φλεγμασίης, ἢ τῆ σκίρρα
 φραχθῶσι, πλημμυρῆ δὲ ἢ κύσις,
 παλλίσυτος ἢ χολή. τῷ αἵματι οὖ
 μίσηται. τὸ δ' αἷμα, ἐς πᾶν τὸ σκί-
 ρρον φοιτῶν, ἀγει τὴν χολήν παντὶ
 τῷ σώματι. γίγνεται δ' ἢ * ἰδίην χολ-
 λῆς. λουκά ἢ καὶ δὲ γιλώδεα τὰ σκυ-
 βάλα. ἢ γὺ γίγνεται χολή βαφα,
 ὅππερ οὐκ ἴαχῃ τῆ δὲ ἔχουσι τὴν
 σκίρρον. τῆ δὲ καὶ γαστῆρ σκίρρονος.
 οὔτε γὺ ὑγραίνεται, οὔτε * δὲ ἀκνε
 χολή. χροῖ ἢ, ἔλθοκοχρός εἶδε
 σκίρρον σπληνί ἢ ἢν ἰκτερο φανῆ, με-
 λάγχλωρ. μέλαινα γὺ αὐτέου
 ἢ τροφή, ὅππερ ἐκμαγαῖόν ἐστιν αἵ-
 ματι μέλανος, οὔ τὴν ἀκαθαρσίω
 εἶδον ἢ δέχεται, οὔ δὲ ἐκπρονέει νο-
 σέων ὁ σπλην. ἢ δὲ ξὺν τῷ αἵματι
 πάντῃ φοιτῆ. διὰ τὸ δὲ μέλαγχλω-
 ροῖ δὲ σπληνός ἰκτερο. ἀτρε καὶ
 ἐπὶ τοῖσι σκυβάλοισι τοῖσι ξυνήθει, ἐπὶ
 κὺ * μελαντέρη χροῖ. τὸ γὺ σπληνός
 τροφῆς τὸ ἀειπὸν, ἐς ἐξοδὸν ἀειπὸ-
 μα γίγνεται, κὺ ἐπὶ κώλω καὶ γαστῆρ
 * ἰκτερο, ἢν περ εἰς πέψιν ἢ γαστῆρ
 κὺ τῷ κώλω κακωθῆ. κὺ γὰρ (καὶ) ἐν
 τῷ κώλω πέψις, κὺ δὲ τὸ τοῦδε ἢ ἐς τὸ
 ἥπαρ ἀναγωγὴ τροφῆς. ἢν οὖν ὠ-
 μότερον τὸ ἥπαρ τὴν ἄλλω τροφήν
 λάβῃ, τὴν μὲν * ἰδίην ἐργασίω πο-
 νέει. τὴν ἢ ὀθεινῆν, ἢ τὸ γὰρ ἐν τῇ

sed & uentriculus, & lienis, & renes, &
 laxum intestinum in causa sunt, & ab
 jecinore quidē nascitur, si phlegmone
 aut scirrho uiscus illud opprimitur, à
 solito tamen munere non impeditur.
 Creatur enim in jecinore bilis, eamque
 in jecinore posita uesica sēcernit. Ve-
 rum si meatus ad intestinum bilem de-
 ferentes phlegmone, aut scirrho in-
 terclusi fuerint, uesica autem exunda-
 uerit, bilis retrò labitur. Cum sangui-
 ne igitur miscetur, qui per totum cor-
 pus discurrens, secumque bilem ue-
 hens in omnia membra diffundit: at-
 que ita corporis species bile tingitur.
 Stercora uerò albidà sunt, & argillam
 referentia. Neque enim bile coloran-
 tur, quoniam humoris eius affluxu
 carent. Iccirco & uenter ualde siccus
 est, siquidem bile nec madet, neque
 stimulatur. Color autē ad albū cum uiridi
 mixtū uergit. Si morbus regius ab liene
 ortum habeat, color est ater cum uiri-
 di mixtus. Ipsius enim atra bilis ali-
 mentum est: cum sanguinis atrī effigi-
 es quaedam ac simulacrum sit, cuius
 purgamenta non suscipit, neque cla-
 borat lienis ægrotans. Inde fit ut per
 omne corpus cum sanguine dilaban-
 tur. Propterea lienis arquato laboran-
 tes eum uiriditate quadam nigricant.
 Ipsorum quoque consueta stercola ni-
 griore colore imbuta sunt. Nam quod
 alimenti in splene abundat, ad uias
 exitus tanquam recrementum propel-
 litur. A laxo etiam intestino & uentri-
 culo arquatus prouenit, ubi conco-
 quendi facultas in uentriculo & laxo
 intestino, quod Græci Colōn nomi-
 nant, læsa fuerit. Nam & in colō con-
 coctio efficitur, & ab ipso alimentum
 in jecur digeritur. Igitur si aliud ali-
 mentum crudius jecur susceperit,
 proprium quidem elaborat, & confic-
 cit, alienū uerò dimittit. Sanguis enim,

* ἰδίην

* ἰδίην

* ἰδίην

* ἰδίην

* ἰδίην

* ἰδίην



qui distribuitur, coli cessationem atque inertiam retinens, in omnem partem labens eam disseminat. In colo autem cruditas ipsius bilis effectrix est. Hunc sanè in modum ab omnibus uisceribus arquatus oriri poterit, non modo ab ijs, quæ jecori escam suggerunt, sed etiam ab ijs, quæ à jecore suscipiunt. Neque enim per canales duntaxat sensiles, sed multò copiosius per halitus natura in omne corpus alimenta distribuit, qui à toto in totum natura ipsos per solidas ac densas partes dirigente discurrere facile queunt: gignuntur itaque halitus bile infecti: & corpus, ubi infederint, colorant. Nempe per aluum laborante colo non fit, albida excretio: jecur enim creandis succis nullam noxam patitur, exitumque bilis ad intestina patentem habet. Habitus quoque totius corporis ad morbum regium citandum summoperè efficax est. Habet enim & in toto causam, quæ huiusmodi est. In omnibus corporis partibus calor ad concoquendum insitus est: in omnibus item humorum est creatio ac separatio. Sed aliorum alia, singulis autem propria, ut pote in carne sudor, in oculis lachryma, in articulis & naribus mucus, in auribus Cypselis græcè διὰ, Latini aurium marmorata, seu cerumina uocant. Itaque si ad singula obeunda munera calidum fatigatum lassatumque fuerit, ipsum quidem in acre atque igneum uertitur, humiditates autem omnes in bilem abeunt. Ignis enim opera amara & bile infecta sunt. Quòd si & in sanguine cruditas incidat, sanguis biliosus efficitur, & quoquo uersus nutritus dispergitur. Propterea & ubique bilis conspicitur. Planè acerbum id malum est, color uero specie horribilis. Etenim colore aurum representat: sed nò hominè decet, quod in lapide pulchrum fuerit. At superuacuum mihi uidetur,

ἀναδοσει αἷμα, τὴν ἀεργίαν τὴν
τῆς κῶλης ἐπέχον, διασπείρει παντὶ
χεομόρφον. ἀπεψίη ἢ ἐν κῶλῳ, χολ-
λῆς ἐστὶ ἐργασίη. ὧδε καὶ ἐπὶ παντὶ
γίγνεται ἀπλάγχχιω δυνατὶ κίτερον,
ἐ μόνον τῷ ἐς τὸ ἥπαρ πεμπόντων
προφῆν. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἥπατος λαμβ-
βάνη. ἐ γὰρ ὁ χεομορφὸς αἰσθητοῖσι μόνον
ἢ φύσις παντὶ διαπέμπει τὴν προφῆν,
ἀλλὰ πολλῶν πλέον ἀτμοῖσι, οἵπερ
ἀπὸ παντὸς * εἰς παντὶ ἐνεχθῆναι ῥησι-
δοιοι, τὸ φύσις αὐτοῦ (καὶ) διασε-
ρεῶν καὶ πυκινῶν ἀγούσης. γίγνεται
ἐν οἱ ἀτμοὶ χολόβαφοι, καὶ χεομορφῆσι,
ἢ αὐτῶν ἢ σώματι. ἐ μὲν ἐπὶ
κῶλον * ἢ τῆς κοιλίας ἐκκροσις λαβὴ.
αἰσιν ἐς τὸ ἥπαρ ἐς γένεσιν, καὶ ἐκρο-
σις ἴχει ἐπὶ ἐντεροχολῆς, δυνατω-
τάτη ἢ καὶ ἢ ἐπὶ τῶν παντὶ ἐξίς, κίτερον
τεκεῖν ἴχει γὰρ καὶ ἐν ὄλῳ τὴν αἰτίαν.
ἐστὶ δὲ τοῦδε. παντὶ μὲν τὸ θερμὸν ἐς
* πέψιν, παντὶ δὲ ὑγρῶν γέννα καὶ
διάκροσις, ἄλλων μὲν ἄλλη, ἐκάσῳ
δὲ οἰκείῳ. ἐν σαρκὶ μὲν ἰδρώς, ἐν ὀφ-
θαλμοῖσι ἢ δάκρυον. ἐν ἄρθροισι δὲ
καὶ ῥινὶ κύψη, ἐν ὠσὶ κυψελίς. καὶ οὐκ
ἐς ἐκάστον ἐργον τὸ θερμὸν ἐγκάμη,
αὐτὸ μὲν ἐς δριμύ, καὶ πυρῶδες ἐπεί-
πη. τὰ ὑγρά πάντα γίγνεται χολῆ,
πυρῶς γὰρ ἐργα πικρὰ καὶ χολόβα-
φα. καὶ ἢ ἐν αἷμα ἀπεψίη συμ-
φῆ, γίγνεται τὸ αἷμα χολομορφῆσι,
σιόδιον ἢ παντὶ πρέφον. διὰ τὸδε
παντὶ φαίνεται χολῆ. δεινὸν μὲν γὰρ
τὸ πάθος, φοβερὴ δὲ ἢ χεομορφὴ εἰδῆ, καὶ
χεομορφῆς ἐστὶ τὴν χεομορφῆν. ἐ γὰρ
αἰσθητῶν εὐπεπῆς, ὅγε ἐν λίθῳ κα-
λὸν ἐστὶν. ἀεὶ πρὸν δὲ μοι φράζειν καὶ

H πόθεν



πόθεν τὸν ὄνομα, πλὴν ὀκόσον τῷ χερ-
 σαίων ἰκτίδων τῷ τετραπόδων θη-
 ρίων. τριοῖσι δὲ ἕασοί ὦπες οἶδε.
 εἶδεα τῆ πάθε^θ δοια. ἢ γὰρ ἐστὸ
 ξανθόν, ἢ τὸ κροκῶδες ἐτέρα πη τοῦ
 λυκο χλώρε εἶδεος, ἢ ἐς τὸ πελιδ-
 νὸν καὶ μέλαν. τῷ δὲ μύρι^η αἰτή.
 εἶδη ἢ ἢ χολῶν ἐς αἰτή. καὶ γὰρ τῆς
 δεῖ ἢ μύρι^η ξανθῆ, λεπτή, διειδή, λε-
 πιότερα εἶδε^θ, ἢ ἐς τὸ πελιδνὸν καὶ
 μέλαν. ἢ δὲ κατὰ κορῆς, ὡς κρόκον, ἢ
 λέκιδον φάναι τῆ αὐτῆ εἶδεος. δού-
 τερη ἢ μελαντέρης χροῖης πρᾶσιζου-
 σα, ἰσατώδης, μέλαινα. μυρία ἢ
 ἐν μέσῳ τῷ χροῖων * ὡδραλλαγαί.
 ὡδρα δὲ τὸ θερμὸν τριέων ἢ τὰ ὑγρά,
 ἢ προπῆ. ἀλλὰ ἢ τὰ σπλάγχνα τῆ
 δεῖ ἐς αἰτή. καὶ ἢ ξανθόν, ὡς τὸ ἦπαρ.
 ἢ πελιδνόν, ὡς ὁ σπλῆν. καὶ μύρι^η ἐπὶ
 σπλάγχνω πνίικτερος γένηται, ἐπὶ
 ἦπαρ μύρι^η, τὰ ἦπαρ^θ ὡροφάνεα.
 ἐπὶ ἢ σπλῆνι, τὰ σπλῆνός. ἕκασα δὲ
 τὰ τῷ ἄλλων ἕκασα. καὶ δὲ μηδενὸς
 φαίνεται, τῆς ὅλης ἰξίος ἐσίν. ἢ πά-
 θη διαφανῆ δὲ ἢ τὰ ἐν τοῖσι λυκο-
 τᾶσι ὀφθαλμοῖσι. μετώπε δὲ,
 πρὸς κροτάφοισι μᾶλλον τοῖσι λυ-
 κοῖσι φύσει, καὶ ἐπὶ σμικρῶ ἰκτέρῳ
 ἢ χροῖῃ μέζων * ἐπανθῆει. ὀκόσοισι
 μύρι^η οὐ μέλας ὀκτερο^θ, χροῖῃ με-
 λάγχλωρι, ῥιγώδεις, ἀδρανῆες,
 ὀκνῶ εἰκόντες, ἀθυμοί, βρομώδεις
 δεῖ τὴν ὄσμιν, πικρὸν δὲ τὴν γού-
 σιν, τὴν ἀναπνοὴν οὐκ εὐκολοί. γα-
 σεῖ διακνώδεις, διαχωρήματα
 πρᾶσοειδέα, ὑπομέλαινα, ξηρὰ, μό-
 λισ διαχωρῆματα, οὐρα κατὰ κορῆα
 ἐπὶ τὸ μελάντερον. ἀπεπθῆ, δὲ πῶσι,

unde id nomen Icerus tractum fue-
 rit, explicare: præterquam à terrestri-
 bus feris quadrupedibus; quas Græ-
 ci Ictidas, latini Viverras, aliqui Mar-
 tes uocant, & sylvestris mustela species est.
 His enim bestiis oculi huiuscemodi
 colore tincti sunt. Dux sunt huius-
 celabris species: aut enim in flauum
 croceumque uergit, simulque albi-
 cat & uirescit: aut in liuidum nigrum-
 que declinat, atque istorum quidem cau-
 sa est; ea uero & generabilis sunt. Aliqua
 enim bilis flaua est subtilis, perspicua,
 tenuioris generis: aut ad liuidum
 atrumque uergens: aliqua magis co-
 lore saturata, ut crocum, aut uitellum
 eiusdem speciei quis affirmet. Secun-
 da bilis species nigrioris coloris est,
 porri, aut isatidis herbæ colorem re-
 ferens, atra. Inter hæc extrema infi-
 nitæ sunt colorum uarietates. Penes
 autem calorem atque humiditates
 istarum mutatio fit. Quin etiam uiscera
 huiuscæ uarietatis causæ sunt: ut
 puta si flauum uiscus sit, quale jecur
 est: aut liuidum, qualis lienis. Quo-
 circa si ab aliquo uiscere arquatus ori-
 tur: à jecore quidem, jecoris notæ
 sunt: à liene, lienis: singulorumque,
 unde oritur, membrorum indicia ap-
 parent. Si nullius membri signa uide-
 antur, uniuersi habitus ægritudo est.
 Perspicua uerò sunt & ea, quæ in al-
 bissimis oculis cernuntur. Frontis
 autem secundum tempora, in corpo-
 ribus naturaliter albis præcipue, & in
 paruo arquato color exquisitior efflo-
 rescit. Porro quicumque nigro arquato
 laborant, in his ater color uiridi
 commixtus apparet, iidem frigent, im-
 becilli, desides, tristes, atque demissi
 animo sunt, tetrum odorem exhalant:
 gustatum amarum habent: spiritus
 non facile ducunt: in uentriculo mor-
 sum percipiunt: alui excrementa por-
 racea, subnigra, arida sunt, ægræque
 descendunt. Urina bene colorata
 est ad nigrius uergens: ad hæc cru-
 ditate laborant, cibum detestantur,

uigi-



uigilant, mærent, melancholia agitantur. At in albiore arquato color est ex albo & uiridi temperatus: mente sunt hilariiores: cibos accipere primo eos piget, sed ubi ceperunt, nauiter comedunt: facilius, quam priores, concoquunt: alui purgamenta alba sunt, arida, cretacea, lotium reddunt flauum, pallidum, crocinum. In utrisque corpus omne pruriginosum est calor in naribus exiguus quidem, sed mordax percipitur: nam biliosum distrahit laniatque. Gustatus amarorum quidem non amarus, quod mirum est, non tamen dulcis: dulcium uerò amarus. In ore nanque bilis in lingua residens, & prius cibis occurrens sensum hunc ludificatur ac decipit. Lingua enim bile suffusa cibos non sentit, atque antea quidem jejunij tempore bilis quiescit: neque iccirco lingua propter consuetudinem ægrè fert: uerum si cibis excitata bilis efferbuerit, ipsa cibis obiecta prius linguam mouet ac stimulat. Itaque siue amara sit esca, amari sensus est, siue dulcis, biliosi perceptio. Bilis enim sensio præuertit. Falluntur autem, qui amara uideri dulcia existimant. Res enim haud ita se habet: sed quoniam membrum amaro aliquo delibutum duntaxat propter morbi consuetudinem amaritatem non percipit, ideo speciem dulcescentis repræsentat. Verum in dulcibus & amaris cibarijs idem status reperitur. Fallacium igitur ciborum uelamentum bilis est. Vtique si nullius uisceris calefactio euidentis fuerit, plerunque sine noxa arquatus est, sed diuturnior. Si perseuerauerit, atque

ἀγρυπνοί, ἀθυμοί, μελαγχολώδεις. Ἐπι δὲ τὸ λευκότερον, χροίη μὲν * λευκόχλωρον, γνώμη δὲ φαυλότερον. σιτίων ἀρξασθαι μὲν ὀκνηροί, ἐμφαγεῖν δὲ ἐκ ἀγενεῖς, πένθει ῥηίδιοι τῷ πρῶτον μάλλον. διαχωρέσει λευκά, ξηρά, δριγλώδεα, οὐρέσει ξανθὰ, ὠχρὰ, κροκοειδέα. ἀμφοῖν δὲ τὸ ξύμπαν σῶμα κνησμώνδες, δέρμη ἀνάρινας, σμικρὴ μὲν, διακνώδης δὲ. ἀμύσον τὸ χολώδες, γεῦσις μὲν πικρῶν, οὐ πικρὴ τὸ θωῦμα, ἐμὲν * γλυκέων. γλυκῶν δὲ πικρῶν ἢ γὰρ ἐν τῷ σώματι χολὴ ἐκίχουσα τῇ γλώσῃ, ἔπι πρῶτον τῷ ἐδεσῶν ἐντυγχάνουσα, τὴν αἰσθησιν σοφίζε(ε) τὴν δὲ ἢ γὰρ γλώσσα ἀναποῦσα τὴν χολῆς τῆσδε, ἐκ ἐκείνων * αἰσθάνεται. καὶ τὸν μὲν πρῶτον τὸν τὸν ἀποσιτίης χρόνον, ἀδρεμέδ ἢ χολή. αἰσθάνεται ἢ γλώσσα τῷ ἡθει ἀχθεταί. ἢ δὲ ἀναζέση γεύμασι ἔπι πρῶτον τῶν ἐδεσῶν, τὴν γλώσσαν εἶδε κενεῖν. ἢ τε οὐ πικρὸν ἐπισίτιον, πικρῶν * αἰσθησιν. ἢν τε γλυκῶν, χολώδεος. φθάνει γὰρ ἢ αἰσθησιν τῆσ χολῆσ. ἀπάτη δὲ ξύνεσι τοῖσιν ἢ γδύμοισι τὰ πικρὰ γλυκῶ φαίνεσθαι. οὐ γὰρ οὕτως ἔχει. ἀλλ' ὅτι μὴ ἔπι τῷ ἰζαῖνον πικρῶ πικράζεται μόνος διὰ τὸ ξύνηθες τῆσ νοῦσος, φαντασίη γλυκάζοντ(ε) γίνεται. ἢ ὡυτὴ δὲ κατάσασις ἢ ἐν γλυκέσι, ἢ πικροῖσι γδύμασι. ἀπαπλῶν ἀρα γδύμάτων * προκάλυμμα ἢ χολή, ἢ μὲν οὐ μὴ ξύν πινὸς σπλαγχνου δερμασίη φανῆ, * ἀσινὲσ μὲν ὡς ἐπίπαν. μακρότερον δὲ. ἢ δὲ καὶ

Η 2 ἐγχεο-

* λευκόχλωρον

* γλυκέων

* αἰσθάνεται

* γεύμασι

* αἰσθησιν

* προκάλυμμα

* ἀσινὲσ



ἰσπιφλεγ.
ἐνὶ ὄρωπα.

ἐγχερόση, καὶ * Ἰπιφλεγμῆν
σπλάγχνον, * ἐς ὑδρωπαῖα πολλὰ
ἢ καχεξίῳ τελευτᾷ. πολλοὶ δὲ καὶ
δίχα ὑδρωπῶ ἐκτακέντες ὠλοντο.
ξυνηθες δὲ μερακίοισιν ἐνίοισι, καὶ τοῖσι
δὲ ἀσινέσιν ἐργον παιδίοισι δὲ οὐκ ἀήθες
πάγχυ. ἐπὶ πάντι δὲ ἀσφαλές.

ΠΕΡΙ ΚΑΧΕΞΙΗΣ.

Κεφάλ. 15.

Ἐμπάντων ὁμοῦ παθέων καχε-
ξίη τροπή, ἀπασαι γὰρ αἰνέσοι, τὸ δὲ
διπλοῦται. ἀτὰρ καὶ ἡ δὲ μένη ἀνδύθεν
τῶν ἄλλων φαρμάκων ἐπίδοσιν
ἔχουσα πολλὴν ἰλυώδηα, κατὰ
πρώπια γίνεται πάθος. καὶ ἔξισ
μὴ κακὴ γένηται ξυνηπάντων, καὶ
ἔμπιπμάτα πολλὰ, καὶ οὐνομαλῶ-
δε ξύμβολον. ἰσχνότης δὲ, ἢ * ὠχρός,
ἢ οἶδος, καὶ εἰ πῆτερον πρὸς καχεξίαν
ἀνά τὸ σῶμα. καχεξίη δὲ ἐνὸς με-
γάλης πάθεος ἰσχνότης, καὶ ἔξισ οὐνομαλῶ-
δε ξύμβολον. ἢ γὰρ ἀνδρώπια ἐστὶ πάντα εὐεξίη,
καὶ ἡ ἐσπέψιν, ἢ ἐσ ἀνάδοσιν αἵματός
γέννη. ἢ δὲ πᾶν ἔργον φύσις, ἐφ'
οἷσι εὐπνοία, εὐτνία, εὐχεοία, τὸ πρὸς
ἀενεὴν ὑγίην. ἢ δὲ ἐς ἀδενίῳ καχο-
χυμίας ἢ φύσις τροπῆς, τὸ δὲ ἐστὶν ἢ
καχεξίη. ἢ νοῦσος ἢ δὲ δυσαλθής, ἢ δὲ
μηνίσιον κακόν. καὶ γὰρ πᾶσι χροῶ
μακρῶ, καὶ ἐπὶ μὴ ἔξισ σῶμα
κακίη, καὶ ἐπὶ σπλάγχνω ἐνὶ ἀλ-
λά γὰρ τῶν ἀπάντων τροπῆς ἐσ πονη-
ρόν. Ἔτι γὰρ ἐν τῶν ἀπάντων τῶν δὲ νο-
σήματα, ἀφουκῶ γίγνη, ὑδρωπες, ἢ
φθίσεις, ἢ ξυνηθές. καὶ γὰρ πᾶσι

insuper uiscus inflammatione uexa-
tum fuerit : in aquam intercutem,
& malum corporis habitum ut plu-
rimum desinit. Plerique & sine aqua
intercute colliquati interiunt. Id ma-
lum adulescentulis iuuenibusque fa-
miliare est : quibus & minus officit.
Pueris autem, non admodum inusi-
tatum, non omnino tamen innoxium
est.

DE CACHEXIA, SIVE
malo corporis habitu.

Caput XVI.

Omniū simul uitiorum malus ha-
bitus conuersio est. Siquidem
morbis in multum tempus extrahitur.
Verum & ipse solus citra alios morbos
materiam *multum* lutulentam nactus,
à principio noua ægritudo gignitur.
Et habitus quidem malus simplex
communis est, & symptomata multa
comitantur : nomenque ipsum sig-
nificanter inditum est. Gracilitas ue-
rò, aut pallor, aut tumor, & si quid
aliud insit, ad tempus durans in cor-
pore exoritur. Malus autem habitus
unius ingentis affectus species est,
eique nomen tale fuit impositum.
Nam hominis ad omnia bonus habi-
tus est : & ad concoctionem, aut ad di-
stributionem sanguinis creatio, atque
omnis naturæ functio inde prouenit,
hæc consequitur facilis spiratio, uali-
dæ uires, floridus color, sed prima om-
nium sanitas. Quòd si ad imbecillita-
tem uitiosorum corporis humorum,
quæ Caco-chymia à Græcis dicitur,
natura conuersa fuerit : id iam ma-
lus habitus est, quem Græci Cache-
xiam nominant. Valetudo hæc uix sa-
nabilis est, malumque longissimum.
Longo enim tempore acquiritur, ne-
que ab uno corporis uitio, neque ab
uno uiscere prodiens. Sed omnium est
in deterius conuersio. Quocirca ab
hac enascentes morbi inuitabiles
sunt, ut puta aqua intercus aut phthi-
sis, aut *colligatio*. Siquidem &

mali



mali habitus causæ colliquationis germanæ sunt. Morbus autem in multum tempus extrahitur: *morbis iste parua quedam dysenteria est continua*: quibusdam morborum reuersiones eueniunt, bene utique cibos appetunt, tamen si multos ingerant, ac repleantur: crudi uerò, & non confecti digeruntur, quoniam alimenti elaboratio ad coctionem pertinens, debilis admodum atque inualida est. Labis huius causæ sunt & ab hæmorrhoidibus, quas uocant, uenis effluuij suppressio, & usitatorum uomitu reuentione, & ab exercitationibus quies, & sudorum exiccatio, & ab ingentibus laboribus otium; *quo tempore eorum singula, que aderant, nulla redeunt, grauitas corporis adest*: pallor subinde repetens, uenter flatibus refertus, oculi concavi, somni graues torporem afferentes. Verum enim uerò hæc si erraticæ, & non statis temporibus fiant; morbi inconstantiam infirmitatemque significant. Sin altius exactis radicibus maneat, neque desistere uelint, ingentis mali nuncia sunt. Stantibus pedes tibiaeque intumescunt, *inclinata femora decumbentibus*. Quòd si decubitus mutauerint, tumor in illa decumbentes deuoluitur: humidique aut frigidi in grauitatem fit circuitus. Nam si calor humidum euaporet, id uerò non effundatur, postea delabatur. Multos utique cibos appetunt, edaces admodum sunt, celerior coctione distributio fit crudiorum magis, quam inconcoctorum, nutritio non perficitur. Sed hoc inde prouenit, quoniam in toto alimentum a natura non concoquitur. In uentre enim atque in omni corpore caloris imbecillitas eadem est. Quapropter neque optimus, neque boni coloris sanguis procreatur. Cumque crudorum succorum omne corpus refertum fuerit, & ciborum appetentia euanescat, sic malo habitu usque ad uentriculum grassante, & affectu iam summam potentiam obtinente, tunc sanè tumidi fiunt,

καχεχίης προσφάσιες ἀδελφαὶ τῆς
 ξυνηξίᾳ ἔασι. ἡ δὲ νοῦστος μικρὴ
 δυσεντερία ξυνεχίης. νύστων ὑποστροφῶν
 ἐνίοισι. εὐσιπὴ μὲν γὰρ, καὶ τοὶ καὶ
 πρὸσφέραν) πολλά. ὠμῶν δὲ καὶ ἀπέπιων
 ἢ ἀνάδοσις. ἐργασίη γὰρ προσφῆς ἢ ἐς
 πέψιν ἀποροῦσιν. αἰπὴν δὲ καὶ αἰμορροϊδῶν
 ῥόσιν ἔπιχεσις, ἢ ἐμέτων ξυνηθῶν
 ἀπαλλαγὴ. γυμνασίων δὲ γυμνασίου
 ἀνασμός ἰδρωτῶν, καὶ μεγάλων πόνων
 ῥαθυμίη. εὐτε τῶν παρεόντων ἕκαστον,
 ὡς τὸ μηδὲν ἐκ ἐπιτρέφειν. βάρους τῆς
 σκηνῆς, ὡς ἄλλοτε καὶ ἀλλοτε, γαστῆρ
 φυσώδης, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, ὑπνοὶ βαρῆς,
 νωθροὶ. ἀλλὰ ταῦτα ἐρεμβώδεα μὲν γιγνώμενα
 νύστω ἀπίστω ἰσχυρῶν δὲ ῥιζώσασθαι μίμητι,
 μηδὲ ἀπέναι ἐθέλη, μεγάλα κακὰ ἐστὶ
 σύμβολα. ἐσαότες μὲν, οἰδαλέοι, πόδας
 τὲ καὶ κνήμας. κατὰ κλινοῦ μοι δὲ, ἢ
 κατὰ κλινοῦ μοι μῆρια. καὶ ἀναλλάξ
 τῶν κατὰ κλινοῦ μοι, ἰοῦ εἶδος ἐπὶ ἐκείνῃ
 ναφοιτῆ. ὑγρὰ τε ἢ ψυχρὰ ἐς τὸ βάρος
 πρὸς ἰσοδοσίν. καὶ γὰρ ἡ θερμὴ τὸ ὑγρὸν
 ἔξατμίζει, τὰ δὲ ἐκ ἀναχαιοῦ μύε, εἶτα
 κατὰ ῥρῆσι. εὐσιπὴ μὲν πολλῶν σίπων.
 ἀδελφάγοι καὶ ῥα. ἀνάδοσις ταχυτέρη
 πέψιος, ὠμοτέρων μᾶλλον ἢ ἀπέπιων.
 ἐξ ἀνέργασον δὲ ἢ * ἄρῆσι. ἀλλὰ τὸ
 δὲ ἐκ ἐν τῶ ὄλω πύστω) ὑπὸ τῆς φύσεως.
 ἢ γὰρ ἐν τῇ κοιλίῃ τοῦ θερμοῦ ἀρῆσι,
 καὶ ἐν τῶ σκηνεῖ ὁμοίη. τοιγαροῦν,
 ἐδὲ χησόν, ἐδὲ εὐχρῶσι αἴμα γίγνεσθαι,
 καὶ ἐπὶ ἢ * ὠμῶν ὅλον τὸ σῶμα
 πληθῆσθαι, καὶ ἢ ἐς τὰ σίπα ὄρεξις οἴχησθαι
 τῆς καχεχίης ὡς μεσοφισομάχου
 νεμομῆς, καὶ τῆς πάθους κορυφῶν
 ἰσχυρῶσ ἢ δὴ, οἰδαλέοι μὲν,



ἀδρανέες ὅ, καὶ ἐς πᾶσαν πρῆξιν ἀθυ-
 μοι. κοιλίη ὅ ξηροτέρα. ἀχολατα
 πολλά, καὶ λυκαὶ, τσηχέα, καὶ ὠμά
 διαχωρέσει. τὸ σκῆνος αὐτοῖ, ἀνίδρω-
 τες, κνησμώδεις, ὕπνος ἐδραῖος μὲν
 ἐδάμη, κεκλιμῆν ὅ νυσαγμός.
 βραδύπνοοι, σφυγμοὶ ἀμαυροί, ἀ-
 σθενέες, πυκνοί. πυκνότατοι ὅ ἐπὶ πᾶσι
 καὶ σμικρῇ πρῆξει. ἄσμα ὅ ἐπὶ τοῖς δε-
 ῖ ἢ ἀναπνοῇ. φλέβες ὅ ἐπὶ τοῖσι κροτά-
 φοισι * ἐπηρεμά, ἀσαρκίη τῆς πέ-
 ρει. ἀτὰρ καὶ ὅ ἐπὶ τοῖσι καρποῖσι πολὺ
 μέζονες διοιδέσσαι, μελάγχρωρον
 τὸ αἷμα. ὅ ἐπὶ τοῖς δε φθίσις, ἢ συνήξις.
 ἀναπνοῇ, ἀνά σάρεκα ὕδρωπα, ἢ πνα
 ἀσκήτην ἢ γαγεκαὶ τῆς δὲ ἀφυκτος ἢ
 χύνα. φέρεσι ὅ ἡλικίαι, γῆρας, καὶ ἐκ
 διποδιδρῆσσαι. παῖδες ταχὺ παθεῖν
 τε εὐκολοί, καὶ ἀπαλλαγῶν ῥῆνίτε-
 ροι. ἀκμάζοντες ἐπάγχυ μὲν πα-
 θεῖν ἔτι μοι. ἐπάμπαν δὲ ἀπαλλα-
 γῶν εὐκολοί. ὥρη ὅ ἐμὴ φέρεσι τ-
 δε, ἐδὲ ἐς μίλω τελευτᾷ. ἀλλὰ φθι-
 νόπωρον μὲν κύει, χαμῶν πθηνεῖ, ἔαρ
 ὅ ἐς κορυφῶν τελεσφορεῖ, θέρους δὲ
 κτείνει.

* ἐπηρεμά.

imbecilli, & ad omne opus abjecto
 prostratoque animo. Alius siccior est,
 plerunque recrementa bile priuata,
 alba, aspera, crudaque deijciunt: cor-
 pore sqallent, sudore carentes & pruri-
 ginosi. Somnus nequaquam firmus
 est, sed decumbentes conuiuent: tarde
 spiritum ducunt: arteriarum motus
 languidi sunt, debiles, frequentes: post
 quamlibet autem uel exiguam adio-
 nem frequentissimi fiunt. Post hæc re-
 spiratio cum anhelitu fit: uenæ in-
 temporibus elatæ apparent: partes
 enim, quæ circumjacent, emarcuerunt.
 Verum & in brachialibus longe gran-
 diores inflatione uenæ redditæ sunt:
 sanguis atro colore uiridi admixto in-
 fectus est. Ab his phthisis, aut colli-
 quatio hydropem anasarca uocatam,
 aut ascitem adducit: istorumque pro-
 creatio inuitabilis est. Ætates hujus
 morbi feraces sunt inprimis senectus,
 neque mortem euadunt. Pueri & cele-
 riter pati idonei sunt, & liberantur fa-
 cilis. Florentes ætate haud ita ualde
 huic malo patent, non tamen penitus
 facilè sanantur. Tempus anni non
 unum hanc fert ægritudinem, neque
 uno tempore finitur, uerum autum-
 nus concipit, hyems alit, uer ad ulti-
 mam uehementiam perducit, æstas
 uerò interficit.

A R E T Æ I



ARETAEI ARETAIY

CAPPADOCIS DE ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ

signis & causis diuturnorum morborum

χρονίων παθών σημειωτικόν βιβλίον δεύτερον.

LIBER II.

De Hydrope, Caput.	I.	Περὶ ὕδρωπος, κεφαλ.	α.
De Diabete, cap.	II.	Περὶ διαβήτης, κεφ.	β.
De affectibus renum, cap.	III.	Περὶ τῶν κατὰ τὰς νεφρὰς παθῶν, γ.	γ.
De vitij vesicae, cap.	IV.	Περὶ τῶν ἐν κύστι, κεφ.	δ.
De feminis effluvio, cap.	V.	Περὶ γονορροίας, κεφ.	ε.
De stomachi vitij, cap.	VI.	Περὶ στομαχικῶν, κεφ.	ς.
De ventris affectu, cap.	VII.	Περὶ κοιλίης διαθέσεως, κεφ.	ζ.
De dolore intestini coli, cap.	VIII.	Περὶ κωλικῶν, κεφ.	η.
De difficultate intestinorum, cap.	IX.	Περὶ δυσεντερίας, κεφ.	θ.
De laxitate intestinorum, cap.	X.	Περὶ λειεντερίης, κεφ.	ι.
De affectibus uteri, cap.	XI.	Περὶ ὕστερικῶν, κεφ.	ια.
De articularū & coxædicis morbis.	XII.	Περὶ ἀρθρίτιδος καὶ ἰχιάδος, κεφ.	ιβ.
De Elephantiasi, cap.	XIII.	Περὶ ἐλεφαντοπάσιος, κεφ.	ιγ.

DE HYDROPE, hoc est, aqua inter cutem.

ΠΕΡΙ ΎΔΡΩΠΟΣ.

Caput I.

Κεφαλ. α.

Qua inter cutem, quam Graeci Hydrope uocant, injucundum aspectu uitium est, & toleratu difficile: ab ipso enim perpauci liberantur: idque felicitate quadam, ac Deorum potius, quam artis auxilio. Majora enim omnia uitia soli Deo medicantur. Nam aut in uiscere primario morbus delitescens totum in malum habitum conuertit, aut omne corpus ingruente pestilentia in malum succum uiscera permutauit. Quando sibi utraque uicissim ad perniciem suffragantur: nullaque est pars noxa carens, quae uel modicam naturae operam afferre possit. Est autem ad humectationem fluxio frigida, crassa, qualis est nebulæ uniuerso: aut conuersio ab humida & frigida causa in tantum habitum hominem permutante.

Ὑδρως ἀτερεπὲς μὲν ἐστὶν πάθος, χαλεπὸν δὲ παθεῖν. διαδιδρῆσκει γὰρ τόσδε πάγχυ παῦροι ὡς εὐτυχίης, καὶ θεῶν μᾶλλον ἢ τέχνης. τὰ γὰρ μέζονα πάντα ἰώνται μὲνοι θεοί. ἢ γὰρ ἐν σπλάγχνω καρδίῳ νόσημα φωλεῦσαν ἔτρεψε εἰς καχεξίαν τὸ πᾶν, ἢ τὸ ξύμπαν σκλεῖος λοιμῶν κατὰρξάντος, ἐς κακοχυμίνην ἤμειψε τὰ σπλάγχνα. εὐτε ἄλλοι σι ἄμφω ἐς τὸ κακὸν ξυνπιμωρέει, ἀσινὲς δὲ δὲν, δὲ οὐ περὶ καὶ σμικρῆ τῆ φύσει γίνουσι ἀνὸν σπικουρέει. ἐστὶ δὲ ἐς ἐπομβρίῳ ρεῦμα ψυχρὸν, παχὺ, ὀκοῖον ἢ ὀμίχλη τῷ πᾶσι ἢ πρὸς τὴν ὑγρῆς καὶ ψυχρῆς αἰτίας, ἐς τοίνυν δὲ ἐξ ἐτεροίσεως τὴν ἀνδρῶπον.

εἰ γὰρ



ε γδ τὸ ἐν τῇ κοιλίῃ τῇ κάτω ἀλλόμε-
 νον ὑγρὸν ὕδρωπα καλεομένη. ἐπεὶ εἶ-
 τὸ πάθος τῆ δέξι. ἀλλ' ὅτε ξυμπα-
 ρουαρίει τῇ νέσῳ ὁ ὄγκος, τὸ οἶδος, ἢ
 χροίη, ἢ δέξι τὸ ὕδωρ ξυντήκησα ἐξίς,
 ὕδρωψ (ἔστι καλεε). κὴν γδ ἐκρε-
 γῆ κοτὲ τὸ ὕδωρ αὐτομάτως ἐξῶ, ἢ
 ταμίον πρὸ τῆσὶ χόνδριον ἐκχέει, ἐφ'
 ἔδρησ ἔασι οἱ ὕδρωπώδεες. ἢ μὲν οὖν
 πρῶπιση αἰτή καχεξίη. ἰδέαι ἢ πλεῦ-
 ναι, * ἢς ἀτρε ὄνομα ἕτερον καὶ ἕτερον.
 * ἔν.
 ἢν μὲν γδ * ἢ παρέγχυσις ἐνυγρος ἐν
 τῇσι λαγόνεσι ἐμπλήη, καὶ * ἀπὸ τῆσὶ πρῆ-
 * ἢ μπλήη.
 * ἢ πδ.
 σιος ἐν τοῖσι πατάγοισι διοκὴ πως
 τυμπάνω, τυμπανίης κικλήσκε. ἢ
 ἢ ὕδωρ ἀλιεῖς τὸ ἀελίοναμον ἐμπε-
 ριέχη, ἐμπλήη ἢ τῶ ὑγρῶ τα ἐνίερα,
 * ἀσκήτης.
 καλεομένη ἐπίκλησιν * ἀσκήτην. ἢν ἢ αἰ-
 λαγόνες μὲν μηδὲν τρέων ἰχωσι, τὸ
 πᾶν ἢ παρὰ δαίη σκῆνος, ἢν μὲν τῆ
 λυκῶ φλέγματι καὶ παχείη καὶ ψυ-
 γρῶ, φλεγματίης καλεε). ἢ δέξι
 χυμὸν αἰμάλωπα, ὕδατὸ δέξα λε-
 πτὸν συντακῶσι αἰσάρεκες, ἀνάσάρε-
 κα γίγνε) ὕδρωψ. κακὴ μὲν ἢ ἐκάσθε
 ξύσασις. ε κακίων ἢ πολλόν π ἢ τῶ
 δε τῆμιξίη. τῶ ἢ γδ ἀμφὶ τῶσὶ λα-
 γόνας εἰς ἐνὶ τῶ ἀνά τὸ πᾶν ξυμβῆ
 (γέ) κοτὲ χαλεπῶτατος, ἢ ὁ τυμ-
 πανίας τῶ ἀνάσάρεκα μιχθῆ. καὶ γδ
 ἰδίη τῶ μὲν ἀμφὶ τῶσὶ λαγόνας, ἀ-
 σκήτης τυμπανίας χερείων. τῶ ἢ ὄλε
 τῶ σκῆνεός ὁ λυκοφλεγματίας τῶ ἀ-
 νασάρεκα μείων, ἐπεικῆς μὲν ὦν ἐν
 * ἀπελπίσοι, ἢ ὁμοίως ξυση τῶ
 μείωνι. κακίων δέ ἢ εἰς τῶ μεί-
 νων ἐνὶ τῶ μεζόνων ἐς ταὐτὸ ξυμ-
 βῆ. ἢ δέξι ἐς ἀκρας ἢ μίξις ἀμ-
 ἢ κηται δύοῖν μεγάλων, μεζόν κα-

Neque enim in inferiori uentre fluu-
 ans humidum, Hydropa nuncupa-
 mus: quandoquidem neque ibi uiti-
 um est: sed cum morbum consequi-
 tur tumor, inflatio, coloris fæditas;
 iste in aquam habitus colliquefcens
 hydrops & est, & appellatur. Nam
 tametsi nonnunquam foras sponte
 aqua prorumpit, aut aliquis præcor-
 dia rescindens effundit; adhuc in sede
 sua permanent hydropici. Princeps
 itaque causa malus habitus est, species
 autem plures. Verum & ejus nomen
 aliud, atque aliud. Nam si sit humida
 suffusio, quæ in ilibus fluitet, & præ
 inflatione, cum uerberantur, tympa-
 num quodammodo referant; Tym-
 panias nominatur: at si aqua copio-
 sa in peritonæo continetur, natantque
 in humore intestina, Ascitem eam
 cognominarunt. Sin autem illa nihil
 istorum habeant, sed omne corpus
 intumescat: si ex alba pituita crassa, &
 frigida; Phlegmatias ei nomen est. Si
 in humorem sanguineum, aquosum,
 tenuem, carnes liquatæ fuerint, Hy-
 drops anasarca generatur. Praua qui-
 dem est harum singularum constitu-
 tio, peior autem multò ipsarum per-
 mixtio. Nam earum, quæ in ilibus fi-
 unt, una uni earum, quæ totum cor-
 pus inflant, sociari nonnunquam con-
 suevit. Difficillimus est autem tym-
 panias cum Anasarca uocato copu-
 latus. Ex occupantibus enim illa, tym-
 panias ascite improbius est: ex infe-
 stantibus uerò totum corpus, leuco-
 phlegmatias, quam anasarca benigni-
 or. Mitis quidem ut in desperatis mor-
 bus est, si minor species cum minori
 pariter conjungatur: peior uerò, si
 aliqua ex minoribus cum altera ex
 majoribus admisceatur. Quòd si
 duarum majorum mixtio exacte
 facta fuerit, grauius inde
 malum



malum exoritur. Notæ autem maximæ sunt, & visu, & tactu, & auditu facillimæ. In ascite nanque in ilibus tumorem, in pedibus inflationem uiderelicet: facies, brachia, & reliqua gracilia cernuntur, intumescunt testes, præputium, & totus colis, ob inæqualitatem tumoris tortuosus est. Tangitò uerò, & aliquam in partem manum imprimens intrò moderatè pellito. Ad alias enim partes humiditas transfluit. Verùm etiam in corporis ad alterutrum latus conuersionibus humor in locum decliuem & tumorem & fluctuationem facit fluctuantisque liquoris sonitus exauditur. Quin etiam sicuti digitum impeperis, locus cauus efficitur, & multum temporis cauus perseuerat. Hæc utique ascitem signa declarant. Tympanias autem ultra tumoris spectaculum, etiam auditu sonorus est: nam ad palmæ percussum abdomen sonum reddit: neque ad corporis conuersionem spiritus locum mutat. Et si enim locus ambiens aliquorsum inclinatur, spiritus tamen æqualis supra & infra ubique permanet. Cæterùm si in nebulam & aquam spiritus uertatur, (nam ascites ex tympania gignitur) si non perfectè mutatus aliquando fuerit, ex dimidio factus in uentre fluitat. Cæterùm anasarca & leucophlegmatias ilia inania occupant: tumidam faciem & brachia reddunt, & quæcunque in alijs uacua sunt, in huiusmodi ægrogis opplentur. Quandoquidem in leucophlegmatia alba pituita, frigida & crassa redundat: hac omne corpus impletur: facies, collum, brachiaque tumescunt: abdomenque ex inflammatione crassescit. Mammæ quoque in tumorem excitantur, illis scilicet, qui iuuenes robusti in ætatis

κόν τ' ἔγγονον. σημεῖα δὲ μέγιστα καὶ
 ῥήιστα ἰδέειν καὶ θιγέειν καὶ εἰσακῆσαι
 ἐπὶ μὲν τῷ ἀσκήτι ἰδέειν ὄγκον ἐν τῆσι
 λαγῶσι, οἶδος ἀμφὶ τῷ πόδε. πρὸς
 σῶπα δὲ καὶ βραχίονες καὶ τὰ ἄλλα ἰχ-
 νᾶ, οἰδέεισι ὄρχιές τε καὶ * πόσθη, καὶ ὁ
 ξύμπας καυλὸς σκολιὸς δὲ ἀνίσσεται
 οἶδος. εἰ γὰρ ἡδὲ ἐρείσαντα πητὴν
 χεῖρα καταλόγον εἰσωθεῖν. τὸ γὰρ ὑ-
 γρὸν, ἐπὶ τὰ ἄλλα μέρεα μελαρρέει. ἀ-
 λαξ καὶ ἐν τῆσι τῶ ἀνθρώπῳ τῆδε ἢ τῆδε
 ἐπιπροφῆσι, ἐς τὰς μελακλίσιας τὸ ὑ-
 γρὸν, ὄγκον τὲ καὶ κλύδωνα * ποιεῖ,
 εἰσακῆεν τὲ καὶ ἔκ κλύδωνος. ἄλλα κῆν
 πητὸν δίακτυλον ἐρείσης, ὁ χῶρος
 γίγνεται κοῖλος, ἐς χῶρον τε πελλῶ
 μίμνει κοῖλος. τῶδε μὲν τῷ ἀσκήτι.
 τυμπανίας δὲ πρὸς τῆ δὲ ὄγκου θέη καὶ
 ἀκῆσαι ἐπὶ δρονέων. ἡ γὰρ πατά-
 ξης τῆ χειρὶ, τὸ ἐπιγάστριον δο-
 νέει, εἰδὲ μεταχωρεῖ τὸ πνεῦμα
 ἐν τῆσι ἐπιπροφῆσι. πνεῦμα γὰρ,
 κῆν μελακλιθῆ τὸ ἀμπεχον ἀνωτε καὶ
 κάτω ἴσον πάντη μὲν. ἡ δὲ ἐς ὀμι-
 χλην καὶ ὕδωρ τρέπῃ τὸ πνεῦμα. καὶ
 (γὰρ) ἀσκήτις δὲ τὸ τυμπανίον. ἀμείβε-
 μὲν, ἢν μὲν ἐς ἴελος τεραπῆ καθε, ἢ κίτε-
 λῆς * μελαρρέων. ὁ δὲ ἀνασάρκα ἢ δὲ
 λυκῆ * φλέγματις, τὰς μὲν λαγῶ-
 νας ἰχθῶσι κενεὰς, οἰδῆ αἰετοῦ εἰσαι καὶ
 πρὸς σῶπα καὶ βραχίονας. ἀτὰρ ἡ δὲ ὀ-
 κόσα τοῖσι ἄλλοισι κενεὰ, τοῖς δὲ γίγ-
 νεται πλήρεα. φλέγμα μὲν γὰρ λυ-
 κὸν, ἐπὶ τῷ λυκῷ φλεγματίᾳ συνί-
 σαται, ψυχρόν τε καὶ παχὺ τῶ δὲ ἐμπί-
 πλαται τὸ πᾶν, οἰδαίνει δὲ τὸ πρὸς σῶ-
 πον, αὐχὴν τε καὶ βραχίονες. παχὺ δὲ
 τὸ ἐπιγάστριον δὲ τῶ οἰδέος. μαζοῖ
 δὲ ἐς ὄγκον αἴρονται, ὀκόσοι νέοι ἀκμὴν
 ὄντες

καὶ πόσθη

καὶ κλύδωνος

ἰσὺς κροῖου

καὶ μελαρρέων

καὶ φλέγματις



ὅντες ἐν εὐτυχίῃ τῆλικίης. ἐπὶ τῷ ἀ-
 νασάρκα, πικρῶν τῶν σαρκῶς ἐς χυ-
 μὸν * σαρκωδέα, ἰχωρτὲ αἰμαλω-
 πος, ὁκοῖος ῥέει διὰ τὸ ἐντέρων ἕλκεσι.
 τοῖσδε καὶ ἐπὶ θλάσμασι διὰ τὸ βάρεος
 ἐμπεσόντ', ἢν τὰ μὲν πᾶσι ἐπιπολὺ ὁ
 χυμὸς ἐκρέσῃ. ἢ τῷ * τῷ δυοῖν ἐπιμίσθῃ,
 ἀμφοῖν ἴχει τὰ σπιμῆια. ἔμπασιν δὲ
 ὁμῶς ἐξύνεσι, ὠχρος, δύσπνοια, βῆξι, ἀλ-
 λοτε καὶ ἄλλοτε νωθῆες, ὄκνος πελὺς,
 ἀπόστοι. ἢν τῷ πρὸς αἰσῶν κῆν βρα-
 χύ καὶ ἀφυσον, φουσώδες, διατάσεις
 ὡς διὰ πλησμονῆς. ἀνικμοι. διὸ ἐξ ἐ-
 πίληροῖσι ἰκμαλέοι λευκοί, γυναικῶ
 δέες. οἱ τῷ ἀνασάρκα, μελάγχλωροι,
 μελανόφλεβες. ἀσκήτησι μὲν καὶ τυμ-
 πανήσι, ἐπιφανέες καὶ εὐπρόσωποι καὶ
 καρποῖσι καὶ ἐπιγαστρίῳ. ἐπὶ τῷ τοῖσι
 ἀνασάρκα καὶ τῷ φλεγματῇ * οἰδεῖ
 ἀπὸ τῶν κρύπεται, ὑπνοὶ βάρεες, νω-
 θροὶ, σμικροί, ἀψυχίη, σμικρολογία
 φιλοζωίη. καρτερίη ἐκ ἀπ' εὐθυμίας
 καὶ εὐελπίτης, ὅπως τοῖσι ἐν εὐτυχίῃ,
 ἀλλ' ἐξ ἀνίεξ ἔπαθεος, ἐπὶ τῷ φα-
 λὸν τὴν αἰτίαν θεωμάσαι. τῷ μέγα,
 (καὶ) ἐπὶ μὲν γε ἄλλοισι ἐπάμπαν ὁ-
 λερῶσι, οἱ νοσέοντες ἀθυμοί, κατ-
 φέες, ἐράται. ἔθανάτα. ἐπὶ τῷ τοῖσι ἐ-
 νελπίδες καὶ φιλόζωοι γίγνεται. ἀμ-
 φω τῷ ἐναντία τίλειται ἀνέσοι. γίγ-
 νεται ὑδρωψὶ καὶ ἐξαπίνης καὶ ἐπ' ἀθρόῃ
 ψυχροπόσῃ, ἢν τὸ διψῶς χανθὸν
 πολὺ ψυχρὸν ἐγκένη ὑδρωψ, εἴτα τὸ ὑ-
 γρὸν ἐς ἀελίοναμον ἐνεχθῆ. δι' ἃ τῷ
 σι κοιλίῃσι τὸ ἐμφυτὸν θερμὸν κατε-
 ψύχθη, ἐπὶ τῷ εἰς τὸς κενεῶνας σα-
 γόνες ἐκρέουσι, αἱ παρ' ὧν εἰς
 διαπνοὴν ἐξήνερούμηναι διαφοροῦνται.
 τὸ δεοῦ εἰ γίγνεται, ῥηίτερον ἢ τῷ δε

prospera fortuna consistunt. At in hy-
 drope anasarca uocato carnis liqua-
 mentum fit in succum speciem car-
 nis referentem: saniesque cruenta,
 qualis ab intestinorum ulceribus ema-
 nat. Talis uero & a membris aliquo
 graui, quod super incidit, contulis,
Si quam partem multum secuerit, humor
 effunditur. Ex duabus quidem specie-
 bus per mixtio ambarum indicia ob-
 tinebit. Omnibus uero simul inest
 pallor, spirationis difficultas, tussis,
 diuersis temporibus segnes sunt: pi-
 gritia multa, a cibo alienatio, quod si
 aliquid assumant quamuis modicum,
 & flatu carens; nihilominus ualde in-
 flantur: distentiones patiuntur, qua-
 les ex saturitate fiunt: citra madorem
 eorum corpus est: iccirco neque in
 balneis sudore madescunt, praeterea
 albidii sunt, & effeminati. Anasarca
 laborantes colore ex atro, uiridique
 permixto infecti sunt: obscurasque
 & nigras uenas habent. In ascite atque
 tympania conspicuae, atque ad mo-
 dum euidenter sunt in brachialibus
 atque in abdomine. In anasarca uero
 atque phlegmatia tumore omnia de-
 litescunt: somni sunt graues, torpen-
 tes, breues, animae deliquium, circa
 minima quaeque sollicitudo, uiuendi
 cupiditas. Tolerantia non ex animi
 alacritate, ac bona spe, ut in ijs est, qui
 prospera fortuna utuntur: sed ex ipsa
 morbi natura, neque causa dici potest.
 sed mirari tantum id licet, quod me-
 hercule magnum est. Nanque in alijs
 haud omnino perniciosis affectibus
 aegrotantes abjecto sunt animo, tri-
 stes, mortis amatores; in his uero &
 benesperant, & uitae cupidi sunt. Am-
 bo haec contraria morbi efficiunt.
 Aqua inter cutem nonnunquam a
 copioso frigidae potu continuo pro-
 uenit, cum praeter nimiam siti ad saturita-
 tem quispiam multam aquam gelidam
 ingurgitauerit, postea humidum in pe-
 ritonaeum delatum sit, atque inde in uen-
 tribus insitus calor refrigeratus fuerit.
 Deinde in ilia guttae effluunt, quae pri-
 us in aere uersae per transpirationem dige-
 rebantur. Id igitur si incidit, facilius est

* νεκρὸς ἰδία.

* τὸν οἶνον.

* πηλοῦ.

* οἰδεῖ.



huius morbi curatio, antequam uiscus aliquod, aut totus homo affectus sit. Cæterum & uentosus cibus, & cruditas, & buprestes aquam inter cutē pepererūt. Est hæc omnibus communis calamitas uiris, mulieribus, cuicumq; ætati; præterquam quod alij in aliã speciem sunt propensiores. In uocatam anasarcam, & leucophlegmatia pueri, luvenes autem ad consistentem usque ætatē inundationi illiū obnoxij sunt. At senes omnibus quidem generibus sunt expositi, cum inopes sint caloris; frigida enim senectus est. Verum ad humoris multitudinem contrahendam apti non sunt. Ipsis igitur tympanias accidere consuevit. Omnes quidem species prauæ: hydrops enim morborum omnium uitium est: sed inter ipsas leucophlegmatias mitior habetur: nam multæ, & uariæ sunt eius tollendæ prosperæ occasiones, sudoris, aut lotij excretionē, aut alui nonnunquam in huiusmodi ægrotantibus copioso effluuio, jam abeunte aquæ inter cutem habitu. Difficilis autem tympanias est: adhuc tympania difficilior anasarca. Oportet enim Medicum hoc in morbo totum hominem permutare. Quod per Iouem neque Dijs ipsis facile fuerit. Cæterum nonnunquam & exigua in parte homo aquam inter cutem patitur: ut secundū caput in eo morbo, qui Hydrocephalus nuncupatur, aut in pulmone solo, aut jecinore, aut liene, aut in mulierū utero, & cæteris hæc species sanabilior. Nam si ejus ostiolum à priori conclusionē hiare cæperit: humorem quidem si habeat, effundit, si spiritum, efflat. Quod si uterus anasarca laboret, plurimū tota mulier aquam inter cutem patitur. Alia quædam hydrofici morbi species talis agnoscitur: in ea uesiculæ quædam pusillæ, crebræ, humoris plenæ in loco, ubi Ascites fieri solet; excitantur. Cæterum, quod humore multo refertæ sint; illud indicio est. Nam si abdomine perforato, parum admodum humoris effundas, intus uesica ocluditur: at si instrumentum impuleris, iterum effluit. Hæc utique aquæ inter cutem species haud leuis est:

ἰσῆς, πρὶν τιτῶν ἀπλαγχνῶν, ἢ ἕλον τὸν ἀνδρῶπον παθεῖν. ἀτὰρ ἢ τῷ ἔδεσ-
μα φουσῶδες, ἢ ἀπεψία, ἢ βόψησις.
ἔτερον ὑδρωπας, ἐστὶ τὸ ξυγόν πάντων
τὸ κακόν, ἀνδρῶν, γυναικῶν, ἢλικίης
πάσης, ὁ κόσον ἄλλοι ἐς ἄλλο εἶδος ἔ-
ασι ὄρριοι, ἀνάσαρκα παῖδες ἢ δὲ ἔ-
λδοκῆ φλέγματος. νεοὶ δὲ μέγιστοι ἀκ-
μῆς, οἱ κατὰ λαγόνους πλήσμιον. γέ-
ροντες μὲν πάντα παθεῖν ἔτι μοι, δπό-
θερμοι. ψυχρὸν γὰρ τὸ γήρας. ἀλλ' ἐς
ὑγρῶ πλῆθος ἔασι ἀνάπιοι. τοῖς δὲ οὐδὲ
τυμπανίης ξυνηθῆς. ἀπαῖα μὲν οὐδὲ
παντοῦ τὰ εἶδη τετέστι. ὑδρωψ γὰρ
πάντων τῶν νοσημάτων κακόν. ἀλλὰ
τετέων λυκοφλεγματος μὲν ἐπι-
θέσπερος. πολλὴ γὰρ ἢ ποικιλῆ ἐπιτεθε-
ῖ ἢ δὲ τυχή. ἰδρωτῶ ἢ ἔρων ἢ κοιλίης
κοίτη ἐπὶ * αὐτέοις κατέρραγη, λυομέ-
νης ἢ δὲ τῷ ὑδρωπος ἐξίος. χαλεπὴ
δὲ τυμπανίης, ἢ τετέ ὁ ἀνασάρκα
μᾶλλον. τὸν δὲ ἰητρὸν ἐν τῷδε παθεῖ ὁ-
λον γρητὸν ἀνδρῶπον ἀλλάξαι. τὸ δὲ
μὲν τι, ἐδὲ θεοῖσι ρηίτερον. * ὑδερῖα δὲ
ἢ ἐν σμικρῶ κοίτη ἀνδρῶπος, ἢ κεφα-
λήν ἐπὶ ὑδρωκεφάλῳ, ἢ πνεύμονα
μῆνον, ἢ * ἢ παρ. ἢ ἀπληνα ἢ ἐπὶ γυ-
ναικῶν ὑσέρη. ἢ τῶν ἄλλων ἢ δὲ εὐαλ-
θεσέρη. ἢν γὰρ το σάμιον ἀνὴρ ἐκ τῷ πρό-
δεν μύσιος, ὑγρὸν μὲν εἰ ἔχοι, ἐκχέει
ἔξω. ἢν δὲ πνεύμα ἐξεφουσηθῆ τὸ δὲ. ἢ
δὲ ἢ ἀνασάρκα ἢ ὑσέρη παθη, ὡς ἐπι-
παν ὅλη ἢ ἀνδρῶπος ὑδερῖα. ἰδὲ ἢ τις
ἔτερον ὑδρωπος ἢ δὲ γινώσκε, κύστες
σμικραὶ, συχναὶ, πληρες ὑγρῶ, ἐγ-
κέον τῷ χωρίῳ, ἐνθα ὁ ἀσπιτης ξυνί-
σα. ἀτὰρ ἢν ἐμπλέωσι τῷ πολλῷ ὑ-
γρῷ. τέκμαρ δὲ. ἢν γὰρ τετένηας τὸ ἐ-
πιγαστριον ἐκχέει ἐπὶ βραχίῃ φορῆ
τοῦ

* αὐτίαν.

* ὑδερῖα δ.

* ἀπλη.



Ξύγρᾶ, ἐνδοθεν ἀν' ἐπέφραξεν ἡ κύ-
 ρις, κῆν τὸ ὄργανον διώση, αὐθις
 ἐκρέει. τὸ δ' ἐμύτοι τὸ εἶδιον ἐκ ἐνη-
 θες. πόθεν γὰρ ἀν' ἐκπέσωσι αἱ κύστες,
 ὁδὸς ἐκ εὐποροῦ. λόγος ὅ μετεξε-
 τέροισι ὅτι ἠκόν κοτε δι' ἐντέρων τοι-
 αῖδε κύστιες. ἐγὼ δ' ἐκ ὠπώπα, διὰ
 τὸ δ' ἐνὺν ἐδ' ἐν γράφω. ἐδ' ἐ* γὰρ ἴππ
 αὐτέων ὅτι λέξω. εἴτε γὰρ ἐκ τοῦ κώ-
 λα, ἢ τ' γαστρὸς ἢ φροῆ, τίς ὁ τρόπος
 τῆς ξυστάσεως; ὁδὸς γὰρ ἐς ἐξοδὸν ἀ-
 πάντων δι' ἐδρῆς εὐροῆς. ἢ δ' ἐκ αὐτοῦ
 ὑγρᾶ τ' ἐν λαγόνι ξυλλογῆς, ἀπιστος
 ἢ τ' ἐκ ἐντέρων ῥαγῆ. ἐ γὰρ ἀσινὲς οὐδ'
 αὐτὴν ἔθρον τρωθὲν ἐντέρον.

τὸ κρι.

unde enim id genus uesiculæ erupe-
 rint, uia haud facile reperitur. Alij
 nanque affirmant, huiusmodi ampul-
 las per intestina transiisse. Ego uerò
 id nunquam uidi: iccirco, neque nunc
 scribendo affirmo. *Neque enim de his,*
quod dicam habeo. Nam siue ex colo siue ex
uentre proficiantur, quis coagmentatio-
nis modus sit? Iter enim ad omnium
 excretionem per sedem lubricum, ac
 patens est. At ipsius humoris in ili-
 bus collecti per intestinorum ruptu-
 ram egressio credi non potest: neque
 enim innoxium, neq; citra perniciem
 intestini uulnus est.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΗΤΕΩ.

DE DIABETE SIVE
urinæ profluuiō.


Κεφάλ. β.

Caput II.

Θωμῶν τὸ διαβήτην πάθος, ἐ
 κάρτα ξυνηθὲς ἀνθρώποισι. σαρκῶν
 καὶ μελέων ἐς οὐρὸν ἢ ξυτηξισὺ γρηκοῖ
 ψυχρῆ, ὅπως ἐν ὑδρωψίαι τῆ. ὁ δ' ἐ
 δ' ἐξυνηθῆς, νεφροῖ τε καὶ κύστις. ἐ
 γὰρ διαλείπεισι ἐρέοντες. ἀλλὰ ὅπως
 περὶ δ' ἐ* ἀφ' ἐξιοῦ ὄχετ' ἄπαιστος
 ἢ φροῆ, χροῖν ἢ μὲν ἢ τ' νῆσσε φυη, μα-
 κρῶ κυσικεταί χροῖνω. βραχυβίος δ' ἐ
 ἀνθρώπος, μὲν ἢ κατὰ σασίελεωθῆ.
 ὁξείη γὰρ ἢ πικρῶν, ταχύς ὅ θάνα-
 τός ποτέ, καὶ εἰς αἰχρὸς καὶ ἴππινος,
 διψὸς ἀκράτες. πολυποσὶ ἀνισόμε-
 τρος ἐργίσι πολλοῖσι. πλεῖον γὰρ ἐκρεῖ
 τὸ οὐρὸν, καὶ ἐκ αὐτοῦ ἴππινος αὐτέας,
 ἔτε πινάσας, ἔτε ἐρέοντας. μὲν δ' ἐπ'
 ἀκαρῆς ἀντίχωσιν. ἢν μὲν τοῦ πείν,
 ἀνικμοῖ μὲν τὸ σῶμα, αὐαλέοι ὅ τὸ
 σκῆνος. τὰ δ' ἐσπλάγχνα καμῶθ

καὶ φροῖσ.

Diabetes qui uocatur affectus, mi-
 raculum quoddam est, haud ita
 saepe hominibus usitatus, carniū ac
 membrorum in urinam colliqua-
 tio. Frigida atque humida, ut in aqua
 inter cutem, causa est. Transitus autem
 consuetus, renes & uesica. Neque
 enim cum intermissione lotium red-
 dunt: sed perinde atque canales la-
 xati sunt, indefinens est profusio. Diu-
 turna est huius morbi creatio, & lon-
 go tempore parturitur. Breuis autem
 erit hominis uita, in quo affectus iste
 perfectus fuerit: uelox enim est colli-
 quatio, & festina interdum mors ad-
 uenit, & uita facta est, ac uexata do-
 loribus. Sitis intoleranda est, potus
 copiosus, multitudini tamen lotij
 non respondens. Copiosus enim lo-
 tium redditur, neque eos quicquam
 neque a potu, neque a miſtu inhibere
 potest. Quod si uel pundum temporis,



inhibeantur; si quidem à potu os sic-
catur, corpus arcescit, uiscera ipsi sua
conflagrare opinantur, omnia fastidi-
unt, de omnibus dubitant, haud mul-
tò post mortem obeunt, ardentissima
sitis adest. Mictum uerò quæ ratio sup-
presserit, aut quæ uerecundia dolore
potentior? Sin autem uel parum tem-
poris à meiendo abstinerint, intum-
escunt lumbi, testes & ilia: cumque
remiserint, lotium quidem calefactio-
ne profundunt, tumidæ uerò partes
detumescunt, in uescicam enim con-
sistit exundatio. Cum morbus iste jam
perfectus est, facile omnes eum depre-
hendunt. Sed cum futurus est, os hu-
more priuatur: saliuæ est albida, spū-
mans, perinde atque in siti: nondum
tamen sitiunt, præcordia grauiæ sunt;
calorem, aut frigus à uentre in uesi-
cam tendere sentiunt, prout aduen-
tantis morbi processus est. Quin etiam
paulò plus lotij, quam moris erat, ef-
funditur, sitis adest, sed nondum uehe-
mens. Cumque amplius cremētum
accipit, calefactio parua quidem, sed
mordax uisceribus inhærens exori-
tur, abdomen habent rugosum, uenas
extantes, totum corporis habitum
gracilem; quando & urinæ profliui-
um, & sitis jam auaræ insigniter sunt.
Cumque ad extremum colem uitij
consensus peruenerit, protinus uri-
nam reddunt: atque inde mihi huic
morbo Diabetes appellatio indita fu-
isse uidetur, perinde ac si pertransun-
tem dixeris, quod in corpore humor
non remanet: sed ubicunque in ho-
mine collectus stagnauerit, ad exitum
labitur. Durant sanè aliquod tempus,
licet non admòdum diu: nam cum
dolore meijunt, atque atrox fit lique-
factio, Neque enim ex potu aliqua in-
signis portio in corpus absorbitur, &
catinum magna copia in urinam eli-
quatur. Huiusce languoris causa ali-
quis acutus morbus, esse potest, qui
hæc in partem impetū fecerit, & in cri-
si aliquod malignū uirus latenter mor-
bi reliquerunt. Haud incredibile est

δοκέσαι, ασώδες, άποργί, εκ ές μα-
κρόν θνήσκεισι. πυριφλεγέες δίψαι.
άπουρέειν δε τίς αν έπιχοι τρόπος, η
τίς αιχμηρή πόνε κρέστων. αλλά κην
ές μικρόν έγκρατέες γένων, παροι-
δέσαι οσ φυν, ορχιας, και ισχια. κην α-
νωσι, εκ χέσαι μη τ' εργον αλέα (α. δ'
επειδέοντα εξαήρεται. ξυνδιδο') γδ
ές κύσιν η πλημμύρα. κην μη τελεσθ η
τ' κακόν, εύσημον. επήν η * κέλλη, α-
νικμοι τ' σώμα, * σιάλ @ λδουκός,
αφρωδης, οκως άπο δίψεως, η εδέ-
κω δίψος. υποχονδρίων έαρως. αψ-
θησις άπο τ' γαστρός ές κύσιν θέρ-
μης, η ψύξιος, οκως άπο σόδο, πορέ-
οντος ενοσήματος. αάρη η ερέσαι τ' ε
ξυνηθεος μικρόν π μάλλον. δίψος τε,
αλλ' εδέκω μέγα. λε η έπι μάλλον
αυξη η, θέρμανσις μικρη μη, διακ-
νώδης η, ενίξσα τ' οισι απλάγχνοι-
σι. έπιγαστριον ρυασι, έπιφλεβοι,
ισχνοι η τλω ολλω εξιν, ευτε η η ερη-
σις, η τ' δίψος επαυξέα γίγνε ηδη
κοτε. κην ές άκρον τ'ον κορυλον η συναι-
θησις φανη, ευθύς ερέσαι. τη δε μοι
ελοκέει καλέεσθ διαβητης έπικλησιαν,
οκοιον η διαβητησεών, ενεκεν εν τω
σκήνει τ' υγρόν ε μίμνει, αλλά οκως
* διαβάθη τ' ανδρωπω ές εξοδον
χεεεται. * διαρκέσαι η ές χρονον πνα,
ει η μη καρτα πολλόν, οπ' * πονέοντες
ερέουσι, τηκεδών η γίγνεται σηνή. ετε
γάρ π εκ τ' πόσι @ μέγα ές τ' σκη-
νος ερχε η, η ξυναπέρχε η τ'ω σαρ-
κων ές τ' ερα μυρία. αιτην δε οξείων
νεστων τίς απέσκηψεν ές τ' οδε, και εν
κρίσι κρυέδλω τ'ο κακόνθες έγκα-
τέλιπον' αν νεσοι. εκ αδόκητην και

αδ' α, α' δ' αωνι

* κέλλη.

* σιάλ @.

* διαβάθη.

* διαρκίονσι.

* πονέοντες.



δηλητήριον κολετλέ δ'ε την αιτήνην ισχύν
 * της οκόσα κύσει η νεφροίσι εν σκή-
 πει. ατρε ει * εδάκη τις υπο τ' διψά-
 δος, τριηδεξ' ελκεος η πάθη. διψας τ'
 τ' ερπετον θηριον, λω δ'ακη πνα, α-
 χετον διψος εζάπει. πιπισαι τε αδ-
 δλω εκ ες διψος ακεος, αλλ' ες τλω
 τ' κοιλίης πλημύραν ακοριη * πό-
 τε. λω τ' αλγέη τις ωειάσιος τ' κοι-
 λίης, η αχθέη, (η) τ' υγρον * επ'αχη
 ες μικρον, αχθις αδ'δλω πινσαι δι-
 ψωνίης, και ηδ'ε τ'ω κακων η αμοιβή.
 συνπιμαρεει γδ αλληλοισι διψος και
 ποδον. αλλοι τ' εκ ερέσει. εδ'ε πρ' αλ-
 λη τ'ε πινομύρα διαπνοη. τ'ιγαρουω
 ακοριη μω ε ποτε, πλημύρη δε υ-
 γρε, ωειάσει τ' κοιλίης, εζεργά-
 γησαν αθρως.

π'αη.
 δαινον ο τω.
 π'ατοδ.
 τ'αριης.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ
 ΤΕΣ ΝΕΦΡΕΣ ΠΑΘΩΝ.
 Κεφάλ. γ.

Νεφροίλω φυην μωρ' αδενωδεις,
 * χροιν τ' ερευθροτεροι, οκοιον πη παρ
 μαλλον, η μαζοι η ορχιεις. και γδ η
 οιδε αδενες. αλλα λυκοτεροι. χημα
 τ' διδυμοισι ικελοι, πλατες μαλλον
 εσασι αμα και καμπυλοι. κοιλια
 δε σμικρα, ιαμοειδεις (ες) τλω τ'ω
 ουρων δηθησιν. εκπεφύκασι δε
 οχετοι νδρωδεις, οκοιον π'αλοι αφ'
 εκατέρεσ. εμπεφύκασι δε οιδε τ'ισι
 ωμοισι τ' κυστος εκατέρθεν. ιση δε
 τ'ω ερων λ'πο νεφρων η οδος ες κύστιν.
 αμφοι τ' δε λ'εσ νεφρους η λ'εσ πόρες
 τ'υσδε, πολλα η ποικιλα γιγνεται
 παθεα, τα μωρ' οξεία, ει αμωρραγη η

* χροιν δι.

etiam aliquod perniciosum uenenum
 ex his, quæ uesicam & renes infestant,
 huic affectui causam præbuisse. Quin
 etiam si quis à Diplade morsus esset,
 talis morsum affectus sequitur. Diplas
 autem reptilis fera si quem percusse-
 rit, sitim non ferendam accendit, isque
 copiose bibit: neque siti medetur, sed
 uentrem obruit humore: adeo inex-
 plebilis est bibendi cupiditas. At si
 quis ob uentris distentionem doleat,
 graueturque humoris copia, & ideo
 paulum temporis à potu abstineat;
 iterum sitiens largissime bibit. Atque
 hæc est malorum uitissitudo: se nan-
 que mutuo sitis & potus adiuuant.
 Alij præterea sunt, qui lotium non red-
 dunt: neque ulla est alia ejus, quod
 bibunt, transpiratio. Itaque potus in-
 satiabili auiditate, humoris inunda-
 tione, uentris distentione, repente ac
 penitus disrupti sunt.

DE RENVM AF-
 fectibus.

Caput III.

RENES substantia glandulas, quas
 Græci Adenas uocant, referunt:
 colore autem rubidiores sunt, quale est
 jecur potius, quam mamma, aut testes.
 Nam & hi adenes sunt, uerum albiores.
 Figura testibus similes, lati magis sunt;
 juxta & retorti. Sinus habent exiguos
 ad lotium excolandum cribrorum in-
 star foraminibus peruios. Ex utroque
 neruosi canaliculi tanquam fistulæ ex
 pullulant, qui in uesicæ terga utri-
 que sese inferunt. Æqualis est autem
 lotij à renibus in uesicam uia. Hujusce
 uia multi atque uarij affectus reffes;
 prædictosque meatus malè habent;
 aliqui acuti sanguinis profluuiis, &
 febribus, & inflammationibus iugu-
 lates; hi uerò sunt, quotquot ego enu-
 meraui: aliqui diurni hominè colli-
 quatione dissoluentes, haud lethales
 quidem



quidem, sed insanabiles, & unà cum ægroto commorientes: diurni itaq; sunt abscessus, ulcera, calculorū exortus, hæmorrhoides uocatæ. Ulcera quidem hominis ex abscessu facta omnia planè diuturnissima sunt, atque ægrè sanationem recipientia. Calculorum uerò diuturna est creatio, cum dolore obstructions: haud enim facilis est exitus. Adhæc difficilis est & lotij suppressio. At si multi sint, & exigui calculi, sese mutuò impediētes, remorantur: *si magnus unus locorum angustijs inherescat, & in utroque rene hæc fiant*, interclusa urina, distentisque locis, paucis diebus superstites ægri moriuntur. Reçtè sanè natura renem uentrem oblongum, & urinæ canalibus magnitudine æqualem fabricauit, exiguis quidem calculis amplio rem, quò superius concretus calculus expeditissimum in uescicam iter inueniat, atque ideo lapilli oblongi generantur. Plærunque enim propè urinæ fistulas id genus lapilli concretus: & quotquot eo loco fiunt, inæqualis crassitudinis sunt. Priori in parte ob canalium angustia gracilescent, posteriori autem crassiores fiunt: quoniam renes deorsum uergunt. In solis autem renibus oriuntur, hisque igneo calore feruentibus. Neque enim sedem in fistulis urinæ calculi obtinent, sed arenulæ cum lotio per eas fistulas inferius delabuntur, quæ & indicia & materia huiusce affectus sunt. Quòd si aliquando grandior effectus lapis concauo renis inhæserit, tunc dolores lumborum circa musculos, quos Pfoas Græci appellant, excitantur, & ad medias usque costas perueniunt. Multis sanè dolor iste, perinde ac si morbi lateralis esset, imposuit; præterea grauitas adest coxendicis: dorsum

πυρετῖσι, ἢ φλεγμονῇσι κλείνοντα, ὀκόσα μοι λέλεκ). Ταῖς χρόνια κκεδόνι λύνοντα τὸν ἀνθρώπον, ἀνώλεθρα μὲν, ἀναλθέα ἢ ἢ ξυναποθνήσκοντα. χρόνια * οὐκ, δπωςάσις, ἔλκεα, λίθων γέννα, αἰμορροΐδες. ἔλκεα μὲν δὲ δπωςάσιος, μήκισα ἢ δυσαλθέα πάντα τῶ ἀνθρώπῳ. τῶ λίθων ἢ χρόνῆ μὲν ἢ γέννα. ὀδυνάδες σφλώσεις. & γδ ρήσις ἢ διέξοδος. χαλεπὴ ἢ οἱ πρὸς τοῖσι ἢ ἢ τῶ ἔρων Ἰπῖχσις. ἀλλ' εἰ εἰσι πολλοὶ σμικροὶ, ἀλληληχὴ μίμναισι. * μὲν εἰς μέγας ἐμφραχθῆ, ἢ ἐπ' ἀμφοῖν τοῖν νεφροῖν ξυμῆ τῶ δ, ἐς ἔρων χέσις, καὶ διατασιν, ὀλιγήμεροὶ θνήσκαισι. εὔτε μὲν τῆ ἢ φύσις ἐπιμήκεα ἢ ἰσομεγέθεα τοῖσι ἐρητῆσι τὴν κοιλίην τῶ νεφρῶν τεύξασα, σμικροῖς ἀραμέζονα. ὅκως ἀνὴν ἀνω συστῆ λίθος, ρήσις ἢ ὀδὸν τῆν ἐς κύστιν ἴχῃ. διὰ τὸ δὲ ἢ Ἰπῖμκέες οἱ λίθοι γίγνον). πρὸς γδ τοῖσι ἐρητῆσι τα πολλὰ πῆγνυται. καὶ ὀκόσοι τῆ δὲ ἐς πᾶχος ἀνισοὶ, λεπτοὶ μὲν ἔασι τα πρὸς σω, διὰ τοὺς ἐρητῆρας σενοτέρους ἐόντας. παχέες δὲ, διὰ τὸ τῶς νεφροὺς κάτω ρεῖν. ἐγγίγνονται δὲ τοῖσι νεφροῖσι μούνον. ἀλλὰ τοῖσι διαπύροισι. ἐδὲ ἔδρον γδ ἐν τοῖσι ἐρητῆσι, ἐκ ἴχσις οἱ λίθοι, ἀλλὰ τα ψαμμία σὺν τῖσι ἐρητῆσι, κάτω διαπλέει. τὰ περὶ ἢ σμημία ἢ ὑλη τῶ πάθεος γίγνε). ἦν δὲ ἐμφραχθῆ κοτὲ τῆ κοιλίῃ μέζων τελεθ εἰς, πόνοι τῆς ὀσφύος ἀμφὶ τὰς ψόας μέσφι τῶ μέσων πλευρέων. πολλοῖσι γουὼ ἀπάτη πόνο, ὡς δὲ πὸ πλωείπιδος. βάρθ ἴχσις κατὰ



ῥάχιν δυσκαμπέες, ξυνεῦσαι χα-
λεπώς. ἐπώδυνοι σφόθοι, βαρέες, ἀ-
νέκλιτοι. τὸ γὰρ ἐλικοειδές ἐντερον. **ἰὼ**
καὶ πλημμύρη τὸ ἔρρον καὶ διατάσεις,
προθυμὴν ἀπορησίας, ὁκνῶς περὶ ὠδί-
νων. φουσώδες, ἀδιέξοδοι διέαι φύ-
σαι, πυρέτοι δακνώδες, Ἰπὶξηροί.
αἰαλὴ μὲν γλώσσα, ξηρὴ τῶι κοι-
λίῃ. ἰσχυροί, ἀπόσιτι κὴν πρὸσ αἵρων-
), ἔτε πέψαι, ἔτε ἀναλαβεῖν * ῥή-
διοι. ἰὼ τὸ ἐν ἐρητήρα ὀλίθος ἐμπέ-
ση, (βρασμὸς ὡς ἀπὸ ῥίγους, αἰσθησις
ἔλιθος ὁδοιπορέοντος ξυνῶ ὁμοβιαίῳ,
κὴν ἐς τὴν κύστιν ἐμπέτη) ἔρρον * ἄλ-
λις ὑταποδέων ἐκχυσις, κοιλίης ἐξο-
δοι, φύσαι, φουσώδες, σομάχου κα-
τάσεως, ἐρευξίαι, ἀνάπαυσις τῆς
περὶ τὸν κακῶν. περὶ σελήνην καὶ
πρὸς τῆς ἔρρον αἷμα, ἀναδορῆς (πό-
ρος ἀγωνίῃ τῆς δευτέρῃ ἔλιθος, ἢ διὰ τῆς
καυλῆς διέξοδος. ἢν γὰρ μέζων τῆ * οὐ-
ρηθρῆς ἐπὶ, ἐπιχρῆ) πολλὸν χρόνον, καὶ
πλημμυρῆ ἢ κύστις, καὶ ἰσχυρὴν ὑν ἐ-
παλγεσέρη. ξυν γὰρ τῆς καὶ ἐρητήρας
πίμπραν). χαλεπὸν αἶμα τῆς ἰσχυ-
λιῶν ἐξοδος. καὶ γὰρ ἀγκιστροειδῆς ὠ-
πώπα, καὶ Ἰπὶ τοῖς πόροις Ἰπὶ πωρῶ-
σιαις ἐπιμήκεες τῆς πολλὰ διαπλα-
σῶσιν ὄντι τῆς πόρων ἰξίος. χρῆσις
τῆς ἄλλοι μὲν λευκοί, δερμάτιδες,
τῆς πολλὰ παιδιοισι. ἄλλοι τῆς ξανθοί,
κροκοειδῆες, γέρας τῆς οἷσι περὶ καὶ ἐν
νεφροῖσι οἱ λίθοι ξυνηθεες. ἐν κύστει γὰρ,
παιδιοισι μᾶλλον. διττὰ τῆς αἰαλῆς
τῆς πῆξιος. γέρας μὲν τὸ σῶμα ψυ-
χρὸν, παχὺ τὸ αἷμα. ψυχρὸν δὲ τῆς
παθεα θάλασσον πῆγνυσι. τέκμαρ δὲ,
τῆς ὑδάτων τῶν θερμῶν φύσει αἰ

* ῥήθιαι.

* ἄλλοι.

* οὐρηθρῆς.
* ἐπιχρῆται.

agrè incuruatur: difficulter annuunt
tormina dolores inferunt grauia, per-
seuerantia: intestinum enim sinuo-
sum est, cumque exundat urina, & di-
stentiones crescunt, ad mejendum,
ut in parturiginibus, proritantur: fla-
tuosi sunt, sed flatus excerni neque-
unt, febres adsunt mordaces, præari-
dæ, squallida quidem lingua, sicca ue-
rò est aluus, macre sunt, à cibo abhor-
rent: quòd si quid assumant, neque
concoquere, neque distribuere faci-
lè possunt. Sin autem in lotij canali-
culum lapis incidit, concussio cor-
poris fit, ut in rigore, calculi progres-
sus sentitur, communi simul uiolento.
Quod si in uesicam delapsus fuerit,
lotium aquosum uberius effunditur:
aluus deiscit: flatus inde exhalant:
extentus stomachus est: ructus edun-
tur: à prioribus malis quies datur.
Interdum quoque ulcerato canali
præter lotium cruoremanat. Secun-
da porrò calamitas est, cum per colem
calculus transmittitur. Nam si ampli-
or sit, quam urinæ iter (Græci ure-
thram uocant) capere possit; in eo
multum temporis hæsitat, atque uesi-
ca multitudine urinæ completur:
tumque ejus majore cum dolore sup-
pressio fit. Nam cum uesica & canales
ureteres uocati ueluti incenduntur.
Ægerrimè autem tortuosi calculi exe-
unt: quosdam enim & hamatos uidi,
in meatibusque adnatas quasdam cal-
losas duritias. Plerunque autem oblon-
gi propter canalium rectitudinem fi-
gurantur. At colore nonnulli albicant,
argillam referentes, talesque sæpius
in pueris generantur: alij flauii sunt
instar croci, hi uerò in senibus repe-
riuntur, quibus & in renibus creari
solent: crebrius enim pueris in uesica
lapilli oboriuntur. Concretionis au-
tem causæ geminæ sunt. In senibus
frigidum corpus, & crassus sanguis. Fri-
gidum uerò crassas materias celerius
cogit: indicio sunt aquarum natura

calida.



calidarum fontes. Hænanque refrigeratæ in tophaceum lapidem condensantur. At in pueris multum à sanguine silym elixatum generandi calculi veluti sedem ignis habet. Igitur in calculi creatione talis est affectio. Cæterum nonnulli sunt, qui per quosdam circuitus sanguinem mæjunt, hujusmodi affectus hæmorrhoidum profluvio similis est, similis est quoque corporis constitutio. Nam ualde pallefcunt, torpent, ignaui sunt, cibum fastidiunt, cruditate laborant: & cum excretus est sanguis, languidi fiunt, membra resoluuntur, caput uerò leuius & agilius redditur. At si per circuitum nihil sanguinis effluerit, capitis dolore uexantur, oculorum acies hebet, tenebræ eis oburesantur, uertiginem patiuntur. Inde alij infirmi in comitiales morbum incidunt, tumidi, ueluti caligine perfusi, aquam Inter cutem patientibus similes: alij morbo atræ bilis, aut neruorum resolutione tentantur. Nam ex consueti profuuij sanguinis retentione huiusmodi mala proueniunt. Siquidem à renibus defluat sanguis mundus, lottio non permixtus, plerunque tamen cum uesicæ urina *circumfusis* emanat. Nonnunquam & ex renum *disruptione* sanguis fertur multus collectim. Verum cogitur, & in grumos densatur: utque in sanguine extra corpus effuso fieri assolet, interdum utique & in uesicæ congelatur: quando atrociter urina supprimitur. Ruptionem uerò ulcera diuturna, atque uix sanabilia sequuntur. Indicia sunt ramentum, aut membranula aranæ instar rubida egradiens, aut pus album mæjendo profusum, modo purum & sincerum, modo cum urina permixtum. Ab hisdem & abscessus dignoscendi sunt, si uesperii febres accesserint & rigores: dolores circa lumbos, & pruritus. At si ruptus fuerit, grumi purulenti carnisque formam

πηγαί. διὰ ψυχθέντα γὰρ εἰς πῶρ-
 ειδέα λίθον πηγῆν. παιδίοισι ὃ πολ-
 λὸν ἐπὶ ἑσπέριατος τὸ ἰλυώδες ἐψη-
 θέν, γενέστος ὄκως πῦρ τὴν ἑδραν ἴχει.
 λίθων μὲν οὖν ἀμφὶ γενέστος τοιήδε
 πάθη. μέτεξαιέροισι ἐν περιόδοισι ἐρέ-
 ρισαι ἄμα, τοῖσι δὲ τὸ αἰμορροΐδων ἰκέλη
 ἢ δὲ ἕξιμοφορῆ. ὁμοίη ὃ ἢ ἢ ἑσπέριατος
 κατὰ σπασί, ἐξωχρῶσι, νωθροί, ἀπρηκ-
 τοί, διπόσιτι, ἀπεπιοι κήν μὲν ἐκκριθῆ,
 ἐκλυτοί, πάρετοι τὰ μέλεα κεφαλῆ
 δὲ κοῦφοί, ἢ ἐλαφρότεροι. ἠὲ δὲ ἐς
 τὴν περὶ ὄσον μὴ δὲ ἐκρυθῆ, κεφαλαλ-
 γέες, ἀμαυροῦ τας ὄψιας, σκόδιώδες,
 ἀμφιδινεύμυροι. ἐν ἑυθεν ἑπίληπτοι
 μυρίοι ἄλλοι οἰδαλέοι, ἀπαχλυού-
 μυροι, ὑδρωπώδες. ἄλλοι δὲ μέ-
 λαγχολώδες, ἢ τῶν ἀλυτι. ἑπίχέ-
 σιος γὰρ αἰμορροΐας ξυνήθεος, διπό-
 κατῆδε. ἠὲ μὲν οὖν διὰ νεφρῶν
 ἐκρέη τὸ αἷμα καθαρὸν, ἀμιγές
 ἐροισι, τὰ πολλὰ ἐκρέει διὰ κύσι
 τῶν οὔρων τὸ αἷμα. φέρεται κοτε,
 καὶ διὰ ρήξι τῶν νεφρῶν πολὺ
 αἰθρόον. ἀτὰρ ἢ δὲ πᾶγόν ἴχει, καὶ
 γίγονται θρόμβοι ὡς ἐξω χυθέν.
 ἐπάγη κοτε καὶ ἐν κύσει. εὔτε ἰχθύν
 γίγνεται δεινή. ἑπί δὲ τῆ βραγῆ ἑλ-
 κέα συμβαίνει χρόνια καὶ δυσάλ-
 θέα. τέκμαρ δὲ ἐυελκίς, ἢ ὑμύριον.
 εὔτε ἀράχινον ἐρυθρόν ἐκκριθῆν, ἢ
 πύον λευκὸν ἐρηθῆν, ἄλλοτε μὲν
 καθαρὸν, ἀμιγές, ἄλλοτε δὲ ἐροι-
 σι ξυμμεμιγμύρον. τοῖσι δὲ χετὴ καὶ
 διποσάσιας διαγιγνώσκων, ἢν τῶσ-
 γένων. πυρετὶ ἐς ἐσπέρια ἢ ῥίγεια.
 πόνοι ἀμφὶ τῶν ὀσφύν κησομοί. ἠὲ
 ὃ ἢ ἐκρυθῆ, θρόμβοι * πύωδες,

* ξυμμεροφί.

* πύωδες



σαρκοφθίες, ἀτὰρ ἢ ὅ λυκὲ πύκ-
 πόςασις. Ἰὰ ὅ ἔλκεα, δακνῶδεα, ἀλ-
 λοίε μὲν καθαιρόμενα, ἄλλοτε ὅ ῥυ-
 τῶν ὄνια. δηλοῖ ὅ τὸ πύον. ἄτὰρ ἢ ὅ ἔ-
 ρα κάκοσμα, * ἢ ἀνοσμα. ἔαρ μὲν
 οὐδ' αἰμορραγίας πικρῆς, ἀποσάσις.
 χειμῶν ὅ ἢ φθινόπωρον, λίθως. ἠὲ
 ὅ ἵππὶ λίθοισι ἔλκεα γένηται, ἀναλ-
 θέες μὲν αἰνέσοι, ταχέει τικεδῶν ἢ
 θάνατῶ.

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Ἐ Ν
 κύσει.

Κεφάλ. δ.

Τῶν ἐν τῇ κύσει νοσῶν ἔδ' ἐν ἔνη-
 θες. τὰ μὲν ὀξεία φλεγμασῆ ἢ πρῶ-
 μασι, σπασμῶ καὶ πυρετῶσι ὀξέσι
 κλείνοντα. ἔλκος ὅ ἢ ἀποσάσις, ἢ πα-
 ραλυσίς, ἢ λίθος μέγας μὲν, ἀναλ-
 θέης δέ. ἔτε γ' ἰσχύεται, ἢ πόσει, ἢ
 φάρμακῶ, * ἢ ἀμφὶ ἰσχύεται, ἔτε ἀ-
 σινέως τέμνε. χεῖρ γ' καὶ τὰ λεπτὰ
 τὸ κύσι. ξυτάμνειν. τὸ δέ αὐτῆ-
 μαρ ἔκτεινε, ἢ ὀλίγαις ἡμέρησι
 σπασμοῖσι ἢ πυρετῶσι. θνήσκουσι.
 ἠὲ ὅ μὴ τὰ μνη, εἰς οὖρων χέσι, ἢ πό-
 νοισι, ἢ πυρετῶσι, ἢ * τικεδῶσι σμύ-
 χεῶν ἄνθρωπος. ἢ ὅ μὴ κάρβα μέγας
 ὀλίθος ἔη, χέσις μὲν * ἔρων ξυνεχέ-
 σεραι. εἰς γ' τὴν αὐχένα ῥηιδίως ἐμ-
 πίπτων ἀποεργῆ οὖρων ἔξοδον. τὰ μ-
 νειν ὅ εἰ ἢ τῷ μεζόνων ἀσφαλέςε-
 ρη. ἀλλὰ τέμνε) κύσις, κῆν πῖς τὸν
 ἔθανάτε κίνδυνον ἐκφυγή, ῥοιάδος
 γίγνεται ὁ πάθος. κῆν ἀκίνδυνον ἔη,
 ἀλλ' οὐ φορητὸν ἐλδύθεροισι ἀένναον
 ἐκρέειν οὖρον, κῆν βαδίζη, * κῆν εὐδῆ,
 ἀτερπές ὅ ἠὲ βαδίζη). οἱ δέ κάρβα

καὶ φησὶ πρὸς τὴν

καὶ δὲ

καὶ γὰρ

καὶ γὰρ

representantes eijciuntur : quin eti-
 am & albida sanies excernitur. Vlcera
 uerò mordacia sunt, modo repurgata,
 modo sordentia : id pus manifestat:
 urina quoque aut olida, aut nihil
 olens. Ver sanguinis profluvia & ab-
 scessus parit: hyems autem, autum-
 nusque calculos. Quòd si à calculis ul-
 cera facta sint, insanabiles inde morbi
 nascuntur, cita colliquatio, morsque
 adueniunt.

DE VESICÆ A F-
 fectibus.

Caput IV.

Vesicæ morborum nullus placidus
 est. Quippe acuti inflammatio-
 ne, uulneribus, conuulsione, febri-
 busque acutis interficiunt. Vlcus ue-
 rò & abscessus, aut resolutio, aut lapis
 magnus tolli nequit : neque enim po-
 tione, aut medicamento frangitur,
 aut circumteritur, neque præter no-
 xam exciditur. Opus enim est & tenu-
 es uesicæ partes simul cædere. Id uerò
 aut eodem die hominem perdit, aut
 paucis diebus conuulsionibus, febri-
 busque consumit. Nisi excidatur au-
 tem præter urinæ conclusionem do-
 loribus, febribusque, aut liquationi-
 bus homo contabescit. Sin haud ita
 magnus sit calculus, frequentius loti-
 um cohibetur. Nam facile in cerui-
 cem delapsus lotij transitum obstruit.
 Securius autem quàm grandiores ex-
 ciditur, sed uesica quoque necessariò
 sauciatur, cumque mortis periculum
 euaserint, in fistulam Græci Rhœada
 uocant, prolabantur. Quod licet peri-
 culo uacet, ingenuis tamen homini-
 bus non est tolerandum, perpetuum
 sc. urinæ profluum, siue quis am-
 bulet, siue dormiat, ambulanti-
 bus uerò maximè injucundum. Valde
 parui.



parui autem plerunque citra noxam exciduntur. Quod si vesica inhaerit calculus, ex colliquationibus patefiet: sed neque dolorum, neque gravitatis expertes sunt, licet urinam expedite reddant; sin minus, & urinæ difficultas accedet. Omnes uerò calculos ex sabulosis urinæ subsidentijs deprehendentes: & quòd istis uirilia sæpius arripiuntur. Quando enim meijunt, subestque calculus, dolent, trahant, attrahuntque pudenda, tanquam calculam cum vesica exemturi. Anus quoque uitij particeps redditur pruritu laborans. Prominet uerò & rectum intestinum ui, contentationibus, imaginatione perinde, ac si jam lapis excernatur. Ambo enim inter se copulantur anus & vesica: quorum uno affecto, & alterum afficiatur necesse est. Propterea inflammato podice urinæ exitus clauditur: & vesica exacerbata sedes non deijcit, licet aluus admodum sicca non sit. Tales utique sunt ex calculis labores. At sanguinis effluuium tametsi non admodum citò enecet, tempore tamen procedente infinitos jugulauit. Ab eo uerò grumi creantur, lotij suppressio, & matura mors non secus, atque à calculis fieri compertum est. Quamuis enim sanguis tenuis flauusque est, neque ualde crassus, neque concretus: vesica tamen longo tempore congregat, ac eadem calefaciens & elixans cogit conspissatque, atque ita grumus efficitur, & urinæ interclusio, quam Græci Ischuriam uocant, inferendæ morti potentissima. His accedit dolor acutus, ignis acer, lingua arida, & ab his delirantes moriuntur. Sin autem à uulnere dolor excitetur, uulnus uniq; mortiferum est: ulcus uerò & si non protinus interficit, febribus tamè, aut

σ μικροὶ τὰ πολλὰ τὰ μὲν ὀσπινέως. ἡ δὲ συμπεφυκὴ τῆς κύστεος λίθος, διὰ δὲ ἀσπινέως πόνουσι καὶ βάρει, κῆν αὐτῆ δὲ δυσχερὲς ἀτερε. ἡ δὲ μὴ, καὶ δυσχερὲς. συμπαλῆς ὅτι τὰς λίθους διαγνοίης αὐτῶν τῶ ψαμμίων ἐν τοῖσι ἔργοις ὑποσάσει. ἀτὰρ ἡ πρόκοποι τὰ αἰδοῖα γίγνοι. εὐτε γὰρ ἀπερρεσι, κῆν ὑπὲρ καὶ ὁ λίθος ὀδυνέονται, καὶ ἀμφάφωσι, καὶ ἐλκασί τὰ αἰδοῖα, ὅπως τὴν λίθον ἐκ τῆς κύστεος ἐξαιρέωμεν. συμπαθοὶ δὲ καὶ ἐδρη κνησμώδης γιγνομένη. ὡσεπεὶ δὲ καὶ ἀρχος βίη καὶ ἐν τῶσιν φαντασίη. ἐκκείσθαι δὲ ὡς δὴθεν ἔλθῃ. ἀμφω γὰρ συγκέενται ἀλλήλοισι ἐδρητὲ καὶ κύστι. ὡν ἑκατέρωθεν διὰ τὸδε καὶ ἐπιφλεγμάσιν δρχῶ, ἰσχερὲς κύστις, καὶ ἐπὶ τῆσι τῆς κύστεος ἀκίσις * δῆσι ἐδρη, κῆν μὴ ἐπὶ ἐξήρος ἢ γαστῆρῃ. τῶ αὐτῶ ἀλγέα τὰ λίθων. αἰμορραγίη δὲ κῆν μὴ κατὰ ὄξυως κλείνη, χρόνω δὲ ἐξείλυσε μυεῖς. οἱ δὲ ἀπ' αὐτῆς θρόμβοι, ἰσχερὴ, ὄξυες ὀλέθροισι, ὁκώσασθαι οἱ λίθοι. καὶ γὰρ * ἡ τὸ αἷμα λεπτόν τε καὶ ξανθὸν καὶ μὴ παγχυτὸν ἢ εὐπαγές, ἀλλ' ἡ κύστις ἐς πολλὸν ἀλίζει χρόνον, καὶ ἡ δὲ θερμαίνουσα καὶ ἐψύσσα πηγνύει. καὶ ὡς γίγνεται θρόμβος. ἰσχυρὴ μὲν οὐδὲ δυνατὰ τὰ κτείναι. ὡσεπεὶ γίγνεται δὲ τούτοις αἰσθητῶ ὄξυ, πύρρον, γλώσσα ξηρὴ, καὶ ἐπὶ τοῖσδε πύρρον φούρι θνήσκουσι. ἡ δὲ ἐπὶ τῶσιν ἀλγος ἐκφανῆ, τῶμα μὲν * ὀλέθριον. τὸ δὲ ἐλκῶ κῆν μὴ δρχῆθεν κτείνη, πυρετοῖς ἢ φλεγμονῇ ἀνήκεσον γίγνεται

† καὶ ὀδύνην ἄλλως μιλῶσιν.

αὐτῶ καὶ

δὲ ἐξήρος

12

* ὀλέθρον



νε) λεπτή μὲν ἔπαχος κύστις. νεύρον
 ὅστω φυλῶ. τὰ περιεχόμενα σαρκῶ-
 ται ἑτεροειδῶς ἐπιβάλλεται. ποτὶ καὶ τὸ
 ἔργον χολῶδες, δριμύ, δακνῶδες τῶ
 ἔλκος, ἢ ξυνή διαίτα. ἢ ὅτι ἐν μέρει τῆσι
 πληρώσει διαλείπει. καὶ ὅτι κενωθῆ, ξυ-
 νίσει. πάχει οὖν ἀεὶ θρεπταί ἐν ἐκ-
 τασί τε καὶ κάμψι. ἀεὶ θρωτὸν ἐκ ἐναλ-
 θεῶν ἔλκος ἐσθλὸν καὶ * ἐμπυος ὅτι ἐξ ἀπο-
 σασιος γίνεταί. κύστιος σημεῖα, τὰ
 περιεχόμενα ἄλλοισι μέρει * Ἐπι φλέγμα-
 σι. εἰ γὰρ καὶ Ἐπι πυρετοῖσι καὶ ῥίγῃσι ἢ ἀ-
 πόστασις, κίνδυνοι ὅσοι ὄντι. πύον δὲ
 ἀλλ' εἰς παχὺ, λευκόν, ἢ κακοδμον
 ἐπιδοῖ, ἐπιθέατα δὲ τῶν δὲ ἔλκος.
 καὶ ὅτι Ἐπι νύκτι, τρυγῶδες, μύξο-
 ποία, κακοδμον ἐξέεισι. τῶν τοῖων δὲ
 ἢ βραδύνη θάνατος. δακνῶδες μὲν
 τὰ ἔργα. ὀδύνη δὲ ἢ ὡσθῆσι αὐτῶν,
 διαίσει δὲ ἢ ὀδύνη μέσφι ἀκρων τῶ
 καυλοῦ. ἐλαττοῖσι ὅτι αὐτῶν πάντα καὶ
 τ' ἀναντία, καὶ πλησμονὴ καὶ κένωσις, καὶ
 δριμύ καὶ κίνησις, καὶ λεπτὰ, καὶ ἀλυσίη,
 καὶ τροφή καὶ ἀτροφία, καὶ γλυκέα καὶ
 ὀξεῖα. ἄλλων ἄλλα μὲν ὡφελούτων.
 ἄλλα δὲ ἐλαττοῦτων εἰς ἐν συμβῆ-
 ναι μὴ δυναμῶν.

* ἐμπυος
 ἐπι φλέγμα-
 σι.

ΠΕΡΙ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΣ.

Κεφάλ. ε.

Ἀνώλεθρον μὲν ἢ γονορροία, ἀ-
 τρεπὲς δὲ καὶ ἀσθλὲς μέσφι ἀκοῆς.
 ἢν γὰρ ἀκρασίη καὶ πάρεσις τὰ ὑγρά
 ἴσχη καὶ γόνιμα μέρεα ὅπως διαψυ-
 χῶν ῥέει ἢ θορῆ, ἐσθλὲ Ἐπι χεῖν ἐστὶ
 αὐτέλω ἐσθλὲ ἐν ὑπνοῖσι. ἄλλα γὰρ ἢ ἢ
 ἐσθλῆ, ἢν τε ἐργηγορῆ, ἀνεπίχεται
 ἢ φορῆ, ἀναίωτος δὲ ἢ * ῥοῆ ἢ γόνε

* ῥοῆ. τ' γόνε.

inflammatione insanabile redditur.
 Tenuis quidem est crassitudine uesi-
 ca, nervus autem substantia. Quocir-
 ca neque carnem contrahit, neque fa-
 cile ad cicatricem ducitur. Accedit
 & urina biliosa, acris, mordax ulceris,
 communis utculus. Vesica enim cum
 repletur, distenditur: cum inanis est,
 subidit. In extensione igitur & con-
 tractione eundem, quem & articulus,
 affectum patitur. In articulo uero
 nullum ulcus bene sanescit; suppara-
 tionem autem ex abscessu contrahit.
 Vesicæ signa eadem sunt, quæ & in
 alijs membris inflammatis. Nam et si
 febribus rigoribusque succedat ab-
 scessus, eadem pericula impendent.
 Verum si pus crassum, album, non to-
 tri odoris eiciat; ab his orta ulcera
 benigna sunt. At si depascantur, fæ-
 culentam, mucidam, graucolentem
 urinam reddunt. Hujusmodi ægro-
 tantibus non tarda mors aduenit.
 Mordax quidem urina est, & cum do-
 lore est ejus emissio. Ad summum
 usque colem dolor peruenit. Ipsos
 utique omnia etiam contraria lædunt,
 & saturitas, & inanitio, & otium, &
 exercitatio, & lauatio, & illuies, &
 saturitas, & jejunitas, & dulcia & aci-
 da: cum alia alios lædant, alios ju-
 uent, in unum autem conuenire non
 possint.

DE SEMINIS

profluio.

Caput V.

Mortis quidem periculo itacat Ge-
 nitura profluuium, injucundum
 tamen est, & uel auditu insuaue. Nam si
 intemperies & resolutio humida occu-
 pat, genitaliaque membra (ut à frigi-
 dis contingere solet,) profluit semen:
 neque ipsum uel in somnis cohi-
 bere possumus. Verum seu quis
 dormiat; seu uigilet, continens pro-
 fusio est, neque genitura fluor sensu
 percipi-



percipitur. Ægrotant quoque & tali morbo mulieres, sed partibus illis prurientibus, & cum uoluptate nonnullis genitura profunditur: quin etiam uirilem coitum impudenter appetunt. Viri autem nequaquam pruriunt: nam quod effluit, humidum, tenue, frigidumque est, sine colore, infecundum. Qui enim genitale semen refrigerata natura emisserit? Quod si iuuenes hoc uitio laborent, omnes senilem corporis habitum induant: necesse est: quippe qui segnes fiant, resoluti, exanimis, torpentes, hebetes, imbecilli, recurui, ignaui, pallentes, albidii, effaminati, a cibis abhorrentes, frigidi, membris graues & stupidi, cruribus impotentes, & ad omnia remissi & languidi. Multis sanè id genus ægrotatio ad neruorum resolutionem (paralysis Græci uocant) uiam strauit. Quomodo enim neruorum facultas non afficiatur, cum natura ad uitæ generationem faciens refrigerata sit? Atqui & genitura uitalitatem impartiens nos uiros efficit, calidos, articulatos, hirsutos, uocales, animosos, ad intelligendum operandumque ualentes: id uiri testantur. Contrà uerò quibus non inest uitalis genitura, rugosi sunt, debiles, acutæ uocis, glabri, imberbes, effaminati: eunuchi id manifestant. Si quis autem uir & feminis profundendi abstinens fuerit, robustus est, audax, neque uel feras expauescens: testimonio sunt ex athleticis temperantes. Nam & illi, qui natura quibusdam præstant, ob intemperantiam deterioribus multò peiores fiunt: contrà natura deteriores ex temperantia præstantioribus longè meliores euadunt. Neque sanè ab alio quopiam, quàm à genitura robustum animal generatur. Vitalis itaque genitura ad sanitatem, ad robur, ad animi fortitudinem, & ad generandum mirificè confert. A Satyriasi in feminis profluuium corporis status deuoluitur.

γίγνε). νοσέεσι ἢ κὶ γυναικὲς τὴν δὲ
 τὴν νεῖσον, ἀλλ' ἔτι κνησμοῖσι τῶν
 μορίων κὶ ἠδονῇ προσχέει τῆσιν ἠθορῇ.
 ἀτρεκαὶ πρὸς ἀνδρας ὁμιλίῃ ἀναί-
 χυλίῳ, ἀνδρες ἢ ἔσ' ὅλως * ὁδ' ἀξόν). * ὁ δὲ εὐδύεται.
 τὸ ἴρεον ὑγρὸν λεπτόν, ψυχρὸν, ἀχευ-
 ἄγονον. πῶς γὰρ ζωογόνον ἐκπέμ-
 ψαι πᾶν ἔμα ψυχρῇ ἔσα ἠ φύσις. ἢν
 ἢ κὶ νεοὶ πάχωσι, γηραλέες χεῖρ γε-
 νέας πάντας τὴν ἔξιν, νωθώδεας, ἐπι-
 λύτες, ἀψύχες, ὀκνέοντες, κωφές,
 ἀδενέας, ῥικινές, ἀπτήκτες, ἐπώχες
 λδυκές, γυναικώδεας, * ἀποσίτες,
 ψυχρές, μελέων ἐάρεα, κὶ * νάρεας
 σκελέων, ἀκράτεας, κὶ ἐς πάντα παρ-
 τες. ἢ δὲ ἠ νεῖσος ὁδὸς ἐς τὸ ἀλύσειν
 πολλοῖσι γίγνε). πῶς γὰρ ἐκ αὐτῶν
 νεύρων ἢ δὲ ἠ δύναμις πάθοι τ' ἐς ζω-
 ῆς γένεσιν φύσιος ἀπεψυγμῆς. κὶ
 ἠμέας ἀνδρας ποιεῖ ζωῖσα ἠ θορῇ
 θέρμεας, ἐκάρθρες, λασίτες, εὐφώνες,
 εὐθύμεας, κραταίους νοῆσαι τε κὶ ῥέξαι.
 δηλαστοὶ ἀνδρες, οἷσι ἢ ἐκ ἔνεσι ζωῖ-
 σα ἠ θορῇ, ῥικινοὶ, ἀδενέες, ὀξύφωνοι,
 ἀτειχες, ἀγένεοι, γυναικώδεις. δη-
 λαστοὶ οἱ εὐνεχοὶ. καὶ ἢ τις ἀνὴρ τ' ἐγ-
 κρατῆς ἢ τ' θορῆς, κραταῖος, εὐθλμος,
 * ἀλκῆς μέσφι θηρίων. τέκμαρ ἢ ἀ-
 θλητῶν οἱ σαόφρονες. κὶ γὰρ οἱ φύσι
 πνῶν * κρεάσονες ὑπ' ἀκρασίας πολ-
 λὸν τῶν χειρόνων γίγνον) χερεῖνες.
 πολλὸν ἢ οἱ φύσει χερεῖνες ἴω * ἐγ-
 κρατῆς γίγνον) * κρεάσόνων κρεάσο-
 νες. ἀτρεκαὶ ἢ ζῶν ἐξ ἀλλήλου γίγνε)
 κραταῖον ἠ θορῆς. μέγα ἔν κ' ἐς ὑγίην,
 κὶ ἐς ἀλκῆν, κὶ ἐς * ἀψυχίην, κὶ ἐς γέ-
 νεσιν ζωῖσα ἠ θορῇ. διὰ σαθηρήσεως
 ἐς * γονορροῖης ἀπόσκηψιν ἠ καλίας α-
 ρίς.

* ὁ δὲ εὐδύεται.

* ἀπόσιτις ψυχροί.

* νάρεας σκελέων ἀκρατεῖς. ἔς πάντα παρτεῖς.

* ἀλκῆς.

* κρεάσοντες.

* ἀκρατεῖς.

κρεάσου μὲν οὖν κρεάσ. ἀλλου. κρεάσαν ῥῥ.

εὐφώνων.

γονορροῖαν.

Πσει



ΠΕΡΙ ΣΤΟΜΑΧΙ- D E Σ Τ Ο Μ Α Χ Η Ι
Κ Ω Ν affectibus

Κεφάλ. 5.

Caput VI.

Στόμαχος ἡδονῆς κὶ ἀνδίνης ἠγε-
μῶν. καρδίας καίριον γειγνόμενα ἑ-
στίνον κὶ θυμὸν, ἢ ἀθυμίαν, ἢ ψυχῆς
συμπαθείη: ἡδὲ σωμαχὸς πρῶτα
δύναμις. ἰάδε μὲρ οὐ μοι ἄλλη λέ-
λεκ). Διποσοκοι ἡδονῆς μὲρ, εὖπε ψῆν,
εὐσαρκίη, εὐχεροίη ἕσώματος, ἀνδίνης
ἢ τριλέων τὰ ναντία, κόλε κὶ ἀθυμίη μὴ
ἔχων τροφῶ. μελαγχολώδεσι δὲ
καίποσι τῆν ἠν οὐ ὀδενόση, μίσος κὶ
διποσροφὴ τῶν γυμμάτων, ἐκ * λὼ
πρσοαίρων) μόνον, ἀλλὰ κὶ ἠν ἀθέηα
* μὲρ ἢ τὰ σιτία. ἀναπεμπάζονται
* δὲ ναυτίη, ἢ διπορήη, ἢ πλάδω, ἢ καρ-
διαλγίη. κὶ σαλλοχόοι, κὶ ἐμέτοι ἐ-
νίοις κὶ ἠν ὁμῶς τὸ σῶμα * τείρη, κὶ ἠν
γαστήρ μείνη κενεὴ τῶν δειε, τὸν πόνον
ρήιτερον φέρει τὸ πρσοάσειος. λὼ ἢ
καὶ ὑπὲρ ἀνάγκης κοτέες τιμὴ ἐδίω-
δίμω ἠν, πολλὸν κάκιον. ὀδὲ πόνου
τῶν λιμοῦ ἐν τῶν σῶμα π * λελλῶαι
ἄργου, καὶ παῖν μέζων ὀδύνη. ἀ-
τὰρ κὶ οὐκὶ πρσο μὲρ τὰ οἰκεία τῶ-
ῶσδε. ἐς δὲ τὰ ἀλλόκοτα χρεσῶς.
ἀλλαγὴ τῶν κατὰ * φύσιν ἐς τὸ
ἐμπαλιν. ἀχθηδῶν ἐς πάντα, καὶ
φυγὴ, κὶ μίση σιτίων. Ἐπὶ δὲ τοῖσι
μεοσηγὺ τῶν ὠμοπλατέων χρεοίσι-
σιν, ἀλγου. πολὺ δὲ κὶ μέζον, λὼ
πρσοφέρων) κὶ καταπίνωσι. ἄση,
διπορήη, ὀψιες ἀμαυραὶ, ὠτων ἠχοί,
βάρεα κεφαλῆς, νάρκη μελέων κὶ ἰά-
γῆα λυόν). παλμός, ἐν τοῖσι ὑπο-
χοιδίοισι, φαντασίη τὸ ράχιος ἐς

Stomachus delectationis, tristitia-
que princeps est, cordis vicinia ad
tenorem, animiq; alacritatem siue abiectionem,
ob anima consensum plurimum ua-
let. Hac prima est & praeipua stomachi fa-
cultas. Hæc mihi alio loco dicta sunt.
Voluptatem hæc pariunt, bona conco-
ctio, carnis conueniens incremen-
tum, floridus corporis color. Tristitiam
uerò istorum contraria Nonnunquam
& animi abiectionem cum alimento
caret, inducit, atra bile uexatur, ci-
bum reuigit. Cum itaque stomachus
ægrotat; escas odit, & abominatur,
non modò cum offeruntur, uerum
etiam si non in conspectum dentur,
sed eas memoria repetant, aut anxie-
tate, aut madore stomachi, aut ejus
ostiolii dolore perciti, & saliuam effun-
dunt quidam, & uomitibus lancinan-
tur, corpusque simul ab his uexatur.
Quòd si uentriculus istorum uacuum
est, dolorem, quàm cibi sumtionem,
facilius tolerat. Sin autem interdum
ad alimentum capiendum accedere
cogitur, id multò pejus est. Labor
quidem famis est, in cibis ore conteren-
dis angor: in deuorandis dolor maior adest.
Cæterùm non erga usitata quidem ita
se habet, erga aliena uerò optimè; sed
quæ naturaliter habent, in contrari-
um mutata sunt: & omnia graua-
tim ferè: fugaque adest, & odium ali-
mentorum. In interscapulis præterea
dolor inhæret: sed longè major si e-
dant, deuoentque, fastidiunt: animi
pendent: uisus hebetatur: aures so-
nant: caput grauatur: membra tor-
pent: crura, brachiaq; resoluuntur: pal-
pitant præcordia: dorsum imaginatur
uersus



versus crura moveri: aliàs alio, huc atque illuc sese feceri existimant, seu stent, seu jaceant: quemadmodum à uentorum flatu harundines, aut arbores agitantur: pituitam frigidam, aqueam reiiciunt. Quando uerò & in biliosis redundat bilis, istorum oculi tenebris caligant; siticulosi non sunt, etsi à cibis sitire uidentur: uigilant; tardi sunt: dormitant, non uero tamen somno: *γς*, qui sopore graui (Coma Græci appellant) occupantur, similia patiuntur, macie confecti, ualdè pallentes, debiles, resoluti, animæ deliquium patientes, animo consternati, meticulosi, quieti, repente tamen irascentes, ualdè melancholici. Nonnunquam enim in atram bilem, quam Melancholiam Græci nuncupant, id genus ægrotantes inciderunt. Talem utique stomacho impartiente animæ affectum esse oportet. Verùm homines compatibilium membrorum ignari, in quibus hæc grauissima uitia sunt, stomachum esse causam opinantur. Magnum autem ad ea, quæ dico, probanda testimonium cordis contiguitas est, ubi omnium principatus collocatur. In medio enim pulmone cor sedet: horum autem medium stomachum coniungit: ambo uerò dorso inserta sunt. Propter hanc itaque cordis uiciniam & dolor ille excitatur, quem Cardialgiam Græci nominant, & resolutio, & morbi melancholici. Nempè morbi causæ & aliæ sunt plurimæ: præcipua uerò pus. multum à uentre per stomachum effusum. Familiare est etiam, id utriusq; illis, qui tenui uictu, & duriore coacti sunt uti: quin etiam illis, qui, ut erudiantur, laborant, & ejus causa multa perferunt, quibus inest diuinæ scientiæ cupiditas: qui cibi parsimonia, & uigilijs macerantur: qui doctos sermones, & res graues meditantur: qui uictum pleniorum & uarium contemnant: sed famem

τῶ σέλεε κινδυνεύουσ. ἀλλὰ τε ἀλλή
 τῆσδε κακείσε φέρεσθι διοκείσει, κῆν ἐ-
 σήκωσι, κῆν κατὰ κέωνται. ὅπως ὑπὸ
 αὔρης ἀνέμων κάλαμοι, ἢ δένδρεα.
 φλέγμα ψυχρὸν, ὑδαρῆς ἀποβλύ-
 ζει. ἐπὶν ἢ κῆν χολῆ ἢ πικροχολοίσι,
 σκοτώδεες, ἀδιψοί. κῆν ἐπὶ ἐσθλα-
 σι διψῆν διοκείσει, ἀγρυπνοί, νωθροί,
 * νυσαλέοι. ἐχ ὑπὸ * ἀτρεκέι. κω-
 ματώδεες, ὁμοιοπαθεές, ἰσχυροί, ἐξω-
 χροί, ἀσθενές, ἐκλυτοί, λήποσθρανές,
 ἀψυχοί, δειλοί, ἡσυχιοί. ἐξ ἀπίης δ'
 * ὀργίλοι. κάρτα μελαγχολώδεες.
 κῆν γὰρ ἐξ ὀκείλαν κοτεές μελαγχο-
 λιλῶ οἰκτιοίδε. τὰ δὲ μὲν τὶ ψυχῆς
 ἐσσομάχε * ἐκδιθροίος, * εἴτε δὲ
 τὴν πᾶσιν. οἱ δὲ ἀνδρωποὶ ἐκ ἐ-
 δότες τὰ συμπαθεά μερέα, ἐφ' οἷσι
 τὰ δεινότατα γίνεσθι, τὴν σόμαχον ἀ-
 πον * ἢ γέν. μέγα ἢ ἐς πίνων λέ-
 γω, ἢ ξυνάφασ τ' καρδίας, ἐνθα πάν-
 των ἡ δέχη. μέσον γὰρ ἐνὶ ἐξ ἡ πνεύμο-
 νι ἢ καρδίῃ. ἢ ἢ τῶν μεσόσθις τὸν σό-
 μαχον συνάπτει. ἀμφὸς τὸ πρὸσπε-
 φύκασ τῆσδε χεῖ. διὰ τὸ δὲ πρὸσ τὴν
 καρδίαν γαίονημα, καρδιαλγίη, κῆ
 ἐκλυσις κῆ τὰ μελαγχολώδεα. αἰπία
 ἢ τ' ἢ σθ, κῆ ἀλλὰ μὲν μυρίαί, καρδίη
 ἢ πύον αυχρὸν, ἀπὸ κοιλίης διὰ σό-
 μάχε χυθέν. ἐξυνηθες ἢ κῆ τῶσ ὑπὸ τῶ
 ἀναγκασ ἐκπὸ δειθηθροίσι λεπτή κῆ
 σκληροτέρη διαίτη. ἀταξ κῆ τῶσ ἐς
 πᾶσθι τὸν πονεύσει, κῆ ἐς τὴν δὲ τλη-
 μοσι, οἷσι θείης μὲν μαθησίος ποδῆ,
 * ὀλιγοσιπῆ δὲ κῆ ἀγρυπνίη, κῆ με-
 λεδώνη λόγῶν τε καὶ πρηγματῶν
 σοφῶν. οἷσι ὑπεροψίη μὲν διαί-
 τῆσ ἀδρῆσ καὶ ποικιλίης, λιμὸς
 ἢ ἢ

† διοκείσει

* νυσαλέοι
* ἀτρεκέι

* ὀργίλοι

* ἐκδιθροίος
* εἴτε δὲ

* ἢ γέν

ἐξυνηθες

ὀλιγοσιπῆ



ἢ ἡ προφῆ, κὺ ὕδωρ ποτόν, κὺ ἐν ὕπνῳ
 αὐπνίη. οἷσι μαλθακὴ μὲν εὐνὴ ἀ-
 σωτῆς χαμαί, ἀμφίβλημα δ' εὐτε-
 λές, ἀμπεχόνη ἀραιή, τὸ δ' ἔδε κρέ-
 νος, ὁ κοινὸς ἀήρ, πλεῖστος δ' ἐννοίης θεῆς,
 παρειαίης τὲ κρησῆς. ταῦτα γὰρ αὐτέοισι
 ἀγαθὰ γίνετ' ἐξωπαιδείης. κὺ εἰ
 παρσαίρονται, εὐτελές μὲν σίτον,
 εἰ δὲ ἐς κόρην ἐδωδῆς, ἀλλ' ἐς ζῶω
 μένον. οὐκ ἐπ' οἴνω θώρηξις, εἰ θυμη-
 δὴ, εἰ ῥέμβος κὺ παρειαίης, εἰ σωματῶν
 ἀσκησις, εἰ δὲ σαρκῶν παρειαίη. τίνος
 γὰρ ἐκ αὐτῶν ἀπάγοι παιδείης ἕξως.
 πατρίδος, τοκῆων, κασιγνήτων ἐου-
 τῶν μέσφι θανάτῳ. τῶσδε οὖν
 πεκεδῶν μὲν ἔσπηνεος, ἀχρεοί, καὶ ἐν
 νεότητι γηραλέοι, κὺ ὑπ' ἐννοίης κἄ-
 φοι. ψυχὴν δ' ἀμειδέες, ἀμήλιχοι,
 σωματῶν δ' ἀκακοσίη. ταχὺς ὁ κόρος τ'
 ξυνηθεός, εὐτελέος κὺ ἐπίμα προφῆς,
 ἀνθεῖν δ' ποικίλης ἐδωδῆς. ὅκνη δὲ
 πάντων γυμνασίων. καὶ δὲ λάβωσι π'
 τῶν ξένων, ἐλάθη. ἀπόστροφος εὐθύς
 ἐς πάντα. εἰ δ' ἐστὶ σωματῶν κρησῆς
 σπῆ, φλεγμοναὶ γὰρ κὺ ῥεύματα, καὶ
 καρδιωγμός, ἢ πόνος, σωματικὸν εἰ
 κλησκέ) πάθος. θέρους ἀγὰρ τῶν δὲ
 νεσόν. ἐνθα καὶ πέψις κὺ ὀρέξις, καὶ
 πάντων ἀδυναμίη. ἡλικίη δ' γῆρας,
 οἷσι κὺ διχα πάθος διὰ τὸ ἔβρις τέ-
 λος κὺ ἡ ὀρέξις ἐς τέσμα ἤκη.

pro alimentis habet, pro potu aquam,
 & in somnis uigilant: quibus molle est
 cubile humi sinestrangulis, uile indumen-
 tum, tunica lacera: ipsorum uero te-
 cum est communis aer: diuitia autem,
 diuina intelligentia atque copiarum abun-
 dantia usus. Hæc utique ipsis eruditio-
 nis amore bona comparantur. Cum-
 que cibum, & illum quidem ignobi-
 lem accipiunt; id uitæ tantum, non ut
 cibus satientur, sed ut uitam sustineant dur-
 taxat: non uino indulgent: non exhila-
 rantur: non uagantur & obambulant, non
 exercent corpora: non sunt carnulentio-
 res. A quo enim disciplinæ amor non
 auocet? à patria, à parentibus, à fratri-
 bus, à seipsis usque ad mortem. His
 igitur corporis macies adest, decolor
 facies, & in iuuenta senescunt: & ob
 contemplationem stupidi habentur,
 animo autem seueri, non ridentes, im-
 mites sunt. Stomachus quoque is male
 erga cibum affectus est: ac celeriter assue-
 toque satiantur: eorum uili & ad manum,
 quod uarijs dapibus non sunt assueti, & er-
 ga omnes cibos pigri sunt. Quod si ali-
 quem inusitatum cibum acceperint,
 læduntur, omnes alios protinus auer-
 santes. Iste est stomachi longus mor-
 bus. Inflammationes uero, destillatio-
 nes, oris uentriculi morsus, (Car-
 diogmon Græci uocant) aut dolor,
 Stomachalis affectus non dicitur.
 Hunc morbum æstas affert, quando
 & concoctionis, & appetitus, & omniū
 est impotentia. Inter ætates uero sene-
 cta, quibus & absque morbo ob uitæ
 finem & appetentia ad extremum per-
 uenit.

ΠΕΡΙ ΚΟΙΛΙΗΣ ΔΙΑ-
 ΘΕΣΙΟΣ.

DE AFFECTU
 uentriculi.

Κεφάλ. ζ.

Caput VII.

Κοιλίη ἀπλάγχνον πεπλημενον
 κάμνη τῶν πέψιν, ὁ κότε διάρροια τὸν

Ventriculus concoctioni destinatus
 uiscus in concoquendo laborat,
 cum alui profuuium, que Græci Diarrhæa
 uocant,



uocant, hominem premit, & est liquidi alimenti inconcocti profluuiū: nisi à recenti & proxima causa unum aut alterum tantum diem permanente oriatur. Præterea & totus homo debilis redditur, quia corpus non alitur, unde longus morbus, Coeliacum quem uocant, efficitur, latinè uentricularis dici potest, ob concoquentis caloris imbecillitatem, frigusque uentriculi: cum liquefcit quidem à calore alimentum, sed non concoquit calor, neque in succum proprium uertit, semicoctum imperfectumque relinquens, cum perfectionem assequi non possit. Id uerò concoctione destitutum ad prauum commutatur & colore & odore & consistentia. Albus est enim bile priuatus color: olida excernuntur, & lutulenta; liquida & inconsistens ob profligatam actionem substantia est, uirtutem modo atque principium coctionis præferens. Hac de causa uenter flatuosus est, rudus assidui, tetri odoris. Quod si deorsum penetrent: strident intestina, flatus erumpunt asperi, humidi, argillofi. Videtur autem ipsis tanquam humidum quoddam effluere. Dolor uentriculi grauis est, aut subinde punitiones referens, gracilis uerò, & emaciatus homo redditur, pallidus, iners, nihil ex negotijs uisitatis ualenter efficiens: sed cum ambulat, membra labascunt, temporum uenæ exertæ sunt. Siquidem ob alimenti penuriam tempora habent concaua: atque in omni corpore uenæ insignes apparent: non modo enim morbus iste non concoquit, uerum statim neque in molem corporis distribuit. Nam haud solum concoctionis, sed etiam digestionis uitium mihi esse uidetur. Porro si in incremento morbus sit, materias ab omni corpore in uentriculum rursus adducit: tunc ea jam est corporis eliquatio, os est aridum, superficies

αἰθρωπον ἴχει. καὶ ἐστὶν ὑγρῆς τροφῆς ἀπέπτε ἢ διαρροία. ἀλλ' ὡς μὴ ἐπιχεοῖται τῆς αἰτίας γίγνεται τὸ εἶς μίαν ἢ δύοτέρῳ ἡμέρῳ μούνω. πρὸς δὲ καὶ ὁλος ὁ αἰθρωπος ἀσθενεί, ἀτροφίῃ ἔσκηνε. χροῖνι νῆσος ἢ κοιλιακῆ γίγνεται. ἀτονίῃ τῶ πένσοντος θερμοῦ, καὶ ψύξι τῆς κοιλῆς. εὐτε λύεται μὲν ἐς θερμόν ἢ τροφή. ἀλλ' ἐκ ἐκπέσσει θερμόν, ἐδ' ἐς χυμόν οἰκίον τρέπει, ἡμιτελέα δὲ λείπει ἀδρανείῃ ἔτελε. ἡ δὲ ἀφειῖσα τῆς ἐργασίης ἐς κακὸν ἀλλοιοῦται καὶ χροῖνι, καὶ ὀδμῇ, καὶ συσάσει. λυκῆ μὲν γὰρ καὶ ἀχολος ἢ χροῖνι. κακοδμα δὲ καὶ βορβορώδεια. ὑγρῆ δὲ καὶ ἀσύστατος ἀπραγία. μένον δὲ ἀρῆλῳ ἴχουσα τῆς πέψιος τὴν ἀρχὴν. διὰ τὸδε φυσώδεις ἐστὶν γαστέρα ἐρυγαί, ξυνεχέες, κακώδεις. ἢν δὲ καὶ κάτω περὶ σωσι, τρυζοί μὲν τὰ ἔντερα, φύσαι δὲ διεξίῃσι διασῆσαι, ὑγρῆ, δερμιλώδεις. φανταῖται δὲ ἐπ' αὐτέοισι ὡς* διεκθρόντος ὑγρῆ. πόνος τῆς κοιλῆς βαρὺς οἰκίον νύγμα, ἀλλοίε καὶ ἄλλοτε. ἰχρὸς δὲ καὶ ἀτροφος αἰθρωπος, ὠχρὸς, ἀδρανής. ἐδ' ἐν περὶ ξοῖται τῆς συνήθων εὐφρονος. ἀλλὰ κῆν βαδίζη, λυῖ) τὰ μέλεα, φλέβες κροτάφων ἐπηρημῆσαι. ἀτροφίῃ γὰρ, κοιλοκροτάφοι. ἐπιφλέβοι δὲ καὶ παντὶ τῷ σώματι. ἐ γὰρ ἐπέσσει μένον ἢ νῆσος, ἀλλ' ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐς τὸν ὄγκον ἀναδιδόι. δοκεί γὰρ μοι ἐ τῆς πέψιος μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναφορῆς τὸ πάθος ἐμυδρῆσαι. ὡς δὲ ἐπ' αὐξήσει ἢ νῆσος γίγνεται, ἀγαθὰ τὰ ἀπὸ ἔπαυτος εἰς τὴν κοιλῆν παλιν, εὐτε ἢ δὲ ἢ τικεδῶν τῆς ἔξιος. ἀναλέοι δὲ τὸ σῶμα, ἀνικμοί

K διέτιω



ελετω Ἰππολὼν, ἀνιδρωτες, κοιλίη
 ἄλλοτε πυριφλεγῆς ὡς * ἀπ' αἵθρα-
 κος. ἄλλοτε ὅπως ἀπο κρυσαλλῆ ψυ-
 χροσάγδης. ὁκότε δὲ καὶ αἵματισι
 ἐξάρισιν ἐν * σκυβαλοισι Ἰππὶρρέει
 ξυθὸν, ἀκρίτον, ἀμιγῆς, ὡς δοκῆεν
 φλεβὸς σόμιον ἀνεῶχθαι. ἀνεδίει
 γὰρ τὸ σφύμι τὰς φλέβας. μήκισον
 καὶ δυσταλθῆς κακόν, καὶ γὰρ ἦν δοκῆεν πε-
 πικῶς ἀνδρὸς φανερῆς προσάσιθ,
 παλινδρομέεισαιθις, ἦν ἦδη καὶ Ἰππὶ
 σμικρῆ ἀμαρτωλῆ, παλινόρσος ἦκα.
 ἐς ἀειόδον γουηὶδε φοιτῆ. γέγρασι
 ξυιηθῆς τὸ κακόν, καὶ γυναιξίμαλλον
 ἢ αἰδρωσίσι. παιδίοισι δὲ διάρροια καὶ
 ξυνεχῆς, ἐφημέρω ἀκρασίη προσφῆς.
 ἀλλ' ἐκοιλίης κῦται ἰνδσος. πικρὰ δὲ
 θέρως τῶ ἄλλων ὡρέων μάλλον. με-
 τὰ πωρρον δ' αἰτερον, χειμῶν δὲ ὀψυ-
 χροτάτθ, καὶ ἀγχεσβεσι τὸ θέρ-
 μων ἦκη ἐπὶ χρονη ὅπως, καὶ ἦδε, καὶ
 δυτελειρην, καὶ λφενλεῖν πικτέ). ἀλλὰ
 καὶ χανδὸν ψυχροποσίη κοτε ξυνέση-
 σετὼ νοῦσον.

* κῦμαλοισι.

εἰς

ΠΕΡΙ ΚΩΛΙΚΩΝ.

Κεφάλ. η.

Κωλικοὶ δὴ κλεινοὶ εἰλεῶ καὶ σφό-
 Φωξίως. πάνυ μὲν οὖν αἵ πα μύρια
 ἰχθὶ τ' διαθείσιος. σημήια, βαρῶ μὲν
 ἐπὶ αἰσιτή, ἰθάδε τὸ πάθος. μάλισα
 ὅ κραινεί, ὄκνος πελύς, νωθέες, ἀπό-
 σιτι, ἰχθιοί, ἀγρυπνοί, οἰδαλέοι, ἀσέ-
 σωπα. κῆν μὲν πρὸς τὴν ἀσπληνί νοσήη
 κωλον. μελαγχλωροί. λευκόχλω-
 ροί, ὁκόσοι, ἀσέσι ἢ παπ. ξυμπαθείη
 τῶ ἀγχεσάσπλάγχων. ἦν ὅ ἀσέ-
 σαίρωνται προσφῆν καὶ ἐπὶ σμικρῆ καὶ

* οἰλι.

squallida, nihil sudant : uentriculus
 nonnunquam ut ab ardenti carbone
 peruritur, aliàs tanquam à crystallo
 congelatur. Interdum uerò sanguis
 in extremo uitæ discrimine constitu-
 tis in dejectionibus flauus defluxit,
 purus, non permixtus : ut uenæ ostio-
 lum patefactum esse uideatur. Acredo
 nanque uenas exedit. Longissimum
 & difficulter curabile uicium est. Ete-
 nim si absque manifesta causa desisse
 uidetur; iterum inuadit, ubi & ex leui
 errore iam denuò suboritur. Percu-
 cuitum igitur morbus iste reuertitur.
 Senibus hoc malum familiare est, &
 mulieribus magis quàm uiris. Pueris
 autem uentris effluuium assiduum
 est, ob quotidianam cibi intemperan-
 tiam, sed non uentriculi debilitate
 morbus aduenit. Ex anni temporibus
 æstas hoc malum sæpius affert,
 secundo autumnus : deinde hyems
 frigidissima, si proximè ad extindio-
 nem calor deueniat. Diuturnum quo-
 que morbum & affectus iste, & diffi-
 cultas, & læuitas intestinorum con-
 sequuntur. Verum & largissimus frigi-
 dæ potus interdum hanc labem pro-
 genuit.

DE COLICIS, ID EST, intestini plenioris morbo laborantibus.

Caput VIII.

Colici sanè uoluulo & stropho, id
 est, torminibus celeriter necantur,
 longè plurimæ sunt hujusce morbi
 causæ. Signa uerò hæc sunt, grauitas in
 ieiunio, (quando quis se à cibis abstinet) ubi
 affectus maximè urget: pigritia multa
 adest, tardi sunt, cibos refugiunt, graciles,
 uigiles, facie tumidi. Quod si propè
 splenem ægrotet colon, id est, laxius
 intestinum colorè habent nigrū cum
 uiridi mixtum : albū uerò cum uiridi, si
 propè jecur. Ab his enim proximis uis-
 ceribus malū comunicatur. Sin autem
 cibū acceperint, quantum uis paucū &
 flatu



flatu vacantem, mirum in modum tum inflantur, & distendi quidem cupiditas eos incessit, sed inferius exitus intercluditur: superius uerò ructus uolenter tentati neq; ipsi finē assequuntur. Si qua uerò parte flatu ui erūpunt, uirosi planē odoris sunt sursum petentes, & acidos ructus excitātes. Renes & uesica in partē huius doloris adducuntur: & urina cohibetur. Istis alia pro alijs accedūt. Miraculū autē his majus est, quòd in testes & cremasteras, id est, suspensores inopinatus dolor inuadit. Nō paucis medicorū hęc morbi comunicatio in occulto est: siquidem nonnunquam & suspensores exerceunt, propriam morbi causam eos continere opinati. Quocirca & his pro alijs alia fiunt. Ab hoc quoque uitio alia prodeunt, abscessus, & ulcera non mitia, aqua intercus, & phtisis, morbi insanabiles. Nam à frigore & crassis humoribus, & longē glutinosa pituita propositi intestini *morbus* exoritur. Quin etiā & ætate, & tempore, & regione frigida, & aspera hyeme prouenit.

ἀφύσω καὶ ἄρα φυσώδεις, ἢ παρθυμὴ μὲν ἐς διαπνοήν, * ἀδιέξοδοι δὲ φύσαι, ἐρυγαί τε * ἀνω διεύρηται, ἀτὰρ καὶ αἰδέα τελέεις. καὶ ὅπη περησθία, φύσαι βρομώδεις μὲν αἰάνω, καὶ ὄξυρυγμώδεις νεφρὸς καὶ κύστις συμπαθεῖα πόνω, καὶ ἰσχυρή, τρέλοισι ἄλλα ἀντ' ἄλλων. θώμα ὅ τετέων μέζον, ἐς ὄρχιας καὶ κρεμαστῆρας ἀδόκητον ἄλγος ἐπιφοιτῆ. πολλὰς τῶν ἰντεῶν ἡδε ἡ συμπαθειή λήθει. καὶ γὰρ καὶ ἰξέταμόν κολε, τὰς κρεμαστῆρας, ὡς ἰδίω ἐχούιας αἰτίω. ἀλλὰ γὰρ καὶ τρέλοισι * αἰν' ἄλλων ἄλλα. γίγνον ὅ καὶ δπόρκοι τῆδε νεσοί, ἀποσάσιες μὲν καὶ ἐλκεα ἐκ ἐνήθεα. ὕδροι ὅ καὶ φθίσιες, ἀναλθέα. ἐπὶ γὰρ ψυξί καὶ χυμοῖσι παχέσι καὶ φλέγμασι πολλῶν κολλώδεσι ξυνίστα ἡ νόσος. ἀτὰρ καὶ ἡλικίη καὶ * ὠρη. ψυχρῆ ἰπιφοιτῆ χῶρη, καὶ χεῖμα πικρῆρα.

* αἰδιέ.
* ἀνω μὲν
ἰδύμ.

* ἄλλα μὲν
ἄλλων.

* ὠρη.

DE DYSENTERIA, ID est, difficultate intestinorum. Caput IX.

ΠΕΡΙ ΔΥΣΕΝΤΕΙΝΣ, Κεφάλ. θ.

Superiora intestina ad cæcum usque tenuia & biliosa sunt: atque inde Græce Cholades nominantur, post hæc inferiora usque ad intestini recti initium crassa & carnosia sunt. In omnibus ulcera fiunt. Dysenteria uerò est horum ulcerum species: iccirco & uarij existunt morbi. Aliqua etenim superficie tenuis intestina radunt, ex coriationem tantum facientia, & innoxia sunt: sed longē innocentiora, si in inferioribus intestinis consistant: alia paulò etiam profundiora ulcera. Verum neque hæc immitia sunt. Alia profunda non uno loco manentia, sed exedentia

Εντέρων τὰ μὲν ἀνω λεπτὰ καὶ χολώδεα μέσφι τῆ τυφλοῦ, * χολάδες ἐπὶ κλην. δπό ὅ τῆ ἐν ἰά κατώ παχέα καὶ σαρκώδεα μέσφι τῆ δέχης τῆ ἐν θέος ἐνήθεα. ἐγ γίγνε ὡς ἐν ἀπασί ἐλκεα. δυσεντερίη ὅ τῆδε τῶ ἐλκείων αἰδέα. διὰ τῆδε ποικίλαι ἕασαι νεσοί. τὰ μὲν γὰρ ἰπιπολῆς ξέει έντερα, ἀναδόμεν μὲν ἰω ποιεύμερα, καὶ ἔστιν ἀσινέα. ἀτὰρ ὅ ἀσινέερα πολλόν, καὶ (τὰ) κατώ ἡ τὰ παθη. ἄλλη ὅ εἰ σικρῶ μὲν ἐπ βαθύτερα ἰά ἐλκεα, ἐκ ἐνήθεα ὅ καὶ τὰδε. ἄλλα βαθεα καὶ ἐχίσα μὲρα, ἀλλ' ἐδ ἰομὲρα,

χολάδες.



περίεργα.

δυσκολία.


σπίρημα.

χυρίων οίων.

έντερον.

σθένωδ'εα, έρπον. τα κ' έπισφακελί-
 ζοντα, θανατώδ'εα. αταρ κ' φλεβία έπι
 τ'ισι νομησι γίγνον) * ωειδρωια, εντε
 τ'ισι έλκεσι κ' σαξίες αιμορραγίας
 τ'μέζον. άλλο είδος έλκέων, οχθώ-
 δεα, τσηχέα, ανώμαλα, τυλαινια,
 ως εν ξύλω όζον είπομεν. * δυσαχ-
 θέα τα δε. έτε γδ ώτειλην ρηιδίως ίχθ.
 ρηίτερονίε (γδ) λύον). αιτίαι τ' δυσεν-
 τερίης μυρίαι, επίκαιροι τ', απεψίαι,
 ψύξιες συνεχέες, δριμέων πρόσαρ-
 σις, μυηιαξ κρομμυς αυτ'ε, * σφορό-
 δε, κρεών παλαιών δριμέων έδωδη.
 έφ' οίσι απεψία, υγρόν απθεσ, κυκεών,
 η * ρυλιών πόμα, η * οία κατά χωρίω
 εκάστην αντή οίνε γίγνε) διψεος άκε-
 α. αταρ κ' πληγή, κ' ψύξις, κ' ψυχρο-
 ποσίη, πικρσι έλκεα. αι τ' εκκρίσιες κ'
 τα ξυνεόντα τ'ισι έλκεσι έτερα κ' έτε-
 ρα, επ' άλλοισι κ' άλλοισι. μεν γδ
 επ' πολλης εν, ανωθεν μεν λεπία, χο-
 λώδεα, ανοσμα, πλυ οκόσον απ'
 * εντέρων. τα τ' δ' απο τ' ηςτος, κατακορέα
 μάλλον, κροκοειδέα, κακώδεα. τα τ',
 κ' ξυν τ'η τροφή λελυμμένα μεν άλλα
 τσηχείη. άλλοτε κακοδμών έσι, τα δε
 έλκεα σπιδών. άλλοτε τ' ίχθ, ως δ' απο
 σκυβάλων μενον ή οσμή. απο δε τ'ω
 κάτω επ' τ'ισι έλκεσι, υδατώδεα,
 λεπία, ανοσμα. ην τ' επ' μάλλον βα-
 θέα ίχωροφδέα, υπέρυθρα, οινώδεα.
 η εκως κρεών πλύμα. άλλοτε μεν ιδίη
 τα δε, άλλοτε τ' ξυν τ'ισι κοπεραιοσι. και
 τα δε υγρά λελυμμένα πα' περιρρώ,
 άχολα, ανοσμα. η ξυνεσώτα ξηρα
 έξιασι, ολιωηρα πα' περιρρώ. ην τ' μέ-
 ζω κ' λιότερα η τα έλκεα, επ' μεν τ'ισι
 ανω, χολώδεα, κ' αφ' ών κ' δι' ών έρ-

glandulosa, serpentina, & sphacelū in-
 ferentia, mortifera sunt. Venula quoq;
 in hisce ulcerū passionibus circūforā
 apparēt: & in his ulceribus stillationes
 sanguinis largiores cernuntur. Alia est
 species ulcerum, quæ oris tumentibus
 aspera sunt, inæqualia, callosa, ut in
 ligno Gemam dicimus, id genus ulcera
 uix medicabilia sunt: neque enim cicat-
 tricem faciliē contrahunt, & facilius
 aperiuntur. Dysenteria causa pluri-
 ma sunt; principes autem cruditates,
 refrigerationes assidua, acrium cibo-
 rum assumptio, obsonij, quod Græci
 Myttoton uocant, Latini Moretum
 dicerent: cæpæ ipsius, allij, carniū
 uetustarum, acrium esus: à quibus po-
 stea cruditas superuenit. Super hæc hu-
 midū aliquod inuistatū, ut mixtura il-
 la, quæ Cyceon Græcè dicitur: aut po-
 tio Ryteon appellata: potius bryteon, ut
 in lib. 1. c. 9. quæ potio ex uinaceis conficitur.
 aut qualia in singulis regionibus loco
 uini sunt contra sitim remedia. Plagu
 præterea, & refrigeratio, & frigida po-
 tus intestina exulcerant. Excrementa
 uerò, & quæ cum ulceribus sunt, alia
 atq; alia in alijs atq; alijs reperiuntur.
 Nā si in superficie sint; ex superioribus
 quidem tenuia, biliosa, inodora, præ-
 ter eum, qui ab intestinis fit, odorem:
 jejuni autem intestini excrementa
 puriora, crocea, mali odoris. Aliqua
 uerò & cum alimento liquato qui-
 dem, sed aspero exeunt. At modo gra-
 uis odor ab ulcerum putredine fit,
 modo ut à solo stercore prouenit. Ab
 inferiorum autem intestinorum ul-
 ceribus aquosa, tenuia, sine odore fe-
 runtur. Sin profundiora ulcera sint,
 saniosa effluunt, subrubida, uinosa,
 aut instar aquæ, in qua caro lota sit:
 & hæc modo sola, modo cum sterco-
 re, hocque liquidum est circumfuso
 humore dissolutum, non infectum bi-
 le, inodorum: aut compactum, sic-
 cumque, sed ob humorem circum-
 fluentem lubricum delijcitur. Cæterum
 si majora, leuioraque ulcera sint, &
 in superioribus intestinis: eorum ra-
 tione, à quibus, & per quæ tran-
 seunt,



ferunt, biliosa effunduntur. Sed enim uellicant. Nam bilis acris est, eoque magis si ab ulceribus effluat. Bilis uero & instar unguinis pinguis est: ex profundioribus autē ulceribus, sed inferioribus cruenta manant, crassa, pituitosa, carnosa, non ualde pinguis, ramencosa: utpote quæ ab intestinis abstrahantur. Quin etiam & integræ intestinorum partes commixtæ sunt. Excernuntur quoque & albida, crassa, mucosa, adipis concisæ similia, humore circumfusa. Hæc utique à recto oblongo intestino feruntur. Nonnunquam sanè mucosa tantum, uellicantia, parua, teretia, mordaciaque egeruntur, crebro surgere cogētia, & deiciendi cupiditatem cum uoluptate asferentia, sed quæ deijciuntur ualde pauca sunt. Tenesmus huic uitio nomen est. A cæco autem carnes longe rubicundæ, & grandes excernuntur, circumscriptionem multo maiorem habentes: in ipso enim profunda fiunt ulcera, cruor etiam crassus, faculentusque emanat: & hæc omnia multo quam ante diuina sædius olent. Cæterum postquam serpunt, & exedunt ulcera, & nullo remedio ullo in loco coërceri possunt, à superioribus quidē non solum exquisitè biliosa, sed & crocina, spumea facem uini referentia, & nigra, isatidis, & porri succum representantia, antedictis crassiora: atque instar putredinis graueolentia deijciuntur. Alimentum nunc minus concoctum est, solum ut à dentibus uoracius contritum. At si inferiora intestina ulceribus erodentur, guttæ cruoris atræ, crassa, carnosa, rubida, grumosa, nonnunquam nigra, multis modis uariantia, olida, non ferenda per sedem expelluntur: humiditatumque exitus inuoluntarij fiunt. Nonnunquam oblongum quiddam in pluribus non discretum, instar sani intestini deijcitur: & ignaris rei suspicionem præbuit intestini. At negotium ita se habet, intestinorum

χρῆ. κὶ γὰρ τὴν ἐδρὴν δάκνει. δριμεία γὰρ χολή, κὶ ἐπὶ μᾶλλον ἢν ἀφ' ἑλκεος. κὶ ἡ χολή ὅτι πίων ὅπως λίπας. ἐπὶ ὅτισι βαθυτέροις τῖσι κάτω, αἰμάλω ψπαχὺς σὺν φλέγματι, σαρκωιδέα, ἐκάστα πῖνα, ξυσματώδεα ὡς ἀπ' ἐντέρων * εἶται. ἀτὲρ κὶ ὅλα συμμέμικτῶν μέλεα. Φέρεται λυκαί, παχέα, μυξώδεα, σέα πξυγκοπένι ἰκελα ξὺν τῶν περιόρω. ταδε μὲν τι δὲ εὐθέως ἔσθρα μήκεος ἐντέρω. ἄλλοτε ὅτι μυξώδεα μένον, ὀδαξώδεα, σμικρὰ, σρογγύλα, δακνώδεα ἐξανασάσιας πυκνὰς, κὶ πσοθυμίω ξὺν ἠδονῇ πεύμωρα, ἐκκρίσιας ὅτι κάρλα σμικρὰς. * τήνα σμὸς τῶ δὲ ἠδὲ πικλησις. δὲ τῶ * κωφῶ φέρονται κὶ σάρκες ἐξέρυθροι κὶ μεγάλα, περιγραφήν πολλὸν μέζονα ἔχουσαι. βαθέα γίγνεται τὰ ἑλκεα, κὶ αἷμα παχὺ, πσυγῶδες. τὰ δεκάκοδμα τῶ πρόθεν μᾶλλον. ἐπὴν ὅτι ἐσπη κὶ ἐσθί τὰ ἑλκεα, κὶ ἰσχη) μὴ δαμά ἐπὶ μὴ δέν, ἀνωθεν μὲν πρὸς τοῖσι χολώδεσι τοῖσι κατωτέρω, κροκώδεα, κὶ ἐπαφρα, πσυγίζοντα, κὶ μέλανα, ἰσατώδεα, πσασοφδέα, παχύτερα τῶ πρόθεν, κακώδεα, ὅπως ἠσπηδῶν διαχωρέει. πσοφῆν ἢν ἀπεπιδέρη, ὡς ὑπὸ ὀδύλων λάβρων ἰερίμωρη μένον. ἢν ὅτι ἀκάλω ἀνεσθίεται, αἰμάλω πες μέλανε, παχέα, σαρκωιδέα, ἐξέρυθρα, * θρωκώδεα, ἄλλοτε μὲν μέλανα, * παυλοίως ποικίλα, κάκοδμα, ἐφορητὰ, ἀφέσεις τῶ ὑγρῶν ἀεβλητι. ἀπελυθη κὶ ἐκὶ εὐμηκεσ ἀκρίλον κατὰ * πλεῦνα, ὅπως ὑγῆς τ' ἐντερον, κὶ δέος παρέχεν αἰμφί * ἐντερον τῖσι ἀγνοῶσι ἔσθρα γμαλὸς. τῶ δὲ ἐστὶ τοῖον δελῶν ἐντερον ὅπως

κὶ ἄλλοτε

πυκνὰς

κὶ σμικρὰς

κὶ κωφῶ

κὶ μὴ δέν

θρωκώδεα

κὶ παυλοίως

κὶ πλεῦνα

κὶ ἴσ. ἀμφί ἐπὶ τῶν τοῖσι ἀγνοῶσι τῶ πξυγμα



τῆ κοιλίης χιλιώνες ἔασι *δοιοί. ἀτὰρ καὶ
 ἀλλήλοισι ἐπιβάλλουσι οἷδε λοξοί. ἦν
 οὐκ ἢ διπλὴν λυθῆ, ὁ μὲν ἐντὸς χιτῶν
 δ' ὑποστὰς ἐς μῆκος, ἔξω χωρὲς. ὁ δ' ἐκ-
 τὸς, μίμνη μῆκος, καὶ σαρκαῖ) καὶ ἐπιώλει-
 λαῖ), καὶ ἀλθαξοῖ), καὶ ζώσι αἰσινέες.
 παρὰ τὸ ἔκαστω μῆνον, ἀπὸ τῆ δὲ τῶν
 χιλιῶν τὸ σαρκαῖ) δ' ἐστίν. ἦν ὁ αἷμα διπ-
 λῶ ἀγγεῖα φέρη) ξανθὸν, ἢ μελαν,
 καθαρὸν ῥέει, ἀμιγῆς τροφῆς, ἢ σαρκαῖ
 λων ἄτερ. εἰ δ' ἐπιπαγος ἐπιελάνυτο
 πλάσει ἀραχνίοισι ἰκελος. θρομβῶ)
 * ἦν ψυχθῆ. καὶ γὰρ ἡ πίστις αἵματος ἐκ-
 κρισίς. τὰ γὰρ οἷα πολλῶ ἔξιν πνεύμα-
 τι μέζον τ' ὀρεῖσάσιν ἢ φαντασίη τ'
 ἐκκρίσις. γίνεσθαι καὶ ἐν κώλῳ πύξ
 ἰκτὸς αἰσίν, καὶ ἐν τῶν ἄλλων τῶν ἐντὸς
 ἐλκῶν, ξυνοπρεπεσέρη καὶ γὰρ τὰ σπη-
 ῖα καὶ τὸ πῦον καὶ ἀλθαξίς τῶν ἐλκῶν, ἢ
 ὠλὴ. ἦν ὁ ἐκκρίσις σκληρὰ τῶν σαρ-
 κοειδέων ἔωσι τετραμυθῆσαι τρηχέσι
 σώμασι ἰκελαί, ἢ δ' ὑποστὰς ἐστὶ ἐν-
 θεοστροπέ. ῥέει καὶ πολλὸν διπλῶ κώ-
 λα ὕδωρ, δυσεντερικῶ δ' ἐστὶ τροπὸν ὕδρω
 ποσ τὸ δὲ μυρίως ἐρρύσαλο. τὰ μὲν ἔλ-
 κέα, ὡς ἔπος εἶπεν, τὰ ἐν τοῖσι ἐντέροι-
 σι, τοιαῦτα. ἀτὰρ ἡ δὲ καὶ ἡ τῶν δεῖδ' ἐν, καὶ
 αἱ διπλῶν δ' ἐκκρίσις, ὁκόσας ἐλεξα.
 φράζω ὅτι καὶ τὰ ξυνεόντα ἕκαστοι τῶν
 νοσεούτων, ἢ ἢ ἐντέρα, ἢ ἢ τε. σιναραῖ ἢ
 τὰ ἔλκεια. ἀπὸ οὗ μὲν οὐκ εἰρήσῳ, ἦν
 ἐπιπολῆς ἀναδορῆ, ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ
 τῶ ἢ ἢ, ἀπυροί, ἀπυροί, ὄρθος ἀδ' ἢ ἢ ἢ ἢ
 ἀζομυροί, σμικρῆσι τῆσι διαίτησι ἕτε-
 ροίως. ἦν ὁ ἔλκος ἐγγύχη), ἐπὶ μὲν τοῖ-
 σι ἄνω, σφόδρος δ' ἀκνώδης, δριμύς, ὡς
 διπλῶ χολῆς θερμῆς σμικρῆς, ἐμπυσι
 ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε τὸ ἢ πλεόν, ἐμπυον.

tunica perinde ac ventriculi geminae
 sunt, & altera alteri oblique super in-
 leata est. Igitur cum earum connexio
 dissolvitur, interior tunica secundum
 longitudinem abssistens foras egre-
 ditur: exterior sola intus remanet, &
 carnosa efficitur, & cicatrice solidatur:
 sanescunt quae homines & noxa soluti
 uiuunt. Id uero inferius intestinum
 solum patitur. In causa est tunicarum
 carnosa substantia. Quod si ex quo pi-
 am uasculo cruore emanet flauus, aut
 niger; purus, non cum cibo aut ster-
 core mixtus effunditur: uerum con-
 cretum quiddam latis araneolis simi-
 le extenditur. In grumum enim, cum
 refrigit, obduratur: neque sangui-
 nem excretum esse credideris. Ob so-
 num autem multum cum spiritu ma-
 jor quam pro effectu, excretionis est
 apparentia. Interdum & in pleniore
 intestino purulentus abscessus effici-
 tur, nulla nouitate ab alijs internis
 ulceribus differens. Etenim signa, &
 pus, & ulcerum medicatio penitus
 eadem sunt. Si res dura, carnosa con-
 tritis asperisque corporibus similes
 excernantur: abscessus non benigni
 moris significatur. Nonnunquam ex
 laxo intestino aqua multa dysenteriae
 modo profluit, idque plurimos ab
 hydropico morbo liberauit. Ulcera
 quidem intestinorum (ut paucis dixe-
 rim) huiusmodi sunt. Ceterum &
 ipsorum formae, & ab ipsis purgamen-
 ta tot sunt, quot supra comprehendi-
 mus. Quae singulis quoque aegrotan-
 tibus accidunt, explicabimus: seu pla-
 cida, seu noxia ulcera sint. Itaque col-
 lectum dictum esto. Si exulceratio su-
 perficietentis fuerit siue supra, siue in-
 fra: febrem non habent, nec dolorem:
 ac sine decubitu tenui uictus ratione
 diuersis modis sanescunt. Sin ulcus
 altius descenderit, in superioribus
 quidem mordacia tormina & acria
 sunt tanquam a pauca calida bile.
 Alijs, atq; alijs temporibus suppurant
 intestina: plerunque uero suppurant,

τὰς
 ἐκκρίσις.



aut coctiones dimidiatae sunt, cibos tamen non horrent. Si inferiora ulcera sint, longe superioribus sunt salubriora. Haec enim humiliora intestina multo carnosiora sunt alijs. sin causa & depascentia ulcera in superioribus grassentur : febres acutae concitantur, non emicantes, in uisceribus demerita : extrema refrigerantur : cibus fastiditur : uigilia adest : ructus male olent : nauseabundi sunt : bilis uomitus, uertigo. Cumque multa expelluntur (ea uero biliosiora sunt) tormina, atque alij dolores magis persequerant. His accedit uirium consumptio, genuumque resolutio : ardore aestuant : sitibundi sunt & anxij : atra per nauseam reijciunt : lingua est arida : pulsus pusilli, debiles : atque his germana sunt, quotquot, de perniciosis ulceribus mortifera exposui. Oris etiam uentriculi dolore usque ad animi deliquium torquentur. Quidam uero neque ex eo deliquio in pristinum restituti sunt, sed in tali affectu uitam finierunt, huiusmodi calamitates & inferiorum intestinorum corrosionibus communes sunt, si depascentur ulcera, neque eorum depasitionem compefcere ualemus, praeterquam quod tormina doloresque sub umbilico inferius, ubi ulcera sunt, percipiuntur. Formae autem excrementorum tales sunt, quales supra posuimus. Verum si inter initia parua ulcera sint, in longumque tempus depasitio producat : alia alijs ulcera superueniunt, aliquibus mitescantibus, aliquibus in summum excrecantibus. Quales enim sunt in mari fluctus, talis est in ulceribus tempestas. Caeterum si quando natura resistere potens fuerit, simulque & Medicus subuenerit, depascentia compefcitur, mortisque timor remouetur : intestina tamen dura, tumida, cicatricosaque remanent, & non nisi longo post tempore

ή πέψις ήμιτελής, εκ δπόσι. καὶ ὅ-
 τισι κάτω ἔλκεα γίνη), πολλόν πα-
 σιν ἐσθλαίων ἀνω. καὶ γὰρ ἐντέρα πολ-
 λόν τε μάλλον τῶν ἄλλων σαρκώδη. ἢ ὅ-
 κοιλα καὶ ἀνεσθίωντα ἐς τὰ ἀνω γέ-
 νη), πυρετιόξείες, ἀλαμπείες, ἐν τοῖσι
 σπλάγχνοισι. ὑποβρύχιοι, ἀείψυ-
 ξις, δπόσιτις, ἀγρυπνία, ἐρυγαί κα-
 κώδεες, ναυτή, χολή, ἐμερι, σκοροδί-
 νη. καὶ ὅ πολλή μὲν ἡ φροή, χολώδε-
 σέρον ὅ γίγη). Ἰπμοιοι σρόφοι, καὶ
 ἄλλοι πόνοι μάλλον. ποπ, καὶ ἐκλύσι-
 ες δυνάμιος, ὑπολύσιες γουνάτων,
 καυσώδεες, διψαλεί, ἀσώδεες,
 ναυτή μελαιών, γλώσσα ξηρή,
 σφυγμοὶ μικροὶ ἀτροι. * τρετέων
 ἀδελφά, ὀκόσα ἐπὶ τοῖσι κακοειδέσι
 ἔλκεσι ἔλεξα τὰ θανατώδεα, καρδι-
 ῶσσι μέσφι λειποθυμίας μετεξέ-
 ληροι ὅ, εἰς ἐς ἀνάλησιν ἐπαλησθώ-
 μησαν. ἀλλ' ἔτως ἐξέθανον. τὰ δὲ τὰ
 δεινά ξυνὰ καὶ τῆσι δπό τῶν κάτω ἐν-
 τέρων διαβρώσει. καὶ νέμηται μὲν τὰ
 ἔλκεα, ἀχέλος ὅ ἡ φροή. πλὴν ὀκόσον
 οἱ σρόφοι καὶ οἱ πόνοι ὑπὸ τὸν * ὀμφα-
 λὸν κάτω, ἐνθα τὰ ἔλκεα. ἰδεαὶ ὅ αἰ-
 δετῶν ἐκκρίσεων, ὀκοίας ἔλεξα. καὶ
 ὅ Ἰπμοιοι πρῶτισι μικρά ἢ, * ἀνα-
 κωχή ὅ εἰς μακρὸν * ἢ νομῆς, ἄλλα
 ἐπ' ἄλλοις ἔλκεα γίγνεται, τῶν μὲν
 πρηνομῶν, ἄλλων ὅ κορυφωμῶν,
 ὀκως ἐν θαλάσῃ κύματῶ. τῶν δὲ τῶν
 ἐλκείων χῦμα. καὶ δὲ ἐκ κοτὲ
 ἐπαρκέση μὲν ἡ φύσις, συνασ-
 κήση δὲ καὶ ὀιητρός, πέπαυται
 μὲν ἡ νομῆ, καὶ * θάνατον ἐκ ὀρρω-
 δέει. σκληρὰ δὲ καὶ ὀχθώδεα μίμ-
 νει τὰ ἐντέρα, καὶ * τῶν δὲ ἐς μακρὸν
 ἢ ἀλθε-

καρδίων

καρφαλόσ

ἢ νομῆ

θάνατον

δν.



ἡ ἀλθεξίς. αἱμορραγίη ἢ ἀπ' ἐντέρων,
 ἢν μὲν μεγάλης φλεβὸς ἢ * δριπίδος
 ἐστίν, ὡκυὸς ὁ θάνατος. εἰ δὲ γ' ἐξ ἑτέρας χεί-
 ρας δυνατὸν ἔσω' ἐσμάσαται, καὶ ἔσ' ἀλ-
 γος θίγειν, ἢ φάρμακον αὐτῷ τῷ
 ἔλκει προσβάλλειν, καὶ τὴν εἰ ἐπίχροι-
 τὴν αἱμορραγίη φαρμάκω, ἐκ ἀρε-
 κῆς ἔθανάτης ἢ φυγῆ. μελέξείεροισι
 γ' μεγάλης ἐχάρης ἐκπίωσις, τὴν
 φλεβὸς τὸ σόμιον ἐς μέζον εὐρύνη, εὐ-
 τε καὶ θρόμβοι ἐνδον ἐγγίγνοντο καὶ μίμ-
 νουσι ἔσω, ἀφυκτὸς ἢ νεσος. καὶ οὐδ'
 δραχμῆσι αἱμορραγίησι δριπίδων.
 δὴλη ἢ ὡς ἐπίπαν γίγνεται μέλασσα,
 εἰ καὶ μὴ πάμπαν εὐσημος. * ἀσηξί-
 νεσι, ἀπορίη, βάρος ἔτι περ, ἐνθα ρήσεται
 ἐρυθρῆμα ἔπερσώπερ, ἢν μηδέ κω-
 ραγίη. καὶ μὲν ἢ φλεβὸς νεορραγίης ἐστίν,
 ὡς ἐπίπαν μαλθακάσεται πάμπαν. ἢν
 ἢ πρόσω ἢ χρόνος, χαλεπώτερον καὶ
 βραδύτερον. τὰ δὲ μὲν τὰ ἐντέροις
 ἔλκεα γίγνεται ἢ θέρους * ὥρη, δευτέ-
 ρον φθινοπώρου, * ἢ σον ἢρος, ἢ κίσα
 χειμῶνος. καὶ διάρροιαί μὲν παιδιοῖσι
 καὶ μετράκιοισι. δυσεντερία ἢ ἀκμάζου-
 σι καὶ νέοισι. γῆρας ἢ δυσάλθεος καὶ ἐς
 ὠτειλήν χρόνον. τὰ δὲ ἀνεσδιόμητα
 γέρονσι, ἀήθεα. ἀτὰρ καὶ αἱμορραγίη
 ἐν μεσῶν γῆρας.

* αἱμορραγίη.
 * αἱμορραγίη.
 * ἀσηξί-
 * ἀσηξί-
 * ἀσηξί-

sanescunt. Verum enimvero cum ab
 intestinis cruor erumpit, si ex magna
 uena aut arteria exeat, matura mors
 aduenit: neque enim aut manum in-
 tromittere, doloremque attingere,
 aut medicamentum ipsi ulceri adhi-
 bere possumus. Quin etiam si medi-
 camento sanguinis profluuium coër-
 cetur, non propterea tuta est, ac uera
 mortis euasio: quandoquidem non-
 nullis magna crusta (Escharam Græ-
 ci uocant) decidens, uenæ ostiolum
 patentius efficit. Vbi uerò & grumi
 intus concresecunt, intusque reman-
 ent, ineuitabilis morbus est. Inci-
 pientibus igitur sanguinis eruptioni-
 bus succurrere oportet. Plerumque
 autem cum futura sunt, licet non ad-
 modum claris signis, tamen sese in-
 dicant. Anxietas enim adest, & animi
 ambiguitas: grauitas ea in parte est,
 quæ rumpitur: & facies rubet, si non-
 dum ruptura facta est. Sin autem ue-
 na proximè rescissa est, plurimum
 uenter mollitur omnino: si satis tem-
 poris præterijt, difficilius atque tar-
 dius soluitur. Huiusce qualitatis sunt
 intestinorum ulcera. Præcipuè na-
 scuntur æstatis tempore, secundò au-
 tumni, minus uere, minimè hyeme.
 Pueris quidem, & adolescentibus uen-
 tris profluuia contingunt: difficul-
 tas autem intestinorum uiris & iuue-
 nibus. Senecta uerò ægrè medicabilis
 est, & ad ducendam cicatricem lon-
 gum tempus requirit. At ulcera ex-
 dentia senibus inusitata, sanguinis ue-
 rò profusio senectæ est conueniens.


ΠΕΡΙ ΛΕΙΗΝΤΕΡΙΗΣ.
Κεφάλ. ι.

Ἦν ἐπὶ δυσεντερίησι καὶ ἔλκεσι πλα-
 γῆσι καὶ κάστα βαθέσι τῶν ἀνω ἐντέρων
 ὠτειλαὶ ἐγγίγνονται πυκναὶ, * πα-
 χῆαι, στερέμιοι, τὰ σιτία ἐκ τῶν διε-
 ἐς τὰ κάτω παχέες διεκθίει ὕγρη,
 ἀδιάκριτα ἔπροφίμα. τὸ γ' τῶν ἐντέ-
 ρων ἀραιον δὲ ἔπερ ἐς, τὴν ἀνω

DE LEUITATE
intestinelorum.

Caput X.

Si à torminibus, & ab latis, ualdeque
 profundis superiorum intestinorum
 ulceribus cicatrices crebræ, crassæ, so-
 lidæque contrahantur: stercora ex his
 deorsum liquida, ab alibili indiscreta
 prolabantur. Intestinorum enim
 raritas, per quam sursum uersus
 alimonia



alimonia discurrit, à cicatrice inter-
 clusa est. Homo igitur nutritionis
 inopia laborat : & pallor adest, & in-
 firmitas. Affectus iste qui ab cicatrice
 fit. Lienteriæ cognomen accepit, ab
 intestinis sc. quæ Græci Enterauo-
 cant : & nunc quidem à cicatricibus
 morbus exoritur. Aliàs uerò intestina
 cicatricis expertia sunt, sed consue-
 tundo & exercitatio intestina profluui-
 um pati edocent. *Si enim quod in istis
 est calidum refrigeratum neque concoquat,
 neque ad distributionem incitetur, sed pre
 imbecillitate retinere non possit, omni
 confectione alimentum distribuitur.* Quod
 si ex tempore, & non stabilis, sed leuis
 momenti purgatio fiat, simplex à ci-
 bis uomitus morbum soluit. Sin au-
 tem aliquo tempore prorogetur, & in
 fede firma istorum causa permaneat,
 nihil opis uomitus affert. Morbus
 quoque longus, & malus habitus,
*quem quis se erigendo ac stando compara-
 uit, lienteriam peperit.* Aqua intercus
 nonnunquam in hanc ægritudinem
 feliciter commutata est, in malum sc.
 ex malo, sed melior est successio.

Φορῶν ἢ τροφῆ ἀναίσις, ἀπέκλεισεν
 ἢ ὠτειλή. ἀτροφίῳ οὖν τὸν ἀνδρωπον
 ἴχει καὶ ἀχροίη καὶ ἀρνίη, Πικκίω τὸ
 πάθος λειεντερικῆ ἴχει. τὸ ἐπὶ τῇ ἔλῃ λέ-
 γω τῶ ἐν ἔρω τ' ἐνομα. καὶ νῦν μὲν εἰς
 ἐλκῶν ἐστὶ ἡ πάθη. ἄλλοτε δὲ ἐντερο-
 μὲν ὠτειλὴν ἐκίχθη. ἔθος ὅ καὶ μελέτη
 * διαρρῦεῖσα ἐκιδιάσθη τὰ ἔντερα. τὸ
 γὰρ ἐν τρέμοισι θερμοὶν καὶ καταψυχ-
 θέν κολεμητέ· καταπέσση, μήτε ἐς τὴν
 ἀναφορῶν * ἀναίσις. ἀκροίον ὅ τ' ὕ-
 ἀσθενίης ἐστὶ, διαδιδρῆσκει πᾶν ἔργον ἢ
 τροφῆ. ἀλλ' ἢ ἐν χέλιος καὶ μὴ ἐδραίη
 γένηται ἢ καθαρσις ἀλλὰ φωνή,
 ἀπλῆς ἔμετος διτὸ σιπίων ἔλυσε τὴν
 νόσον. ἢν (δὲ) πρὸς ὠκεία χροῖα καὶ ἐν
 ἐδρῇ ἴζη ἢ αἰτὴ τρέων, ἐδὲν ὠφέλει.
 τίλει ὅ καὶ χροῖα νόσος καὶ ὀρθοσάδω
 καχεξίη. ἀτρε καὶ ὑδρωπῆς κολεεῖς δὲ
 ἀπέσκηψαν εὐτυχῶς, ἐς κακὸν μὲν
 ἐκ κακῆ, ἀλλὰ κρέσων ἢ διαδοχῆ.

* ἴχει.
 ἴσ. διαρρῦεῖσα
 * τούτω οἴστ
 θερμόν
 * καταπίστον
 * ἀναίσιον ἀ-
 κροίον.
 ἀδωσ κατ-
 πίστον.
 * ἄλλως ἀναί-
 σις.

DE VTERI morbis.

Caput XI.

ΠΕΡΙ ΎΣΤΕΡΙΚΩΝ.

Κεφάλ. ια.

Mulieribus uterus ad purgatio-
 nem & partum bonus est, sed
 morborum infinitorum, malorum-
 que aceruum congerit. Neque enim
 ulceribus tantum, & inflammationi,
 & fluori obnoxius est, uerum etiam si
 totus repente sursum uersus mouea-
 tur, celerem interitum affert. Alibi
 quidem scriptum est, qui nam ipsius
 morbi perniciosi acuti sint. Diurni
 uerò hi : fluor duplex, duritia,
 ulcera aliqua innoxia, aliqua ma-
 ligna, exitus totius aut partis. Fluor
 sanè ruber, aut albus est, forma decla-

Τῆσι γυναῖξι ὑσέρη, ἀγαθὴ μὲν
 ἐς καθαρσιν καὶ τόκον. Συμφορὴ ὅνου-
 σων μυελίων τε καὶ κακῶν. καὶ γὰρ ἐλκῶν
 ἢ φλεγμασίης ἢ πρὸς μένον, ἀλλὰ
 καὶ ἐξ ἀπίνης ὅλη ἀνω κινῆται, ὠ-
 κέως κτείνει. γεγραφέαται μὲν οὖν
 ἐν ἄλλοισι, ὅμοια τῶ ἀπ' αὐτέων ἢν
 ὀλέθρια ὄξέα. τὰ δὲ χροῖα ρόθ δι-
 πλόθ, ἐκληρίη, ἐλκεα, τὰ μὲν ἀσί-
 νεα, τὰ δὲ κακοῖα, πρὸ-
 πῆσις ὅλης ἢ μέρεθ. ρόθ
 μὲν οὖν ἐρυθρὸς ἢ λευκός ρόθ. ἰδέα



δηλοῖ. ἔρευθρος μὲν ἰὼ αἷμα ξανθόν,
καὶ αἰτῆσθε ιδέαμ ἢ πελιδνόν, ἢ μέ-
λαν, καὶ λεπτόν ἢ παχὺ καὶ πεπηγός,
* οἶτε θρόμβοι, ἢ λευκός ὡς ὕδωρ, ἢ
ὠχρόξανθος ὡς χολή. παχὺς ὁ ὅπως
ὑπόλεπιος, ἢ λεπτός ἰχὼρ καὶ κάκοσι-
μος. λευκός ὁ ὡς πύον, ὁ ὅς ἀτρεκῆς, ὡς
λευκός ὄρρος. ἀτὰρ καὶ αἰμάλωψ κο-
τε τῷ πύω συνεχέει. μυεῖαι ὅσ' ἄλλαι
ᾧδ' αἰτῆσθε μαλλον τρέων καὶ ἥπιον ιδέαμ.
ᾧδ' ὁδός ὅσ' ἄλλοτε μὲν ἢ ἴπ' ἰμιῶα
κάθαρσις, ἀλλ' ἐκ ἐς τὴν δ' ἔρχαιμ
ξυνίστα) ᾧθεσμίμ. καὶ πολλὸν μὲν
τὸ αἷμα, ἐν ὅσ' πολλῆσι ἡμέρησι ἐκρέε. ὀ-
λιγήμερος ὅσ' ἡ διάλειψις, ἀλλὰ κα-
θαρή. ἄλλος ᾧδ' ὁδὸς τρέπος, εἰς προ-
θεσμίην ὅσ' καὶ ἐκ ἐς πλῆθος* ᾧδ' πλεί-
στον ἢ πρῶτη καθαρισ. δις ὅσ' ἡ ἴρις κα-
θαίρην) ἀνά πάντα τὸν μῆνα. ἄλλη ἰ-
δέη ἀχερς μὲν ἢ ῥοή καὶ σμικρὴ ἐφ' ἡ-
μέρης ἐκάσθης, ἀλλὰ εἰς τὸν ὅλον μῆνα
καὶ πάγχυ βαμῆ. καὶ δὲ γὰρ ὑσέρη μύει τὸ
σῶμα, ἀλλὰ οἴγνυ), πάρεσιν ἐς ῥύσιν
ὑγρότης πάρασσα. εἰ δὲ μήτε δια-
λείπει, μήτε σμικρὸν ἐκρέει, αἰμορ-
ραγίη* θνήσκασι. σημήια δὲ. ᾧδ' ὅσ'
τῆσι χροίησθ' ῥόα ἢ* χροίη τῆς ἀνθρώ-
που. ἀργυρνοί, ἀπόσιτοι, ἀσώδεις, ἐκ-
λυτοί. ἴπ' τὸ ἔρευθρον μαλλον, καὶ ὀδυ-
νώδεις, καὶ* κάκοσιμον ἐπ' αἰ-
φοῖν τὸ ῥεῦμα. ἀλλὰ μαλλον καὶ
ἥσον ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε. ὁ μὲν γὰρ
λευκός κακίων ἰὼ μέζων που ἢ σπ-
πεδῶν ἐη. ἄλλοτε δὲ ὁ ἔρευθρός ἰὼ
ἀργυρῶν ἢ διαβρωσις. ἀθρόον δὲ
εἰρηθῶ, μέλας μὲν ἀπάντων* κα-
κίων, πελιδνός δὲ ὑστερον. ὠχρός δὲ
καὶ λευκός καὶ πῶδης, μακρότεροι μὲν,

declarat. Ruber quidem, si sanguis
flavus emanet, & hujus species: uel
liuidus, uel niger & tenuis, uel crassus
& concretus, ut grumi. Albus, ut aqua,
aut flavus cum pallido mixtus ut bi-
lis; crassus uero aut subtenuis liquor,
quem Græci Ichora uocant, & male
olens. Albus item, ut pus, sed exquisi-
te albus, ut album serum. Quin etiam
gutta cruenta, nonnunquam cum pu-
re simul effluit: mille aliæ sunt secun-
dum rationem majoris & minoris
istorum species. Circuitus uero mo-
do est menstrua purgatio, sed non ad
pristinum præscriptum diem reuertit-
tur. Non multus quidem sanguis, sed
per multos dies effluit. Paucorum
autem dierum fit interpositio, sed
omnino pura. Alter est circuitus mo-
dus, sed ad certum diem: neque plu-
rimi sanguinis est plerunque prima
purgatio, bis autem ac ter purgantur
per totum mensem. Tertia est quo-
que fluoris species, indefinens qui-
dem effluuium est, & singulis diebus
modicum: sed in totum mensem sum-
ma fit non admodum modica: neque
enim uterus osium claudit, sed hiat,
ad effluxum humiditatis relaxatio-
nem patiens. Verum si neque inter-
mittatur, neque parum effluat, ob
sanguinis effusionem moriuntur.
Signa utique hæc sunt, præter humi-
ditatis effluentis colores, ipsius homi-
nis color, peruigilant, cibos oderunt,
fastidiose sunt, dissoluuntur in rubro
profluuiio magis, & dolore torquen-
tur, & in ambobus quod effluit, mali
odori est, sed modo magis, modo mi-
nus. Album enim profluuium pejus
olet, si quando major adest putredo.
Alias autem rubrum, cum sæuius de-
bacchatur erosio. Breuibis sanè di-
cum esto; ater fluor omnium pessimus
est, deinde liuidus. Pallidus, albus
& purulentus, diuturniores quidem
sunt.

* οἶον


* ἰπ'

* θνήσκουσα

* χροσθήτις

* κάκοσιμοι

* κακός



sunt, sed minus periculosi. Ex his ipsis pallidus deterior quidem est, sed longè melior est ille, qui cum usitato colore mixtus est: usitatus autem est ruber, ejusque species. Quin etiam & ipsis minus noxij sunt usitati: sed reuera senioribus infestiores sunt rubri fluxus, puellis uero minimè albi nocent. Item altera est albi fluoris species, menstrua purgatio, exalbida, acris, & pruriginem cum uoluptate afferens. In istis uerò humoribus, crassus, geniturae similis prouocatur; hanc speciem Gonorrhæam, id est, fluxum seminarium muliebrem appellauimus. Est autem uulua refrigeratio: quam obrem humorum tenax esse non potest: quin etiam sanguinem in albidum colorem transmutat: uim enim ignis rubrificam non habet. Id genus uitij & stomachus patitur, ideò & pituitam euomit. Simili affectu & intestina laborant, cum profluuiò Græce Diarrhæa uocato, ægrotant. In utero præterea ulcera suboriuntur, aliqua lara pruriginosa, tanquam sale inspersa: hæc sunt quædam superficie excoriatio. Pus habent crassum, in odorem, paucum. Ulcera hujusmodi mitia sunt. His cauiora sunt ulcera & deteriora, quibus dolores parui accidunt, pus paulò plus, grauius olent: nihilominus tamen hæc quoque placida sunt *Si uero altiora fiant & ulcerum ora immittia sint & aspera, sanies quadam vetri odoris & maior quam antea dolor existit Exedit autem uulua ulcus, & nunquam caruncula quædam separata egreditur, neque ad cicatricem ulcus id ducitur, sed longissimo tempore hominem tollit: nam maxime diuturnum est.* Hujusmodi Græco uocabulo phagedæna nuncupatur. Nempe mortifera ulcera sunt, si præter ipsa dolor exacerbat; & mulier ualde contristatur: & res putrida ab ulcere neque ipsis ægrotis tolerabilis emanat,

ἡσασον ἢ κινδυνώδεις. τέτων ἢ ἀυλιών ὁ ὠχρὸς κακίων μὲν, πολλὸν δὲ κρέστων ὁ πῶ συνήθει μειγμῆος. ξυνήθης ἢ ἐρυθρός μὲν καὶ τὰ τε δεῖ εἶδεα. ἀταρξὴ ἀσινέεροι ταυτήσιν οἱ ξυνήθεις. τὸ ἢ ἀληθές γεραϊτέρησι κακίονες οἱ ἐρυθροί. ἡκίστα δὲ νενησι οἱ λευκοί. ἄλλος ῥόος λευκός, ἢ Ἰπμήνιος καθαρσις λευκὴ δριμύεια, ἢ ὁ δ' αἰσώθης ἐς ἠδονήν. Ἰπὶ ἢ τοῖσιν ὑγρὰ λευκοῦ, παχέος, γονορροίας παροκλήσις. τὸ δὲ τὸ εἶδος γονορροίαν γυναικείαν ἐλέξαμεν. ἐστὶ δὲ τὸ ὑσέρης ψυξίς, ἔνεκεν ἀκρατῆς τῆς ὑγρῶν γίγνεσθαι. ἀταρξὴ τὸ αἶμα ἐς χροὴν λευκὴν ἀμείβει. ἔτι δὲ πυρὸς ἐκίχθ' ἢ φοινίσσον. τὴν δὲ τὴν παθῆν καὶ σόμαχος νοσέει καὶ ἐμέει φλέγμα. ἀταρξὴ ἢ ἕτερα ὁμοίον ἰχθ' εὔτε τὴν διάρροϊαν νοσέει. γίγνεσθαι ἔλκεα ἢ ἐν ὑσέρη, τὰ μὲν πλατῆα, κινσμάδεα, ἀπερ' ἄλλα, ὅπως αἰαδορῆ πρὸς ἐπιπολῆς, * πύον παχὺ, ἀνοσμον, ὀλίγον. εὐήθεια τὰ δὲ τὰ ἔλκεα. ἄλλα τῶν βαθυτέρων κακίονα, οἷς πρόγοι σμικροί, * πύον ὀλίγον πλείον μάλλον, κάκοσμα, ἀλλ' ἐμπης εὐήθεια καὶ τὰ δὲ. καὶ ἢ Ἰπὶ μάλλον βαθεῖα γίγνεται, ἢ τὰ χεῖρα τῶν ἐλκῶν ἀπηνεία, ἢ τσηχέα, ἰχώρ τις κακώδης, ἢ πόνθ' τῶν παρὰ ἐν μέζων. ἀνεσθίει ἢ τὴν ὑσέρη τὸ ἔλκος. ἔξηκει ἢ κοίε καὶ ἀπολυθέντι σαρκίον μὴ εἰς ὠτελλῶ ἰὸν μήκισον κλάνει τόδε. χροῖον γίγνεται καὶ ῥα. τόδε ἢ φαγέθαινα κικλήσκει. ὀλέθρια ἢ τὰ ἔλκεα, ἢ τὰ πρὸς τοῖσιν ἄλγος ὁξυτή καὶ ἢ ἀνθρώπος ἀπορῆ σπηδῶν ἢ ἀπὸ ἔλκεθ' ῥέει ἔτε αὐτέρησι φορητή, ἀγριαίνει



ἀγριαίνει ψάσσει τε κὺ φαρμάκοι-
 σι, κὺ χαλεπαίνει * πῶς κὺ ἰητήρη. φλέ-
 βες δ' ἐν ὑσέρη ἐς ὄγκον ἀεργήαι ξὺν
 πῶσι ἀσέσι τῷ πέλας. * ἐστὶ ἢ πεπυ-
 μῖοισι ἐκ ἀσπμον τῆ ἀφῆ. οὐ γὰρ ἄλ-
 λως δῆλον. πῦρ δὲ κὺ ἀσπ ἔπαντός
 κὺ σκληρὴν ξύνεσιν, ἢ περὶ τοῖσι θηρώ-
 δεσι θανατώδεα ὄντα ἔλκεα ἀτὰρ κὺ
 ἑπικλησιν ἰσχυρὰ καρκίνων. ἄλλος καρ-
 κίνος, ἔλκος μὲν ἐδραμῆ, ὄγκος δὲ
 σκληρὸς, ἀτέρα μιν. ξυνπιναίνε τὴν
 ὑσέρην ὄλλω, ἀτὰρ κὺ ἄλγεα καὶ τὰ
 ἄλλα ὅσα ἐφέλκει. τῶν ὡν ἢ ἀμφω
 τὰ καρκινώδεα, καὶ χρόνια, καὶ ὀλέ-
 θρια. πολλὸν ἢ τὸ ἔλκος τῆ ἀνεγκώ-
 τικῆ κίον, κὺ ὄσμῆ, ἔπνοισι, ἔζωῆ,
 κὺ θανάτῳ. ἑξίσταται κοτε τ' ἐδρησῆ
 ὑσέρη ὄλη, καὶ ἐπὶ τοῖσι μηροῖσι τ' γυ-
 ναικὸς ἰζάνει. ἀπὸς ἢ ξυμφορῆ,
 ἀλλ' ἐκ ἀθέτησ ἢ ὑσέρη, ἐδ' ἐγέννη-
 τῆ ἢ αἰτίη. ξυνδίδοται γὰρ οἱ ὑμῖνες, οἱ
 πῶσι τῆς λαγόνας, ὄχῆες τ' ὑσέρης
 ἐόντες νδρωδέες. οἱ μὲν κατὰ πυθμέ-
 να πῶσι τὴν ὄσφυν λεπτοί. οἱ δὲ κατ'
 αὐχένα ἔνθα ἔνθα πῶσι τῆς λα-
 γόνας. οἱ ἢ μάλισανδρωδέες, πλα-
 τῆες ὄκως νεῶς λαίφρα. πάντες οὐδ'
 ξυνδίδοται οἱ δὲ, μὲν ἔξω ἢ ὑσέρη
 * αἰσθη. κλείνε μὲν οὐτὰ πολλὰ ἐκ-
 πῶσι τῆ δὲ γίγνε) γὰρ ἑπὶ ἀμβλυσ-
 μῶ κὺ σεισμοῖσι μεγάλοισι ἔβιαίω
 τόκῳ. μὲν δὲ μὴ κλίση, ἐς μακρὸν αἰ-
 δε ζώσιν, ὄρεσσαι τὰ μὴ θεπτά, καὶ
 πθλωῦσαι ἔξω, κὺ καυκαλῶσαι τὴν
 ὑσέρην. διοκεί δὲ κοτε τ' διπλῆς τ'
 ὑσέρης ὁ ἔνδρον ὑπεζωκὸς χιτῶν,
 εὔτε ἀποπαῖται ἔξω ἀφ' ἑ. δόλαι
 γὰρ ἀγχιες μέναι ἀπηλαγμέναι

efferaturque manuum atrectatione
 & medicamentis, & quolibet genere
 medelæ exasperatur. Venæ autem in
 utero turgent, & proximæ simul partes
 distenduntur. Id uerò perspicacibus
 medicis tactu depræhenditur: neque
 enim aliter liquet. Cæterum ignis &
 anxietas totius, & duritia simul, ut in
 feris ulceribus insunt, quæ & ipsa mor-
 tifera sunt, nec non & Cancri appel-
 lationem obtinent. At cancer neuti-
 quam ulcus est, sed tumor durus & in-
 domitus, qui unâ totum uterum di-
 stendit: dolores quoque, & reliqua
 omnia, quæ in ulcere insunt, cancerum
 comitantur. Hæc eadem uerò cance-
 rosa utraq; sunt, & diuturna, & per-
 niciosa. Ulceratus autem cancer non
 ulcerato longè improbius est, & odo-
 re, & doloribus, & uita, & morte. Non-
 nunquam integra uulua de sede sua
 egreditur, & mulieris feminibus in-
 sidet. Incredibilis calamitas: sed ne-
 que inaspèctabilis est uterus, neque
 ingenerabilis causa. Relaxantur enim
 membranæ ilibus appensæ: quæ ute-
 ri sunt ligamenta neruosa: quæ in
 fundo sunt juxta lumbos gracilia,
 quæ in ceruicè hinc atque inde juxta
 ilia, maximè neruosa, lataque sunt:
 qualia nauigiorum uela cernuntur.
 Omnes igitur hæ membranæ remittū-
 tur, cum uulua foras procidit, ple-
 runque lanè hujus exitus mortem af-
 fert. Accidit enim ex abortu, & mag-
 nis concussionibus, & uiolento partu.
 At si non interficit, diu hæ uitam pro-
 ducunt, non uisibilia uidentes, extra
 alentes uterum, atque fouentes. Vi-
 detur autem nonnunquam duplici-
 tatis uteri interius succingens tunica,
 quando à contiguo diuellitur. Gemi-
 næ nanque membranæ tantum sunt
 differentes à tunica. Hæc uerò absce-
 dit & fluxione, & abortu, & uiolen-
 to partu, quando ipsa secundis
 inhæret



inhærescit. Nam cum ipsa ui extra-
hantur, simul & uteri tunica extrahi-
tur. Verum nisi pereat mulier, re-
uertens eadem tunica utero adamuf-
sim connequitus, aut paulum extra
prominet: contegit autem femini-
bus mulier. Nonnunquam uteri oscu-
lum solum ad ceruicem usque proci-
dit, sed rursus intrò se recipit, si ute-
rus suffimenta mali odoris olfaciat:
ipsum quoque mulier attrahit, *ut gra-
ta odorem olfaciat.* Quin etiam ob-
stetricis manibus paulatim intrò re-
currit, si placide & sensim prematur:
& ante mitigatorijs uterinis oblinatur.

χιτώνος, ὃ ἴσως ἀφίσταται μὲν καὶ
ρέυματι, αἴτε καὶ ἐν τρωστικῶ καὶ βιαστικῶ
ῥήκῳ, εὔτε ἐπιπύχῳ χωρίῳ πρὸς πέ-
φυκεν αὐτή. καὶ γὰρ τὸ δὲ ἔλκη βίη,
συνεκπεράσας ὃ τ' ὑσέρης χιλῶν, ἀλλ-
λὰ καὶ μὴ ἐκβαίνει ἢ γυνή, παλιν οὐ-
σος ἐς τὸ αὐτὸ συνήφθη καὶ σαθρή, ἢ
σμικρὸν ἔξω φαίνεται. σκέπη γὰρ τοῖσι
μορφοῖσι ἢ γυνή. πρὸς πίπτει καὶ τὸ
σόμιον τ' ὑσέρης μοῦνον μέσφι τ' ἔ-
αὐχένος, ἀλλ' αἰθίς εἰσὼ δὲ, καὶ
ὄσφραϊν ἢ ὑσέρη, θυμῶσι κακῶ δέσι
ἐλκει ἢ αὐτὴν καὶ ἢ γυνή, ἢ ὄσφραϊ-
ν ἢ θυμῶν ἐυδέων. ἀπὸ τῶν χερσὶ
μαίης ἀπέρμα εἰσὼ θεί, ἢ συχῆ
πεζυμῆ καὶ χειρομῆ πρὸς ἐν τοῖσι
ὑσέρης μελίγμασι.

DE ARTHRITIDE
& Ischiade, id est, Articulorum
& Coxendicis dolore.

ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ,
καὶ ἰσχιάδος.

Caput XII.

Κεφάλ. 16.

Communis omnium articulo-
rum dolor est Arthritis: sed pe-
dum dolorem Podagram uocamus,
coxendicum Ischiada, manuum uerò
Chiragram. Nempe aut ex tempore
dolor est, si ex aliqua parum durante
causa confluat: aut latenter medi-
tationibus longo tempore contra-
ctus est morbus, cum ab exigua oc-
casionē dolor & morbus accendun-
tur. Est autem omnium simul ner-
uorum affectus, si auctum malum
omnibus ingruat. Initio uerò nerui
articulorum uincula, & quæcunque
ex ossibus exorta sunt, & in ossa inse-
runtur; dolere incipiunt. At istorum
magnū est miraculū; non dolent qui-
dē uel minimum, etiā si quis secet, aut
collidat: at si quis ab ipsis doleat, nihil
aliud est eis ad dolorem citandum

Ξυλὸς μὲν ἀπάντων τῶν ἄρθρων
πόνος ἢ δερτίσις. ἀλλὰ ποδῶν μὲν
ποδάγραν καλέομεν, * ἰσχιάδα δὲ
ἰσχίων, χειρῶν δὲ χιρῶν. καὶ γὰρ
μὴν χέδος ἢ ἐπιπύχῳ πρὸς σκαίρων
αἰτίων ὁ πόνος, ἢ κρύβδη ἢ μελέτησι
πολλὸν χρόνον ἢ νῆσος. εὔτε ἐπιπύ-
φασε σμικρῆ ὁ πόνος καὶ ἢ νῆσος ἐ-
ξήφθη. ἐστὶ δὲ ἀπάντων μὲν ξυλλή-
δην τῶν νεύρων ἢ πάθη, καὶ αὐξηθὲν τὸ
κακὸν ἀπασὶ ἐπιφοιτῆ. δερτὴ δὲ, νεῦ-
ρα τὰ δεσμά τῶν ἄρθρων καὶ ὀκόσα ἐξ
ὄσέων πέφυκε καὶ * ἐν ὄσέοισι * ἐμφύ-
νει. θωμά δὲ τετέων μέγα. ἢ πόνει
μὲν γὰρ ἰριξ, εἰδ' ἀντέμνη τις ἢ θλίβη.
ἢ ἢ ἐξ ὀσέων πονῆ, εἰδ' ἕτερον ἀλγέει

* ἰσχίων δὲ ἰσχ-
ιάδα χερσὶν δὲ
χειρῶν.

* ὄσέων οἷσι.
* ἐμφύ-
νει.



τῶδε δυνατώτερον, οὐ σιδηρῶ
 σφίγγοντα, ἐδυσμα, οὐ πτερώσκον
 ξίφος, ἐκαίον πῦρ, καὶ ὃ κῆταῦτα
 ἐπαναιροῦνται ὡς μέζονων πόνων
 ἄκεια. καὶ ἡ τῶδε πῖς αὐτῶ, πονεῦν),
 ἀμαυρεῖται ὁ τῆς τμῆς πόνος σμικρὸν
 ὑπὸ τῆς μέζονος, ἡ δὲ ὁδὲ κρατή,
 ἡ δονήσφείας λάζυται Ἐπιλήθεσα
 τῆς πάρος. πάχισι ὃ τῆς ὁδόντες
 καὶ ὄσέα. αἰπίλω ὃ ἀτρεκέα μὲν ἴσασι
 μῆνοι θεοί, ἐπικῆαν δὲ καὶ ἀνθρώποι.
 ἐστὶ δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν, τριόνδε. τὸ μὲν
 κάρτεα πυκνὸν ἀναμάθητην ψαύσιος
 καὶ * τρώσιος, τῆς δὲ καὶ ἀπονον ψαύσι
 καὶ τρώσει. ἀλγῶ ὃ τῆς χεῖρα * ἐν
 αἰδήσει. τὸ ὃ πυκνὸν ἀτρήχυντην.
 διὰ τῶδε καὶ ἀπονον. τὸ ὃ ἀραιὸν, ἐυα-
 μαθητην, καὶ τῆς χύνεται τρώματι. ἀλλ'
 ἐπεὶ καὶ τῶ πυκνὰ ζῆ ἐμφύτω θέρμη,
 καὶ αἰδοιοτ τῆς δὲ τῆ θέρμη. εἰ μὲν ἐσι-
 ῶδης ἡ δρωσα αἰτή ἐοι, οἷον ἡ μά-
 χαρρα ἡ λίθος, τὸ οὐσιῶδες ἔπα-
 χοντες ἐκ ἀλγεί. πυκνὸν γὰρ τῶ
 φυλῶ. καὶ ὃ τῆς ἐμφύτω θέρμης δυσ-
 κροσῆ λάθηται, αἰδήσει ὃ γίνε-
 ται τροπή. τριτέων Ἐξέωυτής πονεῖ
 ἡ θέρμη, ἐκ τῆς κατ' αἰδήσειν ἐσωθεν
 ἐγείρεται ὡσι ὃ. φύσιος ὃ τῆς ἐς μέζω
 ἡ ὀρεκσίης, τῶ ἀλγεία. * ἐγχιρίμ-
 πεται ὃ ἡ δρωρίης ἄλλοτε ἐς ἄλλα
 ἄεθρα. τοῖς μὲν ἐς ἰχία, καὶ τῶ πολ-
 λά τῆς δὲ Ἐπιμίμνει γυῖ ὃ, ἄσα τε
 μέλεια κοτὲ μικρὸν (ἡ γουῦ,) εὔτε
 οὐδὲ Ἐπιτῶ σμικρὰ φοιτῆ, πόδας
 τῆ καὶ χεῖρας. καὶ γὰρ μέζονων
 λάθηται μελέων χωρῆσαι τῶ νῆ-
 σον δυναμῶν, ἐκ ὑπερβαίνει τῶ
 ὄργανα, καὶ δὲ ἀπὸ τοῦ σμικροῦ δρ-

* ἀνθρώποις.

* κατ' αἰδήσει.

* αἰ.

* ἐγχιρίμπεται.

potentius; non ferramenta adstrin-
 gentia, non vincula, non uulnerans
 gladius, non exurens ignis. Nam &
 hæc assumuntur tanquam majorum
 dolorum remedia. Quod si quis ipsa
 dolentia ossa præciderit: sectionis
 dolor, ut exiguus à majore obscura-
 tur. Sin autem iste præualeat, eos
 uoluptas capit priorum malorum
 obliuionem afferens. Id sanè pati-
 untur dentes & ossa. Causam qui-
 dem ueram soli Dij nouerunt, pro-
 babilem uerò & apparentem etiam
 homines. Est autem (ut simpliciter
 dicam) huiusmodi. Quod præden-
 sum est; contractum, uulnerationem-
 que non sentit: iccirco & ex tactu
 uulnerationeque non dolet. Dolor
 enim est res aspera sensui: densum
 autem non exasperabile, ideò quo-
 que est indolens. At rarum bono
 sensu præditum est, & uulnere exaspe-
 ratur. Cæterùm quoniam & densa
 ingenito calore uiuunt, per hunc
 eundem calorem etiam sentire pos-
 sunt. Siquidem efficiens causa sub-
 stantialis sit, ut gladius, aut lapis, sub-
 stantialis patientis corporis pars non
 dolet: natura enim densa est. Sed si
 caliditatis insitæ intemperatura cor-
 ripiatur, sensus fit permutatio. Cum-
 que ipsorum ex se ipsa dolet calidi-
 tas, ab interna sensus pulsione exci-
 tatur. Natura autem in majus exce-
 dente, uel ex abundantia dolores pro-
 ueniunt. At aliàs in alios articulos
 morbus articularis inuadit, quibus-
 dam in coxendices, (eaque parte ple-
 runque claudus remanet.) & in alia
 quædam membra nonnunquam exi-
 guus. Quandoque nec in paruas par-
 ticulas transit, pedes & manus. Nam
 si maiora membra occupauerit
 morbum ipsum capere ualentia,
 instrumenta illa non supergre-
 ditur. Sed si ab exiguo membro mi-
 nimum



rum cœperit; mitis est, & inopinata inuasio. Iſchiadis quidem à femore posterius, aut poplite, aut tibiâ initium est. Aliàs uero in coxæ cauo (Cotylam Græci uocant, Latini Accrabadulum) dolor apparet, rursus in clunem aut lumbos impetum facit, & omnia potius esse uidetur, quam coxendicis morbus. Verum etiam articuli ita ferè dolere incipiunt, magnum pedis digitum dolor occupat: rursus calcem in priori parte, qua nitimur; deinde in concauam subit: Malleolus autem postremus intumescit. Doloris causam non legitimam afferunt, aliqui nouæ crepidæ attritum, aliqui longam obambulationem, alius plagam, aut calcationem, nullus intestinam domesticamque causam explicabit. Quin etiam ægrotis uerum audientibus incredibile esse uidetur. Quamobrem in insanabilem affectum inciderunt. Quoniam principijs, cum debilissimus morbus est, medicus non resistit. Qui ut temporis spatium uires acquisiuit, nihil Medici diligentia proficitur. Quibusdam in pedum articulis usq; ad mortem residet morbus, quibusdam in omni corpore ambitum uagatur, plerunque à pedibus in manus profilit. Neque enim multum interest in pedibus ne, an fiat in manibus: cum utriusque eisdem naturæ sint, graciles, ex carnes, externo frigori proximi, à calore interno remotissimi. Item cubiti flexura, & genu conueniunt. Posthæc coxarum cauitates, quas Cotylas Græci uocant, & uocatus peristrophus. Transitus quoque in dorsi, thoracisq; musculos fit: incredibileque est, quam latè malum serpat. Vertebrae dorsi, ceruicisque dolent; & in summo sacri ossis dolor in hærescit, simulq; omniū bos, asinus,

ζηταί, ἐστὶ εὐήθης καὶ ἀδόκητος ἢ εἰσβολή. * ἰχιάδος μὲν ἀπὸ μηροῦ κατόπιν ἢ ἰγνύου, ἢ κνήμης, ἢ δρχῆς ἄλλοτε δ' ἐπὶ τῇ κοτύλῃ τ' ἀλγημα φαίνεται, αὐθις ἐς γλαστον ἢ ὄσφυν * ἰκέλη, καὶ πάντα μᾶλλον ἐστὶν ἢ δόκους ἰχίε. ἀτὰρ καὶ τὰ ἀρθρα ὡδὲ πως ἀρχεται. Ἐπιπέδος τὸν μέγαν δίακτυλον ἀλγεί, αὐθις τὴν ἐπιπέδω πέντε, ἢ ποτὲ σπείζομεθα. ἔπειτα ἐς τὸ κοῖλον * ἦκε. τὸ δ' ὄσφυν δὲ ἰσώθησε ὕσαν. ἀρθρασι δὲ αἰπῶνται ἀναίπτον, οἱ μὲν κρηπίδου κενεῆς τρεῖς. οἱ δὲ μακρῶν ἀείδων. ἄλλο δ' ἐπὶ πληγὴν ἢ πάτημα. ἐδείξει δ' φράσει τὴν οἰκοθεν ὕσαν. ἀτὰρ καὶ ἀκέραισι τοῖσι πάχασι τὸ ἀτρεκέες ἐδόξε ἄπισον. διὰ τὸ δὲ ἐς ἀνήκεσον ἐτρέπη, ὅπερ τῆσι δρχῆσι ὁκότε ἀθενεσάτη ἐστὶν ἢ νοῦστος, ὁ ἰσπρὸς ἐκ * ἐνίσταται. καὶ τὸ χρόνον κρηπυθῆ, ἀνόνητος ἢ μελέτη. πῶς μὲν οὖν ἐς ποδῶν ἀρθρα μίμνει μέσφι θανάτῃ. πῶς δὲ ἐνέμεται ἐς τὴν τῆ παντὸς σκώετος ἀείδων. τὰ πολλὰ δ' ἀπὸ τῶν ποδῶν ἐς χεῖρας ἦξε. ἐγὼ μεγάλα τὰ ὄρα τῆ νῆσω χειρῶν τε καὶ ποδῶν, ὅτι ἀμφω ὁμοφύεα, ἰχνα καὶ ἄσαρκα, καὶ ἐγγυτάτω ἔξω ψύχεται. ἀπωτάτω δ' ἐς ἔσω θάλπει. αὐθις ἀγκων καὶ γόνη. ἐπὶ δ' τοῖσι κοτύλαι, ἀείσροφτος ἢ δὲ μετὰ βασις ἐς νώτε μύας καὶ θώρηκα. ἄπισον εἰς ὅσον ἐρεπει τὸ κᾶκόν. ἀπόνδυλοι ἀλγέσσι ράχεός τε καὶ αὐχένος, καὶ ἐς ἄκρον ἐρείθει τῆ ἰερεῖ ὄρεα καὶ ξυμπαντῶν τῶ ὄρεα, ὄνος,



καὶ ἡ ἰδέη ἐκάσθε ὀδύνη. ἀτὰρ ἦσθε
 τένοντες, * ἡ δὲ νυμῦες ζῶν ἐντάσι
 ἀλγέσαι. γνάθων καὶ κροτάφων
 μῦες, νεφρῶν καὶ κύστιος ἡ διαδοχή.
 ὡτὲ θώματος. Ἐπιπάσι πάχει ρίνας
 καὶ ὠτα καὶ χεῖλεα. πάντα γὰρ νεῦρα καὶ
 μῦες. τὴν κεφαλῆς ἡλγες. τὰς ῥα φάσ.
 ἐκείδως μὲν ὅτι πονέει, ἐδείκνε τῆν
 ῥα φῶν τὰ εἶδη λοξῶν, εὐθείην, Ἐπι-
 κάρσων, ὀπίσω τε καὶ πρόσω. ἰχνυλῶ
 δὲ τῶν ὀδύνην καὶ τοῖσι ὁσέοισι ἐμπε-
 παρὶ δὲ μῦ. πᾶσαν γὰρ ὁσέων ζυμβο-
 λῶν νέμεται ἡ νεσθ, ὅπως ποδῶν ἢ
 χειρῶν ἄρθρον. γίνονται δὲ τῆν ἄρ-
 θρων καὶ ἑπιπώρῳσιες. τὰ πρῶτα μὲν
 ὁκοῖον ἄποσάσιες ἰχθῶσι. Ἐπι ὅ μάλ-
 λον πυκνοῦται, καὶ πηγνυμῶν ἔστι
 γὰρ * ἀπηνέες αἰ ἀφέσιες. τέλος δὲ
 πῶρσι σέρροι, λευκοὶ ζυνίσανται. ἐς ὃ
 πᾶν ὄγκοι σμικροὶ ὁκοῖον ἰονθοι, καὶ
 μέζονες ὑγρὸν ὃ παχὺ, λευκόν, χα-
 λαζῶδες. καὶ γὰρ (τ) ἔπαντὸς ἡ νεσθ
 ψυχρῆ ὅπως χαλάζα. δοκείει ὃ θέρ-
 μης ἢ ψύξιος ἰχθῶν διαφορῶν. καὶ
 γὰρ * οἷσι τῶν εὐ ἐδελυκτέων ἡδονῆ.
 ἐμοὶ ὃ ἀνδράνει μίλω μὲν αἰτίων τὴν
 ἐμφύτων ψύξιν ἐμυδαί, μίλω ὃ καὶ
 πάθην. ἀλλ' ἐμὲ μὲν εὐθέως * Ἐπι δὲ
 καὶ θέρμη φανῆ, ἐμψύξιος χεῖρος, καὶ
 τοῖσι τέρπεται. ὀνομάζουσι ὃ θέρμῶν
 τὴν δὲ. καὶ ὃ ὀπῶνος ἐν τοῖσι νεύροισι εἰ-
 σωμίμη, ζυμπεπίωκη ὃ τὸ ἄρθρον
 ἀθερμον, μηδὲ ἐποιδέη, ψυχρὴν τὴν
 δε φαίλω ἐμυδαί, ἐφ' ἧς θερμῶν
 φαρμάκων ἐς ἀνάκλησιν θερμῶν
 χεῖρος. * χεῖρ ὃ τὰ δε πολλὰ τῶν κάρ-
 τῶν δρμῶν. θερμασίη γὰρ τὰ τε ζυμ-

& proprius cuiusque dolor. Verum
 etiam tendones & musculi cum di-
 stentione dolorem patiuntur; nec
 non maxillarum, & temporum mu-
 sculi. Item communicatur renibus
 & vesicæ. O rem admirabilem. Post
 omnia nares, & aures, & labia affici-
 untur. Nam quoquo versus nervi
 & musculi feruntur, dolent capitis
 futuræ, & quid doleat ægrotus igno-
 rans indicat futurarum species, ob-
 liquam, rectam, transversam, posteri-
 us ac prius. Tenuem autem dolo-
 rem & in ossibus defixum conqueri-
 tur. Vniuersam enim ossium com-
 pagem morbus populatur haud secus,
 atque pedis, aut manus articulum.
 In articulis quoque tophacea qua-
 dam coalescunt. Ab initio quidem
 ueluti abscessus occupant: postquam
 uerò magis spissantur, etiam concre-
 to humore difficiles fiunt inflexiones:
 demum tophi solidi, albi consistunt.
 In toto autem membro tubercula
 exigua, quales sunt Ionthi à Græcis
 appellati, Vari à Latinis, & maiora
 exurgunt. Humiditas uerò crassa, albi-
 cans, grandinosa est: nam & totius
 morbus frigidus instar grandinis est.
 Videtur autem caloris, aut frigoris
 differentiam præferre. Siquidem
 modo ex calore, modo ex frigore uo-
 luptas percipitur. At mihi placet
 unicam esse morbi causam insitam
 frigiditatem, unicumque esse affe-
 ctum, uerum si protinus increseat,
 & caliditas apparuerit, refrigeratione
 opus est: ac talibus delectatur: &
 huiusmodi affectum calidum uocant.
 Quòd si dolor in intimis neruis demo-
 retur, & articulus non calens colla-
 psus sit, neque extumeat; frigidum
 hunc esse dixerim: in quo ad caloris
 reuocationem medicamenta calida
 requiruntur. Multis autem ualdè acri-
 bus opus est. Caliditas enim colla-

ἡ δὲ νυμῦες

ἐπιπώρῳσι.

τὸν ὀπίσω ἐπὶ τῶν
λευκῶν.

ἐπιπώρῳσι.

ἡ δὲ νυμῦες.

psas



psas partes in tumorem excitat, & internum calorem ad superficiem euocat, quo tempore frigida medicamina proficient. Huic rei fidem id facit, quod iisdem eadem non conducent. Nam quod modo profuit, id aliàs noxium fuit. Atque (ut compendio dicam) calore in principio, frigiditate in fine opus est. Haud facile quidem continua podagra gignitur: sed nonnunquam longo intervallo temporis intermittitur: tenuis enim est. Et in ludis olympicis podagricus morbo sedato cursu uictoria adeptus est. *Viri ut facilius in hunc morbum incidunt, ita mulieribus lenius torquentur.* Mulieres autem, licet rarius, quàm uiri, difficilius tamen hoc uitio laborant. Quod enim neque usitatum, neque familiare est, id si aliqua urgente causa potentius euaserit, uiolentum cum sit, maiorem calamitatem infert. Ætas autem huic morbo subiecta est, à quinque annis, supra triginta. Celerius quoque, aut tardius, pro ut cuiusque natura, aut uictus ratio postulat. Atrocēs sanè dolores sunt, sed dolores comitantia atrociora: defectus animæ, ad manuum contactum immobilitas, ciborum auersatio, sitis, uigilia. Si discrimen euaserint, tanquam ab inferis elapsi laxiorem uitam degunt, incontinentes, simplices, hilares, *munifici*, & in uictu molles, ac delicati. Iccirco uerò tanquam *iterum mortem euasuri* licentiosè præsentī uita fruuntur. Multis in hydropicum morbum podagra concessit, quibusdam in deprauatam spirationem, Asthma Græci uocant, latini Anhelitum. Hæc uerò successio imedicabilis, atque inuitabilis est.

πεπλωκότα μέρεα εἰς ὄγκον ἤγειρεν
 καὶ τὴν ἐσω θέρμην εἰς ἀνάκλησιν ἤγα-
 γε. εὔτε τῶ ψυχρῶν χρέος. πῖσις, τῶσι
 γὰρ αὐτέοις εἰς αὐτὰ συμφέρεται. καὶ γὰρ
 ὅκοις ξυνήνεγκε, τούτ' ἐβλαψεν ἄλ-
 λοτε. ὡς δὲ ἐβλαψεν ἄλλοτε. ὡς δὲ
 ἔπος εἰπεῖν, θέρμης ἐπὶ τῇ δεξιῇ, ψύ-
 ξιος ὅ ἐπὶ τῷ τέλει χρέος. ξυνεχῆς μὲν
 οὐκ ἔστι ποδ' ἀγρη εἰρησίδως γίγνεται, δια-
 λείπει δ' ἔσθ' ὅπη χρόνον μακρὸν. λεπτή
 γὰρ καὶ ὀλυμπίασι ἐνίκησε ποδ' ἀ-
 γρὸς ἐπ' ἀνέσει δρόμον. ἀλλ' ἀνδρες
 μὲν παθεῖν ῥηίτερον, γυναικῶν δὲ
 ἐλαφρότερον. γυναῖκες ὅ ἀραιότε-
 ρον μὲν ἀνδρῶν, χαλεπώτερον δὲ.
 τὸ γὰρ μὴ ἐν ἐθεί, μηδ' ἐοικεῖον, καὶ ὑπὸ
 ἀνάγκης κρέασον γένηται, βίασὴν
 μέζονα πικτεῖ τὸ ξυμφερόν. ἡλι-
 κία τὰ πολλὰ μὲν ἀπὸ ἐτέων πέντε
 καὶ τετρήκοντα. θάσσον δὲ καὶ βράδιον
 ἐν τ' ἐκάστῃ φύσει, καὶ διαίτη.
 δεινοὶ μὲν οὐκ οἱ πόνοι, καὶ τὰ πα-
 εῖοντα πόνων μέζονα. λειποθυμῖν
 ἐπὶ τῆσι ψάσσει ἀκίνησιν, ἀποσιτή,
 δίψα, ἀγρυπνία. καὶ δὲ ἐπ' ἀνέλ-
 θωσι, τὰ μὲν ὅπως ἐν θανάτῃ πε-
 φουγότες, ἀνετιτὸν βίον, ἀκρατέες,
 ἀπλοῖ, εὐθυμοί, δωροδόχοι, καὶ ἐς τὴν
 διαίταν ἀβροί. τὰ δὲ ὅπως ἐν θανάτῃ
 αὐθις ἐσόμφοι ἀδδὴν χρέον τῆς
 ἐξουσίας ζῶν. ἀπέσκηψε πολλῆσι ἐς
 ὄρωπα ἢ ποδ' ἀγρη, ἄλλοτε ὅπως ἀδ-
 μα. καὶ τῶ δὲ ἀφουκτρῆ διαδοχῇ.

DE ELEPHANTIA-
 tiasi.

Caput XIII.

ΠΕΡΙ ΕΛΕΦΑΝΤΙΑ-
 σιῶ.


Κεφάλ. ιγ.

L 3 Έλε



Ἐλέφαντι τῷ πάθει καὶ τῷ θηρίῳ
 τῷ ἐλέφαντι ξυνὰ μόρια καὶ ἰδέη, καὶ
 * ἀλλοί. χροίη, καὶ μεγέθει, καὶ βιοτῇ. * ἀτὰρ εἰς
 ἀλλώτῳ ἰκελα, ἔτε τὸ πάθος πάθει,
 ἔτε τὸ ζῶον ζῶω. ἐλέφας μὲν γε τὸ
 θηρίον καὶ κάρτα διαφέρειν. πρῶτος
 μὲν γε μέγιστον καὶ πάχιστον. μεγέθει
 μὲν, ὁκόσον αὐτὸ ζῶον ἐπὶ ἄλλῳ ζῶω
 πυργηδὸν ἀναθείης μέγα. πάχιστον
 ὅ, ἐς πλεῦνα ζῶα πάχιστα, εἰς ὧν ἀλ-
 ληλα ξυθείης. ἀτὰρ εἰς ἰδέην κάρ-
 τῶ * ἰκελον χροίην μὲν * μέλανος
 κατὰ κορέος ἀπαντες, καὶ δι' ὅλας ἔσκη-
 νος. ἵππος μὲν γε ἄλλος μὲν λευκό-
 τῶτος, ὅπως οἱ θρηϊκῆς ῥήσου. ἄλλοι δὲ
 πόδαργοι, ὅπως μενέλεω πόδαργος.
 οἱ δὲ ξανθοὶ, ὅπως ἐκατόν καὶ πεντήκον-
 τῶ. ἄλλοι δὲ κυάνεοι. ἵππων εἰς ἀμε-
 νῶ παρῆλξασιν κυανοχαίτης. ὧδε
 καὶ βόες, ὧδε καὶ κύνες, ἠδὲ ὁκόσα ἀνά-
 τλῶ γλῶ ἐρπετὰ καὶ ζῶα φέρβεται.
 * ἰλεφάντας. * ἐλέφαντες δὲ μέντοι μέλανες, ζο-
 φοειδέες τὴν χροίην. νυκτὶ δὲ καὶ θανά-
 τῶ ἰκελοὶ. ἰορέω δὲ, κάρηνα μὲν κα-
 τέχων καὶ σφρόσσωπα ἀσσημα, αἰδέη-
 λα τὴν μορφὴν, ἐπὶ αὐχένι σμικρῶ,
 ὡς δλοκέειν τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τῷ σῶ-
 μοισι ἰζάνειν. καὶ ὧδε ἐκ ἐκδηλον. ὧδε
 γὰρ μεγάλα, πλατέα, πτερυγώδεια,
 * μέσφι κληιδωνίη καὶ ἐρηνων. ὅς ἐκρυ-
 ψε * τὴν αὐχένα τῷσι * ὡσὶ, ὅπως
 νῆες λαίφεισι κέρτατα ὅ θωῦμα διά-
 λυκα ὁ ἐλέφας ἐπὶ μελανιάτῳ. με-
 λεξέτεροι τὰ δὲ ὀδόντας κικλήσκουσι.
 τὰ δὲ μένα λευκότατα, ὅπως εἰδενὸς
 ἄλλα τε εἰδέν εἰς λευκὸν ζῶον. καὶ
 τὰ δὲ εἰς ὑπερ μέτωπα καὶ κροτά-

Elephantum morbo & fera elephantum
 communia multa sunt & specie,
 & colore, & magnitudine, & uictu.
 Verum neque ulli alij similia sunt, ne-
 que affectus affectui, neque animal
 animali. Nam Elephas fera longè ab
 alijs differt. Primum quidem ingen-
 tissima crassissimaque est. Magni-
 tudo enim tanta est, ut magnum ani-
 mal super aliud animal turris instar
 imponere queas. Crassitudo quoque
 tanta, quantam plura crassissima ani-
 malia inter se conjuncta uix æquare
 ualeant. Cæterum neque specie cui-
 piam admodum similem inuenias:
 siquidem omnes exquisitè nigro co-
 lore toto corpore obscurantur. Nam
 equorum alius candidissimus est,
 quales Rhæsi equi Thracij: alij sunt
 podargi id est, albis pedibus, qualis
 Menelai Podargus: alij flauii, quales
 centum & quinquaginta: alij cærulei,
 unde illud Homeri, factus equo simi-
 lis concubuit Cæruleos habens crin-
 es. Ita boues se habent, ita & canes,
 ita quælibet reptilia, & animalia, quæ
 super terram depascuntur. Elephan-
 tes autem soli nigri, tenebricoso co-
 lore, nocti & morti similes. Specie
 uerò tali sunt. Capita quidem & fa-
 cies ignobiles & obscuras habent, figura
 non euidenti, super breui ceruice, ut
 caput, in humeris consistere uidea-
 tur: atque ideo non euidens est. Aures
 enim grandes sunt, latæ, alarum simi-
 les, ad jugula usque & pectoris ossa.
 Hæ ceruicem armosque tegunt, sicut
 nauigia uelis conteguntur. Cornua
 uerò mirandum in modum candida
 nigriori colori internitentia possidet
 Elephas: alij hæc dentes appellant.
 Hæc sola autem candidissima sunt,
 quale nihil in ullo alio quamuis
 candido animali reperitur: &
 hæc ipsa non super frontem & tempo-
 ra,



ra, qualis cornigeris natura est, sed in ore superiorique maxilla sita sunt, prorsum uersus spectantia, recta non admodum, sed paulum in superiora retorta, quo à recto detorquefi liceret, & in simis dentibus pondus extollere. Grandia utique cornua sunt, longitudinem extenti brachij, Orgyam Græci uocant, æquant mediocria. Alia his multò longiora duplo longiora sunt, Prominentiam habet superior maxilla à labro enascentem, longam, exossem, tortuosam, serpentis similem. Duo uerò in summa prominentia foramina sunt: & hæc in pulmones usque pertinentia natura terebrauit, duplicis tibiz imaginem referentia. Hac sane fistula tanquam nare ad respirationem, nec non & uice manuum id animal utitur. Poculum etenim, cum uelit, hoc processu corripit, complectiturque, & ualide retinet: neque ab eo quispiam ui eripere posset, nisi alius sit potentior Elephas. Herbam etiam ad pabulum hoc quærit: neque ore minoribusque dentibus carnes edendo uitam ducit. Prælongi enim pedes longè à terra distans animal sustinent. Quin etiam breue (ut diximus) collum est. Ore igitur humi pabulari non potest. Nonnunquam & cornuum ab ore processus herbam os tangere prohibet. Itaque hac prominentia magnum pondus haurit: deinde quocumque uenatur, hac complexus uentri futura alimentum in os detrudit. Rite igitur primi illi proboscida hanc uocauerunt. Nam, πρὸ id est, ante se animal, hac βόσκεται, id est, pabulatur. Verum enim uerò

Φως, ὅπως τοῖσι κερασοφόροις ἡ φύσις. ἀλλὰ κατὰ σῶμα καὶ γινώσκοντες ὄρθια μένει ἐς τὸ πρῶτον ἐκέρτα. ἀλλὰ αἰὼν σμικρὸν πικρὰ καμπύλα. ὅπως * ἐντύσασθαι ἐκ τῆς ὄρθιας ἐκείνης, καὶ ἀραδα ἀχθος ἐν τοῖσι ὀδοῦσι σιμοῖς. μεγάλα δὲ τὰ κέρατα, μήκῃ * ἐντύσασθαι. μὴ ὀκόσον ὄργην οἱ μέσοι. ἄλλοι δὲ πολλὸν πτερόων μέζουσι, μέσφι διπλῶν. πρῶτον δὲ ἰσχυρὴ αἰὼν γινώσκοντες ἀπὸ τῆς χείλεος μακρὴν, ἀνόσειον, σκολιῶν, ἐρεπείωδεα. δοιαὶ δὲ ἐπὶ τὸ ἀκρον τῆς πρῶτης ἔασιν ἐκτετήσιες. καὶ τὰς δὲ διαμπερές μέσφι τῆς πικρὰς ἀνοσίου ἐτέτησεν ἡ φύσις, ὅπως αἰὼν διφύεα. * χεῖρ δὲ τὸ ζῶον ἐς ἀναπνοὴν, ὅπως ῥῆνι τῆς δὲ τῆς σύριγγι. ἀτὰρ καὶ χεῖρ τῆς δὲ καὶ κωθωνίῳ τε γινώσκοντες ὀκότε δέλει τῆς πρῶτης. ἀμφιλαμβάνει τε καὶ ἰσχυρὰ κραταιῶς, καὶ ἐκ αὐτῆς ἀφέλοιτο αὐτὴς βίη, * ἢν μὴ κρείσσων ἄλλος ἐλέφας. ἀτὰρ καὶ ποῖον ἐς νομὴν τῆς δὲ μαστεύει, ἐξ τῶν σῶμα πικρὰ καὶ τοῖσι σμικροῖσι ὀδοῖσι * ἔδων σάρακας ζῆ. πόδες γινώσκοντες εὐμήκεες ὑπερθεῖν τῆς πολλοῦ ζῶον ἀνεχούσας. ἀτὰρ καὶ σμικρὸς αἰχὴν ὅπως ἐλέξα. ἔκεν δύναμις τῶν σῶμα πικρὰς τὴν γινώσκοντες ἀραδα. ποτὲ καὶ ἡ τῆς κεράτων πρῶτης σῶματος ἐκφυσις εἰργαίει τῆς ποῖος ἀπὸ τῆς σῶμα. τὴν γὰρ οὐκ ἀνιμάται τῆς πρῶτης φέρειν μέγαν. ἐπειτα ὀκόσα. μάλλον δὲ τῆς δὲ ξυωδῆσαι τῶν σῶμα πικρὰ. ἐν τῆς πολλὸν τῆς κοιλίῃ. εὐτε οἱ πρῶτοι πρῶτος πικρὰ τῶν καλέουσι. ἐπὶ πρῶτον γὰρ τῆς ζῶου τῆς δὲ βόσκεται. ἀτὰρ ἐδὲ

* ἐντύσασθαι

* χεῖρ δὲ

ζῶον



εἰδὲ πίνειν ἀπὸ λίμνης, ἢ ποταμοῦ τῷ
 σώματι θείμις. ἢ οὐτὴ γὰρ αἰτία. ἀλ-
 λά καὶ διψῆ, ἐπιτίθεται μὲν τῷ ὕδα-
 τι τῷ πρὸς ὀπίσθον ἀκρὸν τῆς ρίνας.
 ἔπειτα ὅπως ἀναπνεύων, ἀπὸ τῆς ἡ-
 ρῆς. τῷ ὕδατι ἔλκει πολλόν.
 ἐπὴν δὲ πλήσῃ ὅπως κώθωνα τῷ ρί-
 να, τὸ σώματι ποταμοῦ ἐκχέει.
 εἴτ' αὖθις ἔλκει, καὶ αὖθις ἐκχέει,
 ἔστ' αὖ πλῆσῃ ὅπως φορτίδι νηὸς
 τῷ γαστέρι. ρινὸν τεχνικῶ καὶ πά-
 χιστον, * ὀρθώδεας ῥωγμοὺς * ἰ-
 χοντα, αὐλώνας Ἰππικήκας, ἐτέρας
 ἐν τῷ στήθει * κοίλας, Ἰππικασίους,
 ἀλλας δὲ λοξὰς, βαθείας κάρτα,
 ἰκελον τὸ ξύμπαν τριποδονίω. κεί-
 χες δὲ ἄλλοισι μὲν ζώοισι φύσει
 τριακίδε αἰχάται. * ἐλέφαντι δὲ
 τὸ εἰς ὀχνοῦς. μυρία δὲ καὶ ἄλλα
 ἀπὸ ἀλλογαγαί πρὸς τὰ αἰμά ζῶα. καὶ
 γὰρ ὀπίσω κοτὴ κατὰ γόνυ κάμπηται,
 ὅπως ἀνδρῶν, καὶ μαζὸν πρὸς
 τῆσι μαχαλίησι ἴχει, ὅπως γυναικῶν.
 ἀλλ' οὐτὶ μοι χεῖρ τανῦν ἀμφὶ τῆ
 ζῶα γράφειν. πλὴν ὀκόσον ἔξ ἄλ-
 λων τὴ καὶ ἡ νοῦσ' ὀλέφας, καὶ
 ὀκόσα ἰκέλα ἢ ἰδὲν ἔνοσοι ὡτ' ἴχει
 τῆς ζῶας φύσιν. ἐκίκλησκον δὲ καὶ
 λέοντα τὸ πάθ', τῆ Ἰπποκυνίε τὸ
 μοιόσητ' εἶνεκεν, καὶ ὕστερον φρά-
 σω. * ἢ ἵσα τερσίον τῶν τε μήλων ἔ-
 ἐρυθρήματ', καὶ τὸ ἐν συνεσιῶν ὀρ-
 μῆς ἀχέτε τὴ καὶ ἀναγκύντε. ἀτὰρ
 καὶ ἡρόκλειον ὅτι τῆδε μέζον εἰδέν,
 εἰδὲ δὲ κριμώτερον. μέγα μὲν οὖν
 τὸ πάθ' ἐς δύναμιν. κτεῖναι
 γὰρ πάντων μᾶλλον δυνατώτερον.

* αὐθις.

* ὀρθώδεας ἰχοντα.

* κοίλας.

* ἐλεφαντίδος.

* ἢ ἵσα τερσίον.

ἀκριβέστερον

neque ex palude aut flumine ore
 bibere ei licet. Eadem enim causa
 est. Quod si sitiat, proboscidis extre-
 mam narem in aquam demergit:
 deinde tanquam respirans, uice aëris,
 multum aquæ attrahit: ubi uerò
 impleuit narem ceu poculum in os
 fluminis instar effundit: deinde ite-
 rum attrahit, iterumque effundit,
 quoad uentrem tanquam onerariam
 nauem compleuerit. Corium habet
 asperum, crassissimumque, tumo-
 ribus inæquale, fissuras habens, ceu
 semitas prælongas, aliàs diuisuras
 concauas transuersas, aliàs uerò ob-
 liquas ualdè profundas. Totum
 Tripodonio persimile est. Pili autem
 alijs quidem animalibus natura, aut
 setæ sunt, Elephanti uerò fordida la-
 nugo est. Infinitæ sunt & aliæ diffe-
 rentiæ inter Elephantem & cætera
 animalia. Etenim retro uersus quan-
 doque secundum genu flexitur,
 quemadmodum & homo, & mam-
 mas propè axillas habet, ut mulieres.
 Cæterum non in præsentia mihi opus
 est de animalis hujus natura tractare,
 nisi quatenus ex eo & morbus Elephas
 uocatus, patefiat, quotque ægrotan-
 tis forma hujus animalis naturæ si-
 milia obtineat, agnoscat. Morbum
 quoque huic Leonem uocauerunt,
 ob extremarum frontis rugarum si-
 militudinem, quam partem Græci
 Episcenium nominant. De ea po-
 steriori suo loco dicitur. Satyriasis
 etiam appellatur ob malarum rubo-
 rem, atque inexplebilem impuden-
 temque coeundi libidinem. Nec non
 & Hercules dicitur, quoniam eo nul-
 lus major est, neque ualentior.
 Magnus est quidem potentia mor-
 bus. Ad mortem enim inferen-
 dam est omnium longè efficacissimus.

Est



Est etiam uisu fœdus, & in omnibus
 terribilis, quemadmodum & ele-
 phas belua. Inevitabilem quoque
 affert interitum : quandoquidem à
 mortis causa ducit originem. Ea
 ingenti caloris frigiditas est non
 exigua, uel potius congelatio, ceu
 quædam sæua hyems : cum aquam
 in niuem, aut etiam grandinem, aut
 crystallum, aut glaciem conuertit.
 Hæc est communis mortis ac morbi
 causa. Veruntamen neque ullam
 insignem conjecturam morbi prin-
 cipium obtinet : neque ulla noua,
 atque inusitata labes hominem in-
 cessit: neque in corporis summis par-
 tibus representatur, ut protinus ui-
 dere quis possit, & incipienti malo
 resistere. Sed in uisceribus tanquam
 domo Plutonis delitescens ignis jam
 succenditur, internorumque uictor
 rursus in superficie aliquando ex-
 ardescit. Plerunque sanè à facie hæc
 pestis incipiens tanquam ignis de
 specula procul conspicuus effulget:
 Nonnullis uerò ab extrema cubiti
 curuatura, à genu, à manuum, pedum-
 que articulis. Iccirco autem hujus-
 modi hominum salus desperata est:
 quoniam Medicus ad morbi debilif-
 sima initia artem non adhibet negli-
 gens, & ægrotantium calamitatis
 ignarus. Tardi enim sunt, ut ab
 aliqua leui & uulgari causa, somnicu-
 losi, quieti, sicca aluo. Hæc etiam sa-
 nis haud ualde inusitata sunt. In
 morbi autem cremenstis respiratio
 graue olet ob interni spiritus exhalationem.
 Hujusce rei aër, aut quip-
 piam aliud extrinsecum causam præ-
 bere uideretur. Lotium crassum est, albū,
 turbidum, quale jumentum reddit,

ἀτρε καὶ ἰδέσθαι χερὸν, καὶ δαιματώ-
 δεσ τὰ πάντα, ὡς ἐλέφας τὸ θηρίον.
 ἀλλ' ἀφυκτος ἡ νοῦσ' ὅ. πικτεται
 γδ θανάτου ἐπ' αἰτίη. ψύξις ἐστὶ τῆ
 ἐμφύτῃ θερμῆ ἔμικράτε, ἢ καὶ πᾶ-
 γ' ὅ, ὡς * ἐν μέγα χεῖμα. εὔτε
 τὸ ὑδρὸς πέπεται ἐς χιόνα, ἢ καὶ
 χάλαζαν, ἢ κρύσταλλον, ἢ πάγον.
 ἢ δὲ ἐστὶ ἡ ξυνη θανάτου καὶ πάθε' ὅ
 αἰτίη. ἀτρε οὐδέ τίχαι τέκμαρ εἶδεν
 ἢ δὲ χη τ' νοῦσε μέγα. εἶδεν ξενο-
 πρεπέσκακόν τ' ἐν αἰθρωπον ἑπιφοι-
 τῆ. εἶδεν ἑπὶ τῆσι ἑπιπολῆσι ἑσκή-
 νε' φαντάζ' ὅ, ὡς ἰδεῖν τε εὐθύς
 καὶ δροχομῶν δροξῆαι. ἀλλὰ τοῖσι
 σπλάγχνοισι ἐμφωλεῦσαν ὅπως
 αἰδι, πῦρ ἤδη τύφει, καὶ τῷ εἰσωκρα-
 τῆσαν, αὐθίς κοτε ἑπιπολαίως
 ἑξάπτεται, τὰ πολλὰ μὲν ὅπως δὸπ
 σκοπιῆς τῆ προσώπῃ δροχομῶν
 πλεφανές πῦρ κακόν. μετεξετέ-
 ρισι δὲ, δὸπ τῆ ἀκρε ἀγκῶν ὅ,
 γούνατ' ὅ, κονδύλων, χειρῶν τε καὶ
 ποδιῶν. τῆ δὲ καὶ ἀνέλπιστοι οἱ αἰθρω-
 ποι, ὅτι περ ὀϊητὸς ἔπρε τὰς δρο-
 χὰς τὰς ἀθνεσ ἀτρε τῆ πάθε' ὅ,
 τῆ τέχνη χεῖεται ῥαθυμῆ καὶ ἀγνοίη
 τῶ καμνόντων τ' ξυμφορῆς. νοθέες
 μὲν γδ, ὡς δὸπ χεδίε προσφάσι ὅ.
 ἑσναλέοι, ἢ σῦχοι, τῶ κοιλίω ἐπὶ
 ξηρι. τὰ δὲ καὶ τοῖσι ὑγαινῶσ
 κάετα ἐκ ἀήθεα. ἑπὶ δὲ τῆσι * αὐ-
 ξήσεσι τοῦ πάθε' ὅ, ἀναπνοῆ βρο-
 μώδης, ἐκ τ' ἐνδον ἀναφορῆς τῶ
 πνεύματος. τοιάδε ὀαῖε, ἢ τῆ τῶ
 ἑξωθεν αἰπίω ἰχεν δλοκέα. ἑσπα-
 χέα, λδουκά, θολερά, οἱ τ' ἑσζυγίε.
 ἀφροδι-



ἀφροδισίων ὠμῶν τε καὶ ἀπέπιων ἢ ἀνάδοσις, ἢ οὔτε τυτέων ἐστὶ ἀλθι-
 σίς τε καὶ μελέτη. οὐδὲ γὰρ ἐστὶ λυμὴ μὴ
 πέψωσι γινώσκουσι. ὁμοίᾳ ἀπεψίῃ
 καὶ πέψιθῆ ἤσθ. εἰς χερσὸν γὰρ ἡ ὀ-
 κείον, ἔξυνηθῆς αὐτέοισι ἢ πέψις.
 ἀνάδοσις ὅ* ρηιδίη, ὅπως ἐστὶ τῶ ἐνω-
 τέων τροφίῳ, ἀεργά γδῶ ἐλκοντος
 τῆ πάθεθ. διὰ τὸδε Ἰπὶξηρη
 τὴν κάτω κοιλίαν. ὄχθοι ἐπανισά-
 μθοι, ἄλλοι παρ' ἄλλοις ξυνεχέες
 μθ* ἔδ' ἐκω, παχέες ὅ καὶ τσηχέες,
 καὶ τὸ μεσηγὺ τῶ ὄχθων ἐρρεῖτο,
 ὅπως τὸ ρινὸν ἐλέφας. * εὐρεῖαι δὲ
 καὶ φλέβες, * ἐπλημμύρη τῆ αἵμα-
 τθ, ἀλλὰ τῶ τῆ δέρματθ πά-
 χεῖ. ἐκ ἐς πολλὸν ὅ καὶ ἐδρα δηλοῖ ὅ
 παντὸς εἰς ἴσον ὄχθον ἐγερομθ.
 τείχες ἐν μθ τῶ παντὶ πωρετεθνήσ-
 κουσι, χερσὶ, μηροῖσι, κνήμησι, αὐθις
 ἤθη, γενείοισι ἀραιαί, ψεδναί δὲ καὶ
 Ἰπὶ τῆ κεφαλῆ κόμαι. τὸ ὅ μάλ-
 λον πωρόωροι πολιοί, καὶ φαλάκρω-
 σις ἀθρή. ἐκ εἰς μακρὸν ὅ ἤθη καὶ
 γένειον ψιλὰ. εἰ δὲ καὶ Ἰπὶ μίμνοιεν
 παυραὶ τείχες, ἀπρεπέσεραι τῶ
 ἀποικομθίων. δέρμα τῆ κεφαλῆς
 κατερρωγὸς εἰς βαθὸς * ρύπει δὲ
 * συχναί, * βαθεῖαι, τσηχεῖαι. ὄχθοι
 ἐς τὸ πωρόωπον σκληροί, ὀξέες. ἄλ-
 λόιε μθ ἐς κορυφὴν λυκοί. ποιω δὲ
 σεροι ὅ τὴν φάσιν. σφυγμοὶ μικροί,
 βαρέες, νωθροί, ὅπως δὲ ἰλύος μόλις
 κινεύμθοι. φλέβες κροτάφων ἐπηρ-
 μθραί, καὶ ὑπὸ τῆ γλώσσης. κοιλία χολ-
 λάδες. γλώσσα χαλαζώδ' ἐσι ἰόν-
 θοισι τσηχεῖαι. ἐκ ἀδόκητον καὶ ὅ ξυμ-
 πανσηκῆνος ἐμπλεωντοίων ὅ ἐμμεναί.

* ρηιδίη

* εὐρεῖαι

* εὐρεῖαι

* εὐρεῖαι

* συχναί, * βαθεῖαι, τσηχεῖαι.

τυτῶν δε

Vencrem appetunt, *feminis crudi & in-
 cocti emissio fit*, neque istorum est sen-
 sus & meditatio. Neque enim con-
 coxerint nec ne, percipiunt: & crudi-
 tas hæc concoctioni similis est. Nam
 ipsis haud frequens est in optimum
 aut familiare concoctio. Digestio
 uerò facile fit, tanquam in suum
 ipsius alimentum raptim morbo at-
 trahente, propterea ualdè siccitate
 inferioris uentris laborant. Tumo-
 res alij juxta alios exurgunt, nondum
 quidem continui, sed crassi & asperi:
 & interstitium tumorum discissum
 est, ut elephantis corium. Venæ la-
 tæ sunt, non sanguinis redundantia,
 sed cutis crassitudine. Non multò
 post autem & sedes declarat uniuerso
 corpore in æqualem tumorem disten-
 to. Pili in omni corpore præmori-
 untur in manibus, femoribus, tibijs.
 Item in pube, in mento rari sunt: rara
 quoque in capite cæsaries. Quòd
 uerò majus est, intempestiui cani, &
 caluitium affatim subitoque ingru-
 unt. Non multò post autem pubes &
 mentum glabrescunt. Quod si qui
 pauci pili remaneant, hi magis dede-
 cent, quàm qui defluerunt. *Capiti*
cutis altius rescissa est: rimæ autem
frequentes, profundæ, asperæ sunt.
 Tumores in facie duri, acuti: non-
 nunquam fastidio albido, basi uiri-
 diore. Pulsus pusilli, graues, tardi,
 tanquam per cæcum uix se mouen-
 tes. Venæ temporum distentæ
 sunt, & sub lingua, uentres bilio-
 si. Lingua grandinosis uaris ex-
 asperatur. Neq; inopinabile est & omne
 corpus talibus scaterere tuberculis:
 quando-



quandoquidem & in uisitimis prauos humores habentibus carnes grandinis plenæ sunt. Sin autem ualdè ab intimis partibus erumpet morbus, & in extremitatibus apparebit; impetigines summos digitos infestabunt, genua prurient, pruritusque cum uoluptate scalpetur. Ambit uerò impetigo & mentum nonnunquam in orbem: rubent malæ cum tumore haud ita magno: oculi caliginosi, ænei coloris sunt: supercilia prominentia, crassa, glabra, deorsum uersus pondere uergentia: contractis glabellis eminens tumor insurgit: color luidus, aut ater est. Episcenium uehementer contrahitur, ut oculos contegat, quemadmodum irascentibus, aut leonibus accidit: unde & Leonina hæc ægritudo uocatur. Igitur neque Leonis, neque Elephantis solum, uerum etiam nocti tenebrose æquales sunt. Hypopia, id est, sub oculis insurgentia ossa, & nares cum atris tumoribus salebrose, extantesque sunt. Labiorum prominentia crassa est, pars autem inferior liuescit. Nasus tumet, dentes non albi sunt, sed nigricare uidentur. Aures rubent admixta nigritia, obstructæ, elephantice, ut grandiores consueto esse uideantur. Ulcera in basi aurium sunt: sanies defluit: pruriunt. Totum corpus rugis asperis exaratur: nec non & altè descendunt scissuræ ueluti nigri in corio sulci, propterea & Elephas huic morbo nomen est. Plantarum & calcaneorum usque ad medios digitos fissuræ sunt. Quod si plus augetur malum, tumores

ἢ γὰρ καὶ τοῖσι κακοχύμοισι ἰσθμίοισι τὰ κρέα χαλάζης ἐστὶ ἐμπλεῖα. ἡ δὲ πολλὸν ἀγρῆ τι δὴ τῶ ἐνδοθεν ἢ πάθη, καὶ ἐπὶ τοῖσι ἀκροῖσι φανήται, λειχῶες ἐπὶ τοῖσι ἀκροῖσι δακτύλοισι, γούνασι κνησμοῖ, καὶ τῶ κνησμών ἀπὸνται μετ' ἡδονῆς. ἀμπίχαι ὅλοιαι καὶ γενεῖον κοτὲ ἐν κύκλῳ. ἐρευσθῆ ἢ καὶ μῆλα ξὺν ὄγκῳ ἐκέρτα μεγάλῳ. * ὅπῃες ἀχλυώδεις, χαλκώδεις, ὀφρῦες προβλήτες, παχέαι ψιλῆ, βριθοῖσι κάτω, μεσοφρέων ξυνηγνῶν, ὀχθώδεις, χεῶμα πελιδνόν, ἢ μέλαν. ἐπισκηνίον ἐ μέγα ἔλκε) καλύπτειν ὄσσε, ὅπως τοῖς θυμωμένῃσι, ἢ λέουσι. (διὰ τὸδε, καὶ λέοντοισιν κικλήσκε). (τοῖγαρ ἐν, οὐ λέουσι) ἢ δὲ ἐλέφαντι μόνον, ἀλλὰ καὶ νυκτὶ θοῆ ἀταλάντω. ὑπόπια, σὺν ὄγκοισι μέλασι, * ὀκραιοειδῆες, χειλέων πρὸς βολῆ * παχέη. τὸ δὲ κάτω πελιδνόν, ἐκρινες, ὀδόντες οὐλοκοίμῳ, δοκέοντες δὲ ὑπομέλανες, ὡς ἐρευσθῆ, μελανόεντα, κεκλεισμένα, ἐλεφαντώδεια, ὡς δοκέειν μέγεθ' ἰχθῆν μέζοντα ξυνηγνῶ. ἔλκεα ἐπὶ τῆσι βάσει τῶ ὠτων, ἰχθῶρ ῥύσις, κνησμώδεια. ῥύσοι τὸ πᾶν σκῆν ῥυτίσι τρηχέησι. ἀτῆρ καὶ ἐντομαὶ βαθείαι, ὀκοῖον αὐλακες, μέλανες τῶ ῥινῶν. διὰ τῆ καὶ ὁ ἐλέφας τῆ πάθε τουνομα: ἰχθῆν καὶ πτερινῶν μέσφι τῶν μέσων τῶν δακτύλων ῥήξιος. ἡ δὲ ἐπὶ μᾶλλον αὐξῆ τὸ κακόν, ἐλκώδεις τοὺς ὀχθους, μῆλων,

ὁ δὲ καὶ καὶ ῥύσιον

ἢ ὀφρῦες

καὶ λέοντοισιν

ἐπὶ τοῖσι



κνήλων, γενείας, δακτύλων, γονάτων, κάκοσμα κ' αναθήα (α' έλκεα. άλλλα γδ επ' άλλλοισι εξανίστα), κ' επ' άλλλοισι άλλλα πρηνέ). ηδη κοτε και τρω μελέων * ωραποθνήσκει * ξανδρω π' ε' αχει εκπιώσιος, ρίς, δ' ακτυλοι, πόδες, αιδοία, κ' όλαι χείρες. ε' ο γδ θανατοι το κακόν εις απαλλαγην βίαι αιχρ'ε, και άλλγέων δεινών πρ'οσεν, η' ες μέλεα διαμνηθηναι τον ανθρωπον. άλλά μακρόβιον εστι, οκως ελέφας το ζων. ω' ο γκ' άλλγος δ'επίως * επ' τρω μελέων, πολλόν π' * επικόπει βαρύτερον. άλλη κ' άλλη πλαυδρ'ων σιπών ορεξις εκ άγενής, άποιθ' η γευσίς, ε' ο τερπνόν η' εδωδη κ' η πόσις. απάντων ο' υπ' άχθηδόνος, μίσος, άτροφιη, επθυμίν λυσώδης. κόποι αυτόματοι, μελέων εκάσ' ιδέη βαρεία, κ' τον ανθρωπων * άχθει κ' τα σμικρα μέλεα. άταρ κ' το σωμα πρ'ος άπαντα άχθε'), ε' λετ'οισι τερπε'), εκ άλλσιη. ε' τροφιη, εκ άσιπη. ε' κινήσει, εκ * ηρεμίν. πασι γδ εφ'εσηκέν η ν'σος. ύπνος λεπτός, άγρυπνία κακίων εν φαντασίη, δύσπνοια καρτερή. πνίγες ως απ' άγχόνης. ω' δε γου πνες καλέςρεψαν τον βιον, νηγρετον ύπνον ες θάνατον ε'δόντες. τρισδε ου' εόντας τις εκ αν φύγοι, η τις εκ αν εκτραπέι, κην υός, η πατήρ εη. κην κασίγνηλος τυχη. δ'εος κ' άμφι μέλασ'όσιος ε'κακ'ε. πολλοι γου επ' ερημίας κ' ες όρεα τ'εσ φιλιάτες εξέθεσαν, οι μ'ω' ες χρονον επαρήγοντες τ'ω λιμω'. οι δ'ε, ως ηκισα σφ'εας εθελούτες εκθανειν. λόγος ο' ως τ'ων επ' ερημίας άφιγμ'ών τις, εξερπύσαν

malarum, menti, digitorum, genuum- que ulcerosi fiunt : ulcera foetida sunt, & insanabilia : alia enim super alia exurgunt, super alia alia nitescunt. Siquidem membra hominem diu morte praeveniunt, quoad de corpore excidant nasus, digiti, pedes, genitalia, atque tota manus. Neque enim haec labes prius perimit, a turpi uita, sauisque cruciatibus liberans, quam membratim dilaceratus homo fit. At longeva est, quemadmodum & Elephas animal. Sin autem membrorum recens dolor sit, longè acerbius affligit. Aliter atque aliter paratorum ciborum appetentia est non obtusa, sed gustatus qualitatis expers est : nullaque edendi ac potandi delectatio. Omnia uerò ob doloris cruciatum oderunt : alimento priuatur corpus, rabiosa inest cupiditas : spontinae sunt lassitudines, singulorum membrorum species hominem gravitate inusitata premit, quantumlibet exigua membra sint. Quin etiam corpus omnia grauatim fert : non balneis delectatur, non illuue, non cibo, non jejunio, non motu, non quiete : ab omnibus enim morbus alienus est. Somnus tenuis, uigilia peior mala sua cogitans, spirandi uehemens difficultas : suffocationes fiunt ac si laqueo strangulentur. Hoc igitur pacto nonnulli uitam perdiderunt, inexcitabilem somnum in mortem dormientes. Itaque tales, cum sint, quis non aufugiat? aut quis non auerfetur, licet filius, aut pater, aut etiam germanus frater sit? cum metus est, ne morbus communicetur. Propterea multi in solitudines & montes sibi charissimos abduxerunt : aliqui eorum egestati, quoad uiuerent, subuenientes, aliqui uerò minime, cum eos uita defungi mallent. Fama est eorum quendam, qui in solitudinem

α σφοδρα
θνήσκειν.
* τ'ω ανθρω-
πων.

α οκ.
* επικοπει.

* άχθεις.

* ηρεμια.



tudinem expositi erant, ex terrae labris reptantem uiperam intuitum, aut fame coactum, aut morbi tadio in ductum, ut malo malum commutaret, uiuentem uiperam edisse, neque prius e uita migrasse, quam omnia ipsius membra computruerint, atque exciderint. Alterum praeterea ferunt uiperam in musti dolium irreplisse conspicatum, cum mustum ad satietatem ingurgitasset uomuisse, multumque ueneni simul cum musto reie-
*cisse: postquam autem seram in musto extin-
 eta est auidè largiterq; hominem e musto
 bibisse: uita pariter ac morbi finem qua-
 rentem.* Ut uero fatiatus, iuxta inebriatusque fuit, primum quidem humi prostratus instar morientis jacebat. Posteaquam deinde graui sopore ex-
 perrectus est, ebrietatemque discussit, in primis comae defluerunt, praeterea digiti & unguis; deinceps omnia in
 habitu corporis membra contabue-
 runt. Quoniam uero adhuc in femine facultas erat, iterum tanquam ab ortu hominem natura ueluti ex cera crea-
 uit. Alios enim crines enutriuit, un-
 guis novos, & nitidam carnem in-
 staurauit, ac uetus corium ceu serpen-
 tis seneam exiit: & tanquam alter homo ad uitae munia reuocatus est. Ita habet fabula non admodum qui-
 dem uera, neque ualde fidem exce-
 dens. Malum enim malo pulsum esse probabile est: naturam uero ex
 residua uitae scintilla hominem redin-
 tegrasse: haud ita a ratione abhorret,
 ut monstro simile esse uideatur.

Τα ἐκ τῆς γῆς ἔχινιδῶν, ἰσὺ ἀνάγκης
 ἔλιμεν, ἢ τῷ παθεί ἀχθεθεῖς, ὡς ἀ-
 μείψασθαι τὸ κακὸν κακῷ, ζῶντος ἐνέ-
 φαγε ἔχιος, καὶ ἐπεὶ ὄθεν ἐτελευ-
 θησε, πρὶν ἢ πάντα αὐτῷ διασαπῆ-
 ναι καὶ διαρῆναι τὰ μέλη. ἄλλον δὲ
 ἰδεῖν ἔχιν εἰς πίθον γλυκέος ἐρπύ-
 σαντα, πόντα τε ἔγλυκεος εἰς κόρον,
 διαβλύσαι. πολλὸν δὲ καὶ τὰ ἐξ συνεχ-
 χεῖν τῷ γλυκέϊ. ἐπεὶ δὲ ἀπεπύγη τὸ
 θηρίον ἐν τῷ γλυκέϊ, χανθὸν καὶ πολ-
 λὸν τὸ γλυκέος πῖν τὸν ἄνθρωπον,
 ἀπαλλαγὴν τῆς βίης, καὶ τῆς πάθους δι-
 ζήμων. ὡς δὲ ἐς κόρον ἦκε καὶ μέθην,
 ἐκεῖτο μὲν χαμαὶ τὰ πρῶτα, ὅπως ἀ-
 ποθνήσκων. ἐπεὶ δὲ ἐκ τῆς κάρου καὶ τῆς μέ-
 θης * ἔξήρητο, διεκέρυψεν μὲν τὰ
 πρῶτα αἰκόμα, ἐπὶ δὲ δάκτυλοί τε καὶ
 ὄνυχες. ἔξῃς δὲ διελετήκασαν πάντα.
 ἐπεὶ δὲ ἐπὶ ἐν ἀπέρματι ἡ δύναμις αὐ-
 τοῦ ἐκπροπλάσσει αὐτὸς ὅπως ἐκ γενε-
 τῆς τὸν ἄνθρωπον ἢ φύσιν. ἔξεδρεψε
 μὲν ἄλλας κόμας, καὶ ὄνυχας νέας, καὶ
 σάρκα καθαρήν, καὶ ἔξεδυ μὲν τὸ πα-
 λαμόν ρῆνος, ὡς γῆρας ἐρπέει. ἐπανε-
 κλήθη δὲ, (ὡς) ἐς φύμα * ζῶης, ὅπως
 ἄλλος ἄνθρωπος. ὡς δὲ μὲν οὐδὲ ὁ μῦ-
 θος, ἐκάρτα μὲν ἀτρεκέως, ἐπάγχυ
 δὲ ἄπιστος. κακὸν γὰρ κακῷ βλαφθῆ-
 ναι, πιστόν. τὴν φύσιν δὲ ἐπὶ τῷ ἐόντι
 ζῶντι ἀνανεῶσαι τὸν ἄνθρωπον,
 ἐκ ἄπιστον ἐς τέρατος ἰδέσθαι.

* ἐξήρητο.

* ἐκπροπλά-
 σσει.

* ζῶης.

ARE

M APE



ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ

ARETAEI

CAPPADOCIS DE morborum acutorum curatione,

* θεραπευτικῶν.

ὀξείων (νούσων) * θεραπευτικὸν

βιβλίον πρῶτον.

LIBER PRIMVS.

- Θεραπεία φρενιτικῶν, κεφάλ. α.
- Θεραπεία ληθαργικῶν, κεφ. β.
- Θεραπεία μαλασμοῦ, κεφ. γ.
- Θεραπεία ἀποπληξίης, κεφ. δ.
- Θεραπεία παροξυσμῶν ἰπληπικῶν, κεφ. ε.
- Θεραπεία τετάνου, κεφ. ζ.
- Θεραπεία συνάγχης, κεφ. ζ.
- Θεραπεία τῆς κατὰ τὴν κιονίδα παθῶν, κεφ. η.
- Θεραπεία τῆς κατὰ τὴν φάρυγγα λοιμικῶν παθῶν, κεφ. θ.
- Θεραπεία πλευρίτιδος, κεφ. ι.

- Curatio phreniticorum, Caput I.
- Curatio Lethargicorum seu Veterinoforum, cap. II.
- Curatio tabis, cap. III.
- Curatio Apoplexiæ, cap. IV.
- Curatio accessionis morbi comitialis, cap. V.
- Curatio Tetani, seu Rigoris, cap. VI.
- Curatio Anginæ, cap. VII.
- Curatio uitiorum columellæ, cap. VIII.
- Curatio pestilentium in faucibus uitiorum, cap. IX.
- Curatio Pleuritidis, id est, morbi costalis, seu lateralis, cap. X.


ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

PROOEMIUM.

Ὁξείων νέσων ἄκεια ξυναφεία τῆσι ἀμφὶ σημεῖων ἰδέησι, ὧν τῶς ξυγγράμμασι ἄοσα μοι παρόθεν γεγράφα. ὁκόσα μὲν ὧν ἐν πυρετῶν θεραπείῃ γίγνεται, κατὰ τὴν τέτων διαφορίαν, καὶ κατὰ τὴν νοσημάτων ἰδέην, καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς ποικιλίαν, τετέων τε πλείων ἐν τοῖσι ἀμφὶ πυρετῶν λόγοισι λελέξεσθαι. ὁκόσα δὲ ἐν πυρετοῖσι ὀξεία γίγνεται πάθεια, ὁκοῖον ἢ φρενίτις, ἢ ἀνδρεπυρετῶν, ὁκοῖον ἀποπληξίη, ἀμφὶ τῆς δεμῆνον τε * ἄκεια φράσω, ὡς μὴ διαμαρτάνειν μηδὲ μακρηγορέειν ἕτερα ἐν ἑτέροισι γράφοντα. Δεχθὴ δὲ ἢ ὡς τὴν ἢ καὶ ἀμφὶ τῶν παθῶν, καὶ τελευτή ἢ ὡς τὴν.

Acutarum ægritudinum medicamina speciebus signorum contigua sunt, quæ superioribus libris à me comprehensa fuerè. Quæcunque sanè in febrium curatione fiunt secundum ipsorum differentiam, & secundum morborum speciem, & in ipsis diuersitatem: eorum plura in tractatione de febribus explicabuntur. Quotquot autem cum febribus acuti morbi fiunt, qualis phrenitis est, aut sine febribus, qualis Apoplexia: eorum duntaxat medicamina commemorabo: ut ne aberrem, neque uerbosior sim, alia in alijs describens locis. Idem uerò principium, quod & de morbis feci, eundem etiam finem faciam.

Curatio



Caput I.

Κεφάλ. α.

AEgrotum cubare conuenit in con-
clauī mediocriſ amplitudinī,
aëriſ temperati, hyeme tepidi, æſtate
frigidiorīſ & humidiorīſ. Verē autē
& autumnō ſecundum temporū na-
turaſ coniectura uti decet. Deinde qui-
eſcere iubendum eſt & ægrotōſ ipſoſ &
omneſ domeſticoſ. Acute nanque
audiunt phrenitici, & ſtrepitib꿯 ir-
ritantur, nec non & ab hiſ in furo-
rem aguntur. Parieteſ læueſ ſint,
æqualeſ, neque ſuper eminenteſ, ne-
que feſtucāſ, aut aliquid exertum
habenteſ, neque picturiſ exornen-
tur: pictura enim parietum mentem
turbat. Nam præ oculiſ falſa quæ-
dam ſimulacra obuertiuntur, & quæ-
dam non eminentia tanquam emi-
nentia manib꿯 contrectant, omniſ-
que occaſio citra cauſam manuum
agitationem prouocat. Cubiliſ lon-
gitudō & latitudō moderata ſit; quo
neque in ampliōri uolūtari, jaſtari-
que poſſit, neque à nimīſ anguſto de-
labi. Stragulæ ueſteſ glabræ ſint, ut
ne floccoſ colligere in mentem ueniāt.
In molli lecto decumbant, nam dū-
rum ſtratum neruiſ ingratum eſt.
Non minimē autē inter cæterōſ
ægrotanteſ phrenitici neruiſ labo-
rant: facile enim conuelluntur. Ami-
ciſſimi eoſ inuiſant: fabulæ & ſer-
moneſ animū ne uellicent: cū
delectabilia omnia eſſe oporteat, illiſ
præcipue, quorum iracunda inſania
eſt. Vtrum in tenebris an in lucē ha-
bendi ſint, ex morbi natura conſijcere
debemus: nam ſi ad lumen efferantur,
& quæ non ſunt, cernūt, & quæ non ad-
ſunt, cogitāt, aut pro aliſ alia cognof-

Κατακεκλιόσ χη τόν νοσέοντα εν
οίκω ευμέτερω, ευκρητώ, χειμώνοσ
μὴ ενάλη, θέρεοσ δ εν ψυχεί νοτέ-
ρω. έαροσ δ η φθινοπώρω πρὸσ ται
ώρωσ τεκμαίρεοσ. επείτα ησυχίω
άγειν κελέυειν η αυτόν νοσέοντα, και
τὸσ δπὶ τ οίκίησ άπαντασ. οξυήκοοι
γδ ηδὲ ψόρω καθαπίομμοι φρενι-
τικοί. άταρ υπό τήσδε μαίον. τήχοι
λείοι, όμαλοί, μηδ' έωερίχοντεσ,
μηδ' άχνη, μηδ' ε γραφήσ ευκοσ-
μοι. έρεθιſτικόν γδ τριχογραφή. η γδ
πρὸ τών όφθαλμών * άμφαρέεσ ^{κα φάρεσσι}
* πνα ψουδέ άινδ άλματα, η ται μη ^{κα άμφαρεσσι}
δξίχοντα άμφαφώωσί ωσ έωερί-
χοντα. η πάσα πρὸφασίσ άναυτίη,
πρόκληησ χειρών φορησ κλίνησ μη-
κοσ η πλατοσ σύμμετρον, ωσ μήτε
βλησριζέ εν τή πλαλίη, μήτε δπό τ
σενησ έκπίπειν κοίτησ. εν ψιλοίσι τήσ
σρωμασ, ωσ μη κροχυδιζεν υπόμνη-
σίσ έοι. άταρ ηδὲ εν μαλθακοίσι. ά-
σενρηγίσ γδ τήσιν νεύροισι η σκληρη κοί-
τη. άχ ηκίσα δ τών άλλων τήσιν φρενι-
τικοίσι τά νεύρα πονέει. μάλα γδ ται
πώνται φρενιτικοί. είσοδοι τών
φιλτάτων. μύθοι, η λαλιη μη θυ-
μοδακείσ. παντα γδ ευθυμείεοσ χη,
μάλισά τήσιν έσ όργη η πώραφορη.
κατάκλιſίσ η εν ζόφω, η εν φωτί
πρὸσ τόν νοσημα τεκμαρτέη. λε γδ
πρὸσ τήν αυγλή άγριαίνωσ, η όρέ-
ωσί ται μη όντα, η ται μη ύπεόντα φαν-
τάζων, η αυθ' έτέρων έτερα γγνωσ-



κωσι, ἢ ξένα ἰνδάματα περιβάλλονται, καὶ τὸ ξύλον τῆς αἰγῆς ἢ τὰ ἐν αἰγῇ δεδιπῶν, ζόφον αἰρέει δὲ χεῖρ ἢ μὴ τὸ ἐναντίον ἀγαθὸν ἢ πρὸς αἰγῆν σωφρονέειν τὴν περὶ νεοστὴν ὡσαύτως. ἀσιτία μὴ μακρὴ. σιτία δὲ ὑγρότερα καὶ βραχύτερα καὶ συνεχῆ. μελίγματα δὲ θυμὸς σιτία. εὐκαίρῃ δὲ ἐν τῷσι ἐπανεσεσι ἀμφοῖν, καὶ πυρετῶν καὶ ὡσαύτως. ἡ δὲ ὑπὸ ἀσιτίας ἐκμαίνων, καὶ ἢ μὴ παρήκη ὁ πυρετός, διδόναι μὴ μεγάλα ἔπι πυρετὸν ἐλάττωσα. ἀγαθὸν δὲ ἐμφωνέειν (καὶ τὸν πυρετὸν) καὶ τὴν ὡσαύτως, * ἔστε τὰς παρεξουσίας καὶ τὰς ἐπανεσεσι. ἢν ὠνήκη ὁ καιρὸς ἐς ἄρῃν, πρῶτα σκεπτόμεν εἰ καὶ ἀφαίρειν αἷμα. ἢν μὲν ὠνήκη ὡσαύτως ἢ ἔπι πυρετῶν δὲ χεῖρ ἐκβαλλῆται πρῶτος ἢ δεύτερος ἡμέρας, τὰ μὲν φλέβα τὴν ἐπὶ ἀγκῶνι μάλιστα τὴν μέσον. ἀτὰρ καὶ ἢν ἐς τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν ἢ ὡσαύτως ἢ καὶ μέσφι τῆς πρῶτης τῶν κρίσεων * περιδοιῶμεν. εἰ δὲ πρῶτος ἢ δεύτερος χεῖρ ἐκταμῶν ἐόντων ἢ ἐβδομαίῳ ἢ πλείον, πολλὸν πρὸ τῶν κρίσεων ἐν τοῖσι ὀξέσι κενεῖν καὶ ἢ φαρμάκωμεν, ἢ τοῖσι ἄλλοις ἐρεθμοῖσι χεῖρ. ἀτὰρ καὶ φλέβα τὰ μὲν, μὴ πολλὸν ἀφαίρειν, καὶ ἐν δὲ χεῖρ τὰ μὲν. φρενίτις γὰρ εὐπρεπὸν ἐς συγκοπὴν κακόν. ἢν δὲ πολυπληθὴς ὀνοσεῶν ἢ καὶ νενίης, καὶ ἔξ ἀδιδιφαγίας καὶ οἰνοφλυγίας, οἷον ἐκ τῆς φρενίτιδος ἔασιν οἱ λογισμοί. ἀλλὰ καὶ ἀνεὺ ὡσαύτως, πολλὸν τετέων ἀφαίρειν αἷμα

cunt, aut quasdam nouas & uanas imagines accipiunt, atque in summa lucem, aut quæ in luce sunt, extimescunt; obscuro loco eos continere præstat. Sin secus se habeant, lucido. Bonum est autem ad lucem respicere, placarique insaniam. Ne diu à cibis abstineant: cibi uerò humidiores sunt, paucioresque, & continui: nam cibi animum demulcent. Occasio autem exhibendi cibi esto in utriusque remissionibus, febris uidelicet atque delirij. Quòd si ab inedia furant, & non desinat febris; cibos dare non ualde febrim lædentes utile est. Nempe bonum est febrim deliriumque in accessionibus remissionibusque concordare, quò exhibendi cibi oportunum tempus inueniatur. In primis itaque considerandum est, sanguis nec ne mittendus sit. Si mentis quidem alienatio unà cum febre à principio inuaserit: uena in cubiti curuatura primo aut secundo die, media potissimum secunda est. Quòd si non nisi tertio, aut quarto die delirium accedat: usque ad primum decretoriorum dierum circuitum uenæ sectio differenda est. *At si ultra conueniens tempus, ut puta sexto aut septimo die accedat, multum ante iudicationes in acutis morbis uacuandum aut phar macis utendum:* aut alijs irritationibus utendum. Venæ quoque incisor ne multum sanguinis detrahat, licet à principio secet: *phreniticis* namque malum est in syncopam facile mutabile. Sin autem ægrotus ualdè repletus sit, & iuuenis, plurimo cibo, & largissimo uini potu saginatus; hæc ad phrenitidem rationes non pertinent. Verùm istis & citra delirium multum sanguinis hauriendum est: longè



longe autem minus auferendum, si iisdem phrenitici sint. Verumtamen audacius uena soluenda est, si à præcordijs, non à capite morbus oritur: ibi enim uitæ principium est: caput uero sensus, neruorumque originis locus est, sanguinèque potius à corde trahit, quam alijs distribuat. Igitur si membrum hoc affectum sit, uenam cubiti scindere non conuenit: quippe in illis uitijs inanire uasa oportet, à quibus non modica noxa prouenit. Quod si uires patiantur, ut quantum sanguinis satis est, euacuetur; semel auferendum est: ne, dum repetendo tempus conteritur, exhibendi cibi occasio elabatur: quandoquidem phreniticis continuæ febres sunt, neque remissiones longas habent, sed breues & latentes subleuationes. Cæterum si ante mediocritatem defecerit æger, ad secundam remissionem differendum est, nisi longò tempore postuentura sit. Quod si non sit; uires in flaurando odoramentis, faciei tractione, & pedum compressionè protinus sanguis detrahendus est: quantum uero mittendum sit, facultas ostendet. Esca humida omnibus quidem febricitantibus idonea est, sed phreniticis maximè: aridiores enim sunt, quam si sola adesset febris, neque mulsæ danda, nisi biliosi sint: nam facile à biliosis naturis concoquitur. Far lotum cum aqua, aut mulsæ conuenit. Bonum quoque est ex his sorbitiones simplices præbere, quales saturcia, aut apio, aut anetho incoctis fieri solent. Hæ namque bonam spirationem conciliant, & urinam cient: conducit autem phreniticis lotij excretio. Omnia olera profunt: sed maluæ potissimum. Lentor enim bonus est & ad

πολλὸν ὃ μείον ἀφαιρέειν, ἢν οἰδίε ἔωσι οἱ φρενιτικοί. Ἐμνεὶν ὃ φλέβα τετέων εὐτολμότερον, καὶ ἄλλοιων χονδρίων ἢ μὴ ἀπὸ κεφαλῆς ἢ νῆσος ἢ ἐνθάδε γὰρ τῆ ζωῆς ἐστὶν ἡ ἀρχή. κεφαλῆ ὃ, χωρὸς μὲν αἰσθησιος, καὶ νῆσων ἀφαιρέειν, αἷμα ὃ πρὸς καρδίην ἔλκει μάλλον, ἢ ἄλλοισι διδοῖ. καὶ ὧν πεπόνθη ἡ δέ, οὐ χεῖρ ἴην ἐπὶ ἀγκῶνι ἔμνεὶν φλέβα. τὰ δὲ γὰρ πάθει, κενεαγγείων ἐφ' οἷσι ἡ βλάβη ἔσμιχρη. κῆν μὲν ἡ δύναμις ἀντέχει εἰς τὸ ἰκανὸν τὸ κενώσιος, ἀπαξ ἀφαιρέειν, ὅπως μὴ ἐν τῇ διαστάσει τὸ ἐπαφαιρέειν διόμνυται τὸ τροφῆς ἢ ἐγκαταλείπει. ἔνεχέες γὰρ τοῖσι φρενιτικοῖσι οὐ πυρετὶ, καὶ εἰ δὲ ἐπανεσίας μακρὰς, ἀλλὰ βραχείας, καὶ ἀσήμες κεφισμῆς ποιεύμενοι. ἢν ὃ πρὸς τὸ ἔμμετρῆς ἀπαυδήση νόσων, ἐς δευτέρῳ ἐπανεσιν ὑπερβάλλεας, καὶ μὴ ἐς μακρὸν ἐπιπέτη. εἰ δὲ μὴ, ἀνακαλεσάμενον ὁσμῆσει καὶ ψάσει πρὸς ὄψα, καὶ πῆσι ποδῶν, αὐτὰ καὶ ἀφαιρέειν. γῶμα ὃ τὸ αὐταρκίης ἢ δύναμις. τροφή ὑγρὴ πᾶσι μὲν τοῖς πυρεταίνουσι, ἔχῃ καὶ ὃ φρενιτικοῖσι. * ἐπιξηρότεροι γὰρ πυρετῶ μένων. * ἐπιξηρότεροι. εἰ δὲ μελικρητῶν, ἢν μὴ χολώδεις ἔωσι. εὐπεπτόν γὰρ τοῖσι πυροχόλοισι. χόνδροι πλυτὶ ξὺν ὕδατι ἢ μελικρητῶ. ἀγαθὸν ὃ καὶ ἐκ τῶν δευροφῆματῶ διδοῖται ἀπλᾶ, ὅποια θυμβρῆς ἢ σελίνης, ἢ ἀνήθης * ἐνεψήμετων. εὐπνοα γὰρ τὰ δὲ καὶ διεξηπκά. σύμφορον δὲ γὰρ φρενιτικοῖσι ἔρησις. λαχάνων πάντων μὲν, μάλιστα ὃ μαλάχης. ἀγαθὸν γὰρ τὸ γλίχασμα, καὶ ἐς




πιοφώτερος.

αχάρι.

οπώρης.

λειότητα γλώσσης καὶ δριπύνης, καὶ ἐς
 πλεῖστον κοπρίων διέξοδον. ἀριστον δὲ, καὶ
 λεῦτλον καὶ βλίτον, καὶ κορωνόπους, ἔκο-
 λοκύν) καθ' ὄρεον, καὶ ὅτι ἀν' ἐκά-
 σης ὄρης ἀριστον ἢ πλισαίνης ἢ χυλός,
 ὑγρότατον μὲν ἐν πρῶταισι ὡς* δι-
 τσοφώτερος εἶσι, ἐστὶ δὲ μάλλον παχύ-
 λeros, ὁκόσον αὐτὴν ἠνέστος προήκοι χρο-
 νον. ὑποσέλλεαδς δὲ ἐν τῆσι κρίσεισι,
 καὶ μικρόν τι πρὸ τῶν κρεσσίων. καὶ δὲ ἐς
 μῆκος ἠνέστος ἴη, καὶ ἀφαιρέσειν τῶν
 προσοδείων. ἀλλὰ σιῶδεα διδόναι,
 ὡς Ἰζαρκέση ὀνοσέων. εὐτε καὶ κρεσσίων
 ἀκρεσσίων ἔπεινῶν χρέος τὰ πολλὰ
 ὧσι χυλοῖσι ἐκπηκομύρον. καὶ ἔτα γὰρ
 χρεῖ τὰδε ἐν τῆ ἐψησει λυεαδς. ἰχθύ-
 ων οἱ πεπεραῖοι τῶν ἄλλων εἰς κρέασον
 ἔσων. Πίπται δὲ τὰς ἐν τῇ χώρᾳ δρι-
 πύς ἀρετέον. ἄλλη γὰρ ἄλλας φέρειν
 ἰχθύων ἰδιόεας πεπύσθιαι χῶρη. * ὁ-
 πώρας οἰνώδεος ὑποσέλλεαδς κεφα-
 λῆς γὰρ καὶ φρενῶν ἄψιν ποιεῖ. καὶ δὲ
 ἀνάγκη ἐστὶ δυνάμιος ἢ Ἰσομάχου
 βιαζομύων, ἐφθὰ ἐν μελικρητέω, ἢ
 ὀπία ἐν σέαπ, ὁκοῖον μῆλα δοτέον.
 τῶν ἄλλων θερμῶ ὑδαπὶ ἕκασον
 ἐκλύειν, ἢν ἐς μέντω τὴν Ἰσομάχου
 πῶρα μύθιν διδῶς. καὶ δὲ καὶ ἐς δύναν
 δειν, καὶ καὶ ἔτα ὁ οἰνώδεος ἐκλύειν προ-
 φημύων ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὧσδε. τέγ-
 γεν δὲ τὴν κεφαλῶν ἐς ἐμφυξιν λί-
 πατὶ ἐλαίης ὀμφακος τετραμύθης.
 ἀλεαίνεαδς γὰρ ἢ κεφαλῆ ἢ φιλέα
 φρενιπκοῖσι. ἢν δὲ καὶ ἀγρυπνίη καὶ φαν-
 τασίη ἔωσι, ῥοδίνου μίσγεν ἴσον ἴσω τὰ
 πρῶτα. ἔπι δὲ μάλλον τὸ ῥοδίνον
 ἔσω πλέον ἐς σύψιν καὶ ἐμφυξιν τῆς
 κεφαλῆς. καὶ δὲ καὶ τὴν γνώμην πα-

linguæ arteriæque læuorem, & ad
 stercorum descensum optima est be-
 ta, blitum, coronopus, cucurbita, &
 quicquid suis temporibus optimum
 fuerit. Ordei uerò mundati cremor
 liquidissimus quidem imprimis nu-
 tribilior est : sed tanto etiam spissior
 crassiorque sit, quanto plus temporis
 morbus progressus fuerit. Verùm
 in iudicationibus & paulò ante iudi-
 cationes cibus subtrahendus est.
 Si morbus longiori tempore produ-
 catur : cibus ne subtrahito, sed triti-
 cea exhibeto, quò sufficiat ægrotus :
 quando extremorum & uolatilium
 carnibus in cremore liquefactis ple-
 runque opus est. Oportet enim hæc
 in elixando ualde dissolui. Ex pis-
 cibus saxatiles alijs præstantiores
 sunt : atque omnino regionis illius
 optimos deligito. Quippe aliàm regi-
 onem alias piscium species procreare
 creditum est. Vinosa naturæ fructus
 subtrahito : quoniam caput & men-
 tem percutiunt. Verùm si necessitas
 urgeat, uiribus aut ore uentriculi la-
 bantibus; mala in mulla elixa, aut in
 adipe tosta exhibeto, aliorum singula
 calida aqua dissoluito, si roborandi
 duntaxat oris uentriculi causa exhibe-
 as : sin autem uires quoque instau-
 rare opus sit, non usque adeo uinosa
 facultas dissoluenda est. Cibi qui-
 dem (ut semel dicam) huiusmodi
 sunt. Irrigandum uerò caput est
 refrigerandi causa oliuæ acerbæ con-
 tritæ unguine : nam caput in phreni-
 ticis caleferi nõ amat. Quòd si uigiliæ
 & cogitationes ægrotum agitet : rosa-
 cei parem modum in principio miscē-
 to : adhuc uerò plus rosacei addendū,
 quo magis extra intraque caput robo-
 retur ac refrigeretur. At si mens labe-



faciatur, & locutio euariet, serpylli comam oleis incoquito, aut hederæ succum, aut sanguinalis affundito. Si mentis uerò alienatio uehementius hominem turbet; peucedanum, & spondylium oleis inferuefacito, & aceti parum instillato: hæc enim halitus & caliditatem diffiant, crassasque humiditates, quæ & ipsæ deliramenti causæ sunt, discutiant. Cauere autem conuenit, ne in ceruicem ac tendones madefactio descendat. Tendones enim atque neruis inimica est. Nempe irrigandi semper occasio est, præterquam exacerbationis initio: rarius quidem in incremento, omnium uerò frequentissimè uigente morbo, cum maxime insaniant, tum maximè irrigandum est humore frigido: atque æstiuo tempore multo magis refrigerato, hyeme uerò tepido. Ut mitescat autem delirium; posca, aut conyzæ decocto cum spongia facies fouenda est. Deinde œnanthino, aut erocino unguine linienda: quin etiam nares, & aures iisdem imbuenda. Hæc enim somnum alliciunt. Si quando isti pernoctant, neque interdiu sopiuntur, sed penitus intenti sunt oculi atque instar cornu rigentes, jactantur autem, & eleo profiliunt; his somnus & quietes conciliandi sunt: primum quidem caput rosaceo mero irrigando, aut amaracino cum succo hederæ, aut serpylli, aut etiam fertulæ decocto. Magis autem soporiferum est papauer in oleo elixum capitis sincipiti superdandum, aut in aqua faciei per spongiam

ρακινέωνται, ἢ τὴν φθέγγιν ἕλαιλάσων), ἐρπύλλου κόμης ἐνεψιτέον ἐν τοῖσι ἐλαίοισι, ἢ κισσῶ χυλὸν ἢ πολυγόνου ᾠδαχυτέον. ἢν δ' ἐπιμάλλον ἢ ᾠδαφορῆν ἕξάπη) ἢ πικρὸν ἢ ἀσπιδύλιον τοῖσι ἐλαίοισι ἐνεψιῖν, ἢ ὄξος ᾠδαχεῖν. ἀτμῶν γὰρ ταῦτε ἢ θερμῆς διαπνευστικὰ, καὶ παχέων χυμῶν διαλυτικὰ, * ἂ τ' ᾠδαφορῆς ξυναίτια. πεφυλάχθαι ὅτι καὶ ταῦτε, ὡς μὲν * τὴν αὐχίνα ἢ τὰς τένοντας ἢ τὴν ἐξίσκη. πολεμῖν γὰρ τένεσι καὶ νύκτοισι. καὶ τὸς ὅτι πάσης τὴν ἐξίον, πλεὺ τῆς ἐσβολῆς τῆ παροξυσμῶ. ἀραιότερη δὲ ἐν τῇ ἀναβάσει, πάντων δὲ μάλιστα ἐν ἀκμῇ. ἢ δ' αὖ ἐκμαίνονται, τῇ δὲ μάλιστα τὴν γένει ψυχρῶ, καὶ ψυχροδύω ἐπιμάλλον θέρους ὄξω. χειμῶνος δὲ χλιαρῶ. εἰς ὅτι τὸ πενήναι τὴν ᾠδαφορῆν, ὄξω κρήτω, ἢ κονύζης ἐψήματι καὶ ἀπογγῆτα ᾠδῶσωπα πυελῶ, ἢ παρὰ χεῖρην οἰανθίνω ἢ κροκίνω λίπαι, καὶ τὰς ῥίνας καὶ τὰ ὠτα. τοῖσι ὅτι διαχεῖται. ταῦτε μύρτι καὶ ὑπερ ἀγωγὰ. ἢν γὰρ παῖνυχοι μὲν ἐγρήσωσι, μὴ δὲ δι' ἡμέρας εὐδῶσι, ἀτενέες ὅτι τὸ ξύμπαν εὐδῶσι, ὁφθαλμοὶ ὅτι ὀκκοῖον πικρὰς ἐσθήκωσι, ἐλησρίζων) ὅτι ἢ ἕξανισῶν), ὑπνον αὐτέοισι καὶ ἡρεμίαν μηχανέας, πρῶτα μὲν διὰ τῶν κεφαλῆς τεγγίων, ῥοδίνω ἀκρήτε, ἢ ἀμαρακίνω, ξυλῶ χυλῶ κισσῶ, ἢ ἐρπύλλω, ἢ καὶ μελιλώττω ἐναψιψήματι. ἐπιμάλλον ὅτι ὑπνωτικόν, μήκων ἀψιψηθεῖσα * ἐν λείπασι, ἐστὲ τὸ τῆς κεφαλῆς βρέγμα, ἢ ὑδαπῆς τὸ πρῶσωπον ξυλῶ ἀπογγῆ.

τ. α.
τ. β.



ὑποπθέναι ὄρεθι καὶ αὐτὰς ὄλας, εἰ
 εἶεν νεοσρεπείς. χλωρὰς τῆσι ὑπο-
 κεφαλαίοις. παχύνει γὰρ καὶ ὑγραί-
 νει τὸ πνεῦμα, ξηρὸν τὸ καὶ λεπτὸν ἐόν,
 καὶ ὁμίχλω τῆσι αἰσθήσεσι παρέ-
 χόν. βαρὺ δὲ καὶ *νωθὲς ὁμίχλη, ἥ-
 περ ὑπνοῦ δόχη. καὶ δὲ μεζόνων δέ-
 ωνται, καὶ αὐτὸ τὸ μηκύνειον ἐστὶ μέ-
 τωπαξιν ὑδαπχεῖν. ἢ ὅτι ὑποαλεί-
 φειν τὰς ῥίνας, καὶ ἐς τὰ ὠτὰ *ἐγγεῖν.
 Ψηλαφίη ποδῶν ἐναφῆς ξινὸν λι-
 παί, *ψαῦσις τὸ κεφαλῆς. ἀνηκὸν
 ὅτι καὶ κνήσις μάλιστ' ἀποτὰ φωνὰ καὶ
 ὠτων. καὶ γὰρ καὶ τὰ θηρία ἐς ἀνάπαυ-
 λαν ὀργῆς τὸ καὶ θυμοῦ κνήσι ὠτων
 τὸ καὶ κροτάφων δάμνονται. ὑπὲρ
 ὅτι ἀγωγὰ ἐκάστου καὶ τὰ ξυνήθεα.
 ναυπλῶ μὲν ἢ ἐν ἀκάτω κατάκλι-
 σις, καὶ ἐν θαλάσῃ ἀειφορῆ καὶ αἰ-
 γαλῶν ἦχος καὶ κυμάτων κτύπος,
 ἀνέμων τὸ βόμβος, καὶ θαλάσσης καὶ
 νηὸς ὀσμὴ. μεσηκῶ ὅτι ἐπιθισμὸς αὐ-
 λῶν ἐφ' ἡσυχίῃ, ἢ ψαλμὸς *λύρης,
 ἢ πυκτίδος, ἢ μελέτη παιδῶν σινὸν ὠ-
 δη. διδασκάλων ὅτι νηπιάχων μύθων
 ἀεσομιλίῃ. ἄλλοι δ' ἄλλα ὑ-
 πὲρ θελητήρια. τῆσι δὲ ὑποχονδρί-
 οισι καὶ τῆ κοιλίῃ ἐμβρέγματα, καὶ ἐπι-
 πλάσματα, ἢν φλεγμονὴ καὶ σκληρίῃ
 ἐπαίρη, καὶ φύσα, ἔλαιον δρυπετῆς
 ἐλαίης μὴ ὠμῆς ἐμβάλλειν. παχὺ
 γὰρ καὶ γλίχρον καὶ ἀλεαῖνον. τόσδε ὡν
 χεῖρος ἐν φλεγμασί, ἐνεθῶ δὲ ἐν
 αὐτῇ ἀνήθον, κόνηζα, ἀγαθὸν ὅτι οὐκ
 τὰ πάντα. καὶ ὅτι καὶ φύσα ἐνῆ, κυμίνε
 καὶ σελίνε τῶν καρπῶν, ἢ δὲ ὀκόσα ἔ-
 ρων καὶ φυσέων ἀγωγὰ. καὶ νίτρον ἐν-
 σείσαντα ἐμπάσειν. ἢν ὅτι τὸ ἥπαρ ἴην

impositum. Ipsæ quoque integræ
 herbæ (si proximè lectæ fuerint) uiri-
 des cervicalibus subijciendæ sunt.
 Crassant enim, madefaciuntque spiri-
 tum aridum tenuemque: & caligi-
 nem quandam sensibus obducunt:
 graue autem & torpens est caligo: id
 uerò est somni principium. At si ua-
 lentioribus auxilijs egebunt; & ipsa
 papaueris lachryma ex aqua frons
 iungenda. Quin etiam nares ealini-
 endæ, & in aures infundenda est. Con-
 trectatio pedum suavis ex oleo: capi-
 tisque attactus efficax est, sed potissi-
 mum si tempora, auresque scalpan-
 tur. Nam & ferarum iram furotem-
 que aurium & temporum mollis at-
 trectatio coërcet. Cuique uerò usi-
 tata somnum accersunt. Nautis in
 cymba decubitus, & maritima nauigatio,
 & littorū sonus, & undarum
 murmur, uentorumque bombus, &
 maris nauisq; redolētia. Musico quoq;
 tibiaturum exercitatio quietem affert,
 aut lyræ cantus, aut cytharæ, aut me-
 ditatio puerorum canentium. Ludī
 autem magistro puerilium fabella-
 rum enarratio. Atque ita alijs alia
 animum demulcentia somnum insi-
 nuant. Cæterum præcordijs ac uen-
 tri madefactiones ac cataplasmata ad-
 hibeto, si phlegmone subsit, atque du-
 ritias, flatusque distendat: oleum quo-
 que ex oliua benè matura nequaquam
 acerba inijcito: id enim crassum est,
 & uiscidum, & calefaciens. Hæc uti-
 que in inflammatione faciendæ sunt.
 Inijciatur uerò in ipsa anethum, aut
 conyza: bonum quoque est, si simul
 omnia. Quod si adsit etiam inflatio,
 cumini & apij semina adijcito, & qua-
 cunque lotium flatusque prolestant:
 hæc non & nitrum cribratum in-
 spergito. Verum si in jecore
 uitium



nitium dolorque fuerit, lanas ab
oue sordidas accipito, oleum uero
acerbum, aut rosaceum, & sapam
Græcam, aut Creticam admisceto:
fertulamque incoquito, atque omni-
bus in unum succum permixtis je-
cur irrigato. Ad lienem uero ole-
um cum aceto benè facit: aut si ma-
gis, quàm prius curbet; posca, & pro-
lanis spongia mollis adhibeatur.
Nam mirum in modum his gaudet
miscecitque lienis. Porro si præcor-
dia interius sint, sursumque trahan-
tur, & circum tenta cutis sit; opti-
mum hoc remedium erit loco un-
guinis, aut unà cum ipso crasso tan-
tundem opportunum est. Cunila ue-
rò & ros marinus incoquantur. An-
ctum quoque non injucundum erit.
Quòd si cataplasmatis tempus erit
idoneum, oleis quidem iisdem in iis-
dem affectibus utendum est. Materia
sit autem lini semen, fænum græcum,
ordei tenuis farina. Bonum est au-
tem & faba, & eruum, si uenter intum-
escat: pariter & milium torrefa-
ctum, in sacculo positum leue molle-
que fomentum est. Pinsitum uero &
aqua intercutem laborantibus cum
melle & oleo & lini semine cataplas-
ma bonum est. Flores autem & her-
bæ & femina quæcunque à me in ir-
rigationibus posita sunt: & in cata-
plasmatis eadem sunt. Mel uero
& cum ipsis bonum est, ut arida co-
gantur, misceanturque squalentia,
atque ut calor diutius permaneat:
ipsum quoque solum bonum est pro
cataplasmate semicoctum, & ad irri-
gandam, si cum aliquo humore

πείσιν ἢ τὴν ὀδύνην ἴσχει, ἔειά μὲν
ἔσω * οἷσὺ πω πιναρὰ ἀπὸ τ' οἴος.
ἔλαιον δὲ τὸ ἀπὸ τ' ὀμφακῶ, ἢ
ρόδινον. μίσγειν ὃ κρησίραμον ἑλλη-
νικόν, ἢ κρηῖτα, ἢ ἐνεψεῖν * μελίλω-
τον, μίξασθαι * τε εἰς ἓνα χυλὸν τὰ
πάντα * καταμονεῖν τὸ ἥπαρ. σπλῆνι
ὃ τ' ἔλαιον σὺν ὄξει ἔσω, ἢ εἰ μέζον ἢ
πρὶν θονεῖαι, ὄξυ κρητον, ἢ ἀπὶ ἐρείων
απογγή ἀπαλή. μάλα γὰρ τοῖσδε
ὁ σπλῆν χαιρετεῖ, ἢ πρὶν νεταίω, ἢ
ὃ τὰ ὑποχόνδρια εἶσω ἢ, ἢ δὲ ἀκω
εἰρέει, ἢ τὸ δέρμα περτείνται, ἀ-
εισον μὲν ἀπὸ τῆς λιπαῶ, ἢ ξυῶ
αὐτέω παχεῖ σπληκαίον ἴσον. κό-
νυζα δὲ ἔσω ἢ λιβανωπὶς τὰ ἐνεψή-
ματα, ἢ ἀνήθον ἐκ ἀτερπές. ἢ δὲ
σπληπλάσειν εὐκαμείνη, τοῖσι μὲν
ἐλαίοισι τοῖσι αὐτέοισι κρηεῖας, σπλη-
τοῖσι ὁμοίοισι ὕλη δὲ λίνε σπέρμα, ἢ
* πῆλις, ἢ * ἀλητην κρηθὶς λεπτόν.
ἀγαθὸν ὃ ἢ κύαμα, ἢ ὄροβ, ἢ ἢν
σπληδαίνη ἢ γαστὴρ κέγχρος ὃ φοχ-
θεῖσα ὢν μαρσύποισι, πυζήμα κῆ-
φον ἢ μαλθακόν. ἀληλεσμήνη ὃ καὶ
ὑδρωδῆσι ξυῶ μέλιτι ἢ ἐλαίῳ καὶ
λίνε σπέρματι, σπληπλάσμα ἀγα-
θόν. ἀνήθη δὲ καὶ βόταναι ἢ σπέρ-
ματα ἄσφα μοι ὢν τοῖσι ἐμβρεγμα-
σι λέλεκται, ἢ ἐν τοῖσι σπληπλά-
μασι ἔσω τὰ ἐνωτά. μέλι δὲ καὶ
συν αὐτέοισι μὲν ἀγαθὸν ἐς σύσα-
σιν τῶ ξηρῶν, καὶ ἐς μίξιν τῶ αὐ-
χηρῶν, καὶ ὡς ἢ θέρμη ἐς πολλὸν
διαρκέη. ἀγαθὸν δὲ καὶ αὐτὸ μέ-
ρον, καὶ σπληπλάσμα ἢ μίεφθον, καὶ
ἐμβρεγμα ξυῶ πῆ τῶ ὑγρῶν λυθεν,
μαλθαξαι

* πῆλις.
* οἷσὺ πω
* μελίλωτον
* καταμονεῖν

* πῆλις.
* ἀλητην
τὸ ἀλφεινόν



μαλθαξαι ἀλεῦσαι, φουσέων κ' ἔ-
ρων ἀγωγὸν, πρηνύαι πρίσας. τὰ δὲ
γδ κ' μελικρήτην ποιεῖ ποθεν, κ' τριέ-
ων* πλέονα κ' κρέατονα, εἰσὼ παρελ-
θὸν δ' ἄρτην κ' πνύμονι, κ' θώρηκι καὶ
κοιλίῃ. Συνεχέως ὅτι κ' κοιλίῳ ἐρε-
θίζειν βαλάνοισι ἢ διαχρίσοισι. Ἰπ-
ξηραίνον) γδ πολλά, ἔστε τὴν ὀλκὴν
τῷ λπὸ ἴ κεφαλῆς. ἀτὰρ ἡδ' ἐς δια-
πνοὴν τῷ ἐν τῷ θώρηκι ἀτμῶν, κ' ἐς
κρίσιν τῷ ἐν τῇ κοιλίῃ. ἢ ὅτι πολλῶν
ἡμερῶν ἢ γαστρὸς Ἰπ' ἄρη), κλύζειν
κρη μελικρήτῳ, κ' ἐλαίῳ, κ' νίτρω. ἢ
ὅτι μὴ αὐξίως ὑποκαταστῶσι αἱ τῆς
φλεγμονῆς πρηνόνας, σικύλωθέντα
ἐπιλάμναι, ἐνθα αὐτὴ φλεγμονὴ κρη-
νὴ κ' μέζων ἐπ. μίλω ὅτι ἢ δ' αὐτέριω,
ὅπως αὐτὰτε φλεγμαίνοντα σι-
μαίνῃ, καὶ ἡ δ' ἰσχυρὰ κελύη, ἀτὰρ
καὶ τὸ πλῆθος τῆς αἵματός. ὅτι
δὲ τεκμαρτέον. ἀμετερίν γὰρ συ-
κοπῆς αἰτίη. ἐς μὲν ὧν ἡμέρῳ μίλω
ἢ δ' αὐτέριον, τέγξις ἢ ἑωυτῆ, ἐς δὲ
τῷ τρίτῳ κρηωτῆ σὺ πνὶ λίπαϊ
τῶν ἐμβρεγματῶν. ἔπειτα Ἰπ' ἰπ-
μαζα, ἐν φλεγμασίῃ μὲν λὺ ἐπε-
ῶσι, ὑδρωπός, τῆλις ἐφθῆ ἐν μελι-
κρητῳ, τερμίνθη τῆ φυτοῦ ῥηπίνη,
κρηός. τὰ δὲ ἐλαία Ἰπ' ὅτι αὐτέ-
οισι τὰ ἑωυτά. λὺ δὲ μὴ τετέοισι
ἐπανίη μηδὲν ἢ ἀσφαφορῆ, * κού-
ρη τῆς κεφαλῆς κρηός, λὺ μὲν
μηκίσαι εἶεν αἱ κόμαι, τὰ πρῶ-
τισα ἐς ἡμισυ. εἰ δὲ βραχύτε-
ρα, ἐν κρηῷ ἔπειτα μεσηγὺ ἀνα-
λαβόντα τῷ ἰσχυρῶν, σικύλω

liquetur: mollit enim, calefacit,
flatus lotiumque euocat, & ardores
obtundit. Nam hæc quoque mulsa
epota præstat: hisque plura & me-
liora, si interius arteriam, pulmones,
pectus, & uentrem subeat. Assidue
uero aluus irritanda est glandulis,
aut illitionibus (sæpius enim siccescit,) ut à capite materie detrahantur, &
à pectore halitus diffentur, & alui
purgamenta excernantur. Quod si
multis diebus uenter suppressus fuit,
ipsum mulsa, oleo, & nitro subluere
opus est. Verum si non satis phleg-
mones exhalationes desierunt; cu-
curbitulam affigens incidito, qua
parte phlegmone extumuit, & maior
apparet: unam autem, aut duas affi-
gito, prout phlegmone significaue-
rit, & uires præceperint: & san-
guinis detrahendi copiam ab his
conjectare oportet. Excessus enim
syncopæ autor est. Primò quidem,
aut altero die madefactio eadem
esto. Tertio uero ceratum cum ali-
quo ex oleis ad irrigandum aptis im-
ponito. Deinde epithemata in in-
flammatione si facultas sit, ex hyf-
loro, fenugræco ex mulsa decocto,
terebinthi arboris resina, & cera:
olea uero in iisdem eadem. Quod
si nihil istis delirium remittat: ton-
dere caput necesse est: si longissimi
crines sint, primum dimidij: si bre-
uiores, ad cutim. Postea pri-
us refectis uiribus cucurbitula
uertici



uertici capitis affigenda est, sanguis- que hauriendus: uerum prius inanis cucurbitula interscapulo adhibea- tur. Cæterum quoniam thoracem in omnibus acutis morbis medicari oportet: nam prorsus ipse cum corde & pulmone laborat: primum qui- dem ob spiritus modo calidi, modo frigidi necessitatem, præ- terea ab ardenti feбри, & tussi, & humorum prauitate, & neruorum communiõne, & oris uentriculi no- xa, nec non succingentis membranae, & septi transuersi uitio: (cor enim si maiori aliquo malo oppressum sit, nunquam sanescit:) in Phreniticis utique & hæc imprimis mitiganda sunt. Siquidem nonnullis mentis alienatio ab aliquo eorum, quæ in pectore sunt, uitio exoritur. Ea uerò sunt, spiritus calidus & siccus, fitis acris, ignis intolerabilis, qui undique in thoracem confluit, & prauitas qui- dem à domestico calore commuta- to & major & molestior prouenit. Ab alijs etiam membris in thoracem contributio fit. Extrema nanque frigida sunt, caput, pedes, ac manus: super hæc autem thorax est. Igitur humectandi refrigerandi que auxi- lio eget. Humectatio quidem fit ex oleo, in quo chamæmelum, aut nardus incocta sit. Æstate uerò & sapa græca bene faciet. At si epithe- matibus uti deceat; palmulæ uino austero maceratae, deinde contusæ in placentam cum nardo, polenta, atque cenanthe suaue pectori cata- plásina fuerint. Refrigerant quoque mala pinfita cum mastiche & sertula: quæ omnia cera & nardo excipiantur. Sin autem & os uentriculi torpeat, & à cibis abhorreat; succum absinthij, aut

κατὰ τὸ κορυφῆς πρὸς βάλλειν, ἢ δὲ ἀφαίρειν αἷμα. κεφῆ δὲ πρὸς τέρη ἐς τὰ μετὰ φρενα. * κεκολληθῶ. ἐπεὶ δὲ καὶ θώρηκα. ἐν πάσῃσι τῆσι ὀξείῃσι νόσοισι ἀκίεως χεῖν, πάντα τὴν κάμνοντα ζῦν καρδίη καὶ πνεύμονι, πρῶτα μὲν ὑπὸ ἀνάγκης τὸ ἀνα- πνοῆς, ἄλλοτε μὲν θέρμης, ἄλλοτε δὲ ψυχρῆς. ἐπὶ δὲ ὑπὸ πυρετῶ καυσώ- δεος καὶ βηχῶς, καὶ ὑγρῶν πονηρίης, καὶ νεύρων κοινωίνης, καὶ σωμαχῶ συμφο- ρῆς, ὑπεζωκότρως τὴν διαφράγμα- τος κακίης καρδίη γὰρ πᾶθη μέζον πεινῶν οὐποτε ἀκίεται. Ἐπὶ δὲ τῆσι φρενιτικοῖσι καὶ μάλα χεῖν τὰ δευτερίως εἶναι. πρῶτα φορῆ μὲν γὰρ με- τεξέειργισι ἐκ πνός τῶ ἐν τῷ θώρηκι. ἀναπνοὴ θερμῆ τε καὶ ξηρῆ, διψῶ- δριμύ, ἐκ δὲ φορῆν πύρ, * τὰ πάντα ἐς θώρηκα ξυρρέειν καὶ κακίη μὲν, ἀπὸ τῶ οἰκίης θάλπεος τετραμυδῶς μέζων τὴν δυσφορωτέρη ἢ ἀπὸ τῶ ἄλλων ἐς θώρηκα ζῦνδοσις. ἀκρά γὰρ ψυχρὰ κεφαλή, πόδες τε καὶ χεῖρες. ὑπερθευ δὲ τῶ δὲ ὀ θώρηξ καὶ δέε) ὦν * ἀρηγεῖν ὑγρασίη καὶ ψύξη. τέγγις μὲν ὦν ἔ- λαμον ξυὺ χαμαμῆλη ἐψηθεν, ἢ νάρδω. θέρμεος δὲ καὶ σίραι θῶ ἑλληνικός. ἢ δὲ καὶ ἑπιθέρισι δέη χεῖεως, φοίνι- κες ἐν οἴνω αὐστηρῶ δαυθέντες. ἐπειτα λείοι ἐς καζαντεπεμυδοί, ζῦν νάρ- δω, ἀλφίροισι, οἰνάνθη, πρὸς σινές θώ- ρηκι ἑπιπλάσμα. ψυκτικὸν δὲ καὶ μῆ- κα θλασθέντα ζῦν μασίχη καὶ μελι- λώτω. πάντα δὲ κηρῶ καὶ νάρδω ἀνα- λαμβάνειν. ἢ δὲ καὶ τὴν σωμαχὸν ἐχη νάρκη, καὶ ἀποσίτη, ἀψιθίς χυλὸν ἢ κόμην



κόμην τῷσι ᾗ ξυλλεαίνεν. ἢ τῷ δεξί-
 ψηθέντι ξὺν λίπαι καταμνεῖν τὸ
 ὑποχόνδριον. πιπίσκεν δὲ ἢ τὸ ἥπο-
 βρεγμα, ἢ χυλὸν αὐτέα παρὰ τὸ τρο-
 φῆς, * ὀκόσον κυάθους δύο ἔδπο-
 βρέγματος, ἢ κύαθον πικρῶ χυλῶ
 ξὺν ὑδατος κυάθοις δύο. καὶ ᾗ καὶ
 σος ἔχη τὴν σόμαχον, ἐκ δὲ τὸ κα-
 τασάσεως * τῆς νέσας, ἀλλ' αὐτὴ μέ-
 νε δὲ τὸ χυμῶν δριμύτων ἢ ἀλμυρῶν,
 ἢ ὑπὸ χολῆς δακνομένης, ἢ διψῆ
 * αἰναινομένης, ὑδρομιγῆς γαλαδο-
 τέον ἐν τροφῇ, ὅσον ἡμικοτύλιον τῆ
 γάλακτος ἐν ὑδατος κυάθω ἐνί. ρυμ-
 φάνειν ᾗ αὐτέα τὸ πλείστον. βραχυ-
 ᾗ πικρῶν συνᾶραι ἀναλίσκειν. καὶ ᾗ καὶ
 καὶ σος ἔχη τὴν ἀνθρώπον, ἢ διψῆ
 ἢ δριμύτη, ἢ μαλίη, ἢ ἐπιθυμίη ψυ-
 χεῖ ὑδατος, διδόναι, μείον μὲν ἢ ὀκό-
 στον ἐν καύσει νέσω αἰνῶ φρενίπδος.
 τῷ δὲ γὰρ ἀμφὶ τῷ νέρων ὀρρωδέειν
 χεῖ. διδόναι ᾗ ὀκόσον ἐς σόμαχα
 ἀκος. ὀλίγον ᾗ ἀπαρκέει, βραχυπό-
 ᾗ γοὶ φρενίπκοί. ἢν ᾗ εἰς συγκο-
 πὴν τεσσάονται. γίγνεῖ γὰρ ἢ τόδε.
 τὸ μὲν γὰρ δυνάμιος λυομένης, ἰδρῶτι
 ᾗ χεομένης τῆ ἀνθρώπου, πάντων δὲ
 εἰς τὸ ἐπίστικῶ φρενῶ ποιουμένων
 τῷ ὑγρῶν, ἢ τῆ τόνου λυομένης, ἢ τῆ
 πνεύματος, ἔστε ἀκηδίω (μὲν) τῆς
 πῶρα φρενῆς, δέος δ' εἰς ἀτμόν λυθῆ-
 ναι ἢ ὑγρασίω τὸν ἀνθρώπον. ἀλλὰ καρ-
 μούνον ἐστὶν οἶνος, θρέψαι μὲν ὠκέως
 κατ' ἐπίω, ἢ πάντη μέγχι περάτων
 μολεῖν. τόνω ᾗ παρὰ εἶναι τόνον, καὶ
 πνεῦμα νεναρκωμένη ἐγγεῖραι, ψύ-
 ξιν ἀλεῖλαι, σὺψαι πλάδον, φερο-
 μένων ἔξω ἢ ρεόντων κρατῆσαι, ἢ οὐς


* ἢ κυάμου
 ἀλλ' ἰσφαλί-
 ναι, ὡς δὲ πῶρ.

ἢ κυάμου.

ἢ τῆς.

ἀναπορίων.

comam unà cum his terito, ipso etiam
 in oleo incocto præcordia irrigato:
 & aquam, in qua maduit, aut ipsius
 succum ante cibum propinato duos
 sc. aquæ illius cyathos, aut amari succi
 cyathum cum aqua cyathis duobus. At si
 os uentriculi ardor malè habet, non
 ratione morbi, sed ipsum duntaxat
 ab acribus falsisque humiditatibus,
 siue à bile mordetur, atque siti pera-
 rescit; lac aquæ ad mixtum in cibis ex
 hibendum, heminx uidelicet dimidi-
 um uno aquæ cyatho temperatum:
 atque ita huiusce lactis plurimum
 sorbeat: nonnihil etiam cum pane
 assumat. Verùm tamen si ardor ho-
 minem torqueat, & sitis, & anxietas,
 & furens insania, & frigidæ cupidi-
 tas, propinanda quidem frigida est,
 sed non tanta, quanta in ardore mor-
 bo absque phrenitide propinatur.
 In istis enim timendum neruis est.
 Itaque danda est, ut ori uentriculi
 subueniatur. Pauca uerò satis est:
 parum enim potant phrenitici. Cæte-
 rum si in Syncopam prolabantur,
 nam & hoc incidere solet, uiribus
 euanescentibus, in sudorem liquef-
 cente homine, omnibus humoribus
 extrorsum impetum facientibus, te-
 nore ac spiritu fatiscentibus; tunc cu-
 ra delirij posthabetur. Sed cum me-
 tus sit, ne in uaporem, humiditatem-
 que homo dissoluatur; unicum substi-
 dium uinum est. Celeriter enim sub-
 stantiam alendo inaurat: & quoquo
 uersus ad extremitates usque permeat:
 tenori tenorem apponit: & spiritum
 torpentem expergeficit: frigiditatem
 calore temperat: laxantem madorem
 adstringit: extrorsum erumpentia
 atq; diffluentia coërcet: olfactu suaue
 delectat:



delectat, vires demum: fulcire, ad ui-
tam prorogandam potest: atq; in insa-
nia ad animum demulcendum opti-
mum est. Hæc omnia epotum uinum
simul præstat. Iracundia nanque
mollescente animo conquiescit: at-
que ipsimet ad recreandas vires cibos
accipiunt: quin etiam seipfos ad uo-
luptatem replent. Nempe si jam
plus temporis morbus extrahitur, &
febris ignaua est, & delirium in fatui-
tatem uertitur, & præcordia non us-
que adeo læsa sunt, aut tumore, aut
inflatione, aut duritia, sed in capite
potissima morbi causa est; audacter
lauare oportet, atque sapius caput
perfundere: habitus nanque sanabi-
tur: & caput distillabitur: & omne
corpus exhalabit. Atque ita sicci-
tas obrunditur: & sensus caligo discuti-
tetur: & mens stabilis, atq; in concussa
firmatur. Hæc utique sunt tollendi
morbi præcepta.

μὲν ὁσφραγεῖται ἐς ἡδονήν. κεφαλαίος
ἢ σπριξαμὲν ἐν δυνάμει ἐς ζωὴν. ἀεισος ἢ
μελίξαι θορμὸν ἐν πᾶσι φορῆ. τὰ δὲ
μύτρι ποθεῖς ἅμα πάντα πηροσει:
θυμὸν ἐξ ἐπιπέων ἐς δύναμιν πρέφον-
ται. ἀλλὰ ἐν ἀξέωυτέροις ἐμπνεῖται ἐς ἡ-
δονήν, πᾶσι μὲν ἡδὴ πολλὸν ἡκει
χρόνον ὅταν ἢ ὁ πυρετός νωθὴς ἔη, ἀλλὰ
ἡδὴ πᾶσι φορῆ ἐς μώρωσιν πρέπη ἢ
τὸ ὑποχόνδριον μὴ πολλὰν πηροσει
βλάπη), ἢ ὄγκω, φύσσει, σκληρῆ
κεφαλῇ ἢ τὸ πλέον ἔχη τ' αἰτίας, χεῖ
τλμείοντα λειν, ἡδὲ καὶ αἰωνεῖν πολ-
λὸν πτω κεφαλῆν. ἢ τε γὰρ ἐξ ἐπι-
μανθῆσε), ἢ κεφαλῇ διαπνδιωθῆ-
σε), ἢ τὸ ξύμπαν σκῆνος διημιώθη,
ᾧ δὲ γὰρ τὸ μὲν ξηρὸν ἀμβλύνη), καὶ
καθαρεύει) τὸ μίχλης ἢ αἰσθησις ἢ ἢ
γνώμη εὐσθησις ἡδὲ ἐμπειο) μίμ
νει. τὰ δὲ μύτρι τ' λύσιος τῆς νούσε
γνώματα.

CVRATIO VE-
ternorum.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΗΘΑΡ-
γικῶν.

Caput II.

VEternosi in luce & ad Solis radios
collocentur: morbus enim nihil
aliud est, quam tenebræ & magis in
loco calido habeantur: ipsius enim
causa est insita frigiditas. Cubile agi-
tabile sit, stragulae uestes, parietum
picturae, omnia sint paria, quæcun-
que uisum proritare queunt: multus
habeatur sermo: pedes premendo
tractentur: uellantur pili: membra
scalpanitur. Si altus sopor obtineat, uo-
ciferandum est: iracundè increpandus est
ager, ijs quæ timere consuevit deterrè-
ndus, quæcunq; prius optabat expecta-
batq;, aunciada sunt: omnia ad sopo-

Κεφαλ. β.

Ληθαργκοῖσι κατάκλις ἐν φω-
τὶ ἢ πρὸς αἰγλωζόφος γὰρ ἡ νῆσος.
ἡ δὲ ἐν ἀλλήμαλλον. ψύξις γὰρ ἐμ-
φυρῆς ἢ αἰτή. κοίτη εὐαφῆς, σρώ-
ματα, τοιχογραφίη ποικίλα πάντα
ὄκοντα περ ἐρεθιστικὰ ὄψιος, λαλή,
ψηλαφίη ξυῖ πῆσι ποδῶν, τλ-
μοι, κνέσμοι. λὺ βαθὺ κῶμα ἰσχη, ἐμ-
βόσις, νεθεσίη ὀργίλη, θεῖμα ἐφ' οἷσι
δαμαίνει. πρὸς αγγελίη τῷ ὄκοντα
ἐπὶ ὀθεεῖ ἢ πρὸς ἐδόκεε. πάντα ἐς ἐγρή-
γοσι,

N γοσι,



γορσιν, ἐναντίως τοῖσι φρενιτικοῖσι.
 ἀμφὶ ἧ καὶ * κενώσιος ληθαργικῶν,
 τῶδε χεῖρ γινώσκειν. καὶ μὲν εἰς ἐτέρης
 νοῦσα. οὐκοῦν φρενίτιδος διαδέξη-
 ται ἡλήθη. φλέβα μὲν μὴ ταμνεῖν,
 μηδὲ ἀθρόον ποθὲν κενουῦ-
 αἵμα, ὑποκλύζειν ἢ τὴν κοιλίαν, μὴ σκο-
 πῶδεός εἶνεκε μῆνον, ἀλλ' ὅπως πῆ καὶ
 αἰῶθεν ἀντισσασθῆ, καὶ ἀπὸ τῆ κεφα-
 λῆς ὀχευθῆ. πλέον οὐκ ἔστω ἀλ-
 λῶν τε καὶ νίτρου. ἀριστον ἢ τὸ κλύσμα-
 τι, εἰ κασόριον ἐμπάσσοις. ψυχρὸν
 γὰρ τὸ κάτω ἔντερον ληθαργικῶσι, καὶ
 πρὸς ἐκκρίσιν νεκρῶδες. καὶ ἢ μὴ ἐκ
 διαδέξιος νόσα, ἀλλ' ἐωυτέα ἀρχῆ)
 ὁ ληθαργος, καὶ δοκίμη πεπληθῶς ὄνε-
 σέων, ἢν μὲν αἵματος, φλέβα τὴν ἐπὶ
 ἀγκῶνι ταμνεῖν. καὶ ἢ φλέγματός
 ὑδάτιδος, εἴτε ἄλλων χυμῶν, κα-
 θαίρειν χεῖρ κενώσῃ σὺ τῆ πησάνῃ.
 ἢ ἐλλεβόρω μέλανι ξυὸ μελικρήτω,
 πρὸς τῆσι δόχησι, ἢν μετρίως βούλη.
 ἢν ἢ μεζόνως, εἰ φαρμάκων εἰς ἑρῆς
 καλθυμίδης νῆσει διδόναι ὀλκῆς * β.
 ξυὸ μελικρήτω κυάθοις τρισί, καὶ πε-
 ριμείναντα καθήρασθ. τότε διδόναι
 σίτια, ἢν καμρὸς ἢ. καὶ ἢ μὴ, εἰς τὴν ἐπι-
 σαν ἡμέρην ἢ προσφί. εὐκαμρὴν δ' ἐκοτε
 καὶ ἐν ἑσπέρῃ γίγνε) εἰς ἑρῆς ὀλκῆς. * α.
 ὑδάτι, ἢ μελικρήτω λυομυρηνκυάθοις
 δύο. ἀπροφίη κακόν. κακόν ἢ καὶ πο-
 λυπροφίη. χεῖρ ὧν ὀλιγοσιπὴ χεῖρ εἰσθ
 (εἰς) ἐκάστην ἡμέραν. ἀθρόον ἢ μὴ ἀσι-
 τεῖν. ὑπομνήσιός τε γὰρ ἢ ἀλέης τῶ
 σομάχῳ χεῖρ ἀναπᾶσαν τὴν ἡμέ-
 ρην. ἀταξὶ καὶ ἢ προσφί ἔστω λεπτόνυσα,
 καὶ διαχωρητικὴ ἐν ζωμοῖσι μάλλον ἢ
 * καὶ χεῖρ. ὀστρίοις, ἀλεκτορίδι, * κεγγεῖδι. λινο-

rem discutiendum contra, atque in
 phreniticis, molienda. Quod ad
 ueternosorum euacuationem attinet;
 hæc nouisse oportet, si alteri morbo,
 utpote phrenitidi succedat ueternus;
 uenam ne soluito: neque alicunde
 multum sanguinem educito: sed uen-
 trem subluito, non solum stercore
 educendi causa, sed etiam ut aliquid
 à superioribus partibus reuellatur, &
 à capite deriuetur. Igitur multum
 insit salis & nitræ. Optimum uero
 sit, si sublutioni castorium inspergas.
 Imum enim intestinum ueternosis
 frigidum est, & ad excretionem emor-
 tuum. Quod si non per, successio-
 nem, sed suo pte ingenio ueternus in-
 cipiatur, & æger plenus esse uideatur:
 si sanguinis, uena in cubiti curuatura
 secanda est: si pituitæ aquosæ, aut
 aliorum succorum, purgare opus est,
 cnico ex ordeï cremore, aut nigro ue-
 ratro ex mulsæ inter initia, si medio-
 criter purgare uelis. Sin autem copio-
 sius, medicamenti, quod hieram, id
 est, sacram uocant: pondo drach-
 mas duas jejuno dato cum mulsæ cya-
 this tribus: atque tantisper expe-
 ctans, quoad purgatio confecta sit;
 tunc cibos, si oportunum sit, exhibe-
 to: sin minus: in posterum diem ali-
 mentum differto. Nonnunquam sanè
 & uesperæ hieræ drachma cum aquæ
 aut mulsæ cyathis duobus dissolu-
 ta in tempore datur. Nempe ine-
 dia malum est, malum est & cibi mul-
 titudo. Igitur exiguu cibo uti sin-
 gulis diebus oportet: neque subito
 ac penitus jejunandum est. Os enim
 uentriculi per totum diem refecione
 caloreque indiget. Quin etiam cibus
 esto attenuans, & aluum leniens in
 iusculis magis quam leguminibus,
 gallina, conchride. Cum her-
 ba uero



ba uero mercuriali concoquito: acetum- que affundito, & succis inijecto, si forte succo ptisanæ utendum sit. Bonum autem spiritum reddit, urinamque citat fœniculum, apium, olera, aut horum semina. Item porrum acrimonia sua proficit, & brassica cum oleo & garo. Optimè facit & cuminum dulce cum brassica ad flatu digerendos & lotium euocandum. Vesica enim atque uenter in quolibet morbo irritant atque infestant. Irrigationes capitales fiant, quales & in phreniticis. Vtrisque enim sensus pleni halituum sunt: quos refrigerando, adstringendoque rosæ atque hederæ succo propulsare necesse est; aut digerere per transpirationem extenuantibus, exempli causa serpyllo aut aceto cum rosaceo. Si nerui doleant, & totum corpus, sed multò magis extrema frigescant; caput ceruicemque castorio cum anethino oleo inungito, atque irrigato. Quin etiam spinam eodem, sicyonio, aut gleucino, aut ueteri oleo admixto perfundito: nec non & manus ab humeris usque: pedes item ab inguinibus: perungendi sunt. Nonnullis quoque uesica est humectanda: quæ tanquam neruus patitur, & tanquam urinæ iter laborat: insuper & humorum acredine uexatur: biliosum enim lotium est. Sin autem maior tremor adsit, & conuulsionem minetur necessario & sicyonium oleum capiti superfundendum: sed breuidis usus esto. Quod si præcordia inflammata sint, cutis uero tumida, inflata distentaque, aut introrsum uergentibus præcordijs concava efficiantur; madefactiones & cataplasmata anisodidi sint, cuiusmodi in capite de phreniticis comprehendimus. Cucurbitula minime utitur, si à phrenitide in hanc labem incidit: audacius uero cucurbitula uti poteris, si ab initio morbus iste iuaserit.

ζώσω ἢ ξυνεψείω, κὶ ὄξος τῶν ἀχρεῖων, κὶ τοῖσι ἢ χυλοῖσι ἐμβάλλειν, εἰ ποιδέοι χυλῶν χρεῖας * πρισάνης, εὐπυοον ἢ ὄσρων ἀγωγόν, μάραθρον, ἢ ὄσελινον, τάλανανα, ἢ τάλων τες καρπες. ἀγαθὸν ἢ κὶ πρᾶσον τῆ δριμύτι, κὶ κράμβη ξὺν ἐλαίῳ κὶ γάρῳ ἄρισον ἢ κὶ κύμινον γλυκὺ ξὺν κράμβη φουσέων ἢ ἔρων. ἐρεθιστικὸν ἢ γδ κύσι, ἢ ὄ γαστῆρ ἐν πάσῃ τῇ νῆσῳ. ἰεργίτες τ κεφαλῆς, αἵπερ κὶ τοῖσι φρενιτικοῖσι. ἀμφοῖν γδ αἰ * αἰδησῆτες πλέαι * ἀλλοτῆς ἀλλως ἀλλοτῆς. γίγνον ἢ ἀτμῶν, ἅς ἀπελαύνειν χρῆψύξει, κὶ σὺ ψεί * ροδίνε κὶ κισσέχυλῶ. ἢ ἐξαμίτζιν ἐς διαπυοον τοῖσι λεπτύνεσι, οἷτ ἐρπύλω, ὄξει σὺν τῶ ροδίνῳ. λῶ δὲ νεύρων πόνος ἐπὶ κὶ ψύξις ὄλα, * πολλῶ ἢ μάλλον ἀκρέων, τῶ κασορίῳ ξὺν ἀνθηθίνῳ λιπαίνην, ἢ ὄ τέγγην τὴν κεφαλὴν κὶ τὴν ἀχένα, καὶ τὴν ῥάχιν χεῖρ τῶ ἀντῶ ξὺν λίπαι σικυωνίῳ, ἢ γλαυκίνῳ, ἢ παλαμῶ. ξυγχειεν ἢ κὶ τῶ χεῖρε δὲ τῶ ὄμων, κὶ τῶ πῶδε δὲ τῶ βεβῶνων. τοῖσι ἢ μῆτρει κὶ τὴν κύστιν καλαιωνεῖν, κὶ ὡς νεῦρον πάχασαν, κὶ ὡς ἔρων ὄδὸν κάμνασαν. ἄθῆρ κὶ τῆ δριμύτι τῶ χυμῶν ἀχθομένην. χολώδεα γδ τῶ ἔρα. ἢ ὄ μέζων ὄ τῆ ὄμοσ ἐπὶ, κὶ κίνδυνος παασμῆ, κὶ * σικυωνίῳ εἰς τὴν κεφαλὴν ὑπ' ἀνάγκης χρεῖας. ὄλίγη ἢ ἢ τῶ ἢ χεῖσ. ἢ ἢ κὶ φλεγμασίαι τῶ ἢ ὄποχονδρίων ἔωσι, κὶ πῆσῆσις κὶ φύσαι, κὶ τῶ εἰλάσιες τ δερμαίος, ἢ κοῖλον γίγνη εἰσῶ * εἰρουμῆς τ ἢ ὄποχονδρίαι, ἐμβρέγματα κὶ ἐπιπλάσμαα, ὄκόσα * μοι ἐν φρενιτικοῖσι λέλεκ. σικίη ἢ κίσα χρεῖας, ἢ δὲ τῶ φρενιτιδος ἔωσι. εὐτόλμοτερον ἢ ἢ ἀρχῆθεν ἢ νῆσος εἰσβάλλη.

* πρισάνης.
* ἀλλοτῆς ἀλλως ἀλλοτῆς.
* ροδίνης.
* πικρῆς.
* σικυωνίῳ.
* εἰρουμῆς.
* ῥῆς.




ἡ δὲ γλῶσσα μελαίνη, καὶ ὄγκος ἐν
 τοῖσι ὑποχονδρείοισι σημαίνει, ὑπὸ
 ἀνάγκης τῆ σκλήχρεοται. ἐπὶ δὲ
 πρὸς τῶ μήκει ἔχρονος κενωθήσεται
 τῆσι αἰθήσεσι, τὰλλα δ' εὐπετέσε-
 ρον φέρη, ἢ κορυφῆ τ' κεφαλῆς προσ-
 βάλλειν. ἀλυπον γὰρ τῆ δυνάμει τ' ἐν-
 τεῦθεν κενουῖ. * ἀγνὴ τε καὶ φύσας αὐτῶ
 τε καὶ κάτω. * φυσέων γὰρ συναγωγὸν
 ληθαργος, καὶ ἐν τῆσι κοιλίησι, καὶ ἐν τῶ
 ὄλω σκηνεῖ δεργίη, καὶ νωθίη, καὶ ἀψυ-
 χίη. διαπυθυσικὸν ἢ κίνησις, ἢ ἐγρή-
 γορσις. διαχρίθου οὖν πῆγανον χλω-
 ρὸν τριβούρα ξὺν μέλιτι καὶ νίτρω, ἀγω-
 γόν τε ἐστὶ μάλλον φυσέων ξὺν τοῖσι,
 καὶ τερμίνθου ῥητίνης μέρος ἐν καὶ πυρεῖν
 προσκλητικὴ φυσέων ἢ πιναρθῆσι θερ-
 μοῖσι ἐρείοις, τρηχέσι παλαμοῖς ῥά-
 κησι, ἢ ασογγίη ξὺν ὕδατι, ἐνθ' ὕσω-
 πον, ἢ ὀρίγανον, ἢ γλήχων, ἢ ῥύλη ἔψη
 ἢ. ἀγοὶ δ' αὐτὴ φύσας, ἢ δὲ ὀκόσα πρὸ
 τῶν σιτίων πίνε, τὰ περὶ καὶ φλέγμα
 καὶ χολήν ἐν τοῖσι ἐπὶ ῥοῖσι καὶ σωμαχῶ
 ἀγνῆ, * ὕσωπον ἐν μελικρήτῳ ἔψη-
 θέν, δίκταμον τὸ κρητικόν, * ὀρίγανον.
 δριμέα μὲν, ἀγωγὰ ἢ ἀδιαντον, ἀ-
 γρωσις, τὰ δὲ μὲν καὶ καὶ φυσέων καὶ ἔ-
 ρων καὶ ῥητικῶν. ἡ δὲ ῥοῖος χει-
 ρῶν καὶ κεφαλῆς ἐπὶ, καὶ ὀρίον πρὸς τὴν
 δραχμῆς ὀλκῆς ἡμισυ, ξὺν μελικρή-
 τῳ κυάθοις τρισὶ ἐς ἡμέρας πλεῦνας.
 ἡ δὲ καὶ πίνη τὸ δὲ, ἐκίθου ξὺν συμφο-
 ρῆς ξὺν ἐλαίῳ, ἐνθ' ἀπῆγανον * ἐκίθου
 ἀπῆ κυάθοις τρισὶ, τὸ διπλόον ἐς τὸ κα-
 τῶ ἐν τεσσάρων ἐγχεῖν καὶ τὸ δὲ ἐς πλάνας
 ἡμέρας. μετὰ ἢ τὸ ἐκ τεσσάρων συμφο-
 ρῶν. φύσας γὰρ ἀγνῆ ἀνωτὲ καὶ κάτω.
 μελέξεῖ ῥοῖσι ἢ ἔρα καὶ κόπριον. ἡ δὲ
 ἀπῆ ποθεν εἰς τὸ πᾶν διαθείον ἡχη,

* ἀγνῆ.
 * φύσας.

* ὕσωπος.
 * ἐψηθεῖσα.
 * ὀρίγανον.
 * δριμύμεν.

* ἐκίθου καὶ
 * ἀπῆ.

Sin autem atra lingua sit, & tumor in
 præcordijs appareat, cucurbitulam
 affigere necesse est. Postquam uerò
 interuallo temporis sensus purgati
 fuerint; & alia facilius feret; capitis
 uertici applicare. Quandoquidem
 ea parte euacuare sine ulla uirium mo-
 lestia possumus. Et status supra in-
 fraque eliciendi sunt. Vetus enim
 flatus colligit, & in uentriculis, & in
 toto corpore ignauia, marcor,
 animæque defectus conspicitur.
 Motus autem ac uigilia discu-
 tiendi facultatem habent. Ru-
 tam igitur uiridem cum melle & ni-
 tro contritam illinito: *cum his uerò
 magis quoque flatus digerit: si hac adjun-
 gantur, & terebinthina resina pars una.*
 Fetus quoque flatus prouocat aut
 cum sordidis calentibusque lanis,
 aut cum asperis panniculis ueteribus
 atque attritis: aut cum spongia ex
 aqua, ubi hyssopum aut origanum,
 aut pulegium aut ruta incocta sit.
 Euocant autem flatus & quæcunque
 ante cibos propinantur: quæ utique
 pituitam bilemque ab intestinis &
 stomacho educunt. Hyssopum in
 mulsa elixum, dictatum Creticum,
 origanū. Acria quidem sunt, sed edu-
 ctoria. Adiantum, græmenque fla-
 tus & lotia erumperè faciunt. Sima-
 nus & caput contremiscant, castore-
 um dimidiæ drachmæ pondere ex
 mulsæ cyathis tribus ad plures dies
 bibendum est: si bibi uerò non possit,
 ad demoliendam calamitatem cum
 olei cyathis tribus, in quo ruta inco-
 cta sit, duplum inimum intestinum
 infundatur: idque per plures dies fa-
 ciendum. Ultra uerò utilitatem
 quæ ex hoc prouenit (nam supra
 infraque flatus expellit, & nonnul-
 lis urinam, stercusque detrudit:) si
 forte in omne corpus dilabens



penetrat, firmi atque robusti nerui efficiuntur, & habitus ad calidum siccumque permutat: morborumque constitutiones conuertit. Optimè etiam proficit si in nares inspiretur; nam & ea ex parte spiritus sternutamentis educit. Et quemadmodum per vesicam urinam expellit, ita & per narts mucum. Hos autem effectus hoc loco suavi caliditate præstat, & melius quàm alia sternutatoria, scilicet quàm piper, ueratrum, radícula, euphorbium. Nam hæc ad primum atque ultimum attactum immitia sunt, & caput sensumque perturbant. Castoreum uerò paulatim adhibitum calefacit, cum & alioqui capiti conducatur: quandoquidem nerui undique ex capite oriantur: morbis autem neruorum castoreum medetur. Cæterum ipsum cum aliquo aut aliquibus ex supra comprehensis admiscere non ingratum fuerit. Nam si admixtum sit, non protinus quidem caput mediocriter conturbauerit, diutius uerò caliditatem accenderit. Nares proritatione humidæ reddantur. Odoramenta applicentur acriâ quidem ad sensum, sed facultate calida: quale ipsum castoreum est, aut thymbra, aut pulegium, aut thymum, uiridia aut arida aceto per fusa. Acribus pharmacis pedes genuaque illinantur. Materia esto calefaciens, & ex adiectione mordens: nam utroque ueternosis opus est ad calorem excitandum atque uigiliam. Primum igitur urtica crura uerberato. Tenuissimam nanque urticæ partes adhærentes non diu perseverant: sed *pruritus doloris expertem* inferunt; mediocriter uerò stimulant, & tumefaciunt, & calorem excitant. Quod si hæc uehementiora fieri uolueris: lemnilidis, atque

ἀτρομά, ἢ κρῆλαι τὰ νεῦρα γίγνε)
 ἢ τὰς ἐξίας ἐστὶ θερμὸν ἢ ξηρὸν ἀλ-
 λοιοί, ἢ τὰς κατὰ σῆσας τῶν νῆσων
 πρέπει. ἀεῖσον ὃ ἢ ἐς τὰς ῥίνας ἐμ-
 φυσῆν. ἢ γὰρ ἢ τῆδε πνευμάτων κα-
 τὰ ῥήκτικὸν πᾶρμοῖσι. καὶ ὁκοῖόν τι
 κῦσις ἀγωγὸν ἔρων, ἢ ῥίν μύξης.
 πρῆσαι ὃ θερμὴ πρῶσινεῖ τὰ δε τῆδε,
 ἢ τῶν ἄλλων τῶν πᾶρμικῶν κρέασον.
 πεπέρεος, ἐλλεβόρου, σρεθίσι, εὐφορ-
 βίσι. τὰ δε γὰρ ἐς τὴν πρῶτον, ἢ δε πνευ-
 μάτων θίξιν ἀπηνέα, ἢ ταρακτικὰ
 κεφαλῆς τε ἢ ἀιδήσιος, ἐκ πρῶσα-
 γωγῆς ὃ τὸ κασόριον ἀλεαίνει. κε-
 φαλήσι ὃ ἢ ἄλλως ξύμφορον, ὅτι
 περὶ τὰ νεῦρα παίτη ἐνθένδε φειφύε-
 ται. νῆσων ὃ νεύρων κασόριον ἐπιπρί-
 ον. ἀλλὰ * ξυμίσγειν τὸ δε τῶν γε-
 γραμμένων πνι, ἢ πσι, ἐκ ἀχαρι. ἢ
 γὰρ μιγῆ, μὴ αὐτίκα μὲν κεφαλῶν
 ξυμμέτως ταραξαι. ἐς μακρὸν ὃ τὴν
 θερμὴν ἔξαι ψαυγῆσαι, τὴν ῥίνα
 πρῶσινεῖ. ὅσμαι δριμύται μὲν ἐς
 ἀιδήσιν, ἐς δύναμιν δε θερμαί. ὁκοῖ-
 ον αὐτὸ τὸ κασόριον, ἢ θύμβρα, ἢ γλή-
 χων, ἢ θύμος, χλωρα, ἢ ξηρα δισυ-
 θέντα ὄξει. δριμύτων φαρμάκων χρί-
 σιες κατὰ τῶν ποδῶν, καὶ γενάτων.
 ὕλη ὃ ἐσω ἀλεαίνεσα ἢ δάκνυσα ἐκ
 πρῶσαγωγῆς. ἀμφοῖν γὰρ χέρος λη-
 θαρτικοῖσι ἐς θάλψιν ἢ ἐγρήγορσιν.
 τὰ πρῶτα μὲν ὡν ἢ κνίδημασι ζεῖν τὰ
 σκέλεα. πρῶσιζσα γὰρ ἢ ἀχρη, ἐκ ἐς
 πολλὸν μὲν διαρκεί, ἀλυπον ὃ ὀδα-
 ξισμόν ἢ πόνον ἐνθιδῶσι. μετρίως δε
 ἐρεθίζει τε ἢ παροιδίσκε, ἢ θερμασίην
 πρῶσαλέει. ἢ ὃ ἐπιμᾶλλον ἐθελη-
 σης τὰ δε τῶν γίγνεσθαι, λημνίσιδος, ἢ δ'

* ξυμίσγειν

* λημνίσιδος



εὐφορβίαισα ξυὼ λίπαι γλυκίνω
 χεῖν ἀεισον κὺ σίλλης ὠμῆς λεπτοῖ-
 σι ἐκτεῖβειν. χεῖ ὅ δ' ἀπομάξαντα τῶν
 μελέων τὸ ἐλαμῶδες. ἀδηκτον γδ παῦ
 δριμύ ξυὼ λίπαι, λῶ (μῆ) φαρμα-
 κῶδες ἢ κυπρίνω, ἢ γλυκίνω, ἢ σκυ-
 ωνίω. ἢ ὅ τ' ἐπιτετέοισιν ἐπιβαθὺ κῶ-
 μαίχη, σκυδὸν χεῖ τὸν ἀγριον ξυὼ
 ὄξει τείψαντα, σινήπιση μάχη
 ξυμμίξαντα. πθέναι δριμύ ὅ τ' ἐπι-
 πλασμα, κὺ ὠκέως ἐρυθθήματα ἐνθευ-
 ζον, ὠκέως ὅ οἰδαλεθρήματα. εἰκίν-
 δυνος δε φλυκλαινώσιος καὶ τρωμά-
 των, ξυνεχέος ἐπαίρειν τὸ ἐπίπλασ-
 μα, καθορέοντα μήπιτερίων ξυμβῆ.
 τὰ δ' ἐμὲ ὦν ἐς τὸ νωθές κὺ νεκρῶδες
 αὐτές κὺ ἐς πάντα καιρὸν, πλιὼ τῆσι
 ἐσβολῆσι τῶν παροξυσμῶν. ἢν δ' ἐ
 ἀναφέρη μὲν ἤδη τὴν ἀσθῆσιν, βάρος
 μὲν π' ἐπιτ' κεφαλῆς, καὶ ἦχος, ἢ
 βόμβος ἦ, κὺ διὰ τ' σώματος ἀγαν
 φλέγμα, μασίχλω τὰ πρῶτα ἐς
 *μάσπιν διδόντα, ὡς ξυνεχέος ἀπο-
 πύοι. ἐπαῖτα δ' ἐ αὐθις ἀσαφίδος ἀ-
 γρίης, κόκκη τ' ἐ κνίδης, πάντων δ' ἐ
 μάλισα σινήπιος, ὅτι τ' ἐξυνηθές, ἀτὰρ
 ἠδ' ἐ ὅτι τῶν ἄλλων μάλλον τόδε
 φλεγμάτων ἀγωγόν. κῆν μὲν
 καλαπὴ πῆς ἐκῶν, ἰκανὸν μὲν τὰ ἐν τῷ
 σωμαχῶ λῦσαι, δύνατ' ὅ κὺ ὑγρῆσαι
 γαστέρα, κὺ φύσας ἀγαγεῖν. καὶ
 γδ μοι κατ' ἐξυτυχίης τὰ δ' ἐξυνέ-
 βη, καταπίνοντες τ' ἀνθρώπους κατὰ
 γνώμην τὴν ἐμὴν. ἀγαθὴ ὅ διδάσκα-
 λος ἢ πείρη. χεῖ ὅ κὺ αὐτὸν πειρήν. εὐ-
 λαβίη γδ ἀπειρή. χεῖ ὅ κὺ τὴν κεφα-
 λὴν μετὰ τὴν κερῆν τὴν ἐν χεῶ, ἢν μὴ
 μέγα ἦ δ' ἐ ἀνύη, ξυρεῖν ἐς διαπνοήν.

* εἰκίνδυνος.

* μάσπιν.

euphorbij pares portiones cum uni-
 guine gleucino illinito. Optimum
 quoque est scillæ crudæ laminis per-
 fricare. Sed à membris omne oleo-
 sum detergere oportet: quodlibet
 enim acre minimè mordax est admix-
 tum cum unguine, aut cyprino, aut gleu-
 cino, aut scyonio, ne ista medicamento sa-
 putes. Si præter hæc altus adhuc so-
 por occupet: proderit sylvaticum
 cucumerem ex aceto tritum, & æquæ
 sinapis portioni admixtum impone-
 re. Acre uerò id est cataplasma, ce-
 leriterque ruborem concitat: celeriter
 quoque calefacere potest. Verum
 ne pustulas uulneraque efficiendo
 periculum inferat, frequenter detra-
 hendum est cataplasma, atque nun-
 quid horum acciderit, inspiciendum.
 Hæc utique ad ipsius torporem, ac
 ueluti demortui languorem discuti-
 endum quolibet morbi tempore præ-
 ter exacerbationum inuasiones moli-
 enda sunt. Quòd si jam sensum recu-
 peret, pondus tamen aliquod in ca-
 pite insit, & sonus aut bombus obstre-
 pat; etiam per os pituita elicienda
 est. Mastichen imprimis manden-
 dam exhibe, ut continenter expuat:
 postea rursus uuam taminiam, gra-
 num gnidium: sed omnium maximè
 sinapi, & quoniam usitatum est, &
 quoniam inter alia magis pituitam
 educit: ac si quis sponte ipsum deuo-
 rauerit, quæ in uentriculo sunt, disij-
 cere potest: potest etiam aluum ma-
 defacere, & flatus excernere. Etenim
 hæc aliquando casu mihi euenerunt:
 cum homo quidam me consentiente
 ipsum deuorasset. Bonus autem
 magister est experientia: opus est uerò
 & ipsum periculum facere. *Timor
 enim & cautio imperitia causa est.* Ca-
 put quoque postquam ad cutim de-
 tonsum fuit, nisi magno peré profici-
 at; ut transpiret, radendum est:

quin



quin etiam ad usum acrium medicaminum, ut ejus, qui ex lemnistide constat, aut hydar, aut thapsia, aut sinapi, humidum ex aqua cum dupla panis portione in linteolo ueteri illitum capiti superdandum est: cumque horæ spatio ibi permissum fuerit, spongijs calidis fouere oportunum fuerit. Item ex usu erit & lauatio omnibus jam, aut saltem plurimis, & præcipuis ad morbi depulsionem adhibitis, adhuc tamen corpore torpente: ubi & gestatio proderit, & frictio, & qualibet lenis corporis agitatio.

DE CVRATIONE tabis.

Caput III.

Istos sanè si & tabes malè habent, ocys succurrendum est, ad balneum deducendo, & corpus dimouendo. Tabis quoque lac medela est, & nutritio, & calefactio uentrisque humectatio, & uesicæ lenitio. Quin etiam eadem huic uitio, quæ & catocho expediunt: similis enim atque eadem est horum morborum species. Castoreum utique istis oportunius est atque lenius & potui datum, & illitum, & in intestinum infusum. Mulieribus autem qualia his similia ab utero uitia orientur, in libro de muliebribus morbis à nobis disputabitur.

DE CVRATIONE Apoplexiæ.

Caput IV.

Apoplexia ualidus planè morbus est. In totum enim mortem præferant: si è agrotus senex sit, quibus familiaris morbus est: non enim liberantur: tum propter mali magnitudinem, tum propter etatis calamitatē. Quibus autē notis

ἀτὰρ ἢ ἐς φαρμάκων δριμέων χησιν, & διατ' λημνίστιδος, ἢ * ὕδαρ, ἢ θαψίν, ἢ σίνηπι ὑγρόν δ' ἐξ ὕδατος ξύν ἀρωδιπλῶ ἐς σενυχρον ἐγχεῖσαι τὰ ἐμπάσθην τὴν κεφαλὴν. φυλάξαι τὰ δὲ ἐς ὠρίωμιον, εὐκαμείη ἀπόγγοισι θερμοῖσι πυριλῶ. ἐκ ἀνω φελέσ ἢ κ' λείν ἢ δὴ πλείων μῆ, ἢ τῶ γε πλείων κ' καμείων τῶ ἐς τὴν νῶσον λελεμμένων. τ' ἢ ἰωθεῖς μενέσος, εὐτε καὶ αἰώσης χρέθ, κ' τριψίος, καὶ πάσης ἀρωσθινῆς κινήσιος.

ΜΑΡΑΡΜΟΥ ΘΕ-

κεφάλ. γ.

Τοῖσι ἢ ἰσχυρὴν κὴν μαρασμὸς ἐπὶ δὴ γειν θάσσον, ἰόντα δ' ἐπὶ λατρά κ' κινήσιος. μαρασμὸς μῆρι κ' γάλα * ἰητήριον, κ' φρέψαι, κ' ἀλεῖναι καὶ ὑγρῶσαι γαστέρα, κ' κύστιν πρηῖναι. ἀτὰρ ἢ καλόχοισ τὰυτὰ (τὰ) * ξυμφέροντα. ὁμοίη γ' κ' ἢ ἐν αὐτῇ τῶ δὲ τῶ νῶσον ἰδέη. κασόριον ἢ τριτέοισι καιριώτερον τε κ' εὐμμέτερον πείν τε κ' χεῖρα δ, κ' ἐς τ' ἔντερον ἐνεῖναι. τῆσι δὲ γυναίξι, ὁκοῖα τριτέοισι κέλα παθεα διὰ ὕεσης γίγνεται, ἐν τῶσι γυναικείοισι λελέξεται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ- πληξίης.

κεφάλ. δ.

Ἀποπληξίη ἰσχυρὴ μὲν εἶη. ἀπαντὰ γ' ἔασιν νεκρώδεις, ἢν ἢ κ' ὀνισέων γηραιὸς ἢ, τοῖσι περ * ξυνηθες τὸ πάθος, ἐ γ' ἀειγίγνονται τῶτε μεγέθει δ κακῆ, καὶ τῇ τ' ἡλικίης ξυμφορῇ. ὁκως δὲ τεκμαρτέα τὰ με-



τὰ μεγάλα, ὡς ὅθεν μοι λέλει).
 ἢ ἰνεννίης, ἀδενίης ἀποπληξίῃ πέ-
 λει, ἢ ἄσ μὲν ἔρῃδιον, πειρῆς ἰὼν.
 ἰσὸρροπον μὲν ἰνὴν ἰπῆριον, ὡς μεγα-
 λω πάθει μέγα βόηθημα φλεβο-
 μίῃ, ἢ μή τις ἐς ἀμαρτωλὴν εἴη τῆ
 πλήθεος. δυστέκμαρτον ἰὸν μέτρον. ἢν
 ἰε γδ σμικρῶ πλέον ἀφέλῃς, προσ-
 πέπνιξας τὸν ἀνθρώπον. ἐς γδ τὸ ζῆν
 τετέοισι, ἢ τὸ σμικρὸν αἷμα δυνά-
 τωτάτων, ἢ (ἢ) ἀλήτ' ζωῆς ἔσκηνης
 ἢ τ' τροφῆς ἐόν. ἢν τε μείον τ' αἰτίας,
 εἴδεν μέγα ὠνήσας διὰ μέγαν
 ἄκεος. ἐπὶ γδ ἢ αἰτίη μίμνει, κρέσσον ἰ
 ἐς τὸ ἔλασον ἀμαρτάνειν. ἢν γδ καὶ
 δοκῆ μὲν ἐνδέειν, χησαὶ δὲ πνες ὑ-
 ποφάσις γίγνεται, αἷθις ἐπανα-
 τάνειν τὴν φλέβα. τάνειν ἰ τὴν ἐν
 πῶ κοίλῳ ἔσθ' ἀγκῶνος, εὐροος γδ ἢ δε
 ἐν πῶ λαίῳ. ξυτεκμαίρεα δὲ ἐν τῇ
 σμικρῇ ἀποπληξίῃ ἢ τὰ πάρετα μέ-
 ρα, * εἰ ἐπὶ δεξιερὰ, ἢ δεξιά ἢ πά-
 ρεις. ἀπὸ γδ τῶ ὑψηλῶν ὡς ἐπὶ εἰ-
 πείν, τὴν ἀφάρεσιν χηὶ ποιεῖν. τῆ δε
 γδ τὸ αἷμα εὐροον. τῆ δε ἢ ἢ παροχέ-
 τασις ἀπὸ τῶ σναρῶν. ἢ μὲν ἰὼν
 ἀνθ' φανερῆς ὡς ὅφασις ἀπὸ
 πληκτοὶ γίγνεται, ὡς ἢ χηὶ συλλο-
 γίζεσθαι ἀμφὶ τ' ἀφαιρέσει. ἢ
 ἰ ἀπὸ πληγῆς, ἢ κατὰ φορῆς, ἢ * πέ-
 σις ἰ ξυμβῆ, χηὶ ἀναβάλλεα δὲ μετε-
 ξέεργισι ἰ τὸ δε μούνον εἰς ἄκεσιν ἢ
 ζωὴ ἢ κέσεν. ἢν ἰ μὴ δοκῆ τάνειν
 φλέβα, ψύξις πολλῆς ἢ νάρκης, ἢ
 ἀναιδήσις ἀμφιχέσις τὸν ἀνθρώ-
 πον, ὑποκλύζαν ἐς κένωσιν ἔσθ' πλήθεος
 τῶ ἐν τῆσι ἐντέροισι. τὰ πολλὰ γδ

morbi magnitudo conjectanda sit
 antea à nobis positum est. Si juue-
 nis æger sit; debilis est apoplexia, non
 tamen facile remouetur. Tentanda
 igitur curatio est. Æquale sanè adju-
 torium ut pote magno affectui mag-
 num remedium missio sanguinis est;
 nisi quis plusquam conueniat, mit-
 tendo delinquat. Modum autem con-
 jectare difficile est. Nam si paulò plus
 detraxeris, hominem planè strangu-
 lasti. Ad uitam enim tuendam his
 uel paucus sanguis efficacissimus est;
 cum sit uitæ corporisque alimentu to-
 mes. Si minus detraxeris, quam cau-
 sa postulat; nihil magni permagnum
 auxilium contuleris: adhuc enim cau-
 sa permanet. Sed praestat minus de-
 trahendo delinquere: nam si minus
 detractum esse uisum sit, aliqui uerò
 optimi successus apparuerint, iterum
 uenam rescindere congruens fuerit:
 scindenda autem est uena in concauo
 cubiti. Hæc enim in sinistro fluida
 est. Simul quoque in pusilla apople-
 xia & resolutæ partes considerandæ
 sunt, in sinistra, an in dextro latere
 resolutio sit: à salubribus enim par-
 tibus (ut dicere mos est) sanguinem
 haurire oportet. Hac enim sanguis
 facile delabitur: hac etiam à læsis par-
 tibus materia deriuatur. Igitur si
 absque euidenti causa attoniti red-
 dantur: sic de secunda uena ratioei-
 nandum est. At si ab ictu, aut de-
 lapsu, aut compressione in hanc la-
 bē inciderint, in aliud tempus res dif-
 ferenda est. Nonnullis uerò ad me-
 delam atque uitam id solum satis fuit.
 Cæterum si frigiditate multa, &
 torpore, & sensuum abolitione ho-
 minem occupante uena minimè
 scindenda uideatur: subluenda al-
 tius est: ut multitudo ab in-
 testinis extrahatur (plerunque enim

exuo-



ex voracitate & crapula in morbum talem prolabantur) utque humores, caput occupantes reuellantur. Sublutio planè acris esto, pituitam, bilemque subducens. Igitur nitrum solum ne habeto, sed etiam euphorbium trium obolorum pondere (qui eluendæ alio modo usitatus est:) & cucurbitæ agrestis interanea, aut centaurij comæ decoctum ex oleo, aut aqua. Optima quoque sublutio fuerit, melis consuetæ portioni ruta adjuncta, & cum unguine elixa, & terebinthi arboris resina. Et sal pro nitro, & hyssopi decoctum. Quod si per hæc subsidia paulum excitatus homo fuerit, aut febre correptus, aut sensum ab illo marcere suscipiens, aut arteriæ bono pulsu restituto, aut facie utcunque meliora significante; spes salutis concipienda est, audaciusque subueniendum. Interim igitur roboratis uiribus, purgatorij medicaminis, quod sacrum uocant, jejuno maxime quidem integra potio danda est: si uires prohibeant, dimidium cum mulla. Et æger in lectica supinus collocatus agitandus est, sensim eum, qui ferunt, gestantibus; frequenter uerò, quò lassitudo arceatur, interquiescat: ac si alius liquida sit, libens admittito: si uero secus, aquæ, aut mullæ cyathos duos potui dato. Sin autem & dum purgatur, nauſeabundus sit; id ne prohibeto. Nam & illa dissentio ad expergefaciendum uigorem quendam præstat, & pituitæ uomitus morbi causam euellit. Sensum uerò, & caput, & neruos repurgat sacrum quod uocatur medicamen-

ἰσὶ ἀδελθηφαγίης καὶ οἴνοφλο-
γίης ὡδραπλήγες γίγνονται.
ἢ εἰς τὴν ἀπίσασιν τῆς ἰνὸς κεφαλῆν
ἀμφοτερόντων χυμῶν. ἔσω δὲ κλύσ-
μα δριμύ, ἢ φλεγμάτων ἢ χολῆς
ἀγωγόν, ὡς μὴ νίτρον ἔχειν μένον,
ἀλλὰ ἢ εὐφόρβιον, ὅσον ὀλκῆς τριώ-
βολον, ἔστω δὲ ξύνηθες πλῆθος ἔκλυσ-
ματος. ἢ κολοκύνθιδος τὸ ἐπίδος. ἢ κεν-
ταυρίαι δὲ κόμης ἀφεψήματος εἰς ἔ-
λαιον, ἢ ὕδωρ. ἀρίστον δὲ κλύσμα ἢ τὸ
τριόνδε, * ἔξ μελίτος τῶ ξυνήθει πηγῶ-
νον ξύν τῶ λίπαι ἐψηθέν, ἢ θερμίνθε
ἔξ * δένδρεος τῆ ρητίνης, ἢ * ἀλῶν αἰπὶ
νίτρος, ἢ ὑσώπε ἐψηματος. ἢ ἦν ἐκ
τῆ δὲ μίξεσιν ἀνέγρη) ὁ ἀνθρώπος, ἢ
κινεόμυθος τῶσι πυρετῶσι, ἢ αἰδανό-
μυθος ἀπὸ τῆ ἀναμειψίης, ἢ εὐσφυξίη
γένοιτο, ἢ ὁκῶσιν ὁ πρὸς ὄσωπον εὐσημονῆ,
ἐνεληπν χεῖρ ἐμυδρῶν, ἢ δ' ἀρήγειν δι-
τλημότερον. κρατύναντα ἂν μεσηγυ-
τῶ δύναμιν, τῆ ἰερεῖς ἔκκαθαρταίς
διδόναμ ἡσεί, μάλισα μὲν τὸ παῖ τ
πόσιος. εἰ δὲ * κώλυμα ἢ δύναμις ἔοι,
ἔστω ἡμισυ σὺν μελικρητῶ, ἢ κινέειν
αὐτὴν ἐν διφρῶ ἐνθέντα ἀνάκλιτον,
* ἀπέμα μὲν αἰωρέντων τῶ φερόν-
των, διαναπαυόντα δὲ * ξυνεχές διὰ τὸ
ἀκοπον. κῆν μὲν ἢ γαστῆρ εὐρώως ὑπο-
φέρη, δὲ χεαδ. εἰ δὲ μὴ, ὕδωρ ἢ μελί-
κρητῶν πιπίσκιν, ὅσον κυάθους δύο. ἢ
δὲ ἢ ναυτή μὲν ἔλη δὲ τῶσι καθάρ-
σει, μὴ δὲ ποτέπειν. ἢ τε ἐνταῖς ἐς
ἐρηγορσιν ἔχει τὸ ζώπυρον, καὶ
ὁ τῶ φλεγμάτων ἐμετ. τῶ αἰ-
πὶ τῆς νοῦτου ἀγει. ἀμειψίης δὲ
καὶ κεφαλῆς, ἢ νεύρων καθαρτήρι-
ον, ἢ ἰερεῖ τὸ φάρμακον. ἀμφὶ μὲν
ῶν

* τὸ μέλιτος

† δένδρεο
ἀλῶν.

καὶ ἀνέμα

αἰωρέων

ξυνεχές



ων κενώσιος παντός τ' ὄν δ' ἐχρήσι,
 ἄλις. ὅλον δ' ἐχρη τὸν ἀνθρώπον ἐλί-
 οισι εἰλίξαντα, κατακωνεῖν λίπαι
 σικυωνίῳ, ἢ γλυκίνῳ παλαιῷ, ἢ εἰδει
 ἐκάσῳ, ἢ ξὺν πάντεσι συμμεμιγμέ-
 νοισι. ἀριστὸν ὃ κρημικρὸν ὀλίγηεν, ἐς
 πάχος τῷ ἀλλήφάτων. ποιεῖν ὃ κρη
 δυνατώτερην τήνδε. ἐμπάσεν ὃ κ' νί-
 τρε κ' πεπέρεος. ἐσω ὃ λεπία συδέν-
 τα * κρησέρη. μέγα ὃ ἐς δύναμιν τῷ
 * παρένιων κ' τ' κασόριον. κ' ἄλλαιμ-
 μα. ξὺν τινι λίπαι τῷ εἰρημύων. πολ-
 λὸν ὃ δυνατώτερον κ' πιπικὸν ξὺν με-
 λικρήτῳ. τ' ὃ πλῆθος, ὀκόσον ἐπὶ λη-
 θαρτικῶν ἰσμῶν. ξυντεκμαίρεται ὃ
 κ' τὴν ἠλικίην, κ' τὴν γνώμην ἔνοσέ-
 οντος, εἰ πᾶν ἐς πλεῦνας ἡμέρας ἔτι-
 μος. ἐστὶ ὃ κ' * χρίσματα κρέασονα τ'
 τ' ἐγξίος, εὐφοσέρατε κ' δυνατώτερα.
 ἔτε γ' ὡξίρεν ἐς τ' τῶν σρωμάτων
 αἰχῶν. ἀχρησον γ' τ' ἰσικάμνησι τ'
 τ' ἰόνδε, εἰ προσί(ε) τῷ σκήνι, ἐς τε τ'
 ξυλιακέντα ὑπὸ τ' ἀλῆς ἀνεπόθη.
 ἀλλὰ καὶ τ' * αἰδιον αὐτέων ὀνιζόν.
 ὡξίρεν γ' ἢ τ' ἐγξίς. ὕλη ὃ ἀλειφά-
 των μῶν, ὀκόσσα μοι λέλει). ξὺν αὐ-
 λείοισι ὃ κασόριον, ῥηπίνη τερμίνθα τε
 δένδρεος, * εὐφορβίς, λημνίσιδ, ὄ,
 πυρέθρα ἴσα, πεπέρεος, χαλδάνης ἐς
 ἡμῖσιν ξὺν νίτρω αἰγυπῆν τριπλάσι-
 ον, κρημ ὀκόσον ἐς σύσασιν ὑγρῶν.
 πολλὸν ὃ ἰσίων φαρμακίη ποικιλο-
 τέρη, κ' πλεόν κ' ἰδίη λέλει), ἐπιπλάσ-
 ματα τῆσι σκληρίοισι, κ' τῆσι ἐν τ' ἰσέ-
 σι τῶν μερέων, ἐπιθετέον. ὕλη ὃ, λίνη
 * ἄσπερμα, ἰήλις, ἀλφίθον κελθινον,
 μέλι, ἐλαμον, ἐνθα πήγανον, ἢ ἀνήθον
 ἐξέσθη, * ἀλθαίης ρίζα, καπέσσα,

De qualibet itaque ab initio adve-
 nistranda purgatione satis differui-
 mus. Totum uero hominem sanis
 inuolutum oleo sicyonio perfundere
 oportet, aut gleucino ueteri, aut sin-
 gulis seorsum, aut simul mixtis. Sed
 optimum fuerit ad conspissanda olea
 ceræ parum colliquare: atque ista
 nitri ac piperis mixtione ualentior red-
 denda est: sint uero tenuiter contri-
 ta & cribrata. At miram habet uim ad
 resolutos castoreum, & illitum cum
 aliquo ex antedictis oleis: sed longè
 potentius est, si cum mulsa potui de-
 tur, portio uero tanta sit, quantam in
 ueternosis nouimus. — Coniectare
 autem oportet & ætatem ægrotantis,
 & mentem, an pluribus diebus bibere
 sit paratus. Nempe inunctiones ir-
 rigationibus præstant, facilius ferun-
 tur, & magis proficiunt: neque enim
 dilabentes lectum & stragula inqu-
 nant. *Id uero laborantibus inutile est,
 si corpori inhæreat, inq, partibus colli-
 quatis, & à calore sorbeatur.* Quineti-
 am & ipsarum perpetuitas conduci-
 bilis est; nam irrigatio diffluit. Inun-
 ctionum autem materia est, quæcum-
 que à me supra dicta sunt: cum ipsis
 uero castoreum. Accipitur itaque
 resina terebinthi, arboris, euphorbi-
 um, limnestis, (hoc est, adarce) pyre-
 thrum æquis portionibus, piperis,
 galbani dimidium, nitri Ægyptij tri-
 plum, ceræ quantum ad liquida con-
 spissanda satis sit. Cæterum medi-
 camina multò magis, quam hæc, ua-
 ria, & multò plura seorsum loco, suo
 tradita sunt. Epiplasmata quoque du-
 ris dissentisque partibus superdan-
 da. Horum sylua est lini, semen,
 fænum græcum, farina hordei,
 mel, oleum, ubi ruta, aut anethum
 decocta sint: althææ radix pinifera,
 & in

* κρησέρη.
* παρένιων.

κρίσματα


εὐφορβίς

ἰήλις

αλφίθον

ἀσπερμα

ἀλθαίης



& in mulla usque ad ceræ mollitudinem decocta. Sunt uerò & tractabilia, & temperatura sua uia. Si quidem adhuc febre uacant, aut leuiter febricitant, posthabita caloris cura hæc facienda sunt. At si febres acutæ sunt, & reliquus morbus his leuior esse uidetur, febres uerò in discrimen adducunt: ad has & uisus rationem, & reliquam curationem conuertere oportet. Alimentis itaque summe tenuibus, & facilis concoctionis uelendum est, atque oportunitas nunc magis obseruanda. Et per totam curationem in exacerbationibus subtrahere, atque penitus in febres animam intendere oportet. Cum morbus autem diu trahitur, & caput in causa est: cucurbitula occipitio affigenda, & sanguis largiter hauriendus: plus enim quam uenæ sectio, proficit, & uires nequaquam labefaciat. Sed prius inter scapulas inanem cucurbitulam admoueas: ut in contrarium ejus, quæ in occipitio est, succos reuellat. Nempe interdum & gula resoluta est: in qua sola attonitis salutis præsidium collocatur, deuorandis scilicet alimentis & medicaminibus transmittendis. Neque enim inedia famisque tantummodo periculum instat, uerum etiam tussis, difficilis spirationis atque strangulatus. Nam si quis intra os liquidum cibum infundat, in arteriam subterlabitur, cum neque tonsillæ ad impulsam ciborum concidant, neque epiglottis in proprium locum subsidat, quæ arteriæ operculum à natura facta est. Quapropter opus est mullam, aut succum longa myssilla infundentem, supraque arteriam attollentem in gulam demittere: id quoque enim ad de-

κὴν μελικρήτων ἐψηθεῖσα, ὡς κηροδής* γενέσθαι. ἔσω δὲ εὐαφέα κὴ πρὸ σπινέα τῆ ξυσασί. ἢν μὲν ὦν* ἀπυροῦ ἔωσι ἔπι, ἢ σμικρὸν ἄπυρεταίνωσι, τὰ δὲ χεῖρ πρὸς ἄν, ἐκ ἀλεξιζουτα τῆς θέρμης. ἢν δὲ πυρετὶ ὀξέες ἔωσι, καὶ ἢ ἀλλήνησος σμικροτέρη τῷ δὲ φαίνηται. κὴ ἐς τὸν κίνδυνον οἱ δὲ ξυνεπείγωσι, πρὸς τὰς δὲ χεῖρ τὴν διαίταν κὴ τὴν ἄλλω θεραπείαν ἀρμόζουσα. τσοφῆσι τὲ ὦν τελείως λεπτοῖσι διπέπτοισι χεῖρα. κὴ τῆ εὐκαιρῆ πρὸς ἐκλείον νυμᾶλλον, κὴ τὰς παροξυσμοὺς ὑποσέλλουσα ἐς πᾶσαν ἰντείνω, κὴ τὸ ξυμπαν τῶσι πυρετῶσι πρὸς κέεσα χεῖρ. ἢν δὲ πρὸς πρὸς ὀξὴ χεῖρ ὦν, κὴ τὴν κεφαλὴν ἐν αἰτῆ ἰσχυρῆ σικύνη χεῖρ ἐς τὸ ἰνίον πρὸς βάλλουσα, ἀμάσσειν ἀφειδέως. κὴ γὰρ φλεβοτόμιος ὀνίνησι μᾶλλον, καὶ τὰς δυνάμιας ἐκ ἀφαιρέσει. πρὸς ἔρη δὲ μεσηγὺ τῶν* ὠμοπλατέων κερφῶν πηθεῖω ἐς αἰτίωσιν τὸ ἐν τῶ ἰνίῳ. παρελύθη καὶ κὴ κατὰ ποσῶσι, ἢ πρὸς κὴ δὲ πρὸς πηλοῖσι ἀλλὰ πρὸς ἐστὶ σωτηρίας, εἰς τὴν τὸ τσοφῆς κατὰ ποσῶν κὴ ἐς τὴν τῶ φαρμάκων παρρηθῶν. ἔγδ ἀπρὸς κὴ λιμῆ κίνδυνος μῆνον, ἀλλὰ κὴ βηχὸς κὴ δυσπνοίας, κὴ πνίξιος. κὴ γὰρ κὴ ἐγχεῖν τῆς εἰς τὸ σῶμα ὑγρὸν σιπίον, ἐς τὴν δερτρίω ὑπορρέει, ἔτε τῶ παειδμίων ξυμππλόντων ἐς τὸν ὠσμον τῶ σιπίων, ἔτε τὸ ἄπυρωπίδος ἐν ἰσχυρῆ ἐς τὴν ἔωυτῆς ἔσθην, ἢ πρὸς ἄπυρωπία τὸ δερτρίως πέφυκε. χεῖρ ὦν* μελικρήτων ἢ χυλὸν ἐγχεῖν αἰτα μυσίλη μακρῆ ὑπεραιρουτα ὑπὲρ τὸ δερτρίως ἐς τὸν σῶμα χον ἐγχεῖν. τὸ δὲ γδ ἐπὶ ἐς κατὰ ποσῶν

* ὡς
* γενέσθαι
* ἀπυροῦ

* ὠμοπλατέων
* κέρφω

* μελικρήτων



ἰάποσιν ὑπεργέει. εἰ δ' ἄνοσέων ἐς
 ὀλεθρον εἰνύσασθον, ὃ ἔστω αὐχμὴ σὺ τῆ
 ἀναπνοῇ πῆγνυ). τὸν δὲ τὸν αὐχένα,
 καὶ τὸν ἀνθερεῶνα θερμάσμασι χεῖν
 τὴ πυρίλι. μαλαιοπονοὶ ἔστω αἰθρι-
 ες, ὁκόσοι συκίλω ἐς τὸν ἀνθερεῶνα
 πωροβάλλασσι, ἐς εὐρύτητα ἔστω μα-
 χα. ἔστω δὲ διασάσιος χεῖρας ἐς ἐνθεσιν
 ἔστω τροφῆς. ἀλλὰ ξυμπῶσιος ἐς κα-
 ἰάποσιν. πωροδιασέλλει ἔστω σκῆ, κῆν
 καταπίνειν θέλη, ἔστω πῆγαι τῆ δόπος ἀσφ
 τὴ καὶ αἰθολκῆ. ἐπανιέναι δὲ χρῆ ἐς
 (τὴν) * πωροσολὴν τῆς καταποσιος.
 πρὸς ἔστω τῆσιν ἔστω τὴ δόπος αἰλω * πλη-
 ροῦ ἐς κίνδυνον ἀποπνίξιος. ἀλλ' ἔ-
 στω εἰ ἐνθα καὶ ἐνθα ἔστω βρογχεθεῖς, ἀ-
 ρῆγαι. μύες γὰρ καὶ νεῦρα, καὶ τένοντες, καὶ
 φλέβες ἔστω πρὸς ἐν ἑασι αὐτέες. κύ-
 σις ἔστω καὶ τὸ χαλαρὸν ἀγχα, ἀλλοτε
 μὴ ἐς ἐκκρῖσιν παρῆται, καὶ ἐστῶν
 πωροπῶν (ἐκ) αἰεὶ ἐόντα πλήρεια κύσις
 ἔστω καὶ ἐς ὄγκον μέγισον αἰερέ). ἀλλοτε
 ἔστω εἰς καθευξιν αὐτέων. διαρρέει γὰρ ἰά-
 πωροπῆα, ὡς δὲ ἀψύχων. ἐνθα ὦν ἐς
 μὴ τὴν κύσιν τῶ καθετῆει ὄργανω
 ἐκ εὐτολμον χρεῖσται. κίνδυνος γὰρ
 σφακελίξεν τῆ κύσει, ἢ ἔστω σπασμὸν
 διδόναι τῶ αἰθρώπῳ. ὑποκλύξεν ἔστω
 μὴ πολλῶ πληθῆι ἔστω χυλῆ, κρεῖσον.
 κῆν ἐκκοπῶσθῆ τὸ ἐν ἑργον, πωροσε-
 νιέναι ξυῶ ἐλαμῶ κασόροον. ἐλπίς δὲ
 μένη καὶ πάντων ὁμῆ τῶν παρῆτων,
 καὶ ἰδίῃ τῶν μερέων, ἢ εἰς ἐλαμον ἐνίξῆ-
 σις. ὃ δὲ τρέπος αὐτέες, ἐν τῆσιν χρο-
 νίοισι εἰρήσει).


* πωροπῶν ἀλ-
 λως ἐπιτολῆ
 * πωροπῶν.

ψ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟ-
 Ξυσμῆ ἑπληπικῶν.

glutendum inferuit. Verum enim-
 uerò si ægrotus, jam, morti proximus,
 sit, ipsius adeò cervix spiritusque con-
 gelascunt. Ideo cervicem & men-
 tum calefactorijs illinito & foueto.
 Frustra uerò laborant, atque imperiti
 illi sunt, quicunque sub mento cu-
 curbitulam, ut gula dilatetur, affigunt:
 quandoquidē non dilatatione ad im-
 positionem ciborum, sed ad deglu-
 tiendum compressione opus est, di-
 latat autem cucurbitula: & cum de-
 uorare uelis, prohibet reuellens ac
 retrahens: cum remittendum potius
 sit, quò in deuorando constrictione fieri
 possit. In super arteriam repleri, ut
 strangulatio fiat periculum est, ne-
 que etiam si hac, & illa in parte guttu-
 ris affixeris: quicquam prodest.
 Musculi nanque & nerui & tendones
 & uenæ ante ipsum positi sunt. Vesica
 utique, & laxum intestinum inter se
 proxima interdum ad excernendum
 debilitantur, resoluuntur, recremen-
 torumque semper plena reperiuntur.
 Vesica uerò & in maximam molem
 extumescit. Interdum autem ita re-
 soluuntur, ut purgamenta continere
 nequeant: per ipsa enim tanquam
 in anima superuacua delabuntur.
 Tunc igitur instrumentum, quod Ca-
 thetera uocant, in uesicam demittere
 haud sanè tutum est. Ne corrumpatur
 enim uesica, atque homo conuel-
 latur, discrimen impendet: sed præsti-
 terit cremore haud multo alium sub-
 luere: cumque steruus ab intestino
 eiectum fuerit, iterum iniiciendum
 est cum oleo castoreum. Spes autem
 unica omnium pariter resolutorum,
 separatimque singularum partium eo
 uitio laborantium in oleum infessio
 fuerit. Quomodo uerò ipsa admini-
 stretur, in sermone de diuturnis mor-
 bis exponetur.

DE COMITIALIS AC-
 celsionis curatione.



Caput V.

Κεφάλ. ε.

Comitialis morbi primus casus perniciosus est, si acutè morbus inuadit; nonnunquam enim, & uno die hominem perdit. Periculosa etiā sunt per circuitus exacerbationes. Unde factum est, ut in acutorum numerum comitialis morbus poneretur. Quod si malo assuescat homo, & morbus tenaciter adhærens occupet; non solum diuturnus, uerum etiam nonnullis perpetuus efficitur. Nam si ætatis, florem uigoremque excedit, conualescit cum ægro, commoriturque. Quotquot igitur medicamina ut diuturno morbo conueniunt, in sermone de diuturnis comprehenduntur. Quotquot autem ad mortis celeritatem euitandam faciendā sunt; horum plura in sermone de attonitis tradidimus, uenæ sectiones, alui sublutiones, inunctiones, cucurbitulas. Hæc enim ut homo expurgatur, ualentissimè efficiunt. Quotquot autem prolapsui peculiaris adiutoria inueniuntur, ea in præsentia docebimus. Pueris itaque, quibus ex corruptione, aut ex uehementi refrigeratione inusitata hæc labes incessit; uomitus aut cibi, aut pituitæ, aut aliorum quorundam succorum prædesse consuevit. Pennæ autem irino unguento delibutæ nauisam excitant. Veruntamen & irino non usque ad conuulsiones tonsillæ sunt illinendæ. Comprimere quoque clementer, illa opus est, puerum in uentrem suspensum conuertendo: hæc enim figura ad uomitum habilitissima est. At si uellatur, aut distorqueatur inferior maxilla, aut manus & crura jaudentur, aut una cum toto corpore oculi distendantur; manibus per uentris tractando demulcere conuenit: obtorti oculi dirigendi sunt, & rectæ partes ne

Τῆς Ἀπληψίης ὀλεθρὴν μὲν ἢ πρῶτῃ καταπίωσις, καὶ ὀξέως εἰς βάλανη ἢ νεσός. ἐκλενε γὰρ κόλε καὶ ἡμέρη μὴ κινδυνώδεις ἢ καὶ οἱ ἐν τῇσι περιόδοισι παροξυσμοί. διὰ τὰ δὲ μὲν ὦν καὶ ἐν τοῖσι ὀξέσι καταγέγραπται ἡ Ἀπληψία, ἢν ὅς μελέτην μὲν ἢ κητὴ κακῶ ὠνδρωπος, ἢ ὅ νεσός ἀπὸ ἐξέμεψυσα ἐχθῆ, ἐχρονίη μὲν γίγνεται, ἀλλὰ μετεξέτεροισι αἰωνίη. καὶ γὰρ ὑπερβάλλη τὴν ἀκμὴν τῆς ἡλικίης, ξυγγηρὰ τὴ καὶ ξυκαποθνήσκει. ὁκόσα μὲν ὦν ὡς χρονίη ἐστὶν ἰητήρια, ἐν τοῖσι χρονίοισι λελέξετο. ὁκόσα ὅς τὸ τάχος ἔσθληθρῶς πηκίεα, τῶν δὲ τὰ πλεῦνα μὲν ἐπὶ τοῖσι διαπληκτικοῖσι λέλεκται, φλεβοτμὴν, κλύσματα, χρεῖσιες, συκίη. τὰ δὲ γὰρ ἐς ἀνέγερσιν δυνατά τὰ ὁκόσα ὅς ἰδία καταπίωσι θάλασσα, τὰ δὲ νεῦ φράσω. παιδίοισι μὲν ὦν οἱσὶ ἐκ διαφθορῆς, ἢ ἐκ ψύξιος ἰσχυρῆς, ἀξύνθητες τὸ πάθος, ἐμετός ἢ σιπίων, ἢ φλέγματός, ἢ ἄλλοι χυμῶ πνός, ὄνησόν. πύλα δὲ ἰεῖνω μύρω δαθέντα, ναυτὴν ἐρεθίζεν. ἀτὰρ καὶ τὸ ἰεῖνον ἐκ ἀχρῖσασμῶν εἰς τὴν τῶν παριδμῶν χρεῖσιν. ξυμπέζειν ὅ τὴν λαγόναν πηκίως ἔπι γαστέρα *ἐκρεμῆς* *προσβάλλουσα τὸ παιδίον. τὸ δὲ γὰρ τὸ χῆμα πρὸς ἐμετόν ῥήισον. ἢν ὅ καὶ σάταται ἢ διασρέφεται τὴν κάτω γνάθον, ἢ τῶ χεῖρε καὶ τὰ σκέλεα ῥίπῃ, καὶ ξυὸ παντὶ τεινῆται οἱ ὦψ, *ψηλαφίη. ξυὸ λίπαι μαλθάσεν ἀπιθύνειν τὸ ὦψος τὰ διασροφα. πηκίως ὅ διακρατέειν, ὡς μὴ

*ἐκρεμῆς.
† προσβάλλουσα.

* γαφορηλαφίη ἴσως γαφορηλαφίη.

Ο διασρέ-



διασρέφεται τῷ ἥθεα. τῷ ψυχρῶ πυ-
 ριλῶ ἐρείοισι παλαμοῖσι πναροῖσι τρυ-
 χεσι, διαχρίεν τὴν ἐδρῆν μέλιτι
 ξυῶ πηγανίνῳ ἐλαίῳ. ἢ ξυῶ νίτροῳ.
 ἢ ῥητίνῃ ὑγρῇ ξυῶ τῖσδε, καὶ διωθεῖν
 πρηέως ἔσω τῆς ἐδρῆς. τὰ δὲ γὰρ φουσέων
 ἀγωγά. φύσας ἢ διεξίσι τῆς δετῆ
 νύσας παῖδες. καὶ δὲ καταπίνειν δύ-
 νων, διδόναι τῷδε τῷ φαρμάκου,
 καρδαμώμῃ μέρους ἓν. χαλκοῦ
 * κερ. α. τὰ δὲ ξυῶ μελικρήτῳ πι-
 πίσκην. ἢ γὰρ ἔξήμεσαν ξυῶ τῖσι ἐν
 τῷ σωμαχῷ * πίζουσι, ἢ ὑψηλάθη
 ἢ γαστῆρ. ἀείσον ἢ ἐκλύμα καὶ τῷδε,
 ἔκκαρδαμώμῃ, καὶ σινίπῳ, καὶ ὑσώ-
 πῃ τῆς κόμης ἴσα, ἰριδος τῆς ρίζης μέ-
 ρους α, ξυῶ νίτρος διπλασίῳ, πεπέ-
 ρους ἔς * τρίτην, μέλιτι φουράσαντα
 ὅμῃ τὰ πάντα, διασρέσαντα τῷ γε-
 νύῳ ἐς τὸ σῶμα ἐγχέειν, ἀτὰρ καὶ ἐπι-
 προσωτέρῳ τῷ παριωμίων, ὅπως
 καταπίοιεν. τὰ δὲ μὲν ὄν, παιδοῖσι.
 τῖσι ἢ νεανίῃσι, καὶ τὰ δὲ ξυῶ φουρα.
 ἀτὰρ καὶ φάρμακα δυνατώτερα ἐς
 ἐμετον αἰρέεωδῃ, ναρκίος βολβός, σι-
 νίπος καὶ ὑσώπῃ ἴσα, καὶ χαλκῷ καὶ
 πεπέρεος, μοίρης τῷ προστέρων ἐς
 ἡμισυ, σὺν μέλιτι φουράσαντα δι-
 δόναι. τὰ δὲ μὲν ὄν ἐς ἀνέγερσιν ἔ-
 παροξυσμῶν. τὰ ἢ ἐς λύσιν τῆ νοσή-
 ματος, ἐν τοῖσι χρονίοισι λελέξεται.

Θ Ε Ρ Α Π Η Ε Ι Α Τ Ε
 τάνου.

Κεφάλ. 5.


Νυν μάλα χρῆ κοίτῃ μαλα-
 κῇ, ἐναφέα λείην, προσπνέα, θερμῶ

torqueantur, suaviter continendæ:
 frigida membra lanis antiquis sof-
 didis, attritisque panniculis fouen-
 da; sedem præterea melle cum ruta,
 ceo oleo inungito, aut cum nitro, aut
 resina liquida cum his mixta: hæc
 quoque leniter intra anum intrudi-
 to. Flatus enim prolucunt: flatuum
 autem excretio hujusce morbi in pue-
 ris medela est. Porro si deglutire
 ualeant; pharmacum istud exhiben-
 dū est, cardamomi pars una, æris cōbu-
 sti filiqua una. hæc ex mulla propina-
 to, aut enim euomunt unā cum humo-
 ribus uentriculum infestantibus, aut
 aluus subducitur. Optimū quoque est
 hujusmodi linctuarium, cardamomi,
 sinapis, hyssopi comæ par modus, iri-
 dis radicis pars cum nitri duplo, pipe-
 ris tertia pars: omnia cum melle per-
 misceto, & maxillam diducens in os
 infundito: interius etiam, quā ubi
 sunt tonsillæ, quo deglutire ualeant,
 iniicito. Hæc adeo pueris expedi-
 unt. Iuuenibus autem & hæc qui-
 dem profunt, uerū etiam potentio-
 ra his medicamina ad uomitum deli-
 genda sunt, ut narcissi bulbi, sinapis,
 & hyssopi pares partes, æris & piperis
 dimidio minus, quā priora, cum
 melle miscens exhibe. Hæc profecto
 ad leuandam exacerbationem abun-
 dē fuerint: quæ uerò ad propulsan-
 dum morbum facient, in sermone de
 diuturnis morbis persequemur.

D E C V R A T I O N E
 Rigoris, quem Tetanum
 uocant.

Caput VI.

IN præsentia lectum mollem, tracta-
 bilem, læuem, suauem, calidumque
 esse



esse necesse est: neruos enim inflexi-
 les, duros, rigentesque morbus efficit.
 Quin etiam cutis tota squallens
 aspera que corpori obtenta est: pal-
 pebræ natura uersatiles uix oculos
 conuiuendo protegent: oculi in-
 tenti sunt, in profundo conuoluti:
 nec non & artus sunt deligati, ob di-
 lentionem immobiles. Ægroti do-
 micilium calidum esto, si æstas sit, ci-
 tra sudorem, aut resolutionem: ad
 syncopam enim morbus inclinat.
 Neque uerò ad alia magna remedia
 cunctanter accedendum: haud enim
 differendi datur occasio. Quapro-
 pter siue ob refrigerationem absque
 manifesta causa rigor inuaserit, siue
 ex uulnere, siue ex abortu mulieri in-
 cesserit; uenam in cubito rescindito:
 curans in deligando brachio laxio-
 rem compressionem fieri, sectionem-
 que leniter & facile expediri: siqui-
 dem ista neruorum conuulsiones
 cient. Semel etiam cruor citra defe-
 ctum animæ frigusque extremorum
 mediocriter effundatur. Neque inedia
 æger maceretur: res enim frigida sic-
 caque fames est. Propinetur itaque
 mulla spissa meracior, & ptisanæ
 cremor cum melle. Ista nanque &
 tonsillis comprimendo minimum
 dolorem inferunt, & gulæ deglutien-
 do lenia sunt & facilia, & ad mollien-
 dam aluum mollissima, & ad uires
 instaurandas ualentissima. Omne cor-
 pus lanis inuoluito oleo gleucino,
 aut crocino madentibus, in quibus
 aut rosmarinus, aut conyza, aut arte-
 misia incocta sit: atque omnia & fa-
 cultate & ad tactum calida sunt.
 Oblinere autem corpus unguine con-
 uenit, quod ex limnæside (quam ad-
 arcem esse putamus) quod in
 stagnis nascitur, & euphorbio,

ἐμμύρα, ἀπηνέα γὰρ καὶ σκληρά, καὶ
 πταινόμυρα τὰ νεῦρα ὑπὸ τῆς νεύσε
 γίνετ). ἀτὰρ καὶ τὸ δέριμα παῖν καρ-
 φαλέον ἢ περὶ χυτὸν (ἐπιπέτα), τὰ περι-
 στεύτροχα βλέφαρα μόνις τῖσι ὀφ-
 θαλμοῖσι ἐπιμύει. ὀφθαλμοὶ δ' ἀτε-
 νέες ἐνδεδινημένοι. ἀτὰρ ἢ τὰ ἀεθρα
 ξυνδέδετ) ἐκινεύμυρα τῆς αἵσε. ἔσω δ'
 ἢ ὁ οἶκος ἀλεινός. κῆν θέρεος ἢ, μὴ
 μέχει ἰδρώτων ἢ ἐκλύσιος. ἐς συγκο-
 πὴν γὰρ ἢ νεύσος ῥέπει. χεὶ δ' ἢ μὴ δ' ἐς τὰ
 ἀλλὰ τὰ μεγάλα ἀκεα μέλλειν. οὐ
 γὰρ καρὸς ἀμβολῆς. εἴτε ὦν διὰ ψύ-
 ξιν, ἀνθ' φανερῆς πρὸ φάσιος γένοιτο
 ῥέτανος, εἴτε ἐπὶ τρώματι, εἴτε ἐπ' ἀμ-
 βλώσει * γυναικός, φλέβα τὴν ἐπ'
 ἀγκῶν τῶν κινεῖν. περιμυθούμυρον ἢ
 τὴν πύσιν ἔβραχίονος ἐν τῇ ἐπιπέ-
 σει, ὡς ἐς ἀνεσιν ἔχοι, ἢ τὴν τμην, ὡς
 εὐαφέως ἢ ῥηιδίως γένοιτο. τὰ δ' ἐγὼ
 πασσάμων πρὸ κλήσιος. ἢ ἐς ἀπαξ ἀ-
 φαιρέειν εὐμέτρως, μὴ μέχει λειπο-
 θυμίας ἢ περιψύξιος. μὴ δ' ἐπ' αἰσι-
 τῆς ἐπ. ψυχρὸν ἢ ξηρὸν λιμός. δι-
 δόνα ὦν μελικρήτῃ παχέος ἀρη-
 τες ἔρε, ἢ πύσιν χυλῆς ξυτὸν μέλι-
 π. τὰ δ' ἢ γὰρ ἢ παρὰ μίσοις ἐς * ἐκθλι-
 ψιν ἀπονώτατα ἢ σομάχῳ ἐς κατὰ-
 ποσιν λεία ἢ ῥήσις, ἢ ἐς μάλθαξιν
 κοιλίης μαλακώτατα, ἢ ἐς δύναμιν
 δυνατώτατα. τὸ δ' ἐξ ὑμπεαν σκῆν
 ἐρείοις κατελίχθω δεδιδυμφοῖσι
 ἐλαίῳ γλυκίνῳ, ἢ κροκίνῳ, ἐν οἷς ἢ
 λιθανωπῆς, ἢ κόνυζα, ἢ δ' ἄρτεμισίη ἐνή-
 ψηται. καὶ τὰ πάντα θερμὰ ἐς δύ-
 ναμιν καὶ ἐς θίξιν ἔσω. χεῖεν δ' ἐπὶ
 διὰ τῆς λημνίσιδος, καὶ εὐφορβίης,



καὶ νίτρο, καὶ πυρέθρου αλείμματι.
 πωροβάλλειν δεῖ τοῖς δὲ Σκασοεῖς
 συχνόν. εὖ δὲ καὶ τὸν τένοντα ξυλλαμ-
 βάνειν τοῖσι ἐρείοισι, καὶ χρεῖν καὶ τὰ παρ-
 οῦς καὶ ἀνθερωῶνα. ταῖς δὲ γὰρ μάλισα
 πιάχει τὸ δεινὰ καὶ τείνει. περιωῶ δὲ
 * κούφης φερμάσμασι τένοντα, καὶ
 κύστιν, μαρσίποισ ἔχουσι κέγχρον πε-
 φωγμύρω, ἢ κύσει βοῶν ἐλαίου
 φερμῆ ἡμιπληρεῖσι, ὡς εἰς πλάτθ
 ἔπι κένηται τῷ περιωμύρων χωρί-
 ων. ἐβήσατό κοτε ἀνάγκη περιῆσαι
 κεφαλῶν, ἐκ ἀσφαλῆς μὲν αἰδή-
 σεσι, νύκτοισι δὲ ἀγαθόν. ταῖς δὲ μὲν
 γὰρ ὁμίχλης ἐπαναφορῶν ἀνίσι
 ἀτμῶν. πῆμψησι δεῖ τὰ νεῦρα. καὶ
 οὐδὲ τὸ τρέπω τε τὸ περιῆς ὡς ἀσ-
 φαλεσάτω χρεῖται, καὶ ὕλη μὴ σφό-
 δρα βαρυόμω μῆ. ἀλλὰ ὕλη μὲν
 ἔσω ἔλαμον τὸ ἐν κύσει ἀκνισον, ἐν
 διπλῶ ἀγγεῖω ἐψηθεν, ἢ ἄλλες λεπτοὶ
 ἐν τῷ μαρσίπῳ. κέγχρος γὰρ καὶ λίνου
 σπέρμα ἑναφέα μὲν, ἀτμώδεα δεῖ
 καὶ βαρυόμω. τρέπος δὲ περιῆς. ἕπο-
 τετάδω δὲ τοῖς τένεσι ἕπο τοῖσι τὰ
 περιάματα ἀρεῖ τὸ κορυφῆς. πωρο-
 σωῖερω δὲ ἔπι τὸ βρέγμα μὴ προβαί-
 νειν. τὸ δὲ γὰρ τὸ χωρίον, ἀπάσης μὲν τὸ
 αἰδήσιος ἐστὶ κοινόν, καὶ διὰ τῆς δεπῆ-
 σαι αἰ ἀφέσιες ὡφελίης τὸ καὶ βλά-
 ψιος. καὶ δὲ καὶ ἔπι πλάσσειν δεῖ τοὺς
 τένοντα, ὀρθιον ἔσω τὸ ἰνίον. ἀνωτέρω
 γὰρ εἰθείης, τῷ κεφαλὴν πῆσος ἀτ-
 μῶν ἔλινε ἔσπέρματι καὶ τὸ τή-
 λεως. ἔπι δὲ τοῖσι ἔπι πλάσμασι ἀ-
 γαθόν ἢ συκίη ἐς τὸ ἰνίον τῆς ῥάχι
 ἐκατέρωθεν. ἔσω δὲ φειδῶ πολλὴ τῆς

& nitro, & pyrethro conflatum est.
 His uerò & multum castorei adijcia-
 tur. Bene quoque fuerit tendones
 lanis contegere, & secundum aurem
 & mentum loca perungere. Nam par-
 tes hæ maximè patiuntur ac disten-
 duntur. Præterea leuibus calefactorijs
 fouendi sunt tendones & uescica per
 sacculos milium torrefactum inclu-
 dentes, aut bubulas uescicas olei ca-
 lidi semiplenas: quò locis, quæ fo-
 uentur, secundum latitudinem ap-
 plicari ualeant. Interdum coegit ne-
 cessitas, ut capiti fomenta adhiben-
 tur: quod neque sensibus usque
 adeò tutum est, neque nervis salutare.
 Sensibus enim quandam caliginem
offundit multis halitibus ipsos peten-
 tibus: nervos autem replet. Quo-
 circa modo fouendi quam tutissimo
utendum est, atque materia haud ita
 multum fædè olens deligenda. Vti-
 que materia esto. oleum in uescicis in
 duplici uase, citra nidorem ferue-
 factum: aut sales tenues in sacculo.
 Milium enim ac lini semen tactu
 quidem lenia sunt, sed halituosa &
 graueolentia. Ratio uerò fouendi
 huiusmodi esto. Tendonibus re-
 supinatò ægro fomenta usque ad
 uerticem subijcienda sunt. Vltèrius
 uerò ad synciput ne procedito. Ille
 nanque locus omnibus sensibus
 communis est: ab ipsoque, tanquam
 ex fonte omnia adjumenta, omnes
 noxæ scaturiunt. Quod si epiplasma
 tendonibus superdanda sunt, cre-
 scum occipitium esto: nam si magis
 sursum uersus imposueris, caput ex-
 halationibus complebis. Materia
 sit autem epiplasmatum lini &
 fæmnigræci semina. Post epi-
 plasmata uerò utilis fuerit cucurbi-
 tula occipitio ab utroque spinæ late-
 re adhibita. Sed parcè admodum

flamma



flamma accendatur : nam quæ ab
labris cucurbitulæ fit circumpressio,
doloris conuulsionisque autor esse
folet. Igitur diutius trahere præstat,
ac molliter magis, quam plurimum
breui tempore. Sic enim tibi in
conuexum locus sine dolore attolle-
tur, qui concidendus est. Scopus au-
tem modi sanguinis extrahendi tibi
uires ægrotantis proponantur. Hæ-
utique rigoribus, qui sine ulceribus
fiunt, remedia conueniunt. At si ex
uulnere conuulsio facta sit; pernicio-
sum profecto id est, ægreque de salute
sperari potest : nihilominus tamen
opem ferre decet : quandoquidem
nonnulli & adhibitis remedijs mor-
tem euitarunt. Oportet sanè ultra
cæteram medelam & ulceribus con-
sulere cum calefacientibus, quæ-
cunque à me iam dicta sunt, irrigan-
do, & fotibus & cataplasmatibus & me-
dicamentis, quæcunque & facile ca-
lorem excitent, & humectando pus
abundè moueant. Ulcera enim in
rigore sicca & squallida sunt. Acci-
pito ergo thuris mannam, polij co-
mam, terebinthi pini que arborum re-
sinam, althææ radicem, & rutam co-
nyzamque herbam : hæc in cata-
plasmatis commiscere opus est, alia
liquando, alia, quæ puluerea sunt, in-
spargendo, alia in oleo prius mace-
rando. Althæam uerò in mulla ante
contusam decoquito. Inspergendum
est etiam ulceri castoreum : neque exi-
guus inde in totum corpus calor ema-
nabit. Horrores enim ab ulceribus
prodeuntes malefici sunt. Perungen-
dæ quoque sunt nares castoreo cum
crocinio unguento permixto : quin
etiam castoreum trium obolorum
pondere assidue bibere expediet. Ve-
rum si ab hac potione gula laboret :
interijcienda est laserpitij radi-
cis exhibitio . ponderis tantum

φλογός. ὀδυνηρόν γδ κὺ πασμάδες
τῆς χιλιών τ' συκίης ἢ ἀμφίθλασις.
χρῆ ὠν ἐς δὴρὸν * ἔλκειν, κὺ μαλθα-
κῶς μάλλον, ἢ ἀδρόον ἐν ὀλίγῳ χρό-
νῳ. ὡδὲ γδ ἀν' σοι κυβηθεῖν τ' χρω-
ὸν ἀπόνως, ὅπερ ἐπιτάμνειν χρῆ. τέκ-
μαρ δ' ἐσοι τ' αἰμάξιός τ' συμμετρί-
ης ἢ δύναμις γινέσθω. τὰ δὲ μὲν ὠν
τῆς ἀνδρὸς ἐλκείων τεταίνων τὰ ἀκεα.
ὡδὲ ἐπιπεώματι πασμάδος γένη),
ὀλέθριον μὲν κὺ δυσέλπιστον. ἀρήγην
ἢ χρῆ * μετεξέτερον γδ κὺ ἐκ τριῶν
δ' ἐσώθησαν. χρῆ ὠν πρὸς τῆ ἀλλή-
λησίν, κὺ τὰ ἐλκεα ἰῆσθ. τέγγει θερ-
μαίνοντων ἀόσα μοι λέλεκται, καὶ
πυρεῖν κὺ ἐπιπλάσμασι, φαρμάκοι-
σίτε ὀκόσα ρηίδως θερμαίνει τε κὺ
πολλὸν τέγγει * πύον. ξηρὰ γδ ἐπι-
τεταίνω τὰ ἐλκεα. ἐσω ὠν λιβανωτῆ
τ' μανίνης, κὺ πολίου τ' κόμης κὺ * ρη-
πίνης ἀπὸ τερμίνθης, κὺ πίτυος τῆς δέν-
δρέων, κὺ ἀλθαίης ρίζης, κὺ πηγάνης,
κὺ κονύζης τ' βοτάνης. τὰ δὲ χρῆ συμ-
μίσγειν τῆς ἐπιπλάσμασι, τὰ μὲν
τήκοντα, τὰ δ' * ἐμπάσοντα, τὰ δ' ξυῶ
ἐλαίῳ πρὸς λεανίνοντα. ἐν μελικρητῶ
ἢ τῆς ἀλθαίης κεκομμένην πρὸς
εὐαῖν. ἐπιπάσειν ἢ τὰ ἐλκεί κὺ τὰ
κασορέα. ἢ μικρὴ ἢ ἔνθεν ἀλέη ὀλω
τὰ σιλύει, ὅτι καὶ τὰ ρίγεα τὰ ἀπὸ
τῆς ἐλκείων κακοῦθεα. ἐγγείειν δὲ
τὰς ρίνας τοῦ κασορέου ξυῶ κρο-
κίνῳ λίπαι, ἀλλὰ καὶ πιπίσκειν
τοῦδε ξυωχέως ὀκόσον ὀλ-
κῆς πελώβολον. ὡδὲ πρὸς τὰ δὲ
ἀπαυδρήση ὁ σόμαχος, μεσηγυ
σιλφίς ρίζης διδόναι τῆς ὀλκῆς τ'



ἴσον τῷ κασορίῳ, ἢ σμύρνης τῆς σιλ-
φίου ἡμισυ. ἅπαντα δὲ ξυῶ μελι-
κρήτῳ πιπίσκειν. εἰ δὲ διπορεῖν ὁποῦ
ἔσσιλφίε τῆ δ' ὀπὸ τῆ * κυρκόης γένοι-
το, τόνουε κρή μελίτι ἐφθῶ ἐνειλί-
ξαντα ὀκόσον ὀρόβου μέγεθος κατα-
πιεῖν διδόναι. ἀρεσον γὰρ ὡς εἶπε, ὡς τὴν
ὑπερώϊον λάθοι ὡς ἀλάξας. δρι-
μύς γὰρ, καὶ τὴν ἐρυγὴν ἀπηνῆς καὶ
κάκοδος ἐὼν. καὶ ὅμη δύνηται ὡς εἶ-
καταπιεῖν, μελικρήτῳ λύσαντα διδό-
ναι. ἀπαιτῶν γὰρ τῶν καταποτῶν ὀυ-
νατώτερον, ὀκόσον ἀπέφυκε ἀλεαίνειν
τὴν καὶ ὑγραίνειν, καὶ ἀνιέναι τῆ * τάσιος,
καὶ μαλθασεν νεῦρα. καὶ ὅμη δὲν
καταπίνωσι, ἐστὶν ἐδρὴν ἐγχεῖν ξυῶ
ἐλαίῳ ἔκασορίε. τῷ δὲ καὶ κρή τὴν
ἐδρὴν ξυῶ λύπαι ἢ μελίτι. τῷ δὲ καὶ
τὴν κύστιν τέγγειν ὅμη καὶ κρή ἐσπά-
χος ξυῶ κρηῶ τίξαντα. καὶ ὅμη καὶ φύ-
σας καὶ κόπρον ἀγειν κρηῶς ἢ, τῆ ἱερῆς
ἔκκαθαρτεῖς ὀλκῆς δύο ξυῶ μελι-
κρήτῳ καὶ ἐλαίῳ ἐνειναι. ξυῶ γὰρ τῷ
ἀγειν τὰ δε, ἐπὶ τὸ ἐντερον καὶ τὴν
κάτω κοιλίῳ ἐμπυρεῖν ποικίλον γὰρ
καὶ θερμὸν φάρμακον, ἱερῆ.

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Υ.

νάγχης,

Κεφάλ. ζ.

Δοικαὶ συνάγχης ἑασιδέαι. ἢ μὲν
συνθερμασίη καὶ μεγάλη πρησφτῶν
παροσμίῳν, καὶ ἐξογκῶσι ἐξω. ἀτὰρ
καὶ ἡ γλῶσσα καὶ ὁ γαργαρεῶν, καὶ
πάντα τὰ τῆδε μέρεα, ἐς ὄγκον ἀεί-
ρεῖ. ἢ ὅμη ἐτέρη, ξυμπρωσίς ἐστὶ τρετέων,
ἢ ὅμη ἐς τὸ ἐσωπίεσις, ξυῶ ἀγχόνη

quanti & castoreum dandum esse
diximus; aut myrrhæ dimidio minus,
quàm laserpitium. Sed omnia cum
mulla potanda præbeantur. Quod
si Cyrenæici Laserpitij lachrymæ co-
pia tibi fiat, hanc opus est melle co-
cto inuolutam ad erui magnitudinem
deuorandam dare. Ita enim opti-
mum factu est, quò palatum præter-
riens ægrotum lateat, acris est enim,
rursumque insuavis ac fædè olens
excitat. Si neque hac ratione de-
uotari possit, in mulla eliquata pro-
pinetur. Omnibus enim potioni-
bus, quæcunque calcfacere, hume-
ctare, distentionem laxare, & neruos
remollire aptæ sunt: hæc haud du-
bicè ualentior est. Cæterum si nihil
ægroti deglutiant, in anum castore-
um cum oleo dandum est: hoc etiam
anus cum unguine aut melle illincen-
dus: hoc item uescica irriganda, & cum
cera, ut crassius reddatur, perungen-
da. Sin autem flatum stercoisque
educendi tempus adsit; purgatorij,
quod Hieram, id est, Sacram uocant,
drachmas duas cum mulla, & oleo in
sedem *inijcitur*. Nam præterquam quòd
illa euocat; intestinum etiam & infe-
riorem uentrem calcfacit ac fouet.
Varium nanque & calidum medica-
mentum hiera est.

D E C V R A T I O N E

Anginæ,

Caput VII.

DUæ anginæ species reperiuntur,
Altera cum caliditate, & magna
tonsillarum inflatione, & extrorsum
uersus tumefactione: quin etiam
lingua, gurgulio, & omnes adjacen-
tes particulæ in tumorem efferuntur.
Altera istis locis collapsis, &
submissis efficitur: sed interius
compressio maiore strangulatu
discruci-



discruciat: ut interna inflammatio ad cor usque pertinere uideatur, Huic quam celerrimè occurrendum est, nam & hac ægroti celerrimè rapiuntur. Igitur si crapula, & ebrietas in causa sunt; eodem die inferius humorem injicito: isque duorum generum sit, alter usitatus, quò stercora educantur; alter ejusmodi, ut aliquas à tonsillis pectoreque humiditates euellere possit. Neque tamen in cæteris efficacior meraciorque esto: sed centaurij & hyssopi decocta infundenda sunt. Hæc enim & pituitam educere solent. Si tenuis autem uiscus præcesserit, scindere cubiti uenam expediet: & latior sectio, quò majore cum impetu, copiosiorque sanguis emanet, facienda est. Hujusmodi nanque profusio minimè quidem ad caliditatem mitigandam satis est: sed strangulatum soluere, & reliqua omnia diminuere ualet. Haud ignobile quoque adjumentum præstat, si ad animæ usque defectum ægrum perduxeris. Usque eò tamen, dum ne anima deficiat. Quandoquidem nonnulli secta uena ab animi deliquio uita excessere. Item uinculis supra talos & genua constringentes opitulabimur. Optima quoque sunt uincula supra brachialia uersus cubitos, & supra cubitos uersus humeros. At si deglutiendi uia expeditissima sit; elaterium & cum mulla, & cum sero lactis, quantum ad purgandum hominem satis sit, præbeat. Alijs enim purgatorijs elaterium in his ægrotis præstantius est. Conferunt etiam cneorum seu thymelæa, & sinapi: siquidem hæc ambo uentrem repurgant. In quibus uerò inflationes deuorationem impediūt, linguam ad palatum reflectes, ipsius uenas rescindito.

μέζονι.ώς δοκέειν τῷ φλέγμασι-
 λωέσω μέχρι τῆ κεφαλῆς ἐξηρεῖσθαι.
 τῆ δὲ χεῖρὶ μάλινα ὡκέως δρηγείν.
 τῆ δὲ γὰρ καὶ ὡκέως θνήσκουσι. καὶ μὲν
 ὦν ἀπὸ κραμπάλης, καὶ οἰνοφυλγίης
 ἔωσι, ὑποκλύζειν αὐτῆμαρ. ἀλλὰ
 καὶ διασοῖς κλύσμασι, τῶ μὲν ξυνηθεί
 ὡς ἄγειν κοπρώδεα. τῶ δὲ, ὡς ἀπο-
 σπᾶσθαι τῆ χυμῶν ἀπὸ τῆ πα-
 ραιδμίων τὴν θύρη καὶ ἔσαι ὦν ἀλ-
 λὰ μήτε ἀκρητες ἐρη, καὶ * κενταυρίαι
 καὶ ὑσώπις ἐψήματα. ταῦτα γὰρ (καὶ)
 φλεγμάτων ἀγωγὰ. καὶ ἡν δὲ ἀπὸ
 λεπτῆς διαίτης ἔωσι, τὰ μὲν φλέβα
 τῷ ἐπὶ ἀγκῶνι. μέζονα δὲ τῷ τμήν
 χάζειν, ὅπως ραϊζηδὸν ἢ δὲ ἀθρόον
 ῥῆν τῆ αἵμα. ὅδε γὰρ ὁ ῥόος, ἰκανὸς μὲν
 ὡς ἤκιστα θερμοασίλω πρηῖναι. δυνα-
 τὸς δὲ ἀγχνόειν λῦσαι, καὶ πάντα μει-
 ῶσαι. ἐκ ἀγενὲς δὲ καὶ μέχρι λεπτοθυ-
 μίης ἄγειν, μὴ μὲν τι λυποθυμείν.
 μετεξέτεροι γὰρ ξυὺ τῆ πληγῆ ἔξέ-
 θανον ἐπὶ τῆ λεπτοψυχίῃ, ἢ δεσμοῖ-
 σι σφυρῶν σφίγγοντες ὑπὲρ σφυ-
 ρῶν καὶ γέναια. αἰεσον δὲ καὶ ὑπὲρ
 καρπῶν ἐς πήχειας, καὶ ὑπὲρ πήχε-
 ας ἐς θραχίονα. καὶ δὲ καταπίνειν
 ῥήισον ἢ, * ἐλατήριον διδόναι ξυὺ
 μελικρήτω καὶ ὀρῶν γάλακτι * ὅ-
 κόσον αὐτὸ καθῆσαι ἰκανὸν * ἢ τὸν ἀν-
 θρωπον. * ἐλατήριον δὲ τοῖσδε τῶ
 ἄλλων καθαρτικῶν κρέασον. ξύμ-
 φορον δὲ καὶ κνέωρον καὶ ἀπυ. τῶ δὲ γὰρ
 ἀμφὸς κοιλίας καθαίρει. ἐπὶ δὲ
 τῶσι καὶ μὴ ἐνδίδωσι αἰψησίαι, πρὸς
 τὸν ἕρανδον ἀνακλάσασθαι, τὴν γλῶ-
 σσαν, τέμνειν τὰς ἐν αὐτῇ φλέβας.
 καὶ ἡν

κενταυρίαι

υπα

† ἰλαστικῶν

* ἢ
 * ἰλαστικῶν




κὴν δὲ βρώσῃς ἢ πολλὸν ῥυτὴν τὸ αἷμα, τῶν
 ἄλλων μάλλον αὐτὸν ὤνησε τέγγειες
 ἐπι τοῖσι φλεγμαινεσι, τὰ πρῶτα
 μὲν σύφρασαι, ὅπως ἐς παλίρροϊαν
 ἴωσιν αἰϋλαί. ἐπειτ' ὦν πιναρὰ ξυῦ
 ὑσώπω διδθέντα οἴνω ἢ ἀλείφατι
 ἰω δὲ τὸ ἐλάγιος τὸ ὄμφακθ. ἀτὰρ
 ἢ τὰ ἐπιπλάσματα ἰκελα τῆ τέγ-
 ξι, φοίνικες ἐν οἴνω διδθυμυροί,
 λείοι ξυῦ ῥόδοισι τοῖσι πετάλοισι. ὡς
 ἢ γλίχρον τὸ ἢ μαλακὸν ἢ τὸ ἐπι-
 πλάσμα, ἢ ἀλφίτον ἔσω. ἢ λίνου
 σπέρμα, ἢ μέλι, ἢ ἔλαμον, ἐς τὴν
 ἀπαντῶν μίξιν. ἰω δὲ ἐς πύησιν πρῶ-
 πηται, τοῖσι θερμοῖσι χρεέσθ, οἷς περ
 ἢ ἐπὶ τ' ἐτέρης συνάγωγης. τῆλις ὦν
 ἔσω τὸ ἀλφίτον καὶ μαίνα, ἢ ῥήτινη.
 τὰ πικτὰ, καὶ πολλὴ κόμη ἐμπα-
 σέσθω, ἢ * πυρὴν θερμὴν ἀσόγγου-
 σι δ' ἀφνης ἔκαρπε ἢ ὑσώπε * ἐ-
 ψήματι. ἐς δὲ ἐμπύησιν δυνατῶτα-
 τόν, πελιάδων ἢ κυνῶν κόπρον προ-
 σέπιπασεν λεπίω δὲ κρησέρης.
 διακλύσματα δὲ, μελικρήτον ξυῦ
 φακῆς, ἢ ὑσώπε ἐψήματι, ἢ ῥόδων,
 ἢ φοινίκων, ἢ ὄμβρα πάντων. ἐγχεῖν
 ἢ τὸ σῶμα πᾶν μέχρι τ' ἔσω φάρυγ-
 γθ, ἀπλοῖσι μὲν χυλῶ μύρων, ρο-
 ῶν ὑδατι λεανθέντων, ἢ φοινίκων ἐ-
 ψήματι. φαρμάκοισι δὲ, τῆ δὲ τῶν
 μύρων, ἢ ἢ τῆ ἑσασθ, ἢ χυλῶ ῥοός,
 ἢ τῆ δὲ τῶν χελιδονίων. ἢν δὲ ἔλκεα
 ἐχάρων ἔωσι, διακλύσματα ἰάδε ἢ
 ἀνακογχυλισμοί, ὑσώπε ἀφψη-
 ματι ἐν μελικρήτῳ, ἢ σῶων τῶν πό-
 νων ἐν ὑδατι, ἢ ἐπι τοῖσι δεῦ μυλος δι-
 θεῖς ἐν μελικρήτῳ, ἢ πλισάνης χυλῶ,

* πυρὴν ἀλ-
 λως πυρὴν θερ-
 μῶν.

* τὰ πύησι.

Quòd si promptè multusque sanguis
 defluat; inter alia remedia hoc ma-
 gis proderit. Irrigationes utique lo-
 cis inflammatis primum quidem ad-
 stringentes, quò retrorsum materiæ
 labantur, conueniunt. Quamobrem
 lanæ sordidæ cum œsypo uino madē-
 tes, aut oleo ex immaturis oliuis ex-
 presso accipiantur. Quin etiam ca-
 taplasmata irrigationibus similia sun-
 to, exempli causa, palmulæ uino ma-
 defactæ tunfæque cum rosarum fo-
 lijs. Quò sit autem uiscidum & mol-
 le cataplasma; etiam hordei farina
 admisceatur: aut lini semen, & mēl,
 & oleum: ut omnium mixtura fiat.
 Quòd si ad suppurationem ueniat;
 calida admouenda sunt: quibus &
 in altera anginx specie utendum est.
 Adesto igitur fænigræci farina, &
 manna, & resina, quæ liquari possunt,
 & polij coma inspergatur. Nec non
 & fomentum calidum adhibeatur
 spongijs in decocto lauri baccarum
 hyssopi que madentibus. Ad mouen-
 dum pus autem *efficacissimus* est co-
 lumbinus finus tenuiter per criseram,
 id est, lineum sacculum instar pulue-
 ris transmissus, ac super inspersus.
 Idem & caninus eodem modo præ-
 stat. Ex mulsa uerò cum lentis, aut
 hyssopi, aut rosarum, aut palmula-
 rum, aut simul omnium decocto col-
 lutiones fiant. Illinendum præterea
 totum os est usque ad intimas fauces
 simplicibus quidem, ut motorum, aut
 malorum punicorum aqua macerato-
 rum succo, aut palmularum deco-
 cto: compositis uerò medicamentis,
 ut Diamoro, quod uocant, aut eo,
 quod ex Besafa, id est, ruta syluestri, &
 succo rhoi componitur: aut Diacheli-
 donio, id est, ex herundinibus confe-
 cto medicamento. Sin ulcera crustosa
 sint, collutiones & gargarismi fiant ex
 hyssopi in mulsa, aut pinguium ficorū
 in aqua decocto: præter hæc amyli
 percolatum in mulsa, aut in ptisanæ
 tragiæ



tragiūc cremore. Siangina cum coincidentia, quæ erat altera species, occupet; ab interioribus extrorsum omnia euocanda sunt, & humores; & caliditas, & omnis caro, ut totum foras extumcat. Proinde calidæ irrigationes sunt cum ruta, & anetho, nitro insperfo. Et cum his superius memorata cataplasmata. Proficit etiam ceratum ex nitro & sinapiad calorem excitandum superdare: calor autem exterior huiusmodi uitium tollit, sed in collo tumor extuberrat. Tumor autem foras in sublimelatus à pulmonis inflammatione liberat, intus uerò abditus anginam patientibus perniciosum malum est. At quicumque strangulationem ab angina uerentes, quò laxius spiritus duceretur, arteriam secuerunt; non sanè experimento rem comprobasse uidentur. Quippe caliditas inflammationis maior ex uulnere efficitur, strangulatum adauget, tussimque commouet. Quin etiam, si alioqui periculum id euaserint; uulneris oræ in unum coalescere nequeunt: ambæ enim cartilagineæ, atque inter se in-glutinabiles sunt.

ἢ τράγου. Ἐπὶ δὲ τῆς μετὰ ξυμπλώσι συνάγχης, ἔσθθεν ἔξω ἀγειν πάντα, καὶ ὑγρὰ, καὶ φέριλλω, καὶ σάρακα πᾶσαν, ὡς ἔξογκέη ἔξω τὸ πᾶν. ἔσωσαν ὧν φερμαὶ αἰτέγγειες, ξυὸ πηγάνω καὶ ἀνήθω ἐμπασορμύες νίτρος, καὶ ἑπιπλάσματ᾽ αὐτῶν τετρίοσι τὰ πρὸθεν. ἀγαθὸν δὲ * κηρωτῆρ * σὺν νίτρο καὶ * σινήπει πθέναμ ἐς θερμασίω. θερμασίη δὲ ἢ ἐς τὰ ἔξω, τὰ τριάσειηται. ἀτὰρ ἡ δὲ ἔξογκέει ἐς τὸν αὐχένα. ὄγκος δὲ πειπνυμονίης ῥύε) ἐπαμωρεύμμος ἔξω. εἴσω δὲ τοῖσι συναγχικοῖσι ὀλέθριον κακόν. * ὀκόσοι δὲ ὑπὸ εὐλαβίης. τὸ ἑπὶ τῇ συνάγχης πινγὸς τὴν ἀσπείνην ἔταμον ἐς ἀναπνοήν, ἔμοι δοκέσαι πείρη τὸ πηήγμα πωσάσας. ἢ τε γὰρ θερμασίη τὸ φλεγμασίης μέζων ἐκ τῶν πώματος γίγνε), καὶ προσπιμωρέ τῇ πινγί, καὶ βήσσει. ἢν δὲ καὶ ἄλλως ἐκφύγωσι τὸν δὲ τὸν κίνδυνον, ἔξυνάγεται τῶν πώματ᾽ τὰ χεῖλα. ἀμφω γὰρ χονδρώδεα καὶ ἀξύμφυτα.

* κηρωτῆρ

* σινήπει

* ὀκόσοι

DE CVRATIONE Columellæ.

Caput VIII.

Vltiorum, quotquot columellam infestant, aliqua per succisionem curare necesse est: sed de eorum chirurgia disputare ad præsentem locum non attinet: Aliqua, ut pote acuta, medicamentis sananda sunt. Nam facillè strangulant, & difficultate spiritus aliqua istorum hominem perimunt. Talis est utique, quam Vuam, & quam Columnam dicimus: utraque enim cum inflammatione,

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ κατὰ τὴν κιονίδα παθῶν,

Κεφάλ. η.

Τῶν παθῶν ὀκόσα ἀμφὶ τὴν κιονίδα γίγνε), τὰ μὲν ὑποδάμνη χει, ἀλλ' ἔ τῶ παρεόντος λόγος ἢ τῆ δὲ χερεργίη. ἰαδ' εἰς ὅξέα ἰπῶς, ῥηιδίως γὰρ πίνγει, καὶ δυασνοίη πινά τετέων κτείνει. τριάσει μὲν τι ἐστὶ, καὶ καλέομμεν σαφύλλω τὲ καὶ κιονίδα. ἀμφω γὰρ ξυὸ φλεγμασίη καὶ * πάχει



* *πάχει και μήκει ξυνίσανται,*
 ως ἐς τὴν δερτρίω ἐκκρεμέα
 γίνεσθαι, ἴσω μὲν πάχει, ἀπὸ
 τῆς βάσιος μέσφι ἄκρα τῆ ἐρα-
 νῆ, ὀκίων. ἀνίσω δὲ, ἢ σαφυλή.
 τῆσδε γὰρ ἰσὴν μὲν ἢ ἀπὸ τῆ ἐρα-
 νῆ βάσις. ἐς δὲ τὸ ἄκρον σρογ-
 γύλη και παχεῖα, ξὺν ἐρυθ-
 μαπῆ πελιθνώσει. τῆδε καὶ σαφυ-
 λῶ Ἰπικλησιν ἐρχηκε τὸ πάθος.
 τῶσι ὠν χεῖ ὠκέως δρῆγειν. ὠκίς
 γὰρ ὁ ἀπὸ πνιγὸς ὀλεθρος. ἡ μὲν ὠν
 νενίαι οἱ πεπονθότες ἔωσι, τὰ μνην
 τὴν ἐπ' ἀγκῶνι φλέβα, ἢ δ' ἀθρόον
 κενούν * μέζονι τῆ τσιπῆ. ὡς γὰρ ἀπ'
 ἀγκῶνι ἀπέλυσε τὸ πνιγὸς ἢ τσιπῆδε
 ἀφάρεσις, ἡ δὲ ἰσοκλύζειν κλυσ-
 μῶ πηθεί, ἐπειτα δὲ δριμύει ἄλλοτε και
 ἄλλοτε, ἐστ' αὐτὴ ἐλύση πὶ αὐθθεν
 ἐς μετὰ σασιν. ὡς ἐκεῖ δὴ τσαν δὲ και
 δεσμοὶ σφίγγοντες ἄκροισι τῶσι
 σκέλεσι ὑπὲρ σφυρὰ και γούνατα
 και ὑπερθεν καρπῶν και πήχεων
 ἐς βραχίονας. εἰ δὲ πὶ ἢ πνιξ Ἰπ-
 απέρχοι, σικίλω Ἰπὶ τῆ ἰνίον, ἢ δὲ ἐς
 τὸν θώρηκα περιβάλλειν, και τρι-
 τῶν ὀκίτα μνην πνὰ, πηθῶσεν τε
 ἀπάντα ὀκόσα μοι ἐν τῆ συνάγῃ
 λέλεκται. αὐτὸς γὰρ ἀμφοῖν ὀλεθρος
 τῶσι. ἀλλὰ καὶ τῶσι ἐς τὸ σῶμα
 φαρμάκοισι τῶσι αὐτέοισι χεῖραδ,
 καὶ σύψεσι, καὶ μαλθακτείοισι, καὶ πν-
 εἰη τῆ ἐξωθεν, καὶ Ἰπὶ πλάσμασι, και
 ἐς τὸ σῶμα * ἐγχρίσμασι. ὡς δὲ
 τὸν κίονα ἢ τὴν σαφυλῶν ἐσω σύμ-
 μα, ῥοὸς χυλὸς, μέλι πῆ ἢ ὑδαπ

crassitie, longitudineque suboritur
 ita, ut in arteriam pendulæ fiant.
 Equabili sanè crassitudine à basi ad
 summum usque palatum columna.
 Inæquali verò uua constat. Huius
 enim ad palatum basis gracilis est, in
 extremo teres & crassa, rubens aut li-
 uida. Iccirco & uuxæ appellationem
 id uitium sortitum est. Quapropter
 his maturè opem ferre decet: celerrima
 nanque à strangulatu pernicies
 impendet. Proinde si ægroti iuuenes
 sunt, à uena cubiti sanguis detra-
 hendus est: utque largius euacuetur,
 maiore plaga uena aperiatur. Siqui-
 dem huiusmodi sanguinis detractio à
 strangulatu, tanquam à laqueo, ægro-
 tantem liberat. Subluenda quoque
 alius est mitiori lotione primùm: de-
 inde aliàs, atque aliàs acriore, usque
 eo, dum aliquid à superioribus parti-
 bus deriuetur. Circumdentur & uin-
 cula adstringentia extremis cruribus
 supra malleolos & genua: nec non
 & humeris supra brachialia atque cu-
 bitos. Quòd si strangulatio inua-
 lescat; cucurbitula occipitio atque
 pectori agglutinetur, & istarum aliqua
 incidatur: omniaque administrentur,
 quæcunque à me in capite de Angina
 præcepta sunt: cum eadem in utro-
 que uitio sit mortis ratio. Iisdem
 præterea intra os medicamentis &
 adstringentibus & mollientibus, &
 exteriori fotu, & cataplasmatibus, &
 oris, inunctionibus utendum est.
 Circum columnam uerò, aut
 circum uuam adstrictorium rhoi
 succum, acaciam, melle aut aqua
 disso-

* μέζον τῆ τσιπῆ
 μῆς.

* ἐγχρίσμασι.



dissolutam, hypocystida, terram samiam, lemmiamue, aut sinopicam rubricam, atque omphacium ponito. Si ulcerosa sit uua; gummi & amyllum rosarum aut palmularum decocto liquefacta: item ptisanæ aut tragi cremor adhibeantur. At in columnæ curatione aliquanto plus ualentiorum medicaminum adjicito; quæ ex myrrha, costo, atque cypero componentur. Nam id genus acria columna tolerat. Verùm si nonnullis locus iste purulentus effectus est, atque palati ossa computruerunt; hi longo temporis interuallo uitam finiunt. Sed horum auxilia nobis alio loco præcipiuntur.

λυθείσα ἀκακία, ὑποκυσίς, γῆ σαμική, ἢ λημνική, ἢ σινώπις, ἢ ὄμφακίον. ἢ ἑλκώδης ἔη, κόμμι καὶ ἀμυλλον δαθέντα ρόδων ἢ φοινίκων ἀφεψήματα, καὶ πισάνης ἢ τράγαχυλός. ἐπὶ ὄγκιον Θ, ἔσω πλέον τῆ εὐτονώεζων, διὰ σμύρνης τε καὶ κόσας, καὶ κυπέρε. ἀνέχε^ε γὰρ τῶν δὲ τῶν δριμέων ὀκίων. καὶ ὅτι ἐμπυος ὁ δὲ ὀχῶρος γένη^ε μελέξετέροισι, ἢ ὅτι τῶν ἐρωῶν ὅσα ἐφθάρη, καὶ ἐς μακρὸν φθίνουσι τὴν βίον ἐτελεύθησαν. τῶν δὲ μερῶν τὰ ἀκεα ἐτέρωθι λελέξεται.

DE CVRATIONE

pestilentium in faucibus morborum.

Caput IX.

Horum uitiorum curatio cum alijs consillarum affectibus qua communis est, qua propria. In inflammatione & strangulatu purgatio per clysteres, uenæ sectio, irrigationes, cataplasmata, fots, deligationes, cucurbitulæ, omnia demum eadem, atque in his, conueniunt. Illitiones autem acriorum medicamentorum faciendæ sunt: neque enim ulcera quiescunt, neque crustæ in superficie fiunt. Verùm si ab his sanies ad interiora destillet: celerrimè partes, etiam si integræ erant, ulcerantur: celerrimeque, ulcera interius depascendo serpunt, atq; hominem perimunt. Porro igne uitium adurere subleuat: at imprudenter id fit propter isthmum. Sed medicamentis igni similibus, quò & depassio coërceatur, & crustæ decidant; utendum præcipio. Ea uerò sunt alumen cum melle, galla, balaustium,

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ

κατὰ τὴν φάρυγγα λοιμικῶν παθῶν.

Κεφάλ. θ.

Πῆ μὲν ξυνή καὶ τῶν δὲ πρὸς τὰ λλα πάθεα τὰ ἐν τοῖσι παρισημίοισι ἰητρείῃ, πῆ ὅτι ἴδιη. Ἐπὶ φλεγμασίη καὶ ἀγχόνη, κλυσμοί, φλεβοτομίαι, λέξιες, ἐπιπλάσιες, πυρεῖν, διάδεσμοι, σική, πάντα ταυτὰ. * χρίσεις ὅ φαρμάκων δυνατωτέρων. ἔγδ' ἀτρεμεί τα ἔλκεα, ἐδὲ ἐχάραται γίγνον^ε ἐπιπολής. ἀλλὰ κῆν ἰχώρ ἀπὸ τετέων εἶσω σάξῃ, ὡκίσα μὲν ἔλκεται τὰ μέρη, κῆν ἀσινέα ἢ ὡκίσα ὅτι εἰς τὸ εἶσω νέμε^ε καὶ κτείνει. πυρὶ μὲν ὧν καίειν τὸ πάθος * ἀρωγόν, ἀλλ' ἀξύνετον διὰ τὴν ἰσθμόν. φαρμάκοισι δὲ πυρεϊκέλοισι χρέεα^ε, ἔς τε τὴν ἐπίχεσιν τ' νεμήσιος, ἀτρεμεί ἔς τὴν τῶν * ἐχάρατων ἔκπτωσιν. ἔστι δὲ * συπνεῖν ξυὸ μέλιτι, κηκίς, βαλαύσιον, ξηρά.

* ἴπτι
* χρίσεις
* αἶμα γὰρ αἰλα ξυνοτόν.
* ἐχάρατων.
* συπνεῖν



Ξηρά ξὺν μελιχρήτῳ. τῖσι δ' αὐτῖς
 ἢ ἐμφυσην καλάμῳ, ἢ πῖλῳ ἢ καὶ
 λῳ παχεί, ἢ Ἰπμῆκεί, ὡς τῷ ἐλκέ
 ῳν θιγγάνειν τὰ φάρμακα. αἰεσον
 δ' ἢ χαλκίτις ὀπίη, ξὺν καδμῖη λεῖπῃ.
 ξυῶ ὄξει. ἔσω δὲ μοίρης διπλάσιον ἔ
 καδμῖης, ἢ ρίον ἢ ρίζα ξυῶ πνιύρῳ.
 φυλάσσει δ' ἢ χεῖ τῷ δὲ τὰς Ἰπθλι
 ψιας. ὑγραίνει γὰρ τὰ ἔλκεα, καὶ Ἰπ
 μάλλον νέμεῖ. χεῖ ὧν πλεῶν τὰ ξηρὰ
 κατὰ πάσιν. τὰ δὲ ὑγρά, ὑγρότατα
 ποιοῦντα. ἐς τὸν γαργαρεῶνα * ἀγ
 χέειν. καὶ ἢ αἰ ἐχάραται ἢ δὴ τε δ' πολυ
 ῶν), τὰ ἔλκεα ἐξυθρά γίγνη), κίν
 δυνος ἔτε μάλιστ' ἀσασμῶ. Ἰπξη
 ραίνε) γὰρ ὡς Ἰππικῶν τὰ ἔλκεα, καὶ
 τῖσι δ' τὰ νεῦρα ξυθίειν). χεῖ ὧν γά
 λακπι ξυῶ ἀμύλω, ἢ χυλῳ πῖσα
 νης, ἢ τράγα, ἢ λίνε * σπέρματι, ἢ πῖ
 λιος, μαλθακῶν ἢ ὑγραίνειν. μετέξε
 τέροισι δὲ ἢ ἢ κιονίς διεβρώθη, μέχρ
 ὄσ' ἐς τὸ ὑπερώης, ἢ τὰ παρῖοθμα
 ἀχρὶ βάσιος ἢ Ἰπγλωπίδος, ἢ Ἰπ
 πῶτει λῆ κατὰ πίνειν, ἔτε σερρεῶν, ἔτε
 ὑγρὸν ἢ δύνατο. ἀλλὰ ἢ τὸ ποτὸν ἀ
 νακοπτόμυρον, ἀπέπνιγε κοτε τὸν αἰ
 θρωπον λιμῶ.

* ἰσχυρίαν

* σπέρματι

Θ. Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Π Λ Ε Υ

είδος.

Κεφάλ. 1.

Οὐκ ἀμβολῆς καμρὸς ἐν πλῆθρι
 πκοῖσι, ἔδ' ὑπερθέσιος, ἢ μεγάλης
 ἰπτεῖνης. ὅ, ἢ γὰρ πυρετὸς κατόξους ἔων,
 ἐς ὄλεθρον ὀρμαῖ. ἢ τε ὀδύνη ἔτ' ὑπε
 ζωκότος, ξυνεπαίγει Ἰπ τὸ κακίον.
 αἰτὰρ ἢ βῆχες κλονέσσαι τὸν θώρηκα

arida cum mulla. Hæc, eadem ca
 lamo, aut penna, aut crasso & ob longo
 caule, quò medicamina ad ulcera per
 ueniant : inspiranda sunt. Optima
 fanè est & chalcitis uita cum trita cad
 mia ex aceto : esto autem cad
 mia portione dupla : & rhei radix cum
 aliquo humore. Præterea ne ulce
 rum compressio fiat, cauendum est :
 ab ea nanque & humescunt, & magis
 exedunt. Hac de causa opus est
 pinna medicamenta arida inspergere :
 liquida uerò liquentissima reddentem
 in gurgulionem infundere. At si cru
 stæ jam resoluuntur, & ulcera rubidâ
 fiunt ; tunc conuulsionis maximè
 periculum subest. Resiccantur enim
 plerumque ulcera, & cum his nerui
 distenduntur. Itaque lacte cum
 amylo, & succo ptisanæ, aut tragi,
 aut lini seminis, aut fani græci re
 mollire madefacereque conuenit.
 Quibusdam & columella usque ad
 palati os exesa est : quin etiam tonsi
 liæ ad basim usque & epiglottida.
 Ac propter cicatricem deuorare ne
 que solidum quicquam, neque liqui
 dum poterant. Sed & ipsum quod bi
 bebat, interdum repercussum homi
 nem fame necauit.

DE CURATIONE Pleuritidis, seu morbi lateralis.

Caput X.

NVlla moræ atque dilationis in
 pleuriticis, quin protinus ualenti
 remedio succurramus, datur occasio.
 Febris enim peracuta ad perni
 ciem properat : dolor quoque suc
 cingentis membranæ in pejus
 urget: nec non & tussis pectus
 caput



caputque concutiens vires proterit. Quocirca eodem potissimum die uena cædenda est. Sin autem exingurgitatione ciborum potusque ægritudo prouenerit, inedia diem unum ægroto imperanda. Post, sanguinem à uena mitto, quæ in cauo cubiti est, non ejus, qui secundum rectum incessum inflammatis costis opponitur: præstat enim maximè procul abducere. Sanguinem uerò ne usque ad animæ deliquium fundito: nam si refrigeratum corpus animo destituitur; pulmoniam inuadere periculum est. Humores enim exteriori caliditate attractioneque priuati, in penitiores partes relabuntur. Item pulmo rarus, calidus, ad trahendumque ualentissimus est: costis etiam proximus, earumque doloris est particeps. Verùm morbi pulmonis pleuritidi succedentes non usque quaque salubres sunt. Pleuritis uerò à pulmonis uomica exoriens benignior est. Quapropter cum medicriter sanguis effluerit, interjecto ad recreandum hominem temporis spatio, iterum detrahere opus est: si benè quidem habeat, eodem die, cum longa remissio sit: sin minus, postridie. Quòd si neque febris remittat, (sæpe enim diem unum febris occupat, & augetur.) tertio die in secunda remissione, in qua & cibi dandi sunt, sanguinem mitte: totum hominem uberius perungens, costisque oleum molle infundens cum calido unguine ex ruthæ anethiue decocto. Ipsum uerò latus admodum leniter irrigandum est. Sed nonnullis & dolor & inflammatio erupit, ut eorum locorum affectus esse uideretur: cum tamen id interiorum uitiorum incrementum sit. At in præsentia de alimonia,

κὴ τὴν κεφαλὴν, ἐπιλύσει τὰς δυνάμεις. μάλιστα μὲν ὧν αὐτῆμαρ φλέβα* τῶν μιν. καὶ ὅτι πλείους σίτων κὴ ποτῶν ἔσται, ἐπ' αἰσθητικῆς ἡμέραν φυλάξαι τὰ ἀφαιρέειν ἐπ' ἀγκῶν ὅτι ἐν τῷ κοίλῳ φλεβῶς, ὅτι μὴ κατ' ἕξιν τῆσιν ἐτέρησιν πλεονεξίαι κρέσσον γὰρ ἀπὸ τῶν ἀγῶν τὸ ὅτι πλείονος, μὴ μέγιστον λειποθυμίας. πειπνομονίην γὰρ ἐπιφοιτῆσαι κίνδυνος, ἢ τὸ σῶμα ἐπιψυχθῆναι, πλεονεξίαν ἐκλείπει. εἴσω γὰρ τὰ ὑγρά ξυμβέει, ὅτι ἐπὶ τῶν ἀφαιρέθειν τὰ θερμὰ τε κὴ τῶσιν πνεύμων ὅτι μανόστε κὴ θερμῶς, κὴ ἐς ὀλίγην δυνατῶτατος. πλεονεξίαν ὅτι γαίτημα, πνεύμων, καὶ κοινωνὸς ἀλγῶν. ἀτὰρ κὴ αἰτῆ δὲ διαδέξιος, ἐμάλα πειπνομονίην. πειπνομονίην ὅτι πλεονεξίαν δὲ πειπνομονίης, διηθήσεσθαι. καὶ ὧν ἐπὶ ξυμμέτρῳ τῆσιν ὅτι αἵματος μεσηγὺ τὸν ἄνθρωπον ξυλλάξαι τὰ, αὐτῶσιν ἀφαιρέειν. εἰ μὲν εὖ ἔχοι αὐτῆμαρ ὅτι ἐπανέσιος μακρῆσιν γιγνομένησιν. καὶ ὅτι μὴ, ὅτι ὑσέσης. καὶ ὅτι μὴ δὲ ὁ πυρετὸς ἐνδιδῶν. τὰ πολλὰ γὰρ μίση ἡμέραν ὁ πυρετὸς ἔχει τὴν αὐξίαν. τῆσιν ἐπὶ τῆσιν δὲ δεύτερη ἐπανέσει ἀφαιρέειν, τῆσιν κὴ τὰ πλεονεξίαν δότειον λιπαρῶσιν μὲν χεῖσαι τὰ ὅλον τὸν ἄνθρωπον. ἐπὶ ὅτι πλεονεξίαν κὴ ἐλαμον θέντα μαλθακὸν ξυμῶσιν ἀλείφασι θερμῶσιν, πηγάνων, ἢ ἀνήθησιν ἀψήμασιν. καταμωνεῖν ὅτι τὸ πλεονεξίαν εὖ μάλα πειπνομονίης. μετεξέτεροισιν ὅτι τὸ ἀλγημα, κὴ ὅτι φλεγμασὶν ἐξώκειλε, ὡσὶν δοκέειν τῶσιν τῆσιν ὅτι πάθῃσιν εἶναι. τὸ δὲ ἐπὶ τῶσιν ἐνδον αὐξήσις. τρεφῆσιν δὲ ἐν ὧσιν ἀμφὶ πάσης

κ τήμων

κ θερμάσιν



ἰητρείης ἔσω λόγος, ὡς μηδὲν ἐς ἀ-
 μαρτωλὴν εἶη. ἐν τροφῇ γὰρ κείσεται
 Β Φάρμακα. ἀτὰρ καὶ τὰ φάρμακα ἐν
 τροφῇ γένει μὲν ὦν θερμὴ καὶ ὑγρὴ, ἢ ὅ-
 λειν καὶ ὀμαλὴ, * σμηγματώδης δια-
 λυτικὴ, λῦσαι, λεπῦναι φλέγμα
 δυναμῶν. σπῆων μὲν ὦν ἀπάντων
 πρὸς ἀνὴρ προσκεκρίσθω. ἐν δὲ χῆ μὲν
 εἰς χυλὸν διηθημῶν, ὡς τὸ σερρόν αὐ-
 τῆς διακεκρίσθω, ξυὸ μέλιτι πεπονη-
 μῶν μένον. πρὸς ἀνὴρ δὲ τὰ ξυμῆθεα
 ἐς ἡδονὴν καὶ ποικιλίαν φάρμακα,
 ἀπέσω. νυῦ γὰρ δὲ καὶ ὀχυλὸς μένος.
 ἰκανὴ μὲν ὑγρῶν καὶ θερμῶν. δυ-
 νατὴ δὲ λῦσαι φλέγμα, καὶ σμῆσαι.
 αὐτὸ δὲ ἀνάγειν μὲν ἀπόνως, ὀκόσα
 ἀνάγει δὲ χεῖρ. ὑπὸ γὰρ ὀφθαλμῶν τὸ
 κοιλίην. πρὸς ὀφθαλμῶν δὲ τὸ λείον αὐτῆς, καὶ
 ἐς κατάποσιν εὐκόλον. ἀτὰρ καὶ τὸ
 γλίχρασμα θερμασίας πρᾶναι,
 ὑμένας καθαίρει, πεπαίνει βῆχας,
 πάντα μαλθαάσει. αἱ δὲ κριθῆς ἔασιν
 δρεταί. δρυτέρον δὲ χῶρεω ἔχουσι οἱ
 χόνδροι, ὀλίγοισι τῶσι τὸ πρὸς ἀνὴρ ἀ-
 γαθοὶ καὶ ἀεισοὶ ἐόντες. τὸ γλίχρασ-
 μα γὰρ, τὸ λείον, τὸ πρὸς ὀφθαλμῶν ἐς κατὰ-
 ποσιν ξυμῶν. τὰ δὲ ἄλλα πάντα μέ-
 γε. πεποιήσθωσαν δὲ καὶ οἱ δὲ ἀπλοῖ
 ξυὸ μέλιτι μένον. ἀγαθοὶ δὲ καὶ τρά-
 γοι. κακίων (δ') ἐπ' αὐτῶν ὄρουζα ξη-
 ρῆσαι. τρηχῆσαι, ὀφθαλμοῦν, καθαροῦν
 πλοῦτων μάλλον ἢ ξηρῶν. ἀεισοὶ δὲ
 καὶ ἄλλοι ξηρὸς κοπεῖς, κρησέση σεσο-
 μῶν, εὐκρητῶν, εὐπεπίων, ξυὸ με-
 λικρητῶν διαρκῆς τροφῆ. καὶ δὲ ἡδὴ
 μὲν πρὸς ἀνὴρ νοῦσθω, πρὸς δὲ τὰ
 σιτία ἀπνηδὴκῆ ὠνδρωπθω, πρὸς ἀ-
 νὴρ μὲν ὅτι κριθῆς διολόσθω, λείν,

quemadmodum & de uniuersa cu-
 ratione, quò nihil in ea delinquatur;
 sermonem habeamus. In alimen-
 tis enim medicamenta ponuntur:
 quin imò in alimentis medicamenta
 sunt. Itaque genere calidus humi-
 dusque cibis esto, lenis, æquabilis,
 migmatodes, id est, benè permixtus,
 dissolutorius: pituita soluendi, extenu-
 andique potestatem habens. Proinde
 cibarijs omnibus ptisana antepona-
 tur, initio quidem, quò ipsius crassa-
 mentum solidumque reijciatur, in
 cremorem percoletur, soloque cum
 melle condiatur. Ab ipsa uerò usi-
 tata ad uoluptatem uarietatemque
 parandam medicamina remouean-
 tur: in hac enim ægritudine solus
 cremor satis est. Quippe humefare,
 calefacere, pituitam soluere & deter-
 gere, per superiora sine molestia, quæ-
 cunque euocanda sunt, euocare, fa-
 cilè quoque uentrem ducere sola
 ptisana potest. Ipsius uerò lenitas
 blanda est & ad deuorandum habi-
 lis. Ipsius etiam lentor caliditates
 mitigat, membranas mundat, tusses
 concoquit, omnia emollit: tales hor-
 dei uirtutes sunt. Halica uerò se-
 cundum gradum occupat: quæ cum
 pauca quædam cum ptisana commu-
 nia possideat: ob ea probatur, opti-
 maque censetur. Lentor enim, leni-
 tas, suauitasque in deuorando utri-
 que communia sunt: in cæteris omni-
 bus halicam ptisana antecellit: sed
 ea quoque simplex cum melle solo
 conficiatur. Tragi præterea boni
 sunt. Deterior ipsis oryza est: quo-
 niam siccatur & exasperat: potiusque
 costarum purgationem supprimit,
 quàm facilem reddit. Optimus quo-
 que est panis aridus, contusus, per sub-
 cerniculum transmissus, bene tempe-
 ratus, concoctu facilis: cum mulla,
 quantum satis est, alimenti præbet.
 Nempè si jam diu morbus producit,
 cum dictis que cibarijs homo labare
 capit: ptisana ex hordeo præbeatur
 bene



benetrita; bene cocta: condiatur ue-
 rò anetho, sale, & oleo tenui puro,
 non uiscido, non exasperante. At non
 multum olei cum ptisana coquere
 præstat. Nam & sorbitionem pin-
 guem reddit, & præuitatem oleum de-
 ponit: longà enim decoctione in
 cremorem hordei absorptum ampli-
 us non apparet. Item porrum cum
 sua coma, & amygdala amara cum
 cremore incoquantur. Ita nanque
 ferculum ad spirationem expedien-
 dam commodum medicamentosum-
 que ab his efficitur. Porri autem
 cum cremore comesti utilitatem
 juxta delectationemque summam af-
 ferunt. Iam uerò & ouorum bo-
 num succum creantium oportuni-
 tas adest. Ac si humida copiosaque
 per os materia feratur; sulfur ignem
 non expertum nitrumque in oua in-
 spergito. Sed mirificè profunt oua
 nupci à gallina edita ex igne igne carē-
 tia: quippe à matre caliditas inest
 igne quidem humidior, sed ægrotan-
 ti familiarior, ut potè animali ab ani-
 mali. Sin autè pituita glutinosa ac te-
 nax sit; in oua oleum infundito, ac
 resinam siccam pineam, quò sulfur
 melius reddatur, inspergito: nec non
 & terebinthi resinam cliquato. Piper
 præterea in ouis, in ptisana, in omni-
 bus epulis, & quæcunque piperi simi-
 lia sunt, bene proficiunt. Inter car-
 nes extremi pedes in cremoribus cli-
 quati, columbæ, gallinæ elixæ, por-
 corum cerebra cum omento quidem
 tosta, sine illo uerò nidore uacantia.
 Si inter spirandum æger strepitum
 non reddit; dandi sunt etiam marini
 pisces aut saxatiles, quicquid opti-
 mum regio ferat. Verum ut neque
 cupiditate delinquat, neque ui-
 cibus tenuitate contabescat: ex frū-
 ctibus malum concedito in aqua, aut
 malsa elixum, aut cum adipe assatum:

καθεφθός. ἀνήθον ὃ ἔσω, καὶ ἄλλες πτι-
 σάνης τὰ ὄψα, καὶ ἔλαιον λεπτόν, ἀ-
 πσιον, ἀγλίχρον, ἀτρήχυντον. κρέ-
 ασον ὃ ξυῶ τῆ πτισάνη, ὡς μὴ πολλὸν
 ἔλαιον ἐψέιν. καὶ γὰρ πίνιχαί τ' ῥό-
 φημα, καὶ τὸ κακίον τ' ἔλαιον ὄλ-
 λυσι. εἰ δὲ γὰρ ἐμφανὲς ἐπι γίνεῃ τῆ
 πολλῆ ἐψήσει εἰς τὸν χυλὸν ἀναπο-
 θεν. ἔσω ὃ καὶ πρᾶσον ξυῶ τῆ κόμη, καὶ
 ἀμύγδαλα πικρὰ ξυῶ τὰ χυλῶ
 ἐψόμνα. εὐπνοόντε γὰρ καὶ φαρμα-
 κῶδες ὑπὸ τῆ δὲ γίνεῃ, καὶ τὰ πρᾶ-
 σα βρωθῶσαι ὑπὸ ἔ χυλῶ ὀνησιφό-
 ρα καὶ ἡδίστα. ἤδη ὃ καὶ ὠν καιρὸς εὐ-
 χύλων. καὶ ὃ ὑγρὴ καὶ πολλὴ ἀναγω-
 γή ἐστι, θείας ἔ ἀπύρε ἐμπασσέω καὶ
 νίπρε. ἀεισον ὃ τῆ δὲ πύρεων ὠν
 θρωθῶσαι ἐκ πυρὸς ἀπύρεων. ἀπὸ γὰρ
 τ' μητρὸς ἢ θέρμη, ὑγροτέρη μὲν πυ-
 ρὸς, οἰκειότερη ὃ τὰ νοσέοντι, ὅπως ἐν
 ζῶς ζῶω. καὶ ὃ φλέγμα κολλῶδες
 ἐστὶ καὶ γλίχρον, ἐστὶ ὡς ἔλαιον ἐγ-
 χέειν, καὶ ῥητίνης τ' ξηρῆς τ' ἀπὸ πί-
 λυος ἐμπάσειν, ὅπως τ' θεῖον κρέασον
 εἴη, καὶ τ' ἀπὸ τερμίνθη ὃ τῆ ξαντὰ. καὶ
 πέσσει ὀνησιδὸν καὶ ἐν ὠοῖς καὶ ἐν πτισά-
 νη, καὶ ἀπασὶ τοῖσι ἐδέσμασι, καὶ ὁκόσα
 πέσσει ξυνοδά. κρεῶν ἀκρόποδες ἐν
 χυλοῖσι τακερῆ, πέλειαι, ἀλεκτ-
 ρίδες ἐφθαί. συῶν ἐγκέφαλοι, ὀπτι
 μῶ σῶ τὰ ἄππλω. ἀνδρὶ δὲ τε-
 τῆς, ἀκνισοῖ. καὶ δὲ ἀκέρχνη ἔστι
 δοτέον καὶ θαλασίων, ἢ πετραίων, ὅς
 πᾶν ἀεισον ἢ χώρη φέρη. ὡς ὃ μὴ ἀ-
 μαρτῶνη ἄπθυμῆ, μηδὲ σμήχη
 ἐν τῆ λεπτῆ διαίτη ὀνοσέων, χαε-
 ζεῶς ὀπώρης * μῆλων ἐφθῶν, ἐν * καὶ ἐφθῶν
 ὕδατι ἢ μελικρήτῳ ἢ εἰσαπὸ πτῶν.



ἀφαιρέειν ὅτι χεῖρ ἔλεπτος, καὶ τῶν ἐπιπέδων
 τῆς χεῖρος ξυμπίπτει ἀπὲρ μασι. ἐφ' ὧ-
 ρης ὅτι καὶ συκων. ἀτὰρ καὶ τ' ἄλλης δόξε-
 ον, ὁκόσον αὐτὴ ἢ ἀβλαβὴς ἢ ὀπώρη,
 ἀλλὰ καὶ ὀνησιός. ἀμφὶ μὲν ὧν προ-
 φῆς, τὰ δὲ ἐπὶ τῶν πλυρῶν κέεαδ' ἔχει
 ἕρια θυμινθέντα θείω, λίπαι δ' ἐδου-
 μῖα, ἐνθα ἀνηθον ἐψηθῆ ἢ πήγανον.
 ξυμμεχὲς ὅτι τρέφοισι τὸ πλυρὸν καὶ
 ὠνεῖν, ἢ δ' ἐπιπλάττειν πρὸ τ' προσάρ-
 σιος πρὸς τῶν ξυμπίπτει πλάσματα,
 μελίλωτον ἐψηθῆν ξυμμελιχρήτω,
 ξυμμισηγόντα μήκωνος τ' σαρκὸς ἐ-
 νηψημῶνης, καὶ μαίνης ἄλιτον ἐμπά-
 σειν. καὶ ὅτι ὑγροτέρη ἢ ἀναγωγὴ καὶ
 πολλή, * αἰρησ ἀλιτον, ἢ ἐρυσίμου
 ξυμμισηγόν, καὶ νίτρον ἐμπάσειν. ἢν ὅ-
 μῆκος ἢ δὴ τ' νέσσε γίγνη, καὶ τ' ὀδυ-
 νης * ἐγκουμῶνης, καὶ ὑγρῆς καθάρσιος
 γιγνομένης, ἐμπυον μὲν ἐλπίς τὴν
 αἰθρωπον ἐσεαδ' οἰνηπι ὅτι ξυμμισηγόν
 καὶ * κάγχους τοῖσι ἑπιπλάσμασι. ἢν
 ὅτι καὶ ψυχρῶν τῶν ἑπὶ πῶν εἰσῶθεν τοῖσι
 κάμνυσι αἰθρησις γίγνη, ὅξος πῶρα-
 χέν. καὶ ὅτι ἐνεργὸν ποιεῖ αἰθρησις πολλὸν
 τὴν θερμασίην τῶν ἑπιπλάσμάτων
 διαρκέειν. κρέατων γὰρ ἢ δὴ καὶ ἑρμητ' ὅ-
 τῶν ἑπιπλάσμάτων νεωχμῶσι. ὅ-
 ἐσωσαν ὧν θάλψεις ἐν κυρτασίσι
 διὰ εἰδῶν, κάγχους, λίπας θερμῆς
 ἐν κύσει. καὶ φονδ' ἐσω παῖ μὴ χά-
 νημα πυρῆς, ὡς μὴ τὰ ἀχθεα πρὸς
 τῶν πόνω, πόνον ἐνδιδόι. τοῖσι δὲ μὲν τῶν
 καὶ ἐπὶ τῆ προφῆς χεῖραδ', καὶ ξυμπερίγη
 τ' ἄλλος. ἢ δὴ ὅτι τῶν τοῖσι δὲ καὶ συκίης
 καμρὸς γένοιτο. αἰετός ὅτι μετὰ ἐβ-
 δούλω. πρὸς αὐτὸν δὲ, μὴ ξυμπεριχ-
 θεῖς. καὶ γὰρ ἐνήθεες αἱ νοῦσοι, ὁκόσαι


καὶ ἄλλοι

καὶ καμρῶν

καὶ κάγχου

sed corium & interiora aspera cum
 feminibus abijciantur. Tempore quo-
 que illo, quod Horam Græci nomi-
 nant; sici, & alijs id genus fructus
 concedantur: quatenus, scilicet; in-
 noxij sunt, quin potius adjumentam
 præstant. Hæc sanè de alimentis
 abundè sint. Lateri autem Janæ
 superduntur sulfure fumigatæ, un-
 guine imbutæ, in quæ anethum ru-
 thauè incocta sit. Iugiter his latus
 madefaciendum, cataplasmaticisque
 ante cibi assumptionem tegendum
 est. Præter usitata cataplasmata ser-
 tulam in mulla elixam accipito, cui
 papaueris carnem incoctam com-
 misceto, manna quoque pulviscu-
 lum inspergito. At si humidius spu-
 tum copiosumque reijcitur; lolijfa-
 rina, aut irionis commiscenda est, &
 nitrum inspergendum est. Cæterùm
 si morbus productior fit, dolor est
 pertinax, & humida fit expurgatio;
 tunc purulentum hominem fore
 speratur. Itaque sinapi & cachrys
 cataplasmaticis admiscenda sunt. Sed
 si penitiores locos ægroti frigidus es-
 se sentiunt; acetum affundito.
 Illud autem efficere operæ pretium
 est, ut cataplasmatum calor diu effi-
 cax permaneat. Melior est enim id
 genus caliditas, quàm cataplasmatum
 innouatio. Proinde calefactiones
 in sacculis ex hujusmodi, ut pote
 ex milio fiant, aut ex calenti oleo in
 vesica incluso. Omnis uerò fortis
 machinatio, ne pondera dolori dolo-
 rem adjiciant, leuis esto. His enim
 leuibus & assumto cibo, cum dolor
 infestat, uti nihil prohibet. Iam uerò
 post hæc etiam admouendæ cucurbi-
 tulæ occasio adest. Sed hoc post
 septimum diem facere optimum
 fuerit: ante ne festines. Haud
 enim placidi morbi sunt, quicunque

ante



ante septimum cucurbitam requirunt. Esto autem magna, omni ex parte lata, dolentem locum ambire ualens. Quippe cum haud interius descendat dolor, sed in latitudinem diffusus sit. At flamma sub cucurbita multa esto: quò non solum atrahat, uerum etiam ante ignis extinctionem calcfaciat. Extincto igne scarificandum est, tantumque sanguinis, quantum uires permittunt, detrahendum. Multo uerò plus esto, quàm si alia de causa de prae cordijs sanguinem haurires. Nam maximè perspicuum est, quod in lateris morbo uexatis à cucurbita percipitur adjuumentum. Sal quidem, aut nittum in scarificationibus mordacia sunt ac dolorifica, sed salutaria. Quapropter considerandæ sũnt hominis uires & ingenium: nam si forti animo ac tolerans sit; sal inspergendus est, non ipsis uulneribus ita, ut ipsa contingat: sed super linteolum oleo madidum inspergatur. Id uerò super locum scarificatum extendito: humiditates enim ex salis colliquatione manantes minus, quàm sal, mordaces sunt. Sed multo oleo perfundendum linteolum est, quò hujus lenitate morsionis dolor retundatur. Secundo die autem cucurbitam affigere mirificè iuuat: ut ex uulneribus tenuis quædam sanies extrahatur. Id uerò priore cucurbita multo est efficacius, multoque magis uires conseruat. Neque enim sanguis, aut alimentum, sed sanies emanat. Atque id quidem facito, cum prius uires exquisitè perpenderis. Di tertio ceratum cum cypri- no oleo & rutaceo imposito. Quòd si ulterius purgatione sputa indigeant; in ceratis resinam eliquato, aut sulfur ignem nõ expertum admisceto;

πρὸ ἐβδόμησ ἀπαλίσσει * συκίω: ἔ-
 σω ὃ μεγάλη, εὐρέα πάντη, ἀμφι-
 χεῖν τὸ ἀλγέον χωρίον: ἰκανή: ἔ γδ
 εἶσω ἐν διδοῖ τὸ ἀλγος, ἀλλ' εἰς εὖρος
 κέχυθ'. ἔσω ὃ κ' ἢ τὸ πῆσυχίη φλόξ
 πολλή: ὡς μὴ μένον ἐλκύσαι, ἀλλὰ
 κ' ἀλεῖναι πρὸ τ' ἀποσβέσιος τῆ πι-
 ρὸς κ' μετὰ τὴν ἀποσβέσιν ἀποχά-
 σαίτω, ἀφαιρέτω αἷμα, ὅσοσον αὐτὴ
 δύναμις παρείη. πολλὸν δ' ἔσω πλέον
 ἢ ἀπ' ἀλλῆς προσφάσιος ἀπὸ τῆ ὑπο-
 χονδρίων ἀφαιρέσις αἷμα. Ἐπιδη-
 λοῖα τῆ γδ ἐπὶ τῆ πλυρικήων. ἢ ἀπὸ
 συκίης ὠφελείη. ἄλεσ ὃ ἡνίτερον ἐπὶ
 τοῖσι χασεσί, δηκτικὸν μὲν κ' ἀλγει-
 νὸν, ὑγιεινὸν. ὃ ἀλλὰ ξυντεκμαίρεσθ'
 τὰς δυνάμιας, κ' ἔσ' ἀνθρώπου τὸν τρέ-
 πον. ἢ γδ ἀλκήεις τὴν ψυχὴν κ' καρ-
 τερὸς ἐπὶ, ἐμπάσει τῆ ἀλῶν, μὴ αὐ-
 τοῖσι τοῖσι ἐλκεσι ὡς αὐτέων ψαύειν,
 τῆ ὃ ὀθόνη ἐμπάσειν δεσδυμένη τὰ
 λίπαι, ἢ ὃ ἐπιπετάσειν τῶ * χωρίω. οἱ
 γδ ἐκ τ' συνήξιος ἰχώρες, τῶν ἀλῶν
 εἰσὶ ἀδηκίότεροι. πολλὸν ὃ ἔσ' λίπα
 καὶ ὠνεῖν χεῖν, ὅπως τῶ προσπνεῖ τῆ δε
 ἀμβλύνη τὸ ἀλγος τ' δὴ ξιος. δδύρη
 ὃ ἡμέρη, ἄριστον τὴν συκίην προσβάλλ-
 λειν, ὡς ἐκ τῶν τρομάτων ἐλκήαι πῆ
 λεπτός ἰχώρ. τῶδε, πολλὸν μὲν τ' ἐπι-
 πρόθεν συκίης ἀνισιμώτερον. πολ-
 λὸν ὃ τ' δυνάμιος φυλακτικώτερον.
 ἔ γδ αἷμα, ἢ τροφή, ἀλλὰ ἰχώρ ἐκ-
 ρέει, κ' τῶδε μὲν τῶ προσευκρινήσας ἀμ-
 φι τ' δυνάμιος πρῆσθ' ἐν. τῆ τρίτῃ ὃ κη-
 ρωτὴν ξυν τὰ κυψίνω κ' πηγάνω πθέ-
 ναι. ἢ ὃ ἐπικαθάρσιος τῶ * πύαλα
 δ' ἐπ', τοῖσι κηρώμασι ῥητίνης ξυωτή-
 κειν, ἢ ἔθειε τῆ ἀπύρεξ ξυμμίσγειν.



* δερμζοντι.
* εϋρυν.
* πον.
* περιστα.

καὶ αὐθις πυρίην τὸ χεῖρον ἔχειν, ὡς
 τρέπος δ' ἐσικύης, ἔχειν ὧν χεῖ κερ-
 μεσοῦν κέσφον ἴον ἀρμόζον ἢ πλυσθῆ,
 * εὐρὺ, ἢ τὸ χαλκρον, * πρηνές ἢ τὸ
 χεῖλα ἀμφιθεῖναι ὅσι ἀλγέσι.
 ὑποπιθέναι ἢ φλόγα μεγάλην ξυ-
 λίπαι, ὅπως ζῶσα ἐς πολλὸν διαρ-
 κήη χρονον. μὴ φεισφίγγειν ἢ τὰ χεῖ-
 λεα πρὸς τῆσ σαρκι, ἀλλ' ἐς διαπνοῶ
 διαδοχῆ πρὸς ἔσω, ὡς μὴ διασβεθεῖν
 τῆ πυρί. ἐς πολλὸν ἢ ἔξάπειθεῖν. ἢ
 γδ' ἔνδον ἐκείνη θέρμη, ἀεὶ σὸν μὲν
 πυρίμα, ἀγαθὴ ἢ πρὸ κλησις ἰδρώ-
 των. χεῖ ἢ μηδὲ τὴν κάτω ἰητρείην ὑ-
 περορῆν, ἀνδράσι μὲν ἐς τὸ ἔντερον
 πηγάνινον ἔλαμον ἐγχεοῖα. γυναιξί
 ἢ, κὲ ἐς ὑτέρην. διηνεκέα ἢ τὰ πινόμενα
 κὲ κατὰ ποδῶ ἔσω, μελί κρηλον ξυνὶ ὠπη
 γάνω, κὲ χυλῶ πρισάνης μὲν ξυνεχέσ
 ἔησση, ὡς ἐν τροφῆ φάρμακον. μὲν ἢ
 μὴ τροφῆσ κρηρὸς ἔη, * ἔσω δ' ἴπ κὲ τῶν
 ποικίλων * πινέριον ξυνὶ μέλι πὲν ἔψη-
 θεν ἐς σύσασιν. τὰς δὲ χεῖ σφαίρας
 μέγεθος ὅσον κυάμα, στρογγύλας
 ἔσασ διδόναι ὑπὸ ἴην γλωτῆαν ἔχειν
 διαφέροντα τῆσ πακείσε, ὡς μὴ κα-
 τὰ ποδῶν, ἀλλὰ τὸ κλόν ἔη. πρσοπνές ἢ κὲ
 ἴο δια τὸ μήκωνος ξυνὶ μέλι πὲν κὲ μελι-
 λώτῳ φάρμακον λεῖον καὶ ὑπνικόν.
 τὰ δὲ μὲν τὴν κὲ πρὸ τ' ἀρσιος, κὲ ἐπ' αὐ-
 ἴην, κὲ ἐπὶ τῶ ὑπῶ διδόναι. ἀσίτῳ ἢ, τὰ
 φαρμακῶ δὲ α κνίδης κὲ λίνε ἴσ ἀπέρ-
 ματος, κὲ ἀμύλα, κὲ κώνε τ' * κοκκά-
 λα λείε ἐκάσσε κίαθον, κὲ ἀμυγδα-
 λων τῶν πικρῶν πέντε κὲ εἴκοσι τὸν ἀ-
 ειθμόν. τόσοι ἢ κὲ πεπέριος κόκκοι.
 φωχθέντα δὲ χεῖ λεία μέλι πὲν ἐς αὐ-
 * ἐκλεγμα φυρῶ ἴων δόσις μυστῆ

* ἔσασ.
* σικέριον.

* κοκκάδα.

* ἐλεγκμα.

atque iterum forum loco adhibeto. Porro modus cucurbitæ talis esto. Fictile uas habendum est, leue, lateri congruens, latum : aut æneum. Id pronum in labra dolentibus locis circumponito : flammam uerò multam cum oleo subijcito, quò uiuentis flamma in longum tempus sufficiat. Vasculi autem oras carni ne imprimito, sed ad distationem transitus aliquis esto, quò minus suffocata flamma extinguatur. Diutius uerò illam accendere expedit. Nam intra uas illud inclusa caliditas optimum fomentum est, & bona sudoris pro-uocatio. Neque uerò medelam inferioribus partibus adhibendam negligere oportet : uiris quidem in anum rutaceum oleum, mulieribus autem & in uterum infundendum est. Perpetuò sane quæ bibuntur, ac deuorantur, sunt, mulla cum ruta & succo ptisanæ, si continenter tussit : ut in alimento medicamentum sit. Verum si nondum alimenti præbèdi tempus, aliquod compositum, quod Piceriũ Græci dicunt, accipiatur ex uarijs constans, cum melle ad consistentiam decoctum. Globulos autem fabæ magnitudinem æquant, turbínatosque dare oportet sub lingua continendos, huc atque il-luc iactandos : ut non deuorable, sed eliquabile sit. Suaue quoque est id, quod ex papauere cum melle ac fertula campana medicamentum conficitur lenè, atque somniferum. Hæc utique & ante cibi assumptionem, & assumto cibo, & post somnum ipsum præbenda sunt ; sed jejuno medicamentosa exhibeantur. Quale est, quod hæc accipit, urticæ, lini seminis, amyli, nucis pineæ, cuiusque contriti cyathum, amygdala amara numero uiginti quinq; totidem & piperis grana. Oportet autem hæc torrere, ac trita cum melle ad eclegmatis temperaturam permiscere. Horum detur mystilla

una



una. Si liquida crudaque excreat, myrrhæ pondo drachmas duas, croci pondo drachmam unam, piperis grana quindecim, cum mellis pondo libra subigito. Id sanè medicamentum & ante cibi acceptionem mystillæ dimidiatæ mensura dari debet: bene facit in longo lateris morbo, quando & oxymel dare conuenit, si spirandi urgeat difficultas. Frigidam uerò aquam quicumque medici pleuriticis concesserunt; neque qua ratione id fecerint, assequi ualeo, neque experimento confirmare. Quippe si qui à frigida periculum curauerunt; hi profecto mihi non laborare pleuritide uisi sunt. Verùm apud uetustiores etiam Medicos species quædam concursus pleuritis, seu lateralis morbus uocabatur: cum bilis esset excretio, cum dolore lateris, & exigua febre, uel etiam sine febre. Huiusmodi sanè affectus nomen quidem pleuritis, rem uerò non obtinet. Quin etiam spiritus nonnunquam in latere conclusus sitim, dolorem prauum, mollemque caliditatem excitat: id quoque uitium ignari homines Pleuritin nuncuparunt. His nempe frigida aqua remedio esse poterit, cum prospera utentis fortuna extincta sitis erit, bilis ac spiritus per inferiora subducetur, & dolor & caliditas exhalabunt. Verum in lateris inflammatione & succingentis membranæ tumore non solum frigida aqua, sed etiam frigida respiratio noxia est. Itaque si ex prius tradita mendendi ratione incolumes redduntur pleuritici, paulum tamen adhuc tussiant, & caliditas subinde repetit, atque infestat; adhæc penitus discutienda maturandum est. Aut enim quæ relinquuntur, reciduias faciunt, aut ad suppurationem conuertuntur.

μίν. ἢ ὕγρὰ καὶ ἀπεπία ἀνάγη
 σμύνης ὀγκῆς * δύο. κρόκ * μίν, πε-
 πέλιος * κόκκοι δεκαπέντε, μέλιτι
 Φυρῆναι λίτρα μίν. τὸ δὲ μύριον ἦδη
 τὸ φάρμακον, καὶ πρὸ τ' ἄριστος δοτέον
 μυσίλης ἡμισυ. ἀγαθὸν τὸ δὲ ἐπὶ τοῖσι
 χροσίζοσι, εὐτε καὶ ὀξύμελι διδόναι
 χροῆ, ἢν θύσσοισι ξυνεπέιγη. ψυχρὸν
 ὅ ὕδωρ ὀκόσοι τῶ ἰητρῶν τοῖσι πλθ-
 ριπκοῖσι ἔδοσαν, ἔτε ὀκοῖω λόγῳ
 ξυμβαλέν έχω, ἔτε τῆ πείρη πτω-
 σαδ. εἰ γὰρ πινος ἀπὸ ψυχρῆ διηλά-
 ξαιτο τὸν κίνδυνον, οἱ ὅ μοι ἐκ ἔδοκεον
 * εἴτε πλθριπκοί, ἀλλὰ καὶ τοῖσι πα-
 λαοτέροισι ἰητροῖσι * ἰδὲν τις ξυνηρο-
 μῆς πλθριπτις ἐκικλήσκειτο, χολῆς ἐκ-
 κρίσιος ἐὼν ξὺν πόνῳ πλθριπ ἐπὶ σμι-
 κρῶ πυρεῖω, ἢ καὶ ἀνδρὶ πυρεῖ. τὸ δὲ
 μέντοι τὸ πάθος, ἐνόμα μὲν πλθριπτι-
 δος, τὸ δὲ πρῆγμα ἐκ ἴχει. ἀλλὰ καὶ
 πνεῦμά ποτε ξυνιστῶν ἐν πλθριπ, δι-
 ψαν ἐνδιδόι, καὶ ὀδύνην πονηρῆν, μαλ-
 θακῆν τε θέρμην. καὶ τὸ δὲ ἐκάλεσαν
 ἀνδρες αἰδριες πλθριπτι. Ἐπὶ τῶ δὲ
 ὦν ὕδωρ ψυχρὸν ἄκος αὐ γίγνοιτο
 εὐτυχίη τ' ἡρομῆς. ἐσβέσθη μὲν αὐ
 τὸ δόψος, ἢ ὅ χολῆ καὶ τὸ πνεῦμα ὑπη-
 λάθη, καὶ διέπιδυσε τὸ ἄλγος καὶ ἠθέρ-
 μη. ἐπὶ ὅ φλεγμασίη πλθριπ, καὶ ἔϋ-
 πεζωκότος πρῆσει, ἐ μόνον ὕδωρ ψυ-
 χρὸν, ἀλλὰ καὶ ἀναπνοὴ ψυχρῆ, κα-
 κόν. ἢ ὦν ἐκ τ' πρὸ τ' ἐν ἰηρείης ᾤρι-
 γίγνων) οἱ πλθριπκοί, ἐπὶ ὅ βραχέα
 ἐήσασσι, καὶ θέρμη ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε
 ἴχνη, ἠσβύσθη χροῆ διαλύειν τοῖδε. ἢ γὰρ
 ὑποστροφὰς ποίει τὰ ἐγκαταλιμ-
 πανόμῳμα, ἢ ἐς ἐμπύησιν τρέπει).

* γ δ ι
 * γ β
 * κοκκίω

* εἰσάγ
 ὀκεί τῆ

APE.



ΑΡΕΤΑΙΟΥ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ,

ὀξέων νόσων θεραπευτικόν

βιβλίον δευτέρον.

Θεραπεία πνευμονίης, κεφαλ. α.

Θεραπεία αίματος αναγωγής, κεφ. β.

Θεραπεία καρδιακῶν, κεφ. γ.

Θεραπεία χολέρας, κεφ. δ.

Θεραπεία ειλεῶ, κεφ. ε.

Θεραπεία τῆς κατὰ τὸ ἥπαρ ὀξέων παθῶν, κεφ. ς.

Θεραπεία νωθίας φλεβῶς, καὶ ἀρτηρίας ὀξείας νόσου, κεφ. ζ.

Θεραπεία τῆς κατὰ τὰς νεφρῶς ὀξείας νόσου, κεφ. η.

Θεραπεία τῶν κῆτλιῶν κύστιν ὀξέων παθῶν, κεφ. θ.

Θεραπεία ὑσερικῆς πιγῆς, κεφ. ι.

Θεραπεία Σατυριώσεως, κεφ. ια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΝΕΥ-

μονίης,

Κεφαλ. α.

Κατ' ἔξοχὸν ἐπίκαιρον κακὸν φλεγμασίν ἢ πηήσις ἔσπνεύμονος, ἐφ' οἷσι πνίξις ὀλιγοχρονίη. καὶ ὧν ἀντίξοα, ἢ δ' ὠκέα ἐμμεναι τὰ ἀλεξήματα. ταίμηδ' αὐτίκα τὰς ἐπ' ἀγκῶν φλέβας. εἴτ' ἀμφω αἶμα ἐπὶ δεξιᾷ καὶ ἀριστερᾷ μᾶλλον, ἢ ἐν μέσῳ μέζονος. ὡς ἀφ' ἐκατέρης τῆς χώρης ἔσπνεύμονος ἢ ἀντίπασασις τῆς ὑγρῶν ἐστίν.

ΑΡΕΤΑΕΙ

CAPPADOCIS DE

acutis morbis curandis,

LIBER II.

Curatio Pulmonariæ, Caput I.

Curatio rejectionis sanguinis, cap. II.

Curatio Cardiaci affectus, ca. III.

Curatio Cholerae, cap. IV.

Curatio Voluuli, cap. V.

Curatio acutorum jecoris affectuum, cap. VI.

Curatio acuti morbi uenæ & arteriæ dorsi, cap. VII.

Curatio acuti renum morbi, cap. VIII.

Curatio acutorum, uesicæ uitiorum, cap. IX.

Curatio vuluæ strangulatus, cap. X.

Curatio satyriasis, cap. XI.

CURATIO PVLMO-

narix,

Caput I.

PER acutum lethaleque malum est inflammatio *inflatio* pulmonis: quas strangulatus breuis consequitur. Igitur æquis resistentia uiribus, matureque ferenda subsidia sunt. Protinus in cubito uenæ aperiantur, siue utraque, in dextra uidelicet ac leua manu, idque potius: siue una tantum, & ea major, quo ab utraq; pulmonis regione humiditatum reuulsio non



non tamen usque ad animi deliquium fiat: strangulatum enim animi deliquium auget. Cæterum si uel paulum respirauerit; tunc suppressendus sanguis est, ac denuò postea mittendus. Nam si à sanguine morbi causæ prouenerint, eas uenæ sectione tollit. Atqui seu pituita, seu spuma, seu quæuis alia humiditas tumefaciat, uenarum inanitiones amplio rem pulmonis locum ad respirationis transitum efficiunt. Opus est autem humores & flatus post uenæ sectionem deorsum uersus trahere, nitro, melle, ruta, resina terebinthi liquida sedem oblinendo. Sed missionis sanguinis loco, si quod majus impedimentum sit, acrem succum per clysterem in sedem immittito: ut puta, salem cum nitro, aut terebinthi resinam cum melle. Ruta quoque in oleo, & hyssopum in aqua decocta. Item cucurbitæ syluaticæ carnes interiores in aqua excoctæ conueniunt. Præterea inanes cucurbitulæ egregiè faciunt, si tergo, dorso, præcordijsque ubique adhibeantur. Quod sicubi pectus carnulentum sit, quò minus circum ossa cutim cucurbitula incumbens affligat; ibi eam affigito. Nam si ad quancunque partem corporis humores distrahantur, & spiritus ad extrema euocetur, quibus pulmo opprimitur; aliquod mali solamen inuenias. Omni enim ex parte. Pulmonaria obsidenda impugnandaque est. Verùm neque ullum ex his medicamentis, quæ ore sumpta conducunt, despiciendum est. Quippe ca est natura pulmonis, ut siue rectè ualeat, siue ægrotet; ad se humores alliciat. Quocircà ejusmodi medicamenta præbeantur, quæ humores ad transpirandum attenuent, lubricos fluxilesque ad extrudendum efficiant.

μη μέσφι λειποθυμίας. προσπιμω-
ρείει γδ τῆ πιγί ή λειποψυχίη. ἀλλά
κῆν σμικρόν ἀναπνεύσωσι, ἐπιχόντω
χρη τῶ ῥοήν αὐθις ἀφαμρέειν. ἦν γδ
ἔξ αἵματος αἱ προσφάσιες ἔωσι, αὐ-
τήν τὴν αἰτίω ή φλεβοτομή ἀγει. ἦν
τε φλέγμα, ή ἀφρός, ή πάλιο τῶ
ύγρῶν πρήση, αἱ τῶ φλεβῶν κενῶσι
εἰς εὐρυτέρω τὴν ἔπνεύμονος ποιέει-
σι χάρω ἐς διόδον τ' ἀναπνοῆς. χρη
ἡ κατω ἀγειν ὑγρά κ' φύσας, ἔπι
μῶ φλεβοτομίας διαχείοντω τὴν ἔ-
δρην λίτρω, μέλι, πηγάνω. ῥηπὴ τῆ
ἀπὸ τ' τερμίνθε τῆ ὑγρῆ. ἀντὶ δὲ τῆς
φλεβοτομίας, εἰ μέζων ή κώλυσις ἔοι,
ὑποκλύζειν χυλῶ δριμεί, ἀλσι μῶ
πρὸς τῶ λίτρω. ή ῥηπὴ τῆ τερμίνθε
ξύν τῶ μέλι. πήγαυον ἡ ἔν τῶ ἐλαίω.
κ' ὑσώπον ἐν τῶ ὕδατι ἐψηθέντα, κ' ^{κ' ὑσώπον}
κολοκύνθης ἡ τῆς ἀγρίης αἱ σάκεες αἱ
εἰσὼ ἐψηθεῖσαι ξύν ὕδατι, ἀραισαι.
συκία κ' φαίης τὰ μετὰ φρενα κ' αἱ
τὸν νῶτον, κ' τὰ ὑποχόνδρια παῖτι
ξύμφορρι. μῶ ἡ πῶς ὁ θῶρηξ εὐσαρ-
κος ἔη, ὅπως μὴ ἀμφι τοῖσι ὀστέοισι τὸ
δέρμα ή συκία ἀμφιθλάσει ἐρείδω-
σαι, κ' τῶ δε προσβάλλειν. ἦν γδ παῖ-
τι ἔσωματος τάτε ὑγρά ἐφέλυ),
κ' τὸ πνεῦμα ἔξω πταίνη), οἷσι περ ὁ
πνεύμων πύγῃ), ἀνάπιδυσις αὐ γίγ-
νοῖτο ἔκακῃ. παῖτι γδ πολιορκέειν χρη
τὴν περιπυδμονίην. ἀτὰρ μετ' ἡ τῶ δια-
σώματος ὠφελείων φαρμάκων ὑ-
περορῆν μὴ ἔν. ἔλκει γδ ὁ πνεύμων κ'
ἐν ὑγείῃ ὑγρὸν, κ' μὲ νοσῆ. φαρμά-
κων διδόναι ὦν, ὅπόσα λεπτύνει τὰ
ύγρὰ ἐς διαπυλῶ, ή δὲ ὀλιωτηρὰ
κ' μὲ ἔρα ἐς ἀναγωγῶ τ' αὖξει.
πίνειν



πίνειν μὲν ἔς τῶσπερ ἰσχυροῦς, λί-
 τρον ξυῶσπερ ἐψήματα, ἢ ἄλμυρ
 ξυῶσπερ ἐξεί, ἢ μέλιτι, ἢ σίνηπι ὑγρὸν ξυῶ
 μελικρήτω. ἐμπάσσειν ὅτι ἐκαστὸν κτ
 ἰεῖδος τῆς ῥίζης, κτ πεπερίος εὐφύλμον.
 αἰτὴρ κτ τὰ δεξήσασα ἴσασα ξυῶ με-
 λιτι διδόναι. ἡ δὲ ἄπυροι ἔωσι δι ἡ-
 μέρης, ἢ δὲ * ἐρηγορῶσι παινυχοί,
 δέος μὴ ὁ ἀνθρώπος μανῆ, καὶ ποικί-
 λων φαρμάκων ὑπνωτικῶν χρέος, ἢ
 μὴ ἐν διδῶ ἢ νεσος, ὅπως κτ τὸ τα-
 λαιπωρίῳ ὁ τῶ φαρμάκων καιρὸς
 εὐνάση. τὰ πολλὰ γὰρ γίνετ) καρῶ-
 δεα. ἡ δὲ ἐν ἀκμῇ τῆς πνιγῶς, κτ ὑπὸ
 τῶ ὀλέθρῳ φάρμακον διδῶς, θανά-
 τος αὐτοῦ εἰς τῶσπερ τοῖσι δημότοι αἰπῶ.
 χρεῖ κτ τὰ σπία ἴκελα ἐμύδραι, δρι-
 μεία, λεπτά, διαλυτικὰ παχέος,
 σμηγματώδεα λαχάνων πύσσον, ἢ
 κορωνόπερ, ἢ κνίδη, ἢ κρέμνη ἐν ὄξει
 ἐψηθεῖσα. αὐσηρὸν ὅτι πύσσαν, ὁ χυ-
 λὸς τῶ ὀλεγάνε, ἢ ὑσώπερ κερσλα-
 βῶν, ἢ δὲ πεπερίος κτ λίτρε πλείον αἰ-
 πὶ τῶ ἀλῶν. χόνδροι ξυῶ μελικρήτω
 κατέφθοι. ἀφύσα ὅτι πάντα ἐν τῆ ἐ-
 ψήσῃ ἔσω. κακὸν γὰρ ἀειπυδμονι-
 κοῖσι φύσαι. οἶνος ποτόν, ἢ ἄπυροι
 ἔωσι, μὴ πολλόν πτ σύψιος ἔχων.
 πυκνωτικὸν γὰρ σωμάτων ἢ σύψιος. χρεῖ
 δὲ τετέοισι ἀραιουῶ μὲν τὰ μέρεα
 μάλλον. πολλόν ὅτι ἀγνήλα πύελα. τῶ
 ξύμπαν ὅτι ὀλίγον ἔσω ποτόν. πνεύμο-
 νι γὰρ τέγξις κακόν, οὐνεκεν πνεύμων
 ἀπὸ σωμαχῆς ἔλκει κτ κοιλίης. θώρηξ
 ὅτι ἐσκεπὰ δῶ εἰρίοισι ξυῶ λίπαι κτ λί-
 τρω, ἢ ἀλσί. ἀριστον ὅτι χρεῖσμα τῶ δια-
 τῶ * λημνίσιδος. σίνηπι ξυῶ ξυῶ κη-
 ρωτῆ ὑγρῆ, κτ τὸ ξύμπαν ἔξω ἀγνή,

ἢ ἐρηγορῶσι
παινυχοί.

ἢ λημνίσιδος

Propinetur quidem celeriter iuuanti
 di causa nitrum cum hyssopi deco-
 cto, aut muria cum aceto & melle,
 aut sinapi humidum cum mulla. Sin-
 gulis autem iridis radicem & piper
 inspergere aucto bene cedit. Item
 hæc arida cribrato, & cum melle exhi-
 beto. Quod si interdium insomnes
 sint, & noctem quoque totam perui-
 gilent, ne hominem furor corripiat,
 metus est: variisque somnificijs me-
 dicamentis, nisi ægritudo remittat,
 uti decet: quò medicamenta in tem-
 pore data morbi acerbitàtem leniant
 & obtundant. Multa uerò sopori-
 fera sunt. At si in strangulationis
 impetu, jamque aduentante interitu
 medicamen præbeas, apud tuos con-
 tribules mortis ejus autor appellaberis.
 Alimenta pariter eiusmodi esse
 debent, acria, uidelicet tenuia, cras-
 situdinem dissipantia, extergendi que
 facultatem habentia. Inter olera por-
 rum, aut cornicis pes, aut urtica, aut
 brassica in aceto incocta. Inter fru-
 mentacea uerò ptisanæ cremor, pa-
 rum origani, aut hyssopi, nec non pi-
 peris, sed plus nitri loco salis accipi-
 ens. Alica præterea mullæ incocta
 prodest. Omniaque per elixationem
 flatum abijciant: flatu enim
 uomica pulmonis laborantibus in-
 festi sunt. Vinum, si febrè uacant,
 quod haud ita multum adstringat,
 potui detur: quippe densat corpora
 adstrictio. Illis uerò membra potius
 laxanda sunt, sputique educationi stu-
 dendum. Sed in totum potus mô-
 dicus esto, cum pulmôni madefactio
 inimica sit: quoniam à gula atque
 uentriculo trahit. Thorax autem la-
 nis oleo imbutis cum nitro, aut sale
 contegatur. Optima inunctio est ea,
 quæ ex adafce fit. Sinapi etiam ari-
 dum & cum cerato humido prodest.
 Atque in summa & humores & ca-
 lor, & spiritus foras educendi sunt.
 Huic



Huic rei opitulantur actium olfactus atque illitio, & extremorum deligatio. Hæc facienti nisi morbus cedat, de hominis ualitudine actum est.

καὶ ὑγρα, καὶ θερμασίω, καὶ πνεῦμα. δὴ γὰρ καὶ ὅσφρησις δριμέων, χεῖρες, ἀκρων δεσμός. τὰ δ' ἐμὲ τοι ποιεῖον, π, ἡ μὴ εἶκη ἢ νοῦσθ, ἀνέλπιστος ὁ ἀνδρωπος.

DE SANGVINIS
rejectionis curatione.

Caput II.

Omnes sanguinis effusiones haud mite uitium sunt, non modi solum ratione, ut si per fracturam, aut erosionem, uerum etiam si per rarefactionem effunditur. Neque si ex pectore, aut pulmonibus, aut stomacho, aut jecore fertur, periculosum est, è capite uerò si defluit, minorem noxam affert: sanguinis enim exitus est: sanguis autem omnium est alimentum, omnium calor, omnium color, terroremque incutit, sanguinem ab ore utcumque manantem intueri: malumque est, si à primario uiscere: pejus uerò si ob fracturam, aut erosionem profunditur. Huius itaque uitij Medicus ad operendam maturet necesse est. In primis quidem aërem frigidiorum ad respirationem deligito, conclaue non titubans, cubile firmum, quò nullam in partem quatiatur, inhabitet: concussiones enim malum exasperant, stratum solidum, haud multum cedens, neque profundum, neque calidum esto. Positus figura uic corporis erecta sit. Ne sermocinentur, nec uer sermones audiant. Animi absit perturbatio, sed contra oblectamentis leniatur: siquidem id genus ægrotos magna animi consternatio corripit. Quis enim uomens sanguinem mortem instantem non perhorrescat? Igitur si sanguine referti sunt, & uenas prominentes habent, in qualibet sanguinis profusione uenam pertundito. Nam siue ex fractura, siue ex erosione profluit, sectio uenæ conducit. Sin rarefactio in causa est, ne multitudo uenam effringat, metuendum. Cædenda autem est caua in cubito uena.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙ-

ματος ἀναγωγῆς.

Κεφάλ. 6.

Πᾶσαι δὲ ἀναγωγῆς αἵματος ἐκ ἐνθέτες, εἴτε τρεῖς μῶνον, ἢ ἐκ ῥήξιος ἢ διαβρώσιος, ἀλλὰ κῆν δρῶσις φέρεται, εἴτε ἡ δὲ πὸ θώρηκος, ἢ πνεύμονος, ἢ στομάχου, ἢ ἥπατος, τῶ κινδυνωδέων. ἀλλὰ κῆν δὲ πὸ κεφαλῆς ἢ αἰνεσέρεται αἵματος γὰρ ἡ φορῆ. αἷμα δὲ πάντων τροφή. πάντων δὲ θερμῶν, πάντων δὲ χροῖν. καὶ φοβερὸν μὲν ἰδεῖν διὰ σώματος ὀκωσοῦν ῥέον. κακὸν δὲ ἦν τε δὲ πὸ σπλάγχνου καμεία. κάκιον δὲ, ἡ δὲ ἐκ ῥήξιος καὶ διαβρώσιος. χεῖρ ὧν τὸν ἰητρὸν εἴπαθεος ξυνεπείγην μάλλον δρῶντα. καὶ πρῶτον μὲν ψυχρότερον αἰρέεσθ' ἕρα εἰς αἰαπνοῖν, σηκὸν Ἰπίπεδον, κλίνω ἐδραίω ὀκωσ μὴ δὲν σείη. ἐρεθιστικὸν γὰρ αἰσείσιες. κοίτη δὲ σερεῖ, μὴ κάστα εἰκασα, μὴ δὲ βαθεῖν, ἀθερμος. ὄρθιον δὲ τὸ χῆμα. ἢ συχὴν λαλιῆς ἢ ἀκασμάτων. ψυχῆς ἀταραξίη, εὐθυμίη. πάγχυ δὲ τῆσι τέλεισι ξυνομαρίεθ' δυσελπισίη. τίς γὰρ ἐμέων αἷμα, θάνατον ἐκ ὀρρωδέθ. ἢ ὧν πολύαιμοι καὶ ἐπίφλεβοί εἰσι. ἐπὶ πάση ἰδέη ἀναγωγῆς τάμνειν φλέβα, ἢ ἢ γὰρ ἐκ ῥήξιος, ἢ διαβρώσιος, εὐάεμοςος φλεβολομίη, ἢ ἢ ἐπ' ἀραιώσι, δέος μὴ δὲ πορρήξῃ τὸ πλῆθος. τάμνειν δὲ τὴν ἐπ' ἀγκῶνι * κοίλην. εὐροόν



εὔροόν τε γδ τὸ αἷμα τῆσδε. ἢ κα-
 ταχά ζεωδὲ ρηίδην, ἢ ἐς πλεῦνας ἡμέ-
 ρας ῥέειν ἀσπένως εὔσομος. Ἐπιπᾶσι
 ὃ παύτων ὡς ἔπος εἰπεῖν τῷ καμείων
 * αἵματα. ἀσπλάγχων ὁδὸς ἦδε * αἵματι
 ἢ ὃ ἀνωτέρω τῆσδε ἢ ἦδε, δισπαχίδες
 ἕασι μῆς τ' ἀπὸ τ' βραχίονος αἵ-
 φω. ὥστε ἐδένα μείζον ἢ ἀνωτέρω τ'
 * μέζης ἐς ὄνησιν ἴχει. αἰδύριες γδ τῷ
 * μέσης. δισπαχισίων ὅσοι σομάχω καὶ ἥπατι
 ξυνηψαν τὴν αἷω. ἢ ὃ ἀπὸ πνεύ-
 μονος ῥέει, τὰ μνην τ' ἄριστοῦ χερὸς
 τὴν μέσην δακτύλων μικρῶ τε καὶ
 ὡδραμῆσ. τὴν δε γδ τῷ ἰητρῶν μελε-
 ξέτεροι δοκέουσι ἐπὶ ἀσπλήνα κραινῆν.
 ἀτὰρ ἢ ἦδε τῷ ἐπ' ἀγκῶνι τ' κάτω
 ἐσὶν ἢ ἀπὸ χρισίσι. τῶν πλέονι ὡδρῶ
 τρισὶ δακτύλοις, ἢ μὴ ἐπ' ἀγκῶνι
 τὰ μνην πῆσ αὐτέην. μείζων γδ τῆσδε ἢ
 εὔροος. τὸ ξύμπαν μὲν ὦν ὡδρῶ
 λειποθυμίας ἔπιχῆν. ἀτὰρ μηδὲ
 πολλὸν ἀφαιρέειν. ἰκανὴ γδ ἢ ἢ αἵ-
 μορραγίη γυῶσαιλὸν ἀνδρωπον. ξυ-
 νεχῆς ὃ ἢ ἀπὸ σμικρῆς ἀφαιρέσει
 ἐπαφαιρέειν, ἢ αὐτῆμαρ, ἢ τ' ὕσε-
 ραίης, ἢ ἔπι τ' ἄλλης ὕσερῆς. ἦν δὲ ὁ
 ἀδενέων ἰχθὺς ἢ λείφαμος ἔη, μὴ
 τὰ μνην φλέβα. τὰ δὲ μὲν ὦν ἀμφὶ
 ἀφαιρέσειος αἵματος. ἀρῆγειν ὃ καὶ
 δεσμοῖς ἀκροῖσι ποδῶν μὲν ὡδρῶ
 σφυρα, ἢ γένατα. χερῶν δὲ ὡδρῶ
 καρπὸν ἢ βραχίονα. ταμνίη πλατεῖ,
 ὄκως ἢ διάσφυγξίσι κραταμῆ μὲν ἢ,
 ἀλγος ὃ μὴ φέρη. τῶσι ὃ αἵμορρα-
 γέσι χωρεῖσι ἐπιβάλλειν χερῶν, ἔρια
 μὲν * πινόντα οἰούπω ἀπὸ τῆσ οἴος.
 τὲ γγάν ὃ χυμῶ, οἶνω αὐστρεῶ, ἢ ρο-
 δίνω, ἢ μυρσίνω λίπαι ἢ ὃ ξυνεπήγη

Etenim ex hac facile sanguis effluit,
 & ipsa sectioni exposita est: utque per
 plures dies sanguis innoxie decur-
 rat, commodè aperta servatur. In
 omnibus autem omnium (ut ita di-
 cam) præcipuorum viscerum hæc
 est sanguinis via. Vena utique hac
 superior, nec non & hæc unius in
 brachio uenæ ambæ propagines sunt.
 Quare nihilo plus superior, quàm me-
 dia emolumenti affert. Nam propa-
 ginum ignari sunt, quotquot stoma-
 cho & jecori superiorem uenam co-
 pularunt. Sin è liene sanguis fertur,
 sinistrae manus uenam illam, quæ
 inter minimum annularemque di-
 gitum sita est, rescindito: quando-
 quidem Medicorum nonnulli eam
 ad lienem usque pertinere arbitran-
 tur. Verùm & hæc ipsa intercubiti
 uenas inferioris propago est. Cur
 itaque potius eam quis propè digitos,
 quam in cubiti curuatura rescindat,
 cum hoc in loco amplior sit, & ad efflu-
 xum habilior? Prorsus quidem ante
 animæ defectum sanguis cohiben-
 dus est, atque haud ita multus aufe-
 rendus: nam & ipsa cruoris per os
 effusio satis hominem labefactare
 potest. Assiduè uerò post paucum
 detractum sanguinem iterum detra-
 hito & eodem die, & postridie, nec
 non perendie. At si ægrotus tenuis,
 & inops sanguinis sit; uenam ne scin-
 dito. Hæc de sanguinis missione
 abundè sint. Succurrendum est etiam
 extremorum deligaturis, pedum qui-
 dem supra malleolos & genua, ma-
 num uerò supra brachiale & cubi-
 tum. Fascia ipsa lata sit, quò sit ua-
 lidior, neque dolorem moueat con-
 strictio. Nempè locis, unde sanguis
 erumpit, lanas ouium succidas im-
 ponito, & humore perfundito,
 ut pote austero uino, & roseo aut
 myrtino oleo. Si cruoris effluuium
 urget;

* αἵματα.

* μέσης.

* πινόντα
ὡσώπω.

πθ



urget; lanarum uice spongiæ ad-
 mouendæ sunt; & pro uino acetum
 infundito, locumque myrtino sub-
 ungit. In omnibus autem spon-
 gijs acaciæ, aut hypocisthidis, aut
 etiam aloës succi aridi sint. Opti-
 mēfacit & omphacium aceto liqua-
 tum. Quòd si irrigatio sordida sit,
 ægreque feratur, emplastris uti con-
 ueniet: eutim enim circumtendunt,
 ac ueluti manu corripunt, quin eti-
 am ipsorum facultates refrigerare,
 exiccareque magnopere ualent. In-
 finitæ uerò aliæ alijs experimento
 cognitæ uires insunt: sed optima em-
 plastra ac tutiora sunt, quæcunque
 acetum habent; & salicis foliorum
 succum, nec non & bitumen, & æru-
 ginem, & alumen, & thus, & myrrham,
 & æs uisum, & æris squamam: at-
 que in summa quæcunque huiusmo-
 di emplastra sunt; emplastris sordi-
 dæ lanæ, aut spongiæ pauco aceto
 perfusæ superduntur. Sin emplastro-
 rum distentionem ferre nequeunt,
 id genus epithema facito. Palmulæ
 pingues nigro uisio austero macera-
 tæ ad mazæ, id est, placentæ crassitu-
 dinem conteruntor: postea acacia
 trita, & malicoria insperguntur, hæc
 omniâ panniculo trito ac ueteri illi-
 ta pectori inducuntur. Item polen-
 tam uino aut aceto perfusam, nec
 non lentis farinam tenuem per in-
 cerniculum transmissam cerato ex
 unguento rosco facto excipiens im-
 ponito: cum quo & symphyti radi-
 cem tusam & cribratam admisceto.
 Aliud epithema hæc recipit, Pruno-
 rum Damascenorum, quæ Brabylla
 Græci uocant, agresium radices in
 aceto incoquito, ad speciem placentæ
 contundito, ac rhoi, commis, myrti
 paulum misceto. Ex his utique alia
 alijs, prout medicaminum efficacia,
 lenitate, odore opus est, miscenda
 sunt: siquidem & ægrotantibus gra-
 tificari decet. Hæc nimirum exterius

ἡ αἰμορραγία, ἀντὶ μέρους τῆς ἐργασίας
 ἀπόγγοισι χρέεαδς ὄξει ἢ ἀντὶ οἴνου
 ὑποαλειφέντω ἢ μυσσίνω τὸ χωρί-
 ον. Ἐπιπᾶσι ἢ τοῖσι ἀπόγγοισι τὰ
 κακίης, ἢ ὑποκυσίδος ξηρῶν τῆς χυ-
 λῶν, ἢ καὶ ἀλόης. ἀεισον δὲ καὶ τὸ ὀμ-
 φάκιον ὄξει λυθέν. καὶ ἢ τὴν τέγγεις ἀ-
 σπρον ἢ καὶ δύσφορον, ἐμπλάσροισι
 χρέεαδς καὶ γὰρ τὸ δέγμα ἀελεῖναι, καὶ
 οἶον τῆς χερσὶ κραλεῖσαι. ἀταρ καὶ ἀδυ-
 νάμεις αὐτέων * ψύξαι καὶ ξηρῆσαι
 δυνατώτατα. μυρία ἢ καὶ ἄλλοισι ἄλ-
 λαι πείρη ἕασι πτωαί. ἀεισαι ἢ ὀκό-
 σαι ὄξος ἰχθυσὶ καὶ ἰτέης φύλλων χυ-
 λὸν, ἢ ἢ καὶ ἀσφαλτον, καὶ ἰόν, καὶ συπλη-
 ρίνην καὶ λιθανῶτον, καὶ σμύρνην, καὶ χαλ-
 κὸν κεκαυμένον, καὶ λεπίδα, καὶ ὀκόσαι
 τοιαῦτα ἐπὶ τοῖσι ἐμπλάσροισι, ἢ ἕρια
 τα * πινόεντα, ἢ οἱ ἀπόγγοι ἐν βραχέει
 δδθέντες ὄξει. καὶ δὲ τὴν τάνυσιν τῆς
 ἐμπλάσρων μὴ φέρωσι, Ἐπίθεμα
 ποιέειν. φοίνικες οἱ πίνες ἐν οἴνω μέ-
 λαντι αὐσηρῶ δδθέντες, ἐς μάζαν
 τριβόν. Ἐπειτα ἀκακίη ἐμπάσεται
 λείη, καὶ σίδα. ἐγχειδέντα ἢ ἐς τεύχι-
 ον, καὶ Ἐθώρηκος πθέ. ἀλφιτα οἴνω ἢ
 ὄξει δδθέντα, ἢ ἢ φακίης ἄλιτον λεπ-
 τὸν, κρησέρη σεσοσμρόν, κρηωτῆ ρο-
 δίνω μύρω ἀναλαμβάνοντα πθέναι.
 μίσγεν ἢ καὶ συμφύτε τὸ ρίζης σεσο-
 μρήης. Ἄλλο. * βραβύλων ἀγρίων ρί-
 ζας ἐψέιν ἐν ὄξει, καὶ τριψάντα ἐς μά-
 ζαν, ἀδραμίσγειν ῥοός καὶ κόμμιός, καὶ
 μυσσίνης βραχύ. τῆς δὲ μύρτι γε
 ἄλλα ἄλλοισι συμμίσγειν. ὅπως αὐ-
 ἰχθύος τὸ τῆς φαρμάκων καὶ πρσοσνεί-
 ης καὶ ὀσμῆσος δέη. καὶ γὰρ καὶ τοῖσι
 κάμναι * χρεῖσαδς. ταῦτα μὲν ἐκ τὸς
 δέτα

Q δέτα



θεία ἀκνηή ἢ τῆ δὲ καιριώτερη ἰησις,
 ἐν τοῖσι ποτοῖσι καὶ καταποτοῖσι κέει,
 ὡς ἀγχισα. τῆ τετραμύρων εἶη τὰ
 φάρμακα. πεισῆ ἢ τείλων ἢ ἰδίση, ἢ
 τὰς ὀχέλεις τῆ * ῥοῦ δῆσαι ξυναγω-
 γῆ καὶ πῆσι τῶν ἀγγείων, ἢ τῶν ῥέον
 παχύναι τε ἐπιξῆσαι ὡς μὴ διαρρέη,
 κἢν ὡς ἀπέμπωσι οἱ ὀχετεῖ, ἢ ξηρη-
 ναί τὰς ἐφόδους πρὸς ἐδρῶν τιῶν δε-
 χαίνν τὸ αἷμα σῆσαι, ὅπως μὴ τῆ
 ἐπιρροῆ κενεόμυροι οἱ χῶροι παρο-
 μύρωσι. πλημμυρῶσι ἢ ἔνθα ἢ ξυώ-
 διοσι. Ἰπὶ μὲν τῶν δρασίων τῆ
 φλεβῶν, ἢ σύψις δρασίου. * διαρρέει
 γὰρ ὡς ἰδρῆιον νέον ἔθεν τῆσι δρασί-
 σεσι. ἀτὰρ ἢ δὲ Ἰπὶ τῆσι διαρρέεσι,
 σύψις μὲν ἰπτερίης τῆ ξυναγω-
 γῆν τῆ χειλέων. μέζοσι ἢ καὶ δυνατώ-
 τέροισι τοῖσι φαρμάκοις χερείας. ἢ
 ἢ ὅτ' διαβρώσιος ἐπὶ τρέπος, καὶ μὴ ξυ-
 νάγηται ὑπὸ τῶν σύψις ἢ ἔλκεος τὰ
 χεῖλεα, σπασση ἢ τῶν τρωμάτων, ἀξύμ-
 βατην ὅκ τ' διαθλίψις ἐόν, πάγον
 χεῖ τῶν αἵματος. ἀτὰρ ἢ δὲ τῆς θέρμης
 ποιέειν. ἀκνησῆ γὰρ τῶν δὲ καὶ πῆξει
 ἰσα) ὁ ῥοῦ. ὅξυ κρητην μὲν ὦν τοῖσι
 δρασίοισι ἰκανὸν ἐς σύψιν. ἔδὲ γὰρ ἢ
 αἷμα ἀκρητὸν ἐστὶ τῶν ῥέον, ἀλλὰ τοῦδε
 ἰχώρ δια σμικρῶν τῶν σωμαίων. καὶ
 τὰ δὲ ἔ πολλὰ, ἔδὲ πολλάκις χερείας.
 μετεξέτεροισι ἢ καὶ ἢ ἔξωθεν ἰπτερίη.
 ἀτὰρ καὶ φοινίκων, ἢ κερράτων ἐδωδι-
 μων ἔψημα παθεν μένον ἢ ἔκασε,
 ἔσω δὲ τῶν ὄξος, οἴνων μὲν τῶν συφόν-
 των τῶ γενεῖ, εἰ μὴ φαρμακίη δὲ
 ἀλλὰ τῶ χροῶν δριμύτε καὶ συφον.
 ἐπὶ ἢ τῆσι διασάσει τῶν τρωμάτων
 ὡς τῶ ὅξυ κρητῶ ἔσω φάρμακα

applicanda remedia funto. At his,
 presentior medela in potitionibus de-
 uorandisque consistit, ut proxi-
 ma uulneratis partibus medicami-
 na sint. Porro triplex istorum for-
 ma est, ut uel fluxionis ductus li-
 gent, cogendo uascula & compri-
 mendo: uel defluentem humorem
 crassum compactumque efficiant;
 quò licet transitus pateant, ne de-
 stillent, uel exiccent incurfus in sede
 antiqua sanguinem retinentes; ut
 ne effluuio loci exhausti ita perman-
 eant, exundatioque ibi sit, quò facta
 est effusio. In uenarum quidem
 rarefactione adstricchio satis est; ipsi
 nanque ceu situla noua imbecilla
 in rarefactionibus persuunt. Diui-
 sionibus uerò, ut labia committan-
 tur, adstricchio quoque medetur: sed
 maioribus ualentioribusque medi-
 camentis utendum. Verùm enim
 uerò si sit erosionis modus, neque
 per adstringentia ulcers oræ cogan-
 tur, sed uulnus dehiscat, neque ex
 compressione in unum redire ualeat;
 sanguinem atque calorem congela-
 re necesse est. Nam istorum im-
 mobilitate concretioneque proflu-
 uium coercetur. Postea igitur rare-
 factis adstringendum satis est: neque
 enim sanguis effluens purus est, sed
 ipsius sanies per ostiola parua
 dilabitur. Atque huiusmodi postea
 neque adeo multa, neque frequenter
 egemus. Nonnullis & exterius ad-
 mota remedia abundè fuerunt. Quin
 etiam palmularum, aut siliquarum
 esculentarum decoctum potui da-
 tum solum quosdam liberauit. Est
 autem acetum ex uini adstringentis
 genere, quod si non medicatione,
 tempore saltem acre adstringensque
 cuaferit. Verùm in uulnerum dilata-
 tionibus præter posteam medicamenta

primum



primum simplicia adhibeantur, ut plantaginis, aut sanguinalis herbae, aut feridis succus singulorum portio aqua cum posca: quod si adhuc plus effluat, hypocisthidis, aut acaciae siccorum cujusque pondus drachmam in tres poscae cyathos inspergito. Optimè uerò facit & uuae acerbae succus. At si calamitas haec semper in pejus irritetur, gallam tritam, & rubi radicem arefactam, & lapidem ex mari, Corallium quod uocant, aridum tumsumque conspergito. Verum rhei radix ad refrigerandum, siccandum, adstringendum, omniaque facienda his efficacior est. Sed haec quoque cum posca sola praebetur. Sin auxilia maiora requiruntur, radiis huius pondus tres obolos, feridis atque plantaginis succis, qui trium aut quatuor cyathorum mensuram compleant, iniicito. In erosionibus autem prorsus astrigentia adhibere tenta: quò dilabentem sanguinem concretum, compactumque reddas, & suscipientia membra constringas: ut procul à uulnere uenae concidant, & occludantur. Quin etiam quae bibuntur, tenacia sunt, concretionem efficere ualentia. Succum igitur coriandri ex aceto propinato: item & leporis, aut inuli, aut haedi coagulum. Sed multum ne concedito: nam istorum aliquod nonnunquam plus, quam conuenit, datum, hominem iugulauit. Coriandri quidem succi ne minus semicyatho cum tribus poscae cyathis praebetur: coaguli uerò tres oboli, summum quatuor. Adhuc huiusmodi floris sanguinei speciebus & terra samia efficaciter subuenit, & cretrias, & aster quae uocatur, ualde candida, & rubrica sinopica, & sigillum lemnium. Istorum pondus

ἀπλάττω πρώτῳ, δρυνογλώσσου
χυλὸς ἢ πολυγόνου, ἢ σείριδος ἐ-
κάστῃ * μοίρῃ πρὸς τὸ ὄξυκρήτω. ^{μοίρῃ}
ὡ δ' Ἰπὶ μάλλον ῥέη, ὑποκυστίθου ἢ
ἀκακίης * ξηρῶν ἐμπάσειν, ἐς γ'
κυάθους τῆ ὄξυκρήτε ὀλκῆς, τῆσδε
δραχμῶν μίῳ. ἀείσος ἢ χυλὸς
ὄμφακος ἢ ἢ κρέσσον ἢ ξυμφορῆ ἢ
δε γίγνη). κηκίδα λείῳ, καὶ βάτε
ρίζαν ξηρῶν, καὶ λίθον * τὸν ἐξ ἀλός
κεράλλιον λείῳ ξηρῶν, ἐμπάσ-
σειν. δυνατωτέρῃ δὲ τῶνδε τὸ
ρίον ἢ ρίζα ἐμψύξαι, ξηρῶναι, σύ-
ψαι, τὰ πάντα ποιῆσαι. ἀτὰρ κῆ δὲ
ξυῶ τῷ ὄξυκρήτῳ μένω. ὡ δ' μεζόνων
δρῆγειν χρέε, τῶσι χυλοῖσι τ'
σείριδος ξυῶ δρυνογλώσσῳ τῆς ρίζης
ἐμπάσειν, ὀλκῆς τριώβολον ἐς κυά-
θους τῆ ὑγρῆ πρὸς ἢ τέσσαρας. Ἰπὶ
δὲ τῆσι διαβρώσει τότε ὄλως ἐνέ-
κείνη σύψιν ἐμποιέειν ἐς πάγον τῆ
διαρρέοντος αἵματος, καὶ τοῖσι δεχο-
μύροισι ὅπως ἀπὸ πολλῆ τῆ τρώμα-
τος μύωσιν αἱ φλέβες. ἀλλὰ καὶ
τὰ πινόμενα ἐσω κραταῖα, δυνατὰ
ποιῆσαι πάγον. χυλόνων κορυάνε
ξυῶ ὄξει, ἢ δὲ λαγοῦ * θαμισός, ἢ ^{μοίρῃ}
νεβρῆ, ἢ εἰδου, μὴ πολλὸν δὲ δειδόναι.
ἐκτενε γὰρ κοτε τετέων πὶ τῷ
πλήθει. ἀλλὰ τῆ μὲν χυλῆ τῆ κορι-
άνου, μὴ μείον μὲν ἢ μικύαθον ἐς
πρὸς τῆ ὄξυκρήτε. τῆσδε θαμισῆ,
ὄβολοι μὲν πρὸς, τὸ δὲ πλείστον ὄβο-
λοι δ'. ἐς ἢ τὰ τοιάδε εἶδεα τ' φορῆς,
καὶ γῆ δρῆση σαμία, ἢ ἐρετριας, ἢ
αἰσῆς καὶ τα λουκός, καὶ σινώπης καὶ
σφραγίς ἢ λημνίη. τετέων δὲ ὀλκῆ



σαθμᾶ τ' ἄριον, σα. τρεῖς δὲ τ' ἄριον
 σον, ξυῶ πνὶ τῷ ἐψημάτων φοινί-
 κων ἢ * κερατίων ἐδωδύμων, ἢ ῥιζῶν
 βάτων. λυ δὲ τσηχύνῃ) ἢ δρμεῖν, κῆ
 ἔπι τὰ δὲ ἐθόση, σιραῖω τῷ κρηπὶ ἐμ-
 πάσσειν τῷδε. * ἄριστος ἐς λείωσιν
 δρμεῖν κῆ ἀμυλος ξυῶ τῷσι δλυ-
 θείσ. ξυῶ γδ τῷ λείω κῆ τ' παγερόν
 ἴχει. λυ μὲν ὧν ξυωπέειν ἢ φορη,
 ἀπαξ τ' ἡμέρας πρὸ τῆς πρὸσάσει-
 ος ἰσοτέον. λυ δὲ μῆ, κῆ δὲ κῆ τριτὸν
 ἐς τὴν ἐσπέριν. ἐκ τῶν φαρμάκων κῆ
 καταποτῶ ποιεῖν ξηρῶν ἐν μέλιτι
 ἐφθῶ ἐς σύσασιν, κηκίς λείη. ἄριστον
 τῆ ῥοδὸς ἐς τῷ ὄψα, γίγαρτα, κῆ ὀ-
 ξυλαπάθια καρπὸς, κῆ * ἰδίη ἐκάστῃ
 κῆ ξυῶ. τὰ δὲ μὲν κῆ ὑπὸ τῆ γλώ-
 σση ἔχειν ἐς τὸ διλυκέσ τ' σιωπῆξιος.
 ἀτὰρ κῆ * κόμμι ξυῶ τῷ φυτῷ, κῆ
 * πρᾶσον, τ' ἀκάνθης τὸ δάκρυον.
 ποικίλων τῶν φαρμάκων, μυεῖν μὲν
 ἢ πείρη, ποικίλων τῶν κῆ κρησῆες τσο-
 χίσκων τ' δια τῆς αἰγυπτίας ἀκάν-
 θης, κῆ ἑτέρες τ' δι' ἠλέκτες, κῆ ἄλ-
 λες τ' κροκάθεις, ὡς ἡ σκευασίη ἰδίη
 λέλεκ'. ἀνθ' μὲν ὧν πυρεθίων, ἀπαν-
 τα τολμέειν ἔπι τῷσι φαρμάκοισι, κῆ
 πολλὰ κῆ πολλὰκίς διδόντα. ἢ τ' ἐπι-
 πυρεθίων. τὰ πολλὰ κῆ τῷσι φλεγ-
 μασίησι τῷ * κρωτῶν γίγνον) πυρε-
 τῷ. μήτε ἀθρόον ἴχειν τὸ φορῶν,
 μήτε ἐν τῷσι παροξυσμοῖσι φάρμα-
 κα πιπίσκιν. πολλοὶ γδ ὑπὸ πυρετῷ
 θάσσειν ὄλλυν), ἢ * ὑπὸ τ' ἔσμάτος
 φορη. τσοφῶν ποικίλων, κῆ τὸν ἰδέ-
 λω ὀκοῖα τὰ φάρμακα. ἀτὰρ κῆ
 τὰ φάρμακα ἐν τσοφῆ. ἔτε γδ ἔπι

* κερατίων.

* ἀριστον.

* ἰδίη.

* κόμμι.

* πρᾶσον.

* κρωτῶν.

* ὑπὸ.

minimum drachma; maximum
 drachmæ tres cum decocto aliquo
 præbeatur: ut palmularum, aut si-
 liquarum edulium, aut rubi radi-
 cum. Sin arteria exasperatur, pro-
 ptereaque tussiant, in eretica sapa
 idgenus terræ inspergantur. Egregiè
 ad arteriam leniendam & amyllum
 facit: id genus humoribus profu-
 sum: nam cum læuote & glutinan-
 di potestatem habet. Si profusio
 sanguinis urget; semet in die ante
 cibi assumptionem dandum est: sin
 minus, & secundo & tertio sub ue-
 speram. Ex medicamentis quoque
 siccis catapotia fieri possunt ex mel-
 le ad consistentiam decocto: qualis
 est galla trita. Optimus est etiam
 rhous, quo in obsonijs utimur, uina-
 cea, acuti rumicis semen, per se sin-
 gula & simul omnia. Hæc utique &
 sub lingua ad perpetuam eliquatio-
 nem habenda sunt. Gummi etiam cum
 planta porrum, spina lachryma. Vario-
 rum sanè medicamentorum infini-
 ta est experientia, uarij etiam usus:
 ut pastilli ex Egyptia spina, & pastil-
 li ex electro, & ejus, qui croceus ap-
 pellatur, quorum apparatus proprio
 loco expositus est. Porro cum fe-
 bris abest; omnia in medicamentis
 audenda sunt, & multa & multoties
 exhibenda. Si febre accedente uexantur
 (plerunque autem corporum inflama-
 tionibus febres superueniunt) neque
 affatim eruptio suppressenda est, ne-
 que in accessionibus medicamenta
 potui danda: quoniam multi celerius
 febre, quam sanguinis effusio-
 ne consumuntur. Alimenta uaria
 sunt, specieque medicamentis si-
 milia, quin etiam in cibis medica-
 menta reperiuntur. Neque enim in

uno



uno duntaxat cibo omnia alimenti bona inuenire facile est. Atqui si non unus cibus ad medicationem sufficit, non uno propterea uti ob facietatem facile est: sed per uaria eundum: jam enim diuturna ualētudo facta est. Itaque adstringentia sint alimenta, & facultate refrigerantia, & ad tactum quoque frigida esse debent. Calor enim sanguinem prolicit. Alica lota, oryza in posca: sin acetum tussim exasperat, palmularum decoctum: panis assus, præaridus, contusus, atque in farinæ speciem redactus & cribratus: atque ex his omnibus cum oleo sorbitio fiat. Item thymbra sale condita, & rhous cibus aspergatur. Quod si aliqua in re ægrotanti morem gerere placeat, coriandrum, si gratum sit, delectationis causa concedito: aut aliquod ex feminibus urinam mouentibus, faciliemque spirationem reddentibus. Lens utique, si profluuium sanguinis urgeat, cum plantaginis succo præbeatur: si non urgeat, à succo abstineto: quippe qui nec concoctu facilis, neque gustatui iucundus est. Istis uerò minimè omnium ægrè concoctilia danda sunt. At si ob sanguinis effusionem mortem inslare uerearis, tunc in iucunda concoctu difficilia, quin etiam immania sint licet ea, quæ salutem afferunt: propterea galla arida trita lenti sicca & frigida adspargatur: oua coquendo crassiora effecta cum mali punici corio, aut galla exhibeto. Tale utique necessariò in medicamine alimentum est. Potus omninò parcissimus esto: nam sicco uictui humbr inutilis est. Hæc nimirum adhibenda sunt, si adstringere ac refrigerare statueris: si uerò sanguinè ac spiritū crassiorè efficere, lac, amyliū, & alica profunt:

μη μούνη ἀπαντα εἰρεῖν τὰ τροφῆς ἀγαθὰ εὐπορον. ἔτε λω μὲν ἐ μένη ἐς ἰη τρεῖς δὲ ἀρκῆ, μη μούνη χρεεαδς διὰ τὸν κόρον ρηίδιον. καὶ γὰρ κατὰ ποικίλα * εἰκιν. ἦδη δὲ ἀπὸ χροινῶν γίγνεται. ἐσω ὧν σύφρασα καὶ ἐς δύναμιν ψύχρασα. ἀτὰρ ἦδη ἐς θίξιν. θέρμη γὰρ αἵματι & περὶ κλησις. χόνδροι πύλοι, ὄρυζα ἐς ὀξύκετην. λω δὲ τὸ ὄξ & βήχας ἐμποιέη, φοινίκων ἐψημα, ἀστ & ὀπίος κατὰ ξηρ & κοπεῖς, ἦδη καὶ ἐς ἀλίον * σεσσημύδος. ἐς πάντων ὧν (ἦ) ῥόφημα ξυω λίπαι, θύμβρη * ἀλσιν ἠδυν * σισσημύδος. θείσα, ῥόδς ἰππασμα. λω δὲ καὶ χαλίσσα δαί π κάμνον π ἐθε- * ἀλσιν. λης, κορίανον ἐσω ἐς ἠδρον λω ὄτω φίλον, ἦ π τῷ οὐρητικῶν ἠδὲ εὐπνῶν σπερμάτων. φακὸς ἦν μὲν ἠ αἰμορραγίη ἐπέγῃ, ξυω δὲ νογλώσ & χυλῶ. ἦν δὲ μὴ, τῷ χυλῷ ἐσω φειδῶ, ἐ γὰρ εὐπεπτον, οὐα δὲ περσόνες ἐς γεῦσιν. χρεῖ δὲ τετέοισι ἦκισα πάντων δύσπεπτον διδόναι. ἦν δὲ ἐξ αἰμορραγίης θάνατον ὀρρωδέη, καὶ ἀτερπές καὶ δύσπεπτον. ἦδη * ἀπηνέα ἐσω τῷ σῶζον τῷ κηκίδος, ἦ δὲ * πρσοσε- * ἀπηνέα. ππασῶ δὲ φακῶ τῷ ξηρῶ καὶ ψυ- * πρσοσεπια. χρῶ, ὠὰ ἐψησει * παχέα, ξυω ροίης * πασιτέθο. σιδοισι ἠ κηκίδος, ἦ δὲ ἐστὶν ὑπὲρ ἀνάγκης ἐν φαρμάκῳ τροφῆ. ποτὸν δὲ τὸ ξύμπαν ὀλίγον ἐσω. ξηρῆ γὰρ διαίτη ὑγρὸν ἀξύμφορον. τριά- * ἀπαχίαι. δε μὲν σύψαι καὶ ψύσαι εἰ ἐθέλεις. ἦν δὲ παχύναι καὶ αἷμα καὶ πνεῦμα, γάλα, καὶ ἀμυλος, καὶ χόν- * δροι.



δροι, ἄλλοτε μὲν ξυῶ ἀμύλω; ἄλλοτε δὲ ξυῶ χόνδρω γάλα. ἐς πῆξιν δὲ ἢ σύσασιν, ὡς μὴ ῥόφημα ὑγρὸν ἢ. ἢ δὲ ἐπὶ μάλλον παχύναι καὶ σύψαι ἐθέλης, οἱ χόνδροι μὲν ξυῶ φοίνιξι * ἐψείδωσαν. ἐς δὲ τιῶ σύσασιν, ἀμυλῶ ἔσω, καὶ γάλα ἀεισον, καὶ * φάρ τὸ τυρρηνικόν, παχὺ ἔον καὶ γλίχρον καὶ κολλῶδες ξυῶ τῷ γάλακτι. Ἰαμισῶ δὲ τῶ ἐξίφει ὑγροῖσι τοῖσι ἐψήμασι πωροεγγχεῖν ἐς πῆξιν, ὅπως ἐπὶ γάλακτι ἐς νέε τύρε ξύσασιν ἴχει. παχύτερον δὲ τετέων, κέγχρος ἐφθὸς ξυῶ γάλακτι ὡς τὸ φάρ, καὶ τὸ ἐπίπασον, ἢ κηκίς καὶ τὰ σίδια. Ἰακμαίρεα δὲ τὰς ξυμμετερίας τῶ ξηραμόντων ἢ παχυμόντων. καὶ γὰρ βηχῶδες αὐτὰ, ὑπερβολῆ τε ξηρόπτος μετεξετέροισι πωροεγγχεῖ τὰς φλέβας. ἢ δὲ πρήσῃ μὲν, ἢ ἢ τὸ αἷμα, ἐς τὰ ναντία ἐκπροσαγωγῆς ἢ μεταβολῆ, καὶ μηδὲν ἀγαν. Φιλόσροφα γὰρ τὰ δὲ κακὴ θεα. χεῖ δὲ σαρκῶν * ἢ δὲ τὸν αἰθρῶπον καὶ τὰς ὠτειλάς ἐς τὸ * πηρόν ἀγιν αἰώσης, ἢ πείψει μαλθακῆσι, πωροδοῖσι, θυμηθῆσι, πωροφῆ ποικίλη καὶ ξυμῆθει. τὰ δὲ μὲν ὡν ἢ ἐκπῆς φορῆς δ' αἵματος τὸ πρῶμα ξυμπέση, καὶ ὁχῶρῶ ὑγαδῆ ἢ εὐακῶς. ἢ δὲ ἐγκαταλείπῃ ἔλκος καὶ διάπυον γίγνη, ἐτέρης μελέτης χεῖος. καὶ γὰρ καὶ * ἐτέρων διαδέχεῃ ἢ φορῆ. πωρο τὸ δὲ μέντοι, ἐν τοῖσι χρονοῖσι λελέξεται.

modo cum amylo, modo cum aliacalac misceto, horum temperatura, ut ne sit liquida sorbitio, ad concretionem perueniat. Caterum si adhuc magis crassare adstringereque cupias; alicam cum palmulis decoquito; ad spissandum autem amyllum lacque optima fuerint, & far tyrrhenum cum lacte: crassum cum sit, uiscidum & glutinosum. Hædi uero coagulum in decocta liquida causa concretionis affundito: sicut in lac quoque, ut ad recentis casei temperaturam deueniat: his crassius est milium, ut far, in lacte decoctum. Inspergantur autem galla & malicorium. Verum exiccantium, aut crassantium mediocritates coniectura assequi oportet: id genus nanque tussim mouent. Siccitatis quoque excellentia nonnullis & uenas lacerauit. Si bene cedit curatio, sanguisque compefcitur; in contraria paulatim adijciendo fiat mutatio, atque (ut dici solet) ne quid nimis. Huiusmodi enim uitia facile reuertuntur, ac maligno ingenio prædita sunt. Iam uero hominem instaurare, carneque replere, & nouas cicatrices solidare necesse est gestationibus, mollibus frictionibus, peregrinationibus, animi oblectamentis, cibis uarijs atque usitatis. Hæc utique facienda sunt, si à sanguinis exitu uulnus coaluit, & congruenter locus sanatus est. Sin ulcus relinquitur, purulentumque fit; altera deliberatione opus est; siquidem & iterum profusio sanguinis redit. Verum de hoc affectu in sermone de diuturnis morbis disputabimus.

ΘΕΡΑ-

DE



Caput III.

διακῶν.

Κεφάλ. γ.

IN syncopa medicum prouiden-
dentia sedulo nauare operam ne-
cesse est : futuram enim si prospexeris, & presentia tibi festinanter opem ferent, & ipsam ante, quam inuadat, propulsabis. Presentem uero non facile euadunt ægotantes. Solutionem nanque naturæ syncopam esse diximus. Instaurabilis autem non est dissoluta natura. Hanc igitur maximè quidem futuram arcere, fin minus, saltem nuper incipienti resistere debemus. Præscienda uero ea sunt, quæ de acutis morbis differuimus, quando & causas, & signa explicauimus. Nam febris ardens initium est: febrem ardentem signa pessima consequuntur, ariditas, uigilia, caliditas uiscerum, qualis ab igit prouenit. Extimæ partes frigeni: manus pedesque extremi frigidissimi sunt: respiratio in attrahendo longa est, siquidem frigidi aëris, quoniam ignem expirant, auidi sunt. Arteriæ motibus exiguis, creberrimis, tremulisque agitantur. Ab his itaque sumta coniectura, & ab alijs, quotquot à me inter signa comprehensa sunt, ipsi ab initio syncopæ occurrendum est. Quapropter nisi hæc omnia impediunt, habitus, ætas, ætatis tempus, hominis timiditas, uena cædenda est. Quod si multa prohibeant, quæ numerum insignem, & magnificiendum constituent, ut puta lingua aspera & sicca & nigra (omnia enim interiora signa noscuntur) in omnibus facultas perpendenda est: nisi prius morbo, doloribus, inedia labefactata sit: siquidem

Εν συγκοπή μάλα χεῖρ τὴν ἰητροῦν
προνοίαν ἐπιτηδύειν. μέλλουσιν
μὴ γὰρ ἐν προγνωστικῆς, ἅτε γὰρ
παρεόντα ἐπεστυμῶως συνεργὰ *ἐ-
νεσω. ἀτὰρ ἡδὲ * εὐξάλαοις ἀν' αὐ-
τήν πρὶν ἠέκιν. παρεῖσαν ὅτι ῥηϊδίως
διδρῆσκαι οἱ νοσευῶτες. λύσιν γὰρ τῆ
φύσις ἰωὺ συγκοπὴν ἐλεξα. ἐπα-
λίωστος δὲ φύσις λυθεῖσα. ἰωὺ δὲ ὧν
μάλιστα μὴ μέλλουσιν κωλύειν. ἦν
ὅτι μὴ ἀρεπὶ δὲ χρομῆν. προγνωστικῆν
ὅτι χεῖρ τῆσι (ἐν τοῖσι ἀμφὶ τῶ ὀξέων
νεσῶν λελεγμῶσι,) εὐτε τῶ αἰ-
πίω, ἀτὰρ ἡδὲ κ' ἐν σημήια * ἐφρα-
ζόμεθα. καύσος μὴ γὰρ ὁ πυρετός
δὲ χεῖρ. ἔπι ὅτι καύσῳ, κάκισα * ση-
μήια, ξηρότης, ἀγρυπνία, θερμοσπῆ
τῶ ἀπλάγχων, ὅπως δὲ πύρετος,
ψυχρὰ ὅτι τὰ ἐξω. χεῖρες καὶ πόδες
ἀκροὶ ψυχρότατοι, ἀναπνοὴ ἐς ὀλκὴν
μακρῆ. ποθέσει γὰρ ψυχρὸν * ἠέρα,
ἐνεκεν ἐμπνέσει πύρ. σφυγμοὶ μι-
κροὶ, πικρότατοι, τρομώδεες. ἐκ τῶ δὲ
ὧν τεκμαίρομενος, ἡδ' ὁκόσα μοι ἐν
τοῖσι σημήιοισι λέλεκ', αὐτὴ δὲ δὲ
χῆς δὲ γὰρ. ἦν ὧν μὴ πάντα κωλύει,
ἐξίς, ἠλικίῃ ὡρη, ἀψυχίῃ τῶ ἀνδρώ-
πε, τῶ μιν φλέβα. κὴν πολλὰ κω-
λύει, εἰς δὲ πύρ δὲ θμὸς ἐπιμαρος ἢ, ὁ-
κοῖον γλῶσσαι τρηχεῖν τὲ κ' ξηρῆ, καὶ
μέλαινα. εἶδ' ὅτι γὰρ εἰσω πάντα ση-
μήια. ξυνηκμαίρεαδ' ὅτι ἐπιπᾶσι τὴν
δύναμιν, εἰ μὴ * προαπνύθηκε ἐκ
τῆς νόσου, πόνων τὲ καὶ διαίτης.

ἰητροῦ
ἐλεξα
ἐμφραζόμεθα
σημήια
πύρ
προαπνύθηκε

εἶδ' ὅτι



οὐδὲ γὰρ ἐστὶν ἐν δειή μῆνον, ἀλλὰ καὶ
 πιγί. καὶ δ' ὑπὸ πλὴθεος γίγνηται
 συγκοπή, καὶ φλεγμασίης πὶ ὑπο-
 χόνδριον, ἢ ἢ πᾶτος μέγα διασημαί-
 νη, καὶ ἀμβολῆς χρέος. ἴσμεν δὲ
 τὴν ἐπ' ἀγκῶν τὴν κοίλῳ. ἀτὰρ
 ἡδὲ διὰ σμικρῆς τμησὶ χάσι
 ἀφαιρέειν, ὡς μὴ σφόδρα τῆ δυνάμει
 ἐπιδηλον ἢ ἐλέγχει γὰρ τὴν φύσιν
 τᾶ ἀφρόον. καὶ πολλόν τι μείον, ἢ δι'
 ἀλλας προφάσις * ἀφαιρέειν.
 καὶ γὰρ ἐπὶ συγκοπῆ καὶ σμικρὸν ἀ-
 μαρτώη, ῥηϊδίως εἰς ἀδ' ἐτρέπει. αὐ-
 τῶν δὲ δόναται τρεφῶ ἐς νεόχμω-
 σιν τᾶ δυνάμειος. γάννυ γὰρ ἢ φύσις,
 καὶ τῆ τῶν παλαιῶν ἀπαλλαγῆ, καὶ
 τῆ τῶν ποταμίων προσηκῆ. ἢν ὅ φλε-
 βοβολίω μὲν ἢ δυνάμεις ἀποτρέπη,
 φλεγμασίαι ὅ ἔωσι, * σκυλῶ τῆδε
 * προσβάλλειν, πολὺ προδέν τ' κρι-
 σιός ἐ νοσήματος. ἐν κρισίμοισι γὰρ ἢ
 συγκοπή. ἐπεὶ τῆσι αὐτέησι * ἀει-
 δοῖσι, αἵτε φύσις κρινεσι, αἵτε νεσοι
 κτείνεσι. κῆν γὰρ ἐς ἀνάγκῳ οἰνοπο-
 σίης ἢ κῆν ὁ ἀνθρώπος, καὶ κάρτα ἀσφα-
 λές ἐπὶ φλεγμονῆσι οἰνοποτέειν. οἰ-
 νος γὰρ φλεγμαίνεσι μὲν πότων ἐπι-
 δοσις. ἀφλεγμάτισι ὅ φύσιος αὐ-
 ξησις, ἐπὶ προδέν ὅ τ' σκυλῶ, προσμι-
 ῆς ἢ δ' οὐτέρης ἐπιπλασιος χρέος. ἐς
 τῆ ἀνεσιν τῶν μερῶν, ἀτὰρ ἡδὲ ἐς
 εὐρόλῳ ὅ αἵματος. μελεξέλοισι ὅ καὶ
 ἐπὶ * τῆ σκυλῶ, ἐς τὴν δ' οὐτέρω ἐπι-
 πλασι. ἐσῶ ὅ καὶ τῆ δεφειδῶ. κίνδυ-
 νος γὰρ αὐτὸς ὅ αἵματος τ' ἀμετέρις
 ἐπὶ τῆ σκυλῶ. κλυσμοῖσι ὅ ἐπὶ σκυβά-
 λοισι παλαιοῖσι μόνον. χρέος.

αφαιρέειν
 σκυλῶ
 προσβάλλειν
 κρινεσι
 νεσοι
 σκυλῶ
 κλυσμοῖσι

non defectu tantum, uerum etiam
 strangulatu prostrernitur. At ubi
 pra multitudine syncopa fiat, & in-
 flammatio aliqua insignis in praeco-
 rdijs, aut jecinore appareat, nequa-
 quam procrastinare expedit, secan-
 da igitur est uena caua in cubito : per
 minutas sectiones, id est, scarifica-
 tionem etiam sanguis detrahendus
 est, quò facultas haud ita insignem
 jacturam faciat. Copiosum enim ac
 subitum naturam uitiat. Quin eti-
 am multò minus sanguinis, quam
 in alijs occasionibus, hauriendum
 est. Nam in syncopa si uel mini-
 mum erroris committitur, ad interi-
 tum ducit. Protinus igitur ad ui-
 res instaurandas alimentum dare
 conuenit. Natura enim priorum
 repulsa, & nouorum adiectione læ-
 tatur. Vtique si missionem san-
 guinis facultas non sustinet, inflam-
 mationesque infestant, cucurbitula
 tunc multo ante morbi judicatio-
 nem ei admouenda est. In iudicato-
 rijs enim diebus syncopa incidere
 solet: in iisdem uerò circuitibus &
 naturæ iudicant, & morbi interi-
 munt. Si uini potandi necessitas ho-
 mini incidit, diligenti consideratione
 opus est: neque enim usque adeò tuta
 est inflammationibus uini potio, si-
 quidem uini potio inflammatione
 laborantibus dolores auget, inflam-
 matione uacantibus naturæ incre-
 mentum affert, sed ante, quam semel,
 aut iterum cucurbitulam affixisti, &
 ad membra relaxanda, & ad sangui-
 nis facilem exitum utilis est: nonnul-
 lis & post cucurbitulæ secundam affi-
 xionem benefecit. Hoc uerò in casu &
 parsimonia utendū est. Nā & in cucur-
 bitulæ usu nimia sanguinis effusionis
 idem periculum adimus: euacuationi-
 bus autem per clysterem duntaxat ad
 inueterata stercorea eijcienda opus est.



sed facultatis rationem habeto. Capitis irrigationes frigidae quotquot mihi in sermone de phrenitide relatæ sunt, paulum mediocritatem excedentes adhibeantur. Aër mundus, ad inspirandumque frigidior deligendus. Vifus plantarum, picuræ, aquarumque asperu oblectandus: & hæc omnia jucundè suauiterque intuenda. Amicorum præsentium locutiones sint iocularis atque ridiculæ. Summa sit in ægrotantis corpore quies, in animo hilaritas. Odoramenta suauiora, quæ capitis sensum non grauent, adhibenda. Quin etiam grati odoris alimenta naribus offerantur, qualis polenta est aqua aut aceto respersa, aut panis calidus recentissimè coctus. Nempe uino haud copiosè os colluatur, neque prorsus denegetur. Potum frequentiore, quàm alijs, & magis assiduè his concedito. Esca per totum diem sit leuis, concoctilis, plerunque triticea, nec non ægrotanti jucunda, licet paulò deterior: istis enim magis, quàm alijs gratificandum est: quandoquidem haud minimè ad stomachi resolutionem id morbi genus aptum est. Inedia uerò aut fames nequaquam prodest: satis enim morbus ipse omnia consumere, & exhaurire potest. Porro cum jam circuitus ad iudicationem peruenit, humiditas uerò jugulum frontemque irrorat, extrema algent, arteriarum pulsatus minimus est, frequentissimus ueluti repens, ac tenore debilis, tum paulum quid alimenti triticei sumendum, uinumque euidenter degustandum est, sed caput irrigationibus præmunire oportet pariter & uesciam. Hæc uerò auxilia in tractatu de phrenitide à nobis memorata sunt. Vinum utique non pleno ore, neque ad saturitatem usque ingurgitandum est. Aliqui sanè importunè repleti, postea inappetentia, atque cibi potusque accipiendi impotentia uita excessere: multis autem satis largè uescientibus, natura jam resoluta

ἡ δυνάμιος ἢ Φείδεο. (τέγγεις) κεφαλής ψυχῆς, ὁκόσαι μοι ἐπὶ φρενιποῖσι λελέχα), ὅπως διμετρῆς ὀλίγω μέρω καθαροῦ ἢ ψυχρότερος ἐς ἀνάπνυσιν. ὄλιος τετραπλή, φυλῶν, γραφῆς, ὑδάτων, ὡς ὀρεῖται τὰ πάντα ἡδέως. λαλιῆ τῶ παρεόντων φιλομεδῆς, ἡσυχίη, θυμηδῆ ἔνοση ὀλιος. ὄσμα ἢ εὐδῆες, ἀβαρῆς ἐς κεφαλής ἀίσθησιν. ἀτρεῖς τῶ τετραπλῶν ἔσωσαν ὄσμα, ἀλφίτων ξυνῦδα πδδθῆτων, ἢ ὄξει. ἀστρων θερμῶν νεοπέπλων. οἶνω δὲ μὴ κάρτα κλύζειν σόμα, μηδ' ἄμα εἶργειν. ποτὸν θᾶστον καὶ συνεχῆς, ἢ τοῖσι ἄλλοισι. τροφή ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν κέφη, εὐπεπτό, τὰ πολλὰ σιτώδης, ἢ καὶ ἡδέια, κῆν μικρὸν χείρων ἔη. τοῖσι δὲ γδ τῶ ἄλλων μάλλον χαλεπέον. ἔχῃ κίσα γδ τῶ σωμαχῶ ἐσέκλυσιν ἢ νεστο * ἀμφύει. ἀσιτία δὲ ἢ λιμός, ^{ἀμφύει, ἴσως ἐμφύει.} ἐσλαμά. ἰκανὴ γδ ἢ νεστο τὰ πάντα λαφύξαι. ἢ ἢ κη μὴ ἢ ἢ πειροδοῦς ἐς κρίσιν, νοπῆ δὲ κληῖδα καὶ μέτωπον ἰζάνη, καὶ ἀκρεα ψυχῆς, σφιγμός δὲ σμικρότατος, ἢ πικρότατος, ὁκοῖον ἔσπων, ἀμυδρὸς τὸν τόνον, μικρὸν πᾶσα λαβεῖν χεῖ σίτων, καὶ οἶνε * ὄναργῶς ἀπίεσθ. χεῖ ἢ κεφαλήν προσηφαλίω ἰέγγεσι, ἢ ἢ ἢ κύστιν. λέλεχ) δέ μοι τὰ δὲ ἀκεα ἐπὶ τοῖσι φρενιποῖσι. διδόναι δὲ οἶνε μὴ χανδόν, μὴ ἢ ἀδδην. μετεξέτεροι δὲ * πλησμονῆς ἀκαρῆν, ἀνορεξίη τε καὶ ^{πλησμονῆ.} ἀδρανεῖ ἢ φαγεῖν τε καὶ πείν, ἀπώλωνο. πολλοῖσι ἢ καὶ εὐσίτρισι ἔεσι, λελυμῆνης ἢ δὴ τὸ φύσεος, ἔδν τὸ πλῆθος



* ἤκεσαν.

ἐς τὸ μὴ θανεῖν * ἤκεσε, ἐς μὲν τὴν
 γαστέρα καπόντων τῶ σιτίων, ἐκ
 ἀνιόντων ὃ ἐστὶ τὴν δύναμιν ἀπὸ τῆ κοι-
 λίας. ἐσω ὦν σιτία μὲν ποικίλα, τὰ
 πολλά σιτῶδες αὐτὸς ῥυμφάνην μᾶλ-
 λον ἢ μαοσᾶδος. κῆν σερεα ἔη, ὀλι-
 θηροῦ ἔσεως γίνεσθαι. ὡς μὴ κάρτα
 ξυωεῶτα, μηδ' ὀπία ὄλα, ὃ σερεοῦ
 γυμνά. ψωμοὶ διάβροχοι οἴνω, τὰ
 πρῶτα θερμώδεες δύο ἢ τρεῖς. ἐπὶ ὃ
 τοῖσι τὰ πάντα ψυχρὰ, ἢν μὴ ὑποικε-
 ρέωσι φλεγμοναί. οἴνω ἐνώδης μὴ
 κάρτα σύφω. πλαγὺς ὃ ὡς ἡκίσα. ἔλ-
 ληνικοὶ μὲν, χίος, ἢ λέσβιος, ὀκόσοι ἢ
 * ἀλλοινησῶται λεπτοί. Ἰταλῶν δὲ,
 σαρρεντίνου, ἢ φρενδανός, ἢ φαλεῖ-
 νος, ἢ σιγνίνος, εἰ μὴ σφόδρα σύφη.
 παραιτέας ὃ τῶδε, τὴν κάρτα πα-
 λαιὸν ἢ νεώτερον. διδόναι ὦν τὰ πρῶ-
 τα θερμὸν, μὴ μείον κυάθων τεσσά-
 ρων πρὸ τῆς κρίσεως, μηδὲ κοτύλης
 πλείον, κῆν εὐπότος ἔη. Ἐπὶ ὃ τῶδε
 σιτίων διδόναι, εἰ τὰ τὸ φλεγμασίης
 παρήκοι, αὐθις ψυχρὸν ὀρέγειν, ὀκως
 ἐς ἀκτῶ * διψεος. πρὸς ἀνάγκην ὃ,
 μὴ μόνον μὲν ξυῶ σιτίω ὃ. * πρὸς νο-
 εῖας ὃ χρεὶ ὡς μὴ ἄψιν φρενῶν ὀ οἴνος
 ποιεῖται ἢ Ἐπὶ * τὸ δεσιν ἀνεχεῖν.
 κῆν ἐκ διασάσιος εὐδεν θέλει. ἢ συχίη
 προσακίη. ἢν ὃ πελὺς μὲν ἰδρῶς ἐκ-
 ρέει, σφυγμοὶ ὃ πρὸς ἀκινήσιν, ὀξεία
 ὃ φωνή, ἀθερμαῖ ὃ τὰ σήθεα, διδόναι
 ὃ οἴνος ὀκόσον ἀν δύνη) πείν. με-
 νος γδ οἴνος ἐλπίς ἐς ζῶην ψυχροῖς. ἢ
 οἴνος ἐὼν * ξυνήθης ἔη, ἀλλολε μὲν πείν
 ἀλλολε ὃ (αὐ) σιτίον ξυν οἴνω φαγεῖν
 ἐκ διασάσιος μὲν, ἐς ἀνάπαυλαν

* ἀλλοι.

* διψεος.

* πρὸς νοσεῖ-
σαι.

* ἢν δὲ συν-
τιχεν.

ξυνήθης.

ad mortem evitandam alimentorum
 copia nihil profuit : in ventriculum
 quidem cibis delabentibus, sed ad
 recreandas vires à ventre non af-
 cendentibus. Alimenta sanè varia
 sint oportet, plerunque triticea,
 quò forberi potius, quàm mandi apta
 sint, si solida sunt, lubrica saltem
 efficiantur, Oua neque ualdè con-
 creta, neque torrefacta sint, sed omni-
 nò soliditatis experta. Panis buc-
 cellæ uino madentes & calefactæ
 duæ tres uè initio præbeantur. Post
 autem omnia frigida ministrantur,
 nisi forsan interius phlegmonæ de-
 litescant. Vinum odoratum, haud
 ita multum adstringens, quàm mi-
 nimè crassum deligatur, ex Græcis
 Chium aut Lesbium, & quotquot
 alia Insulana tenuis sunt tempera-
 turæ : ex Italicis autem Surrenti-
 num, aut Fundanum, aut Falæ-
 num, aut Signinum, nisi uehementer
 adstringat. Atque ex his omnibus
 illud uitandum est, quod perueru-
 lum, aut ualdè nouum sit. Nempè
 detur primò calidum non minus
 cyathis quatuor ante iudicationem,
 neque plus cotyla, siue hemina,
 quamuis bibax homo sit. Deinceps
 cibo exhibito, si inflammatio permi-
 serit, iterum frigidum uinum, quod
 siti mèdeatur, propinandum. At si
 necessitas urgeat, uino non solo, sed
 cum cibo utendum est. Verum ne
 mentem uinum lædat, cibus ante
 sumendus est : & posthæc abstinend-
 dum. Si post aliquod temporis in-
 teruallum dormire uelit, quies conce-
 denda est. Verùm si multus sudor ema-
 net, arteriæ jam micare desinant, uox
 acutior reddatur, & pectus calore de-
 situatur; uini quantum potare possit,
 concedendum. In solo enim uino
 refrigeratis spes uitæ posita est. Vinum
 itaque sit usitatum, & modo id agro-
 tus tantum bibat, modo cibum cum
 uino assumat. Id autem per interualla

fiat



fiat ad tollendam lassitudinem, quæ tum ex morbo, tum ex cibo prouenit. Nam qui exiguas uires habent, & post assumptum cibum ualdè laborant. Igitur & ipsum decet forti esse bonoque animo, & medicum suauis oratione eum ad bonam spem cohortari, uarioque alimento & uino opitulari: nec non & alia efficaci medela uti opus est, & ad sudores coercendos, & ad uires instaurandas, ut penè extinctæ reuiuifcant. Quapropter pectoris sinistræ mammarum palmulæ in uino maceratæ cum aloë & mastiche superduntur: ceratum uerò cum nardo factum ista excipiat. Quòd si istud durum siccumque fiat; aliud epithema imponendum: mala cotonea extracto femine, & quicquid durum est, contusa polentæ odoratæ admisceo: postmodum absinthij & myrthi comam, acaciam quoque & mannam cribratas permisceo: simulque omnia subacta œnanthino cerato excipio. Si per hæc sudor non supprimatur, uix acerbæ succus miscellæ addendus est. Succus igitur iste, quem Græci Omphacion uocant, cum maxime acerbus est, & acacia, & gummi, & rhous esculentus, & alumen, & palmulæ, & rosarum succus benè olens simul omnia cum nardo & labrusca ex oleo pectori superponatur. Huiusmodi nanque epithema juxta refrigerat & adstringit. Decumbat uerò æger in aëre frigido, aut & ad uersam domus uergat. At si & frigida boreæ aura afflabit, malè spirantem animum excitabit. Moretur autem & propè uirentia prata, fontesque, & obstrepentes riuos: nam & ab his emanans bonus halitus,

Ἐκαμάτῃ, τῆ ἐν τῆ ἐνέσῃ, ἢ τῆ τροφῆς. ἐν γδ σμικρῇ τῇ ἰσχύι μογέσει καὶ τῆ ἐπὶ τῆ ἐδωδῇ. χρεῖ ὧν αὐτῶν τε ἀλκήνεται καὶ εὐθυμον ἐμμετραί, καὶ τὸν ἰητρὸν ἐπέσι μὲν πρὸς φαλάκρῃ ἐς ἐυελπισίῳ ἐμμετραί, ὡς δὲ δρήγειν * ποικίλῃ τροφῆτε καὶ οἴνω. χρεῖ ὧν τῇ ἄλλῃ ἰητρῆι * ἐνέργω χρεῖ εἰς, ἐς τὴν τῶν ἰδρωτῶν καθεξίς, ἔτ' δυνάμιος ἀνάσασιν ἐς τὸ ζώπυρον. ἐσω ὧν * ἐπίθημα πρὸ θώρηκι ἐς τὸν δρισερόν μασόν, φοίνικες ἐν οἴνω. * λαῖοι, ξυῶ ἀλόη, καὶ μασίχη. κηρωτῇ ὧν ξυνάρδω πεποιομηδὴ ἀνειλήφθω τῶδε. καὶ μὲν τὸδε ἀσπρὸν γίγνη, ἄλλο ἐπιπλέναι ἐπίθημα, μήλων Ἰξερόντα τὸ σπέρμα, καὶ ὅ, ππερ αὐ σιληρόν ἢ, θλάσαν τῶ ξυμμίσγειν ἀλφίτισι ἐυώδεσι. ἐπειτὰ * ἀψινθίς κόμην καὶ μυρσίνης, ἠδ' ἀκακίης καὶ * μάνης σεσημηδῶν ξυμμίσγειν ὁμῶς ὧν πάντα * φυράσαντα, κηρωτῇ ἀναλαμβάνειν οἰανθίνῃ. μὲν ὧν τῶν δὲ μὴ ἰσχύ) οἰδρῶς, ὁμφακὸς χυλὸν εἰς φύρησιν ξυωτεθέν, ὁμφακίον * ἀκμαῖον, καὶ ἀκακίη. καὶ κόμμι δὲ, ῥοός τὸ * ἐδωδῆμον, καὶ σύπηρειν, καὶ φοίνικες, καὶ ῥόδων χυλὸς εὐπνοῦ. ἅμα πάντα ἀρδῶ τε καὶ * οἰανθίνῃ, πρὸ λίπαι ἐς τὸν θώρηκα πλέναι. καὶ γὰρ τόδε ἐμψύχει τε καὶ σύφει. κατὰ κεῖδω δὲ ἐν ἡέει ψυχρῶ, εἴτε καὶ πρὸς ἀεκτρὸν οἰκῶ. εἰδὲ καὶ εἴη αὐρῇ βορέου ψυχρῇ ὅπιπυείουσα, ζωρήσει κακίως κεκαφνότα θυμὸν. ἐσω ὧν καὶ εἰς * λειμῶνας καὶ πηγὰς, καὶ κελαρῦζόντας ὄχετους. καὶ γὰρ καὶ τὸ εὐπνοῦ τῶν δὲ καὶ ἢ

* ποικίλῃ

* ἐνέργω ἄλλως ἐνέργω

* ἐπίθημα

* λαῖον

* ἀψινθίν

* μάνης
* φυράσαντα

* ἀκμαῖον
* ἐδωδῆμον

οἰανθίνῃ

* λειμῶνας



κὴ θυμῶν, κὴ τὴν ψυχὴν θάλπει,
 κὴ τὴν φύσιν ζῶρει. ἄλλο κὴ πρόσκλη-
 σις ἔφαγείν κὴ πείνῃν ὅτι ἄπο-
 εἰς μὴ ἴαθε τις εὐτυχῆ, μιμῆσα
 κὴ αὐτὴν ψυχρὴν, πλοῦθων ἐνω-
 δέων ἠδονῆς ῥιπίσι, καὶ ὡς ἔω ἡαρος
 φύλλοισι, ἠδ' ἀνθεσι τοῖσι παρεῖσι εὐ-
 ρέσασα τὴν γλῶσσαν καὶ ἐπίβλημα
 ἔσω κοῦφον παλαιόν, ὡς δ' ἐχθρὸν μὲν
 τὸν * αἶρα, διαπνέη ὃ θῶρηκος τὴν
 θέρμην. ἀριστον ὃ ὀθόνη παλαμῆ * πᾶ-
 σιν ὃ αὐχένος κὴ * κληῖδα ἀλφίτα κὴ
 θῶρηκα. πρὸς φειν μὲν τῶ ἐυόσμῳ τῶ ὃ
 αὐχμηρῶ συνέχειν κὴ * ἀπαλαμῆ δὲ
 ἔσω σώματος τὸ ἀραιὸν ἐμπλάσσειν,
 ἀτὰρ κὴ τὰ πρόσωπα τῆ γῆ τῆ σα-
 μίη, τῆ κρησέση σεσοσμῆν ἐς ὀθόνω
 ἀραιὴν ἐνδύσασα καταπάσσειν, ὡς
 διασπῆ) ἐς τὰ μέτωπα κὴ τὰ μῆλα
 ἠδ' ἄχνη, κὴ * πῖλον ἐσοσμῆν, καὶ
 γύψον ὀπῆν, σπαρῆν ἐκ κρησέση
 μικρῆ, ἐμβάλλειν ἴα τοῖσι ἰκμαλέοι-
 σι. ἐσπῆτε κοῖε ἰδρωτάς, ἔσω γῆν
 ψυχρῆ ἐς τὰ πρόσωπα πρόσκληθῆ-
 σα, πῆξι μὲν τῶ διαρρέοντων ὑγρῶν,
 πυκνότητι ὃ τ' ἀραιώσιος * διαχρίειν
 ἴα ἔσθην, ὅπως ἢ ἔψυχρῆ φύσα,
 κὴ τ' ἔσοφῆς ἐκχέη), ἢ ὃ ἀνακαλέ-
 σαθ τῶ ἀκρον τὴν θέρμην, γλα-
 κίνω, ἢ σικυωνίω λίπαι ξὺν πεπέρει,
 κὴ τῶ κασορίω κὴ νίτρω, ἔκαστη κη-
 ρῆ σμικρὸν ἐνήκοντα, ὡς ποθίζει τὸ
 χρεῖσμα, κὴ διὰ τ' λιμνήσιδος ἠδ' ἐυ-
 φορβίς, κὴ δάφνης ἔκαρπῆ ἀλειμ-
 μα, ἐπανάκλησιν θέρμης ποιέεσθ.
 ἀτὰρ ἔβολβοῖ ὡμοί, οἱ σμικροῖτε κὴ
 ἐρυθροί, ξὺν πεπέρει ἔσθ' ἐς τρυγῆ
 λείη, ἀριστον ἐπίπλασμα τῶ ποδῶν,
 & mentis delectatio, animam fouet
 & naturam suscitatur, utraque restituit
 quin etiam cibi potitionisque deside-
 rium lacessit. Cæterum si quis ob
 inopiam hæc assequi nequeat, imi-
 tari oportet & ayram frigidam ramo-
 rum bene olentium uoluptuarijs fla-
 bellis, & tempus uernum folijs ac flo-
 ribus præsentibus humum sternen-
 tes. Operimentum quoque leue sit
 & obsoletum; ut aërem quidem ac-
 cipiat, calorem autem pectoris ex-
 halare permittat. Optimum uero
 est uetus linteum. Ceuices qui-
 dem & jugula & pectus polenta con-
 spergito: ut odoris suauitate nutriat,
 siccitate coërceat. Item & polline
 quidem corporis raras partes con-
 tegito: nec non & faciem terra sa-
 mia lineo sacculo cribrata, & raro
 linteolo inclusa respergito, ut minu-
 tissimus puluis in frontem & malas
 excutiat. Calx præterea extincta,
 & gypsum exustum per lineum par-
 uum sacculum, quem Græci Crise-
 ram uocant, transmissa sudore ma-
 dentibus iniiciantur. Compressit
 sudores nonnunquam & spongia ex
 frigida faciei admota: dilabentes
 enim humores coguntur, & cutis ra-
 ritas conspissatur. Prodest etiam se-
 dem inungere: ut frigidus flatus, &
 ab alimento exortus effundatur.
 Item reuocandus excitandusque est
 extremorum calor illitu glucini
 olei, aut sicyonij, quod ex agresti cu-
 cumere efficitur, cum pipere, casto-
 rio, nitro, & cachry: modicum ceræ
 in eis eliquando, ut inunctio mem-
 bris inhærescat. Illitio quoque ex
 adarce, limnestida uocant, euphor-
 bio, & lauri bacca calorem exuscitat:
 pariter & bulbi erudi, illi inquam, qui
 exigui & rubri sunt, cum pipere & ace-
 ti fecæ læuigata ualentissimum
 pedibus cataplasma imponitur: sed
 intra

ἴερα
 πᾶσιν
 κληῖδας ἀλ-
 φίταις
 παπαλάη
 τίταν
 διαχρίειν



intra horæ spatium illud frequen-
tissimè auferendum est. Instat enim
periculum ulceris & uesciarum. Por-
rò ab his spes affulget ita ægrotan-
tem perniciem euasurum. Quòd si
omnia secundum rationem medicus
præstet, rectèque omnia cedant, cum
syncopa si inflammationes quoque
adsint, discutuntur: sudor nunquam
effluit: calor in quamlibet corporis
partem ad extremos usque pedes, &
summas nares diffusus reuiuiscit: fa-
cies uegeto colore decoratur: pulsa-
tus in magnitudinè efferuntur, ni-
hil tremuli, sed uehementes: uox
autem consuetà reuertitur, & canora
est: ipseque prorsus uiuidus effici-
tur. Lassitudinem quidem haud
exiguam percipit, uerùm dormire
etiam conspicitur. Atqui si ipsum
somnia occupauerit, cibaria planè
concorda erunt: sensus mali oblite-
rabitur: naturæque uis egerminabit,
& reuifciet: cumque à somno ex-
pergiscitur, bene spirat, leuis est, ex-
peditus & robustus: reuocat autem
in memoriam morbum ceu quoddam
somnia. At nonnulli sunt, quibus
febres obscuræ, tanquam morbi reli-
quix, remanent: nonnunquam & in-
flammationes modicæ, & lingua ari-
da, & sudoris priuatio: præterea ri-
gent, torpent, dissoluuntur. Hi sanè in-
tabem prolabuuntur. Tunc uerò tem-
pustèrendum non est quiete & uictu
tenui: sed ad motiones æger traducen-
dus per gestationes, frictiones, & la-
uacra: quò uitæ residuum à morte
iudicetur, augeatur, ac recreetur.
Propinandum uerò est etiam lac ma-
ximè mulieris, quæ proximè peperit,
puerumque nutrit. Hi nanq; alimento,
ut nuper in lucem editi pueri, egent. Si
lactis humani copia non datur, asinæ,
quæ non pridem peperit, lac accipito:
tenue est enim ac fluxile huiusmodi
lac. Posthæc ad resumptionem & ad
consuetà æger ducendus est.

καθ' ὄρεν ξυνεχές αἵματα αἰρόντα. κίν-
δυνος γὰρ ἐλκῶν, ἢ δὲ φλυκῆ νόσος.
Ἐπιτίσι ἐλπίς τὸν ὄδε νοσέοντα δια-
δρῆναι τὸν ὄλεθρον. κῆν πάντα μὲν τὰ
κατὰ λόγον ἰπτεὸς ἔσθῃ, εὖ δ' πάντα
χωρῆν, ξυτῆ ξυγκοπῆ κὲι φλεγ-
μασίαι (Ἐπίεσι ἐκλύον). καὶ ἰδρῶς
μὲν * ἐδάμα, θέρμης δ' ἀνάκλησις * ἐδάμασι
παύτη. ἀτὰρ κὲι ἐς ἀκρῆς πόδας, καὶ
ἀνάρινα. τὸ δ' ἀσώπων εὐχρῶον.
σφυγμοὶ ἐς μέγεθος ἡμέμενοι, ἀτρο-
μοι, σφοδροί. φωνὴ δ' * ξυνήθης, εὐ- * ξυνήθης
φωνος, κὲι τὰ πάντα ζωῆς κάματος
ἐκ ἀγενῆς, ἀτὰρ ἡδ' εὐδῶν ὄραται,
κὲι ἠέ μιν ὑπνος, ἔξέπεψε μὲν τὰ
σιτία, ἔξενηψε δ' τὴν ἀΐθησιν, ἀτὰρ
ἡδ' ἔξεβλάσησε τὴν φύην. κῆν ἔξ
ὑπνῆ ἔγρη), εὐπνοος, εὐσαλής, ἀ-
νος, ἀναπεμπά(ξ) δ' ὅκως περ ὄναρ
τὴν νεῦσον. μετεξέτεροισι δ', πυρετὶ
ἀμαυροὶ ἐγκαταλείπον), κὲι πῆ καὶ
φλεγμασίαι σμικραὶ, καὶ γλώσσα
ξηρῆ, ἀνικμοὶ, ῥιγῶδες, νεφροὶ, δια-
λελυμένοι, οἷσι ἐς μαρασμὸν ἢ πε-
ρὶροπῆ. εὖτε ἐκαταβλακένυν χεὶ ἡ-
ρεμίη κὲι λεπτὴ διαίτη. ἀλλ' ἐς κινήσι-
ας ἀγειν ἀγῶνης κὲι τρεῖς, καὶ λε-
πεῶν, ὅκως ἐκ ἔνεκρῶδες ἐνταθείη
κὲι ἀνὰ τσαφείη τὸ ζῶπυρον. διδόναι δ'
κὲι γάλα μάλισα μὲν γυναικὸς νεο-
τέκῃ, κὲι κροτέοφῃ. κὲι γὰρ οἶδε ἀνα-
τροφῆς ὅκως ἀσπίτικοι παῖδες δέον).
ὡδ' ἢ μὴ, ὄνα μὴ παλαμοτέκῃ. ἔξίτη-
λου γὰρ τὸ τριόνδε γάλα. κὲι Ἐπιτίσι δὲ
ἐς ἀνάληψιν ἀγειν, κὲι τὰ συνήθεα.

CVRATIO CHO-
lera,

ΘΕΡΑΠΕΙΑ * ΧΟ-
λερῆς,
R. Κεφάλ.



Κεφάλ. δ.

Caput III.

Ἐν χολέρῃ ἢ τῶν φερομένων ἐπι-
 χρεῖς κακόν. * ἀπεπία γὰρ χρεῖ ὧν ἡ-
 μᾶς, εἰρήδιως αὐτόματα δέχεσθαι, ἢν
 ἴμῃ, ὁ πρῶτον, διδόντας ὑδάτος εὐκρη-
 τε * ῥυμφαίνεν, ξυνεχές γε μὴ.
 ὀλίγον ἴ, ὅπως μὴ ἐν ταῖσις ἔωσι κε-
 ναῖ σωμαχῶ σπασμώδεες. ἡ δὲ καὶ
 εὐφροῖ ἔωσι, καὶ ποδῶν ψύξεις, τέγ-
 γην μὲρ τὴν κοιλίην λίπαι θερμῶ ξὺν
 πηγάνῳ, καὶ κυμίνῳ ἐψηθέντι, ἐς τὰς
 τῶν φουσέων διακρίσιος. καὶ ἴππθῆ-
 ναι εἰρεῖον, καὶ τῶ πόδε λιπαίνοντα ἡ-
 συχῆ πείθειν, ἀμφοφώντα μάλ-
 λον ἢ πέζοντα. ἀτὰρ καὶ μέχρι τῶν γε-
 νάτων γινέσθω τῶδε, ἐς ἀνάκλησιν
 θέρμης. καὶ μέσφι μὲρ κόπρεα κάτω-
 θεν διαχωρέει, ἀνωθεν ἴ χωρέει χολ-
 λώδεα, τῶδε χρεῖ ποιέειν. ἡ δὲ ἴπε-
 ληθύθη μὲρ ὁ πᾶς παλαιός σιτθ,
 χολαὶ ἴ δῖωσι, καὶ χολώδης * ἔμε-
 τος, καὶ διάτασις ἐπὶ, ἡ δὲ καὶ ἄσι, καὶ ἀπο-
 εἶν, καὶ ἀδυναμῖν, ψυχροῦ ὑδάτος
 κυάθους δύο, ἢ πρῶς διδόναι, ἐς τὸ τὴν
 ἴ κοιλίης σύψιν, ὅπως ἴππθῃ τὴν
 παλῖρροίαν, ἡ δὲ τὸν σόμαχον αἰθό-
 μρον ἐμψύξη. ξυνεχέως ἴ τῶδε,
 ἐπὶ τὸ ποθεν ἐμέση, πρῆσεν. ρηιδί-
 ως μὲρ τὸ ψυχρὸν ἐν τῇ κοιλίῃ θάλ-
 πεῖ. ἀτὰρ ἡ δὲ ἴξεμῆ ὁ σόμαχος,
 ἀχθηδόνι ἴ θερμῆ καὶ ψυχρῆ. ξυ-
 νεχέως ἴ ποθέει ψυχρὸν ποτόν. ἢν δὲ
 καὶ σφυμοὶ μὲρ ἐς τὸ μικρὸν ξυμ-
 πέσωσι, ἡ δὲ ἐς τὸ ξυνεχές καὶ πυκνὸν
 διώκων, ἡ δὲ τῶδε τῶδε μέτωπα καὶ
 κληῖδας, καὶ πάντι ἴ σώματος σάγ-
 δῖω ρέει, καὶ γαστρῆς μὴ ἴππθῃται, καὶ ὁ

IN Cholera eorum, quæ eijciuntur,
 suppressio mala est: cruda enim
 sunt. Quare nos oportet ea facile
 sponteque exeuntia libenter permit-
 tere: si non exeant, incitare, aquam
 tepidam sorbitioni dantes, assidue
 quidem, sed paucam, ne tentiones
 inanes in stomacho fiant convulsio-
 ni similes: si torquentur intestina,
 & pedes frigescent, irriganda est al-
 uis calido unguine, in quo ruta,
 cuminumque incocta sint: ut fla-
 tus digerantur, dissipenturque, lana
 quoque imponenda est, & pedes in-
 unguendo molliter fricare oportet,
 contrectando magis, quam premen-
 do. Sed genibus tenus hæc fiant:
 ut caliditas, quæ abierat, reuocetur.
 Hæc uerò tantisper facienda sunt,
 donec stercora per inferiora deijci-
 antur, & superius biliosa efferantur.
 Sin autem omnia antiqua stercora
 dejecta fuerint, & biliosi humores
 transierint, biliosusque uomitus &
 distentio adsit, fastidium, anxietas,
 uirium labefactatio; tunc frigidæ
 aquæ cyathi duo, aut tres propinan-
 di sunt ad uentris adstrictionem:
 ut retrogradus humorum cursus
 cohibeatur: utque stomachus ar-
 dens refrigeretur. Assidue uerò id,
 cum potam aquam uomuerit, fa-
 cito. Facile quidem frigida in uen-
 tre incalescit: uerum eam stoma-
 chus euomit à calida pariter ac fri-
 gida dolore affectus, semper autem
 frigidum potum expedit. Porro si
 arteriarum motus ad paruitatem lapsi
 fuerint, nec non assidue & frequenter
 micet arteriæ, sudor circa frontem & ju-
 gula & qualibet corporis parte stillatim
 effluat, alui profluuium non sistatur, &

uentri-



ventriculus adhuc euomat cum
 distentione & animi deliquio; pa-
 rum uini odorati & adstringentis
 aqua frigida infundendum est: ut
 præ odore sensus excitetur: ob
 eiusque potentiam roborctur, &
 corpus ob nutritionem recre-
 tur. Vinum enim celeriter sursum
 petit, ut retrogradum humorum flu-
 xum coërceat. Tenuè uerò est, ut
 facile diffusum nature ad sanitatem
 recuperandam opem ferat: uali-
 dum quoque, ut uires dilabentes
 fulciat, atque sustineat. Inspergen-
 da est etiam nonnunquam recens
 & bene olens polenta. Verum
 enim uerò si omnia urgeant, sudor
 & tentio non stomachi modo sed
 etiam neruorum, singultus inanis,
 & pedes, contendantur, & aluus
 multa excernat, & homo caliget, &
 pulsatus arteriarum ad immobilita-
 tem uergant, tunc huiusmodi agroti
 statum præuenter opus est. Quòd
 si iam adsit, frigida ac uini multum
 præbendum est, & nequaquam me-
 raeius: ne fiat ebrius, ac ne lædan-
 tur nerui: sed cum cibo, & panis
 buccellis madefactis. Præbere quo-
 que aliam escam conuenit, qualis
 à me in capite de Syncopa tradita est,
 item fructus mollioris corticis, opo-
 ram Græci uocant, adstringentes,
 sorba, mespila, mala cydonia, unam.
 Cæterum si omnia euomit, & stoma-
 chus nihil retinet, ad calidas potiones
 & cibaria recurrendum: nonnullis
 enim hæc mutatio uomitionem com-
 pescit: calida uerò calidissima fun-
 to. Sin horum auxiliorum nullum
 proficit, cucurbitula in interscapulo
 affligenda est, atque infra umbilicum.
 Verum assidue cucurbitulæ mutandæ
 sunt: nam si diutius permaneant,
 dolorem cient, periculumque est,
 ne uesiculas excitent. Profruit
 interdum & auræ motus suauis:

σόμαχ[⊙] ἐκείνη ἐπιξίω. τὰ σάκη, λή-
 ποψυχίη, κῆ οἶνος βραχὺ * Ἰππασάζην *
 τὰ ὕδατα τὰ ψυχρῶ, εὐώδη[⊙], σύ-
 φοντος, ἐς τὴν τ' αἰσθησιος * ἀνά-
 κλησιν ὑπὸ τ' ὀσμῆς, κῆ ἐς τὴν τέτρα
 ῥῶσιν, ὑπὸ τ' δυνάμιος, κῆ ἐς τὴν τ' ἑ
 σώματος παρὰ εἰσιν ὑπὸ τ' ἰσθμίου:
 οἶνος γὰρ ὡκὺς μὲν ἐς τὴν ἀνω ἴξιν,
 ὡς τὴν παλινροίω χέθειν. λεπτός
 ὅ, ὡς ῥηθίως χυθεῖς τῆ φύσει συνέ-
 ξην ἐρῶσ. κραταῖος δὲ ὡς δυνάμιν
 σῆσαι ῥέεσαν ἰππασάσειν δὲ κῆ ἀλ-
 φίτων κοτὲ νέων, εὐπνόων. ἡ δὲ ἴξινε-
 πείγη πάντα ἰδρῶς καὶ ἐντασις ἐ τῆ
 σόμαχ[⊙] μένον, ἀλλὰ καὶ νεύρων,
 * λυγξ κενεὴ κῆ πόδες ξυμπαινω-
 ται, κῆ κοιλίη ὑποφῆρη πολλὰ, κῆ ἀ-
 χλυώδης ὁ ἀνθρώπος, σφυγμοὶ δὲ
 παρὰ ἀκίνησίω ἔωσι, τότε χερὶ φθά-
 νειν τήνδε τὴν καλῆσασιν. εἰ δὲ κῆ πα-
 ρῆ, ψυχρῶ κῆ οἶνος πολλόντι διδόναι
 μὴ ἀκρητες ἔρεξ ὅ, διὰ τὴν μέθην κῆ τὰ
 νεύρα, ξίω σιτίω, ψωμοῖσι διαβρό-
 χοισι. διδόναι δὲ κῆ τ' ἄλλης τσοφῆς,
 ὁκοῖα ἐν συγκοπῆ μοι λέλεκ', ὁπώ-
 ρω σύφασαν, ἔα, μέσσιλα, μήλα
 κυδωνία, σαφυλήν. ἢν δὲ τὰ πάντα
 ἐμέη, κῆ ὀσόμαχος μὴδὲν ἴχνη ἐστὰ
 θερμα καὶ ποτὰ κῆ βρώματα παλιν-
 δρομείν. μετεξετέργισι γὰρ ἔσθιν
 ἢ μεταβολῆ. τὰ θερμα ὅ ἔσω θερμό-
 τατα. ἢν δὲ μὴδὲν π τέτων δρηγη,
 σικίω ἐς τὸ μεσηγὺ τῆ ὡμοπλατέ-
 ων προσβάλλειν, κῆ κάτωθεν ὀμφα-
 λῶ τρέπειν. συνεχῶς δὲ τὰς σικίας
 μεθίζανειν. ὀδυνηρὸν γὰρ τὸ ἐπίμονον,
 κῆ κίνδυνον φέρειν φλυκταίνωσι[⊙].
 ὠνησέ κοτε κίνης * ὡσης εὐπνο[⊙],

* ἰσθμίου

* ἀνακλήσις

* λυγξ

* ἰσθμίου

R 2 ὡς κῆ



ως ή τ' πνεῦμα ζωοῦσαι ή τ' κω τ' ο-
 φλιῶ ἐν τῇ κοιλίῃ χέθειν, ή εὔπνοον ἐ
 εὔσφυκτον τὸν νοσέοντα θέμεναι. κω
 δὲ ἐπὶ μέζω γίγνηται τὰ δε, ἐπὶ τ'
 κοιλίης ή εἰς θώρηκα πθέναμ. ή τὰ
 δε εἰς ωόκοια ἐς συγκοπήν, φοίνικες
 ἐν οἴνω δεδωμένοι, ἀκακίη, ἕσποκυ-
 σίς. τὰ δε ξιω ῥοδίνη κηρωτή ἀναλα-
 βόντα ἐγχεῖσαντα δε εἰς ὀθόνω, ἐπὶ
 τλω κοιλίω πθέναμ, ἐς τὸν θώρηκα
 μασιχλω, ἀλόω, ἀψινθίε κόμω
 λείαν ξιω κηρωτῆ *ναρδίνω, ή οἴαν-
 θης ἐπὶ πάσαι ὀλω τὰ θώρηκι. ἐς δε
 τὰς πόδας ή τὰς μύας ἢν πλαιῶν),
 σικυώνιον, γλαδίκιον, ή παλαιὸν ἀ-
 λειφα, ξιω κηρω σμικρω χρίεν. ἐπι-
 πάσαι δε ή εἰς κάσοργς. κω δε και
 ψυχροὶ ἔωσι οἱ πόδες, ή τὰ διὰ τῆς
 λημνισίδος ή εὐφορβίε χρίεν ἀλείμ-
 ματι, ή ἐρείοσι *ἀμφελίσαι, και
 ψηλαφίη χειρῶν ἀπιθύνειν. ἀλλά
 ή τλω ῥάχιν ή τὰς τένοντας, και τὰς
 μύας, τῶν τε σηγόνων τοῖσι αὐτέοισι
 χρίεν. κῆν μὲρ ἐπὶ τοῖσι ἰαχῆ) μὲρ ὁ
 ἰδρῶς, ή ή γαστήρ, ὅ, τε σόμαχος δε-
 χη) τὰ σπία, ή μὲ μέση, σφυγμοὶ
 ἰ μεγάλοι τὲ ή εὔτροι ἔωσι, ή ξύν-
 ταις ἀπολείπει, θέρη η) (και) πάντα
 ἀναιρη, ή τὰ ἀκρα ἀδικῆ, ὑπνθ δε
 πάντα πέσαι δ' αὐτέρη ἡμέρη ή τρίτη
 *λύσαντα, *τρέπειν ἐς τὰ ξιωθήα.
 κω ἰ πάντα μὲρ ἀπεμένη, ἰδρῶς δε
 ἀχέτος ῥέση, ψυχρὸς ἰ ή πελιὸς γίγ-
 νη) ὄνθρωπος, σφυγμοὶ ἰ πρὸς ἀ-
 πόσβειν ἔωσι ή ἀπνηδῆκη, ἀγαθὸν
 ἐν τοῖσι τετέοισι εὐπρεπέα εὐρέαδ
 φυγλω.

ταρδι.

ἀφιλίσαι.

λοῦσαντα.
πρέπειν.

β

ut & spiritus reuiuifcat, & cibus in
 uentriculo remoretur: utque me-
 lius ægrotus spiret, meliusque ar-
 teriæ micent. At si hæc in pectus
 labantur, uentri, pectorique talia
 imponenda sunt, qualia & ad syn-
 copam supra memorauimus: pal-
 mulæ uino madefactæ, acacia, hy-
 pocysthis, hæc roseo cerato excepta,
 linteoloque illita uentri imposito:
 pectori autem mastichen, aloem, ab-
 sinthij comam tritam cum cerato
 nardino superdato: aut œnanthem
 toti pectori inspergito. Pedes uerò
 & musculos, si conuellantur; sycyo-
 nio, gleucino, aut ueteri oleo cum
 exigua cera perungito, Castoreo
 quoque respergito. Porrò si frigidi
 etiam pedes sint, unguine ex adar-
 ce & euphorbio inungito, & lanis ob-
 uoluito, & manuum palpitatione
 foueto. Quin etiam dorsi spinam,
 tendones, & musculos; nec non
 & maxillas iisdem inungere expe-
 dit. Quòd si post hæc sudor & uen-
 ter suppressi fuerint, & stomachus
 cibus admittat, neque euomat, pul-
 sus magni & ualidi sint, & conuul-
 sio desinat, sed calor ubique incre-
 scat, & extrema infellet, somnus ue-
 rò omnia concoquat; secundo di eaut
 tertio soluendus (lauandus) est æger, &
 ad consueta mittendus. At contra
 si omnia uomitu reijciat, sudor pe-
 rennis effluat, frigeat laborans, &
 liuidus fiat, pulsus etiam propè ex-
 tincti sint, & uires cadant; cum ita in-
 quam se habuerint, inde honestam
 fugam capessere bonum est.

CVRA.



Caput V.

Κεφάλ. ε.

IN uoluulo dolor est perimens ob
 intestinorum phlegmonem : di-
 stentio adest, & inflatio : celerrima
 ac fœdissima perniciēs impendet.
 Nonnulli enim desperata salute
 ægrotantes mortem euidentem tan-
 tummodo formidant : aliqui uerò
 in uoluulo ob cruciatus acerbita-
 tem mortem expetunt. Quocirca
 neque remedium ullum morbo infe-
 rius, neque debilius à Medico adhi-
 beri opus est. Verùm si morbi cau-
 sam inflammationem esse inuenerit:
 uenam in cubito magna sectione
 aperiat : quò multus subito sanguis
 inflammationis alimentum, uel uf-
 que ad animi deliquium effundatur.
 Etenim hoc uel sedandi doloris,
 uel stuporis ac sensus priuationis
 initium est. In uoluulo autem re-
 creatio est ac respiratio, uel ad breue
 tempus (licet præ ignorantia) tor-
 menti dilatio. Quandoquidem ho-
 minibus ita uiuentibus mori bea-
 tum est : Medico autè cuiquam nobili
 mortem inferre nefas ducitur. Sed
 fas est interdum, cùm præsentia ma-
 la euadi non posse manifestè præui-
 deat; gravitate capitis torpida ægro-
 tum sopire. Sin absque inflamma-
 tione ob corruptionem, aut ingens
 frigus uoluulus prouenerit; uenæ
 sectio dimittenda est : reliqua autem
 omnia facienda. Consulendum est
 igitur, ut à potu aquæ tepidæ frequen-
 ter euomat, oleum multum bibat,
 deinde rursum euomat, flatus infe-
 rius irritamentis educendi. Irritatoria
 quidem sunt cyclamini succus & ni-
 trum, aut sal: flatus autem euocant
 cuminum & ruta. Igitur his omni-
 bus cum resina terebinthi sedem obli-
 nere oportet, & spongijs fouere:
 aut hæc per clysteres infun-

Ἐν ειλῶ πόνος ἐστὶ ὁ κτείνων ἐπὶ
 φλεγμονῇ ἐντέρων ἢ * ἐντασις, καὶ
 πρήσις, ὠκισμός, ἢ κακισμός ὀλεθρος.
 μετεξέτεργε μὲν γὰρ ἀνελπίσως νο-
 σέοντες, θάνατον παροφανεὰ μένον
 ὀρρωδέσσι. οἱ δ' ἐν ειλῶ πόνοι, ὑπερ-
 βολῇ θανάτου ἔρανται. χρεῖων μὴτε
 σμικρότερον πρίγνεας τὴν ἰητρὸν τῆ
 πάθεος, μὴτε βραχύτερον. ἀλλὰ ἢν
 μὲν φλεγμασίην αἰτίην εὐρησῶ, ἴαμι-
 νειν φλέβα. τὴν ἐπ' ἀγκῶνι μεγάλη
 τῆ χάσει, ὅπως * ἀδρώως διεκχέη τὸ
 αἷμα τὸ φλεγμασίης ἢ τροφῆς, κὴν
 μέσφιληποθυμίας. τὸ δὲ γὰρ ἢ δυνάμει
 δόχη γίγνηται, ἢ νάρκης ἐς ἀναμῶσιν
 ἢν. ἀνάπνοσις ἢ ἐν ειλῶ, κὴν ὑπὸ
 ἀγνοίης ἐς βαιὸν χρόνον ἐπὶ ἔπνοια
 ἀμβολῇ. ἐπεὶ κὴ τὸ θηήσκειν τοῖς μὲν ὄ-
 δε πνέσει εὐδαιμονίη. τῶ δὲ χιητῶ ἢ
 εἰ θέμις πρήσειν. θέμις δὲ κοίτη παρο-
 γιγνώσκοντα * σαφὰ τὰ παρεόντα ὡς
 εἰ φύξιμα, καθαρὰ ἐν ὠδῶν εὐνάσκει.
 ἢν ἢ ἀνδρὸς φλεγμασίης ἐπὶ διαφο-
 ρῆ, ἢ ψύξει κραταῖη γίγνηται ὁ ειλῶς,
 φλεβοσμίην μὲν ἴχεν, τὰ ἢ λοιπὰ
 αἷμα πάντα πρήσειν, ἐμέειν δὲ τὸ ὑ-
 δατος θαμινὰ, * συχνὸν πίνειν ἔλαμον.
 εἴτα αὐθις ἔξεμέειν, φύσας ἀγειν
 κάτω ἐρεθίσματα. ἐρεθιστικὸν μὲν
 κυκλαμίνης χυλός, κὴ νίτρον, ἢ ἄλες.
 φύσεων ἢ ἀγωγὰ, κύμινον, ἢ σὺν πη-
 γανον. χρεῖων πάντας ὁμοῦ ξυλῶ ῥητι-
 νῇ * τῇ ἔτερμίνθη διαχρίειν, τὰ δὲ καὶ
 ἀπόγγουσι πυριθίν. ἢ τοῖς δὲ ὑποκλύ-

ἢ ὄλεθρος

κὴ ἀδρώως

κὴ σαφὰ

κὴ συχνὸν

ἢ ῥητινῇ

R 3 ζειν



ζην ξυμ' ελαιω, η μελιτι, και υσω-
 πω, η κολοκύντης αγρίας τ' σαρκος
 εψηματι κηνη εκκριθη κόπρος, αυθις
 ελαιον θερμον ξυμ' πηγανω ενειναι.
 τ' οδε γδ λω εσω μιμη, * πυρειμα
 τ' οι εντεροισι ευμυρες. τεγγειν η τα
 πονεοντα χωρια ελαιω ξυμ' πηγανω,
 και ανηθη αδδλω εψηθεντι. εσω
 δε και πυρει φακων τ' κερραμηνων,
 η χαλκων, η κέγχρεσ, η αλων φωχ-
 θεντων. εππλασματα πωσ τ' οι
 ξυμ' οισι, εσω αιρης αλιτον, και κυμι-
 νον, η υσωπεσ, η οειγανσ κόμη. σι-
 κυαι η κωφαυ μω, συχαι η, αλλη
 πωσ αλλας πιθειμη εν τ' επιγα-
 στριον, εν τ' οις ιξυας, μεσφι βεβαιων.
 η δε κατόπιν εν ισχια πωσ νεφρεσ η
 ραχιν. πατη γδ αυπισ παντα πονον
 ξυμ' φεροι. πωσ πινειν η κυμινε η πη-
 γανσ αφεψηματς, και εσινωνθ.
 η ξυμ' τετεροισι τ' φαρμακων τ' ανω-
 δυνων πνα. μυρια δε αλλοισι
 * αλλα πειρη γεγωνασι * πσα. α-
 γαθον η η το δε εχιδηων φαρμα-
 κον, μεζον ε μετεσ πωσ το ξυνηθεσ
 ποθεν. λω η μητε ο πονος ενδιδω, μη-
 τε φυσα, μητε κοπσιον αναδοιη, τε
 καθαρηριεσ τ' ιερησ υπ' αναγκησ δι-
 δοναι. η γδ απηλαθη ξυμ' φλεγματι
 η χολη το φαρμακον, η διηθεν ε-
 ξαγον φυσασ, σκυβαλα, φλεγμα,
 χολην ε κακωσ εντασιασ, τσοφη
 δεξαγασα. ζωμοι αλλεκτοριδων,
 κογχαριων, πρισανησ οχυλοσ * κα-
 θεφθοσ ξυμ' πολλω λιπαι, δεχθηθεν
 πρσοεγχυθεντι τ' εψησιος, εχην ωδε,
 κυμινον, λιτρον, πρσασον ξυμ' τη κόμη.
 η ιη τρεση ξυμ' ζωμω πνι διαχωρητικω,


πυρειμα.

εσινωνθ.

αλλα πειρη γεγωνασι * πσα.

καθεφθοσ.

dere cum oleo, melle & hyssopo, &
 cucurbitulæ sylvestris carnis deco-
 cto. Quod si stercus excretum sit;
 iterum oleum calidum cum ruta
 iniiciendum : id enim si intus mo-
 retur, fomentum intestinis propiti-
 um est. Præterea dolentes locos oleo,
 in quo ruta & anethum abundè
 incocta sint, perfundere conducit.
 Adhibeantur & foci ex lentibus
 figulorum aut fabrorum ferrario-
 rum, aut ex milio & sale ustulatis.
 Cataplasmata uerò præter uulgata
 sunt lolij farina, & cuminum, &
 hyssopi aut organi coma. Cucur-
 bitulæ quoque leues quidem, sed
 frequentes, alia juxta alias abdomi-
 ni & ilibus adinguina usque admo-
 ueantur : quin & à tergo coxendi-
 cibus ad renes usque & dorsum : ubi-
 que enim quisque omnia dolorem
 leuantia faciens iuuat. Præbatur
 autem cumini, aut rutæ decoctum,
 & sinonis, aut unà cum his aliqua
 ex anodynis appellatis medicamen-
 tis. Infinita autem alia ab alijs pro-
 bata experimento inuenta sunt.
 Bonum uerò est & ex uiperis medi-
 camentum plus consueta portione
 potui datum. Cæterum si neque
 dolor remittitur neque flatu, ne-
 que stercus deijcitur; purgatorium
 pharmacum, quod hieram uocant,
 necessariò dandum est : aut enim
 simul cum pituita & bile pharma-
 cum uomitu expellitur : aut descen-
 dit, flatu, dura stercora, pituitam,
 bilem ipsius mali fomenta secum
 educens. Alimenta exhibeatur aluum
 ducèdi uim habentia, iuscula gallina-
 rum, ostreorum (ραυγορητι) insigni pul-
 chritudine præditorum, ordeï cremor
 cum multo oleo decoctus, quod à prin-
 cipio ante decoctione infusum sit : ha-
 beat uerò cuminum, nitrum, porrum
 cum coma. Aut medela adhibeatur
 cum aliquo iure uentrem subducente.
 cochle



αὐτῶν ἐκδοῦν ἐλιξᾶ, & ipsarum aut
 ἄλλοις ἰσχυρῶν. Aqua potui detur (si fe-
 liciter) cum asaro, aut nardo, aut
 cachry excocta : nam hæc status eli-
 ciunt, urinam ciunt, & spirandi po-
 testatem facilem reddunt. At si pus
 absit, & uinum benè facit, ut intesti-
 na calciant, utq̄ue uires labantes
 confirmentur. Prodest etiam feni-
 culi radicis decoctum, si bibatur,
 & adianthum, & cinnamomum. Sin
 ad abscessum inflammatio conuer-
 tatur; huic opem ferre satius fuerit
 medicamentis abscessui conuenien-
 tibus utentem. Ea uerò in libris
 de longis morbis descripta sunt: ubi
 colici affectus sanatio traditur.

κοχλίας ἀπεως ἐφθοί, ἢ ἐν τῷ δε-
 χυμῶς, ἢ τελλίνης. ὕδωρ ποτῶν, ἢν πυ-
 ρελαίνῃ ξὺν ἀσάρω, ἢ νάρω, ἢ κάρεν
 ἐψηθεν. ἢ γὰρ φύσις ἀγωγὰ, ἢ ἐρη-
 τικὰ, ἢ εὐπνοα. ἢν ὃ * ἀπυος ἐπ, ἢ οἶνος
 ἐστὲ τὴν τῷ ἐλέρων θέρεμιν, ἀταρ ἢ δὲ
 ἐς ἀνάκλησιν τ' δυνάμιος δρηγῆ, καὶ
 μαρά θρηρίζης ἐψημα ποθεν, ἢ ἀδι-
 αῦτον, ἢ κινάμωνον. ἢν ὃ ἐς δότος ασιν
 τρέπη) ἢ φλεγμασίη, τῆ δὲ ξυμβάλ-
 λειν ἀμεινον τοῖσιν ἐς δότος ασιν φαρ-
 μάκοισι * χρεόμφοκ γεγράφῃ) δὲ
 ταδε ἐν τοῖσι χρονοῖσι. ἐνθα κολικῶν
 θεραπειὴ ἐγράφῃ.

ἄποσ

χρεόμφοκ

CVRATIO ACVTORVM
 jecoris uitiorum.

Caput VI.

IN jecore sanguinis creatio est, &
 in totum sanguinis à jecore ema-
 natio: ac omninò jecur est ueluti
 sanguis gelatus. Ideo phlegmonæ
 hoc loco acutissimæ fiunt. Hac enim
 in parte alimentum residet. Sin
 uspiam alibi phlegmone constiterit,
 non usque adeo acuta est: aduena
 est enim sanguinis accursus. In jecur
 autem non opus est aliunde influere.
 Nam si obstructio aliqua exitus oc-
 cludat; jecur effusione priuatum
 repletur abundantq̄ue sanguine, ali-
 menti uerò ad jecur transitus adhuc
 patet: aliud est enim iter alimenti à
 uentriculo & intestinis in omne cor-
 pus. Quocircà euacuare facilè oportet,
 uenam cubiti secando: multum
 quidem sanguinis, sed non semel to-
 tum detrahendo. Inedia primum
 iubenda est, postea cibi paucitas, ut
 & medicamentis ingredientibus je-
 cur inane pateat. Insuper medi-
 camentis exterius appositis, quæ in
 jeco-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑ-

Τῶ ἥπαρ ὀξέων παθῶν,

Κεφάλ. 5.

Ἐν ἥπατι ξαίματος ἢ γενύα, καὶ
 ἐς τὸ παῦ ἐνθεν ἢ ξαφέψη. ἢ τὸ ξυμ-
 παρ ἥπαρ ὀκοῖον ἀμάτος πάγος. ὀ-
 ξύτα) ὦν αἰ τῆ δὲ φλεγμοναί. ἐγ-
 κέε) γὰρ τῷ χωρίῳ τὰ δὲ ἐπ τροφή. ἢ
 μὲρ ἐτέρωθί πη φλεγμονή συστῆ, οὐ
 κάρε (αὐ γίγνε) ὀξείη. νέε γὰρ ἢ ξαίμα-
 τος ἐπιρροή. ἐπὶ ὃ τῷ ἥπατι, ἐχρεός ἐτέ-
 ρωθεν ἢ κειν. ἢν γὰρ πρὸς ἐμφραξις τὰς
 ἐξόδους ἐπιχῆ, πικρα) τὸ ἥπαρ τ'
 ἐκροῆς ἀμερθέν. ὃ τ' τροφῆς εἰσερχε,
 ἐς τὸ ἥπαρ ἐπιμίμνει. ἐτέρη γὰρ ὀδὸς τ'
 τροφῆς ἐς τὸ παῦ σκῆνος διὰ τ' κοι-
 λίας καὶ τῷ ἐλέρων. εὐπόρος ὦν χεῖ
 τὴν κένωσιν ἐμποιέει, * τὰ μνοντα φλέ-
 βας τὰς ἐπ' ἀγκῶνι, συχνὸν μὲρ ἀ-
 φαιρέοντα, μὴ ἀθρόον ὃ δότος ασιν μὲρ
 τὰ πρῶτα, ὀλιγοσιτή ὃ αὐθις, ὀκως ἢ
 τοῖσι εἰσεσι τὸ ἥπαρ κενεὸν ἢ χεῖ ὃ ἢ
 τοῖσι ἐπιθέται * διασκιδνάνα) τὰ ἐν τῷ
 ἥπατι

κατάμνοντα.

κατακιδάνα.



σπινόντα οισώ-
πω.

ἥπασι θεία. τήξισ μὲν ὦν ξυῶ ἀ-
 λότη, ἢ λίπεω ἔρια * πινόντα οισώπω.
 χρέος ὦν ἐμψύξιος, ἔνεκα τῷ αἵμα-
 παιδίε) τῆ παρ. θερμὸν γδ τῷ αἵμα.
 τοιάδε χεῖρ καὶ τὰ ἴσπλάσματα ἔμ-
 μύραι, ἀλίτων μὲν ἀλείων, ἢ ἐρυσί-
 μων, ἢ κριθῆς, ἢ λίνθ σπέρματος, χυ-
 μῶν ὃ οἶνε οξέος, μήλων ἔχυλῆ, ἐ-
 λικῶν τῷ αἵπέλε, οἰνάνθης τῷ ῥαί-
 ης, ἢ ἔστω τῆδε λίπαθ. πυρίη,
 ἀπόγγοισι καρπῆ * λαφνῆς ἐψή-
 ματος, χίνης, γλήχωνος, ἰερίδος. ἐπὶ τῆ
 δε τρεῖσι πενήνης, σικίλω προσ-
 βάλλειν μέζονα, ὡς ἀμφιλαβεῖν
 παῖτη τὸ ὑποχόνδριον, ἐντάμνειν ὃ
 βαθύτερα, ὡς πολλὸν ἐλκύσειας αἵ-
 μα. μετεξετέροισι ὃ αἰσδέλλα (ἢ)
 χάσαι κρέασον. παρυσδύε) δε τῆ
 ζῶσ ἢ δῆξιος. ἀτὰρ ἢ δὲ μέζονα δια-
 βρώσις ποιέε). τῆδε καὶ δυσεπίχε-
 τος ἢ δὲ τῷ ζῶν αἰμόρροια. κῆν
 ἀδδλω πὸν ἐκπέση τὸ θηρίον, σικί-
 λω προσβάλλειν. νέρθεν γδ ἔλκει τὸ
 νυῶ. κῆν ἄλις ἔχη κενώσιος, ἐς μὲν τὰ
 τρώματα * ἰχθαίμασι χρέεαδ, ἀδήκ-
 τοισι, δραχνίων ὑφάσμασι, * μάννη,
 ἀλόη, ἐππάσεν. ἢ ὃ ἄετῶ ἐφθῶ ξυῶ
 πηγάνῳ, ἢ μελιλώτῳ, ἀλθαῆς
 ρίζησιν. ἐς ὃ τῶν τρεῖσιν ἢ μέγλω, κῆ-
 ρωμα ξυῶ κυροβαλάνῳ, ἢ ἀψιν-
 θίς κόμη, καὶ ἰριδί. ἀτὰρ καὶ τὰ
 μαλάγματα τοιάδε χεῖρ ἔμμύραι
 ὀκοῖα λεπτύνα, ἢ ἔξαραιῶσαι, ἢ ἔ-
 ρησιν τρέψαι. ἄριστον μὲν ὦν τὸ
 διὰ τῷ σπερμάτων, ὦν ἅπασι
 ἰητροῖσι ἢ πείρη εὐγνωσθ.
 ἀγαθὸν δε καὶ ἐνθα ἢ σάμ-
 ψυχθ ἢ τὸ μελιλώτῳ ἐγκέεται.

* λαφνῆς, ἄλ-
 λης λαφνῆς.

* ἰσως. ἰχθαί-
 μοισι.
 * μάννη.

jecore accruata sunt, discutere oportet. Igitur illinatur aloë, aut nitro, lanæ œsypo sordentes admouean- tur. Refrigeratione quoque opus est. Iecur enim sanguine accenditur : nam sanguis calidus est. Hujusmodi ergò cataplasmata sunt: accipiatur farina loliacea, aut irionis, aut ordeï, & seminis lini : ex humoribus autem uinum acidum, cydoniorum succus, capreolorum uitis, labruscæ maturæ; aut oleum cum ea. Item cum spongijs fomentum fiat ex decocto baccarum lauri, lentisci, pulegij, iridis; per ista mitigato morbo cucurbitula major applicetur, ut ex omni parte hypochondrio circumdetur : atque altius concidenda cutis, ut multum sanguinis effundatur. Nonnullis autem hirudines, quàm scarificationes, magis placent. Nam ejus bestiolæ morsus altius penetrat : uerùm erosiones quoque majores facit : unde & sanguinis effluuium ægrè supprimitur. Cumque sanguinis potu saturata hirudo ceciderit; cucurbitula est applicanda: ab intimis enim partibus tunc attrahit. Quòd si satis euacuatum sit; uulnera medicamentis sanguinem coërcentibus morsuque carentibus obtegenda sunt, ut araneorum telis, manna aloëque inspergenda : panis cum ruta aut sertula aut althææ radicibus elixus superdandus. Tertio uerò die ceratum cum myrobalano, aut absinthij coma & iride conuenit. Quin etiam & malagmata uocata medicamenta talia esse debent, ut extenuare, aut rarefacere, aut urinam ciere ualeât. Optimū sanè est medicamentum ex feminibus constans : quorum omnibus Medicis experientia perspecta est : bonum est illud, in quo aut sampsuchus, aut sertula ponitur.



Ἐἴς τινες sunt, labiles, lotium mouentes, penetrabiles: alica cum mulla, & forbitio ex ea cū sale & anetho. Ordei uerò cremor & detegendi facultatem habet: at si & dauci seminum nonnihil addatur, ad urinam laccendam præstantior est: subducit enim per alueolos, qui à jecore in renes pertinent. Oportunus uerò est à jecore effluentibus illuc transitus & uasorum laxitate & itineris recitidine. Idcirco & cucurbitulis ea nos trahere oportet eo loco, ubi renes sunt, secundum os coxendicis applicantes. Cæterum & hi unguine cum ruta, aut odorato iunco, aut calamo aromatico irrigandi sunt. Per hæc utique ægrotum posse mortem effugere sperandum est. Sin ad suppurationem conuertatur; pus mouentibus medicamentis utitor, quotquot à me in sermone de Colicis literis prodentur. Cùm pus autem jam genitum fuerit, quomodo incidendum, quomodoque medendum sit; alio loco scriptis mandabimus. Eadem nobis & de splene scripta sunt: si quando & inflammationis acutæ calamitas cum inuaserit.

προφαί ἢ λεπταί, εὐδρομοί, ἐρησιθε
προκληπικαί, εὐδιδοί, χόνδροι ξυῶ
μελικρήτω, ἢ ῥόφημα * ἐκ τῆσδε ξυῶ
άλσι, ἢ ἀνήθω. πρισάνης ἢ χυλὸς ἢ
σμηγμαλιώδης. ἢν ἢ ἢ δαύκεσθ καρ-
πῆ * ἐγγχῆ π, κρεσσον ἐς ἐρησιν. ὑπε-
ξάγει γὰρ διὰ τῆσδε ὀχετῶ, οἵπερ ἀπὸ
ἠπάτος ἐς νεφρεὺς κραίνουσι. καιεῖν
ἢ τοῖς ἀπὸ ἠπάτος ἐκρέουσι τῆσδε ἐξο-
δος, * εὐρύτητί τε τῶ ἀγγείων, καὶ ἰ-
θύτητι τ' ὁδῶ. χεῖ ὦν ἢ * συκίη τῆσδε ἐλ-
κειν (ἐς) τῶ χώραν * προσβάλλον-
τα τῶ νεφρῶν κατ' ἰσχίον. ἀτὰρ καὶ
τέγγειν τὰ δελίπα ἢ ξυῶ πηγάνω, ἢ
χοίνω, ἢ καλάμω πῶ δρωμαπικῶ.
Ἐπὶ ἢ τοῖσδε ἐλπίς τὴν νοσέοντα δια-
δράναι τὴν ὀλεθρον. ἢν ἢ ἐς ἐμπύησιν
τρέπη, τοῖσι πρὸ ποιοῖσι χρεεαδ, ὀκό-
σα μοι ἐπὶ κωλικοῖσι λελέξε. ἢν ἢ ἢ
* πύον γένη, ὀκως μὲν τὰ μνειν, ὀκως
ἢ ἢ τρένειν, ἀλλήλη πη γεγράψε. τὰ-
δε μοι ἢ ἢ ἢ ἀσληνὶ γεγράφθω, ἢν
κοτὲ ξυμφορὴ φλεγμασίης ὀξείης
ἢ τὸνδε κατὰ λάβη.

* ἰσχυρῶς.

* ἐν ἐρύτῃ.

* συκίησιν.

* προσβάλλουσα.

* πύον.

CVRATIO ACVTI morbi dorsalis venæ a Arteriæ.

Caput VII.

Venæ concavæ, crassæque arteriæ, quæ secundum dorsum extenduntur, inflammationem ardoris speciem majores nostri appellauerunt. Nam & ardoribus similes affectus in ambabus oriuntur: ignis acutus & acer, fastidium, sitis, anxietas, pulsus palpitations in præcordijs, & in auersa parte, quam Græci Metaphrenon uocant: & quotcunque à me in uolumine de signis relata sunt.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΤΙΑΙΑΣ φλεβὸς ἢ δρωμαπικῶ ὀξείας νόσου.

Κεφάλ. ζ.

Τὴν τ' κοίλης φλεβὸς φλεγμασίω, καὶ παχείης δρωμαπικῶ, αἰ τῶσδε τὴν ῥάχιν τέταν, * καὶ σε ἰδίεω ἐκάλειον οἱ * ἀσπέν, ἢ γὰρ ἢ καύσοισι κελα πάθεα Ἐπὶ τοῖσι γίνετα. πῦρ ὀξὺ ἢ δρωμῶ, ἀσπ, δίψος, ἀπορίη, σφυγμὸς παλμώδης ἐν ὑποχονδρίω, ἢ ἢ τοῖσι μεταφρένοισι. ἀλλὰ μοι ὀκόσα ἐπὶ τοῖσι σημείοισι γεγράφα. ἀτὰρ

* καυσοῖσι.

* πείθει.



ἀτὰρ καὶ ἐς ξυγκοπήν ὀκέλλει τὸ πῦρ,
 ὅπως ἐπὶ τῆσι καύσεσι. τὸ μὲν γὰρ φλε-
 βὸς ῥίζωσις ἦ παρ. τὸ δ' ἀρτηρίας ἀρ-
 χῆς κραδίη. δοκέοις αὐτῶν μὲν τὰ αὐτῶ
 μέρεα τῶν δὲ τῶν ἀπλάγχμων νοσή-
 ει τὰ καίερα. φέρεται μὲν γὰρ ἡ κρα-
 δὴ ἐν διδοῖ τῆ ἀρτηρίῃ, τῆ * φλέβῃ δὲ
 τὴ ἦ παρ αἷμα. ἀμφοῖν δὲ μεγάλων,
 μεγάλα τὰ ἐγγονα αἰ φλεγμοναί.
 τὰ μιν αὐτὰ τὰς ἐπ' ἀγκῶνι
 φλέβας. καὶ συχνὸν μὲν ἀφαίρειν
 αἷμα, μὴ ἀφρόν δ', ἀλλὰ καὶ δις, καὶ
 τρις, καὶ τ' ἄλλης ἡμέρης, ὡς μεσηγυρὴ ἢ
 δύναμις ἀναλάβη. ἐπειτα ἐπιπλάσ-
 μασι χεῖρας, καὶ σικύης ἐς τὸ ἰσοχόν-
 δριον, ἐνθα ἡ διάφυσις τ' ἀρτηρίας, ἀ-
 τὰρ ἡ μεσηγυρὴ τῶν ὠμοπλάτων. καὶ γὰρ
 ἐ τῆδε σφύξεις ἕασι. χάζειν * τὰ ἀ-
 φειδῶς, ἢ πολλὸν ἀφαίρειν αἷμα.
 ἐ καὶ τὰ γὰρ ἐκ τ' κενώσεως τῶν δὲ λει-
 ποθυμέσων ὄνθρωποι. ἰσχυρὴ δὲ καὶ
 γαστήρ πολλόν τι ξέων ἡθεός. κλύσ-
 μοῖσι ἐς ὄλιγον χεῖρας μαλθακοῖσι,
 δριμύτι δ' ἡκιστα. ἐπιπυρελαίνεσι γὰρ οἰ-
 δε ἄλμη καὶ νίτρον ἡξί. λίνου ὠν καρπὸς
 χυλὸς ἔσω, καὶ τήλιος, ἐ μαλαχῆς
 τῶν ῥιζῶν ἔψημα, καὶ ἐς ἀσκήσιν ἐ
 * ῥῆξιν ἰκανόν, μέλη ἀκρεα πόδες, ἐ
 χεῖρες * τεθάλφθωσαν, γλυκύνω ἢ
 σικυωνίω λίπαι τὰ διὰ τ' λιμνήσιδος
 χεῖσματι. καὶ τὰ γὰρ ψυχρὰ αὐτῶν
 τὰ δε γίγνε. πιπίσκον * τεπερὶ ὧν σί-
 των, ὀκόσα ἔργον ἐξ ἀγρίμιον, ἀσαρον,
 ἀψίνθιον. ἐμπασέω δ' καὶ λίτρος.
 πᾶντων δ' κρεῖσσον σικύη καὶ κυνάμω-
 μον, ἢ ἡλις εὐπορεῖ. γάλα τὸ σδε καὶ προ-
 φη καὶ φάρμακον. ἐμψύξις γὰρ δέον-
 δ' ἐνδον ὀκοῖόν τι πυρὸς * εἰλυμύρα,

Nempe & in synctopam tendit ignis,
 quemadmodum & in ardoribus, si-
 quidem uenæ & radicatio (ut ita di-
 cam). jecur est & arteriæ uero prin-
 cipium cor. Haud ab re igitur exi-
 stimes eorum uiscerum supremas
 partes maximè ad uitam facientes
 agrotare. Etenim cor arteriæ calas
 rem impertit, uenæ autem sangui-
 nem jecur infundit. Amborum
 uero magnorum uiscerum magna
 sunt germina, ipsæ uidelicet phleg-
 monæ. Venas itaque in cubito pro-
 tinus cædito, multumque sangui-
 nis, sed non semel totum mittito,
 imò & bis & ter, & alio die, quò in-
 terim uires instaurentur, repetito.
 Deinceps cataplasmatibus utitor, &
 cucurbitulam præcordijs, ubi est ar-
 teriæ transitio, nec non & inter sca-
 pulas, nam ibi quoque pulsationes
 sunt, affigito, liberiusque scarifi-
 cato, & multum sanguinis detrahito:
 haud enim ita facilè ex horum ua-
 forum inanitione in animæ defe-
 ctum homines cadunt. Verùm &
 alius præter consuetudinem ualde
 suppressa ad lubricitatem per clyste-
 rum molliores infusiones est reuo-
 canda, acribus autem minimè uti-
 tor: nam hi facilè in febrim inci-
 dunt à turia & nitri liquatione.
 Ideo lini feminis & feni græci succus
 esto, & radicum maluæ decoctum
 ad prouocandum, & ad mordend-
 dum satis est. Extremas partes,
 pedes uidelicet & manus oleo
 siccyonio, aut ex adarce un-
 guine excalescito. Nam partes
 istæ in ipsis ualdè frigescent. Præ-
 terea ante cibos potui dato, quæ loti-
 um euocant, meon, asarum, absin-
 thum. Nitrum quoque inspergito,
 sed omnium ualentissima est cucurbi-
 ta, & cinnamomum, si quis ejus copi-
 am habeat. Lac istis & alimenti, & me-
 dicinæ uim præbet: etenim refrige-
 ratione indigent, cum in eorum uis-
 ceribus ueluti quidam ignis ex æstuet,
 & dul-

φλίσα.

ἀναλάβη.

τάς.


δύνη.

κ τεθάλφθωσαν.

* τσ.

μ ι

* εἰλυμύρα.



& dulci alimento, nec non & multo in parua mole: has nimirum uirtutes alimentilac obtinet: esto autem mulieris, quæ proximè peperit, & duobus lactis cyathis unus aquæ admisceatur. Lac etiam bubulum optimum est: tertio loco caprinum ponitur: cibaria concoctu facilia præbeantur, plerique faciei, fœniculi radix, & apij semen: indatur & mel: aqua uerò, quæ bibitur, ista habeto. Oportet etiam sudores elicere, & ubique diffationes humidas & fluxas facere. Caput sicut in ardentibus febribus irrigetur. Epithema pectori & sinistrae mammae, quale in syncopa, superdetur. Cubile rectus decubitus: ut omnia his similia sint, quæ in ardentibus febribus fiunt. Gestatio parua ad sudores euocandos, nec non & balneum, si iste interior exardescit. Neq; enim iudicationibus huiusmodi uitia soluantur, & si ardoris species sunt.

καὶ τροφῆς γλυκεῖης. ἀτάξη δ' ἐν ὀλίγῳ ὄγκῳ * πολλή. τὰ δὲ μάλιστα ἐν τροφῇ τὰς δρετὰς ἴχει τὸ γάλα. εὐπροείδω ἢ νεοίονα, καὶ ἐς δύο κυάθους ἔ γάλακτος * ἐμβεβλήθω εἰς ὑδάτος. ἄριστον ἢ τὸ τ' ἑοός. τρίτον ἢ αἰγός τροφῆ εὐπεπτοί. τὰ πολλὰ χυλοὶ μαράθρυ ρίζης, καὶ σελίνου καρπός, ἐμβεβλήθω καὶ μέλι, τὸ ὑδωρ ἢ τὸ πινόμιρον, ἐχέτω τὰ δὲ. ἀτάξ ἢ ἰδρωτὰς χερσηκνεέν, καὶ πάντοι διαπνοὰς ὑγρὰς καὶ εὐρόες ποιεῖν. ἴγξις κεφαλῆς ὀκοῖον ἢ ἐν καύσοισι, ἴπιθημα ἐς θώρηκα καὶ μαζόν ἀριστερόν ὀκοῖον ἐν συγκοπῇ. κοίτη, κατὰ κλισίῃς * ὀρθίος, ὅκως ἴκελα πάντα τοῖσι ἐν καύσοισι ἢ. αἰώρη σμικρὴ ἐς ἰδρωτῶν πρόσκλησιν. ἢ ἰδρωτῶν ἢ * ἔλε ὑπεκκαυθῆ. ἔ γδ κρίσει ἰάδε τὰ πάθεα λυέ, εἰ καὶ καύσε ἔασι ἰδέαι.

CVRATIO ACVTI morbi in Renibus.

Caput VIII.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ κατα τῶ νεφρὸς ὀξείας νέσε, Κεφάλ. η.

REacuta sanè in renibus inflammatio exoritur. Simul enim inflammantur à jecore in renes discurrentes uenæ: cum illis autem & jecur: cum haud ita prælongæ sint, sed ualdè latæ adeo, ut renes proximi jecori suspensi esse uideantur. Verum & urinæ retentio inflammationi superuenit, uehementiam inflammationis adaugens; nam renum caua lotij non exeuntis alluione replentur. Porro idem & in calculus euenit, si in renibus calculis urinæ canalium laxitate major oriatur, qui non egrediens inhærescit, atque sic & ipse urinam intercludit.

Κατ' ἐξ μὲν ἐν νεφροῖσι φλεγμασίη. συμφλεγμαίνουσι γδ ἀπὸ ἡπατος ἐς νεφρὸς κεραιννοσαι φλέβες. τῆσι ἢ τὸ ἡπαρ. ἔ κάρτα ἴπιμήκεες ἐοῦσαι, κάρτα ἢ εὐρεῖαι, ὡς δοκέειν ἐς νεφρὸς ἴξηρηθῶς ἀγχε ἔ ἡπατθ. ἀτάξ καὶ ἰχθειν ἐπὶ φλεγμασίη γινέ) ξυντιμωρέσσα τὰ ὀξεί τ' φλεγμασίης. πῖμπεται γδ ἢ τῶ νεφρῶν κοιλίη ὑπὸ πλημμυείης τῶ ἔρων ἔ διεκθεόντων. τὸ δὲ μέντοι καὶ ἐπὶ λίθων γίνε) ἢ φύη μὲν ἐν νεφροῖσι, μέζων τ' εὐρύτλος τῶ ἔρητῶν, ἐνίζει * μὲ μὴ διεξιῶν. ἀτὰρ καὶ τὰ ἔρα ὄδὲ ἐπίχδ ἀλλὰ



ἀλλὰ ἀμφὶ μὲν τῷ γενέσθω τῶν λι-
 θων, ἐν τοῖσι χρόνοισι λελέξεῖ, ὅπως
 ἢ μὴ * ξυνήσονται ἢ θρύψωνται γιγνώ-
 μωροι. ἀμφὶ δὲ θερμασίης, ἢ δ' ἐμ-
 φράξιος, ὅπως αὐτὸς κτείνει, τῆσδε
 μοι γεγράψε. ἠὲ ἐν σάσιες λιθων
 ἔωσι * ἐν τῷ φλεγμασίῃ, τῶ μὲν φλέ-
 βατὴν ἐπὶ ἀγκῶνι, ἠὲ μὴ κωλύη τις
 ἡλικίη. εὐρόον δ' ἐκ πολλόν ἔσω τὸ αἴ-
 μα. ἐγὼ αὖ φλεγμονὰν πρηύνονται
 μένον κενώσαι. ἀλλὰ καὶ σφηνώσες
 τῶν λιθων χαλῶν τῆσι τῶν ἀγγεί-
 ων κενώσεται. ἀτὰρ ἢ ἐν ἐρήσει * διεκ-
 θέσει οἱ λίθοι. ἐπεὶ τὰ τέγγεσι γλυ-
 κίνε λιπαροῦ, ἢ κυπρίνης, ἢ πυρήσι, ἢ
 Ἰππλάσμασι ἀνιέται τὰ μέρεα. δρ-
 τεμισίη δ' ἔσω ἢ βοτάνη, ἢ ροίνθη, ἢ
 κάλαμος ὁ ἐνώδης ἐν τοῖσι κατα-
 πλάσμασι. ἐπεὶ τὰ συκίω προσβάλ-
 λειν ἐς νεφρὸς καὶ ἰσχίον, μάλιστ' αὖ
 ἢ ἡ ἀπὸ τῶν χερῶν κένωσις ὀνή-
 σε. λελαπάχθω τῷ κοιλίῃ κλυσμῶ-
 σι ὀλιωθροῖσι, γλίχροισι μάλλον ἢ
 δριμέσι, μαλάχης, ἢ ἡλίου χυλοῖσι.
 κόλιε τῷ φάρμακα πρὸ τῶν σιπῶν ἐρη-
 πικὰ, ὅκοια ἐπὶ ἡπάτος λέλεκται. ἀτὰρ
 καὶ σιπῶν ἡ κελα, εὐπεπτα. κακὸν γὰρ τῶν
 τῶσι ἀπέψιη. ἀριστὸν τῷ γάλα, μά-
 λιστα μὲν ὄνε, ἢ πῶς τῷ δεύτερον, καὶ
 ὄιος τῷ αἰγός, * χρησίμιον, * ὅτι γά-
 λα. ἠὲ μὲν οὐκ ἀποροῖ ἔωσι, καὶ λεί-
 ει κρέασον. ἠὲ δὲ μὴ, ἐς ἐψημα τῶν
 βοτάνων ἐνίξασθαι, ἀχρεῖς ὀμφαλῶ τὸ
 ἀγγος * πληρῶνται. ἠὲ τῷ (ἐς) * πύον
 πρέπηται, ὅκοιοισι καὶ Ἰππλάσμα-
 σι ἢ δὲ φαρμάκοισι χεῖροσδε. Ἰππ-
 πολλοῖσι μὲν καὶ ἀπὸ τῶν ὑπερκεῖται.
 ἠὲ τῷ ἐν σήκη λίθος, πυρήσι μὲν καὶ

ἀποροῖσινται.

ἔστι.

διεκθέσει.

χεῖρα μὲν ἰσώσεται. * ἀποροῖ ἢ ἀπνοῖ.

* πληρῶνται. ἢ πύον.

ἐν σήκη

Ceterum de calculorum creatione
 in libro de longis morbis sermonem
 habebimus : quomodo aut ne coa-
 lescent, aut jam concreti exterantur.
 comminuanturque. De calore au-
 tem atque obstructione, quæcunque
 celeriter enecant, in præsentia disse-
 remus. Si calculi jam conflati sunt,
 adestque inflammatio : uenam cu-
 biti, nisi ætas præpediat, secato : bene
 fluidus autem multusque sanguis
 exeat : neque enim phlegmonæ tan-
 tum euacuatione mitigantur, sed eti-
 am calculorum intrusiones uasorum
 inanitione laxantur : quin etiam per
 midium calculi elabuntur. Postmo-
 dum irrigationibus gleucini aut cy-
 prini olei, & fomentis & cataplasma-
 tis particulæ remittuntur. Artemi-
 sia uerò herba, & juncus, & odoratus
 calamus in cataplasmatibus esto. Dein-
 de cucurbitulam renibus in regione
 coxendicis adhibeto : maximè nan-
 que ab ea parte euacuatio profuit.
 Alius præterea ducatur per clysteres
 cum lubricis, & uiscidis potius, quàm
 acribus, ex maluæ, aut fænu græci cre-
 moribus. Nonnunquam uerò me-
 dicamenta ante cibos urinam ci-
 tantia dentur, qualia in uitijis je-
 coris narrata sunt : pariter & cibaria
 similia concoctu facilia. Cruditas
 enim istis noxam affert. Optimum
 sanè lac est, maximè quidem asinæ :
 secundo equinum : ouillum autem
 & caprinum confert, quatenus lac
 est. (Si non suppurent,) eos
 lauare satius est : sin minus, in de-
 cocto herbarum desidant umbilico-
 tenus folio repleto. Verum si ad-
 pus uergat, quibus cataplasma-
 tis ac medicamentis utendū sit, multis
 in locis superius traditum est. At si cal-
 culus insliterit, fomentis, utique,

& ca-



& cataplasmatibus istis, uti oportet. Calculi uero medicamentis potabilibus conterendi sunt, simplicibus quidem sio, & prionite (asplesnum putō) herbis: cum oleo aut acetosculento decoctis: earum quoque succo potui dato: compositis autem ea antidoto, quæ bistimus appellatur, & ea, quæ ex uiperis constat, & bestia, quæ Coscinos, id est, cribrum dicitur, & quocumque experientia optima esse comprobauit. Gestationes istis, & corporis concussiones ad mouendum propellendumque calculum bene faciunt: nam calculorum in uesicam transitus ingentes dolores concitat. Quod si inde exciderint, dolor tollitur, ut neque per somnium dolorem sentire sibi uideri soleant. Quinetiam tanquam ex ineuitabilibus malis animus perterritus soluitur.

Ἐπιπλάσμασι τοῖσι αὐτέοισι χρέεσθ. Ἐρύθειν τὸ τρυφίλιον τοῖσι πινόμενοισι. Φαρμάκοισι. * ἀπλῶς μὲν, σίον καὶ πριονίτης αἰβοτάνας, ἐφθαλίξυν ἐξ λαΐω ἢ ὄξει ἐδάδιμα, καὶ τῷ δεχυλὸς πορπινόμμος. ποικίλῃ δὲ τῷ βίστιμα καλδύμνης, καὶ τῷ δι' ἐχιδνῶν καὶ κοσκίνης ἔθης, ὁκόσαι τε δοκέσαι ἐμμεναι πῖ πείρη καὶ πύραυ αἰώραι τοῖσι δε, καὶ σείσεις ἐς κίνησιν καὶ πρῶσιν τῷ λίθων καὶ τῷ ἔπιπνονος τῷ λίθων ἢ ἐς τὴν κύστιν ὁδοιπορεῖν. ἢ δὲ ἐμπέσωσι ἐνθεν, ἀπονοίτε γίγνον, οὐδὲ ὄναρ δοκέειν ἔπνον εἰθισμένοι. ἀτὰρ καὶ ὡς ἔξ ἀφύκτων κακῶν τὴν ψυχὴν κατὰ μέλεα λύονται.

CVRATIO ACVTORUM vesicæ affectuum.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΣΤΙΝ ὀξέων παθῶν.

Caput IX.

Κεφάλ. θ.

ET uesicæ acuta uitia renalibus similia proueniunt, phlegmonæ, & ulcera, & lapides, & grumorum obstructions: à quibus urinæ suppressio, & stillicidium exoritur. Sed in hoc membro acutior dolor est, interitusque celerrimus: uesica enim neruus latus est. At renes ueluti concrementum sanguinis jecoris speciem habent: in quibus, & grauissimi & maximè miserabiles morbi incidunt. Vnde mors cum maximis cruciatibus miseris mortalibus ingruit. Protinus igitur uentris ea pars laxa, quam Ceneona Græci uocant, secunda est: multoque oleo cum ruta & anetho uesica est irriganda. Si concretus sanguis doloris, impeditæque urinæ autor sit; oxymel bibere debet: aut calcis parum cum mulsa, quò grumi dissoluantur: deinde quæ urinam mouent, & herbæ, &

καὶ τῇ κύσει πάθει ὀξεία κελευτοῖσι νεφροῖσι γίγνε, φλεγμοναὶ καὶ ἔλκεα, καὶ λίθοι, καὶ θρόμβων ἐμφράξεις, ἐφ' οἷσι ἰσχυρῆ, τραγγυρῆ. ἀλλὰ ὀξύτερος τῆδε ὀπῶνος, καὶ ὄλεθρος ὠκίστος. νεῦρον γὰρ πλάτῃ ἡ κύστις. νεφροῖ δὲ, ὁκοῖον αἰμάλωψ τῷ ἥπατος ἔασι ἰδέης. ἀλλὰ καὶ αἰνότατοι καὶ οἰκτισοί, ἐνθα μάλισα γίγνε) ἀρης ἀλεγεινὸς οἰζυροῖσι βροτοῖσι. τῶ μιν δὲ αὐτίκα τὸν κενεῶνα, καταμονεῖν τὴν κύστιν λίπαὶ συχρῶ, ξυῶ πηγάνω καὶ ἀνήθω. ἢ δὲ θρόμβοι ἔωσι ἔπῶνος καὶ τῷ ἰσχυρῆς αἵπτοι, ὀξύμελι πιπίσκειν, ἢ πῖανος μικρὸν ξυῶ μελικρήτω ἐς τὴν διάλυσιν τῷ θρόμβων, ἢ δὲ ὁκόσαι ἐρήσιας * πορκαλέε, καὶ βοτάνας, καὶ

S ὑπερμα-



* 140. **σπέρματα.** **ὡδ' ἔξ αἰμορραγίας** ὁ
 κίνδυνος, * ἴσχειν μὲν ἐκείναι ἀμβολὴν
 τῷδε μάλλον. ἀτὰρ καὶ ὁδε οὐχ ἤκι-
 σα ὁ κίνδυνος. **ἀρήγειν** μὲν ὧν καὶ τοῖσι
 αἷμα ἐπέχουσι. ἀρήγει ἢ ἡ ψύξις τῆς
 κύστις, ῥοδίνης καὶ οἴνης τέγγεις, καὶ εἰ-
 * 141. **ων κατὰ λησις** ἀπὸ * οἰσύπτε. **Ἐπιθη-**
 * 142. **μα,** Φοίνικες ἐν οἴνω * δουθέντες, ξύ-
 ροι, ἢ χυλῶ ἔρροος. **ὡδ' ἔκπεπτη**
 * 143. **καὶ τῷ ἐπιθημάτων τὰ * βάρεα,** καὶ τὰς
 μεγάλας ψύξιας. **ἐκπεπτη,** καὶ γὰρ
 μὴ κάρτα ψύχειν ψυχρὴν τὴ φύσει
 καὶ λεπτήν ἐοῦσαν ἰλὴν κύστιν. **κατὰ χεῖρ**
 ἢ γλυκίνω, ἢ ἀκακίη, ἢ ὑποκυσιδὴ,
 ξύνοινω. **πυόγγοισι** ἢ ἢν μὴ σφόδρα
 ἐπέγῃ ἢ αἰμορραγίη, μὴ χρέεωδ.
 * 144. **προφαί σιῶδες,** εὐπεπτοί, εὐχυμοί
 * 145. *** ἐρηπὶ καὶ, ὁ κοῖαί μοι ἔπι νεφροῖσι λε-**
 * 146. **λέχα.** γάλα, οἶνος γλυκὺς, * θηρι-
 νός, ἢ σκυβαλίτης. **φάρμακα πινό-**
μενα, ἐρητικά, ἐνώδεια, εὐροα, καὶ
 τὰ λλάτα τριαῦτα. **ἀεῖσον** ἢ κύσις
 * 147. **τέπιγες,** ἐφ' ἄρας μὲν ὀπτοί, ἔδεσ-
 μα. **ἐξωροί** ἢ ξηροί, λείοι ξυῶ ὕδατι.
 * 148. **ἔσω** ἢ καὶ τῆς ῥίζης τῆς ἀεὶ δὲ βραχυ ξύ-
 * 149. **τῶσι * τέπιξι ἀφελήσι.** τοῖσι αὐτέ-
 * 150. **οῖσι ἐπιζέωδαι τὶ λατρεῖ ἐς ἀνεσιν** τῆ
 κύστις. **ὡδ' ἢ * λίθων ἐμφραξίς ἐπί-**
κητῶ οὖρησιν, ἢ δὲ τῶ ὄργανῶ τῶ
 καθετηρίῳ ὠθεῖν τὸν λίθον, ἢ δὲ ἀγειν
 τὸ ἔργον, ἢν μὴ ἔωσι φλεγμοναί. **Ἐπι-**
 * 151. **γὰρ * φλεγμονῆσι,** ἔτε ὁ πόρος δέχε-
 τὸ ὄργανον, πρὸς ἢ πρὸς κόνεται
 τῶ καθετηρίῳ. **ὡδ' ἔξ ἀπορος** μὲν ἢ ἢ
 τῶν δὲ ἐν τρεῖσι. **θνήσκῃ** δὲ ὀδύνησι ὠν-
 δρωπος, τὰ μιν τῶ τὸ ὑπὸ κατω-
 τῆς βαλάνης τρεχάδα, καὶ τὸν τὸ κυ-
 σίδος τρεχάχλον, ἐς τὸ τῶ τῶν λίθων

femina exhibenda. Sin ex sanguinis effusione periculum instet; absque ulla cunctatione ei magis, quam cæteris subueniendum: neque enim id leue discrimen est. Nempe medicamina sanguinem coërcentia opem ferunt: opem fert autem uesicæ refrigeratio, ex rosaceo & uino irrigatio, & cum lanis succidis obuolutio. Epithema bonum est, palmulæ ex uino cum malo punico, aut succo rhois. Verùm si auersatur epithemata graui, & uehementes refrigerationes, (cauendum est enim uesica natura frigida tenuisque, ne ita multum refrigeretur) eam gleucino illinito, aut acacia, aut hypocystide ex uino. A spongijs uerò, nisi ualdè urgeat sanguinis eruptio, abstineto. Escæ triticæ coctæ faciles, bonum succum gignent, lotiumque educentes præbeantur, quales à me in capite de renibus comprehensæ sunt. Lac, uinum dulce theræum, aut scybellite. Medicamenta potabilia sunt, urinaria, benè olentia, fluxilia, & id genus alia. Vtilissimum utique uesicæ remedium cicadæ sunt tempore suo tostæ pro cibo exhibitæ. Extra tempus autem aridæ tritæ cum aqua: sed radicis nardi parum cum cicadis elixetur. In iisdem quoque loco balnei ad uesicæ laxamentum æger desideat. Quòd si lapillorum interpositio minus impediatur; oriculario specillo lapis amouendus est, urinaque educenda, nisi adsit phlegmone. In phlegmonis nanque neque meatus instrumentum admittit: præterea oriculario specillo uulnerantur. At si expediri medicatio nequit, homoque doltribus consumitur, locum eum, qui sub glande est, ceruicemque uesicæ incidito: ut lapis excidat,



excidat, atque urina effundatur. ac deinde potissimum medendum est ad cicatricem uulnus ducendo: Sin minus, puris effluuium, quod Rhocas Græcè dicitur, factum esse pro futura hominis uita satius est, quàm ut tormentis miserimè cruciatu intereat.

CVRATIO VVLVÆ
suffocationis,

Caput X.

VVlva in mulieribus membranis extētis hinc atque inde secundum ilia continetur, ac perinde atque animal uitia in olfactu patitur. Nam ad bene olentia delectationis causa se recipit, fœdè olentia contristantiaque præ molestia refugit. Igitur si aliquid superius triste offeratur; uulua ad naturalia descendit: si extra, ostio naturalium opponatur, retrò sursumque recedit. Nonnunquam uerò in hoc aut illud latus ad lienem, aut jecur mouetur. Ad recessum ejus autem contractionemque membranulæ, ut in nauibus uela, cedunt, atque consentiunt. Hæc uerò illi & propter inflammationem eueniunt. Nam si ejus ceruix afficitur, atque intumescit: fit prominentior. Si infando exoritur inflammatio; sursum repit. Sin ad pedes foràs uergat; turpis & immunda res est, dolores afferens & contristans, præterea difficulter ambulare potest, & in latus & supina decumbere, nisi pedes mulieris phlegmone laborent. At si ad superiora uulua recurrerit, quàm ocysimè hominem strangulat, urget autem spiritum comprimens. Neque enim prius conqueri & clamare, & opem ab adstantibus petere ualet, quod nonnullis, hisque

ἐκπίωσιν, καὶ τὴν τῶν ὕδρων ἐκχυσιν, καὶ μάλιστ' αὐτὴν ἀκέραιον ἐς ὠτὸν ἀεγούσας τὸ ἄσπερον. ἢ δὲ μὴ, * ροιὰ δ' αὖ γενέσθαι ἐπὶ βέλπον, ἐς τὸν αὐθις ἐκείνην πρὸς τὸν ὄδον * οἰκτίσθησαν θανεῖν.

* ροιὰ δ' αὖ

* οἰκτίσθησαν

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΣΤΕΡ

εικῆς πνιγός,

Κεφάλ. ι.

Ἡ ὕστερη τῆσι γυναίξει, ὑμῆσι δ' ἀπὸ τῆς ἐνθα καὶ ἐνθα κατὰ λαγόναν ἰσχει. ἀτὰρ ἡ δὲ ζῶσα παῖθη, ἐν ὄσφρησιν. ἢ δὲ τῶν ὕδρων ἐκχυσιν πρὸς ἡδονὴν καὶ τὰ κάκοσμα καὶ ἀτερεπία, ὑπὸ ἀχθῆδόνος φεύγει. καὶ μὴ ὡς τῶν ἀνωτῶν λυπῆ, προσόντων γυναικῶν ἔξω. ὡς ἡ κατὰ σῶμα πᾶν εἶη, ὀπίσω χάζεται, ἡ δὲ ἀνωθεν. ἢ δ' ἀνποτε, καὶ ἐνθα καὶ ἐνθα, ποτὶ σπλῆνα καὶ ἥπαρ, ξυμδιδοὶ δὲ τὰ ὑμῆρια ἐς ἀπόσασι καὶ ξυμπαγωγῆν, ὅπως τὸς λαίφρα. πάσθαι δὲ τὰ δὲ καὶ ὑπὸ φλεγμασίης. καὶ γὰρ ὑπὸ πείσει τῶ * πάθει καὶ τῶ ὄγκῳ τῆ ἀυχῆν ὅ γίγνεται. ἢ γὰρ κατὰ πυθμῆρα φλεγμασίης ἀνω ῥέπει. καὶ μὴ ἐς πόδιον, ἔξωθεν. * ἀσπερὸν μὲν ὡς καὶ ἀλεγεινὸν καὶ ἀτερεπές. εὐσχεύσον δὲ καὶ βασισαι καὶ ἐς πλῆθυν κατὰ κέρας, καὶ ὑπὸ τῶν ποδῶν φλεγμῆν ἢ γυνῆ. καὶ δὲ ἀνωθεν φοιτῆν, ὡς ὄξύτατα μὲν τὸν ἀνθρώπον ἀπέπνιξε, πέζει δ' ἀγχόνη τ' ἀναπνοῆς. εἰ δὲ γὰρ εἰδὲ φθάνει πονέειν τε καὶ βοᾶν καὶ τὸς παρόντας κικλήσκων δρωγούς. τῆσι γὰρ ἀναπνοῆς ἐπιχειροῦσι θάττον

* πάθει

* ἀσπερὸν



πολλῆσι. πῶς δὲ Φωνῆς. εἰς ὧν τοῖς
 ἐν τετέοισι καλέσαι τὸν ἰητρὸν, πρὶν
 τὴν ἀνθρώπου θανεῖν. ἀλλ' ἰὼ κο-
 τεκ συντυχίης ἥκης γνόντα τὴν
 φλεγμονὴν χάσαι φλέβα, μά-
 λιστα μὲν τὴν ἑπιτῶ σφύρω. ἢν δὲ
 μὴ εὐροσση, τὴν ἐπ' ἀγκῶνι. ἐπα-
 Φαίρειν δὲ ἀπὸ τῆς σφύρας. πηήσασιν
 δὲ τὰ ἄλλα, ὅκοσα ἀντὶς καὶ ἀνδρῶ
 φλεγμασίης δρῆγη πηγή. δεσμοὶ
 χειρῶν καὶ ποδῶν σφίγγοντες, ἀχει-
 ναρκῶσι. ὅσο μὴ κακῶ δέων, πῶσιης
 ὑγρῆς, πειχῶν εἰεῖα κεκαυμμένων.
 * λύχνε φλογὸς ἐσβεσμῆρης, κα-
 σοεῖα. πρὸς τῷ κακῶ δέω, καὶ τὰ νεῦ-
 ρα ψυχθέντα θάλπειν. ἔρον παλαι-
 ὦν καὶ τὴν ἀδνησιν ἔξανίσησι * κάρετα
 τῶ νεκρῶ δέος, καὶ τὴν ὑσέρην κατῶ δῶ-
 κα. τοιγαρῶν καὶ τοῖσι προσδ' ἔτοις ἐν ὠ-
 δεσι ἐς τὴν χῶρην * ἑπιβλητέον τ' ὑ-
 σέρης, μύρω ὀκοῖον ἀπ' ἑπ' ὀροσίνες,
 ἢ ὅ ἀδνηκτον τὴν ἀφῶν, νάρεδον, ἢ * ἑάκ-
 χαρι τ' αἰγυπῆιον. ἢ τ' διὰ τῶ φύλ-
 λων ἑμαλαβάθρα, ἑ δένδρεος ἑ' ἰν-
 δικῆ, ἢ κινάμωμον κοπέν ξύν * τῶ ἐ-
 νόσμων πηλίπαι. ἐγχειν ἢ τῶ δέ,
 τοῖσι γυναικείοισι χῶροισι. ἀτῶρ ἢν ὅ
 * ἐνχυτον ἐκ τῶ δέ ξυσῆ, ἐγχειν τῆ ὑ-
 σέρη * διαχρίεν ὅ καὶ τὴν ἑδρην φουσῶν
 ἀγωγὰ. ἢ ὅ ὑποκλύζειν μὴ δριμέσι,
 μαλθακοῖσι, γλίχροισι, ὀλιωθροῖ-
 σι, ἐς τὴν τῶ κοπῆων ἔξοδον μῆνον,
 ὅκως ἢ χῶρη τ' ὑσέρης, λαπαρῆ γίγ-
 νη, ἀλθαῖης χυλῶ, ἢ τήλιος. μελί-
 λῶλον ὅ, ἢ σάμψυχον ξύν τῶ λίπαι
 ἐψείδω. ἢν ὅ εἰς ἢ * λαπάξιος ἢ ὑ-
 σέρη δέη, χείρεσι μὲν πῆζεν τ' ὑπο-
 χόνδριον γυναικὸς εὐτόνε, ἢ ἀνδρὸς

οὐκ ἔστι.
 καὶ ἄλλοι.
 ἢν ἑπιβλητέον.
 καὶ ἄλλοι.
 * ἰνδικῆ.
 καὶ ἄλλοι.
 ἐνχυτον.
 διαχρίεν.
 λαπαρῆ.

pluribus respiratio, nonnullis autem
 uox celerius intercipitur. Par est
 itaque eos, qui his miseris inter-
 sunt, prius quam mulier intereat,
 medicum accersere. Verum si for-
 te aliquando occurreris; cognita
 phlegmone uenam scindito, præci-
 pue quidem eam, quæ in malleolo:
 quæ si non bene fluida sit, eam, quæ
 in cubito est, petito. Sed a uena
 malleoli sanguinis missionem re-
 petito, Alia uero omnia admini-
 strato, quæcumque strangulati &
 citra inflammationem subueniunt:
 qualia sunt manuum ac pedum uifi-
 cula ad torporem usque adstrin-
 gunt: sæde olentium olfactus, ut li-
 quida picis, capillorum, lanæque
 exultorum, flammæ in lucerna ex-
 tinctæ nidoris, castorei, quod præter
 sæditatem odoris peruos etiam re-
 frigeratos calefacit. Lotium præ-
 terea uetus uel demortui ferè cor-
 poris sensum magnoperè suscitât,
 & uterum ad inferiores partes abi-
 git. Porro medicamenta odorata
 naturalibus sunt imponenda: un-
 guentum uerò lenè sit & minimè
 taatum uellicans, nardus, aut bachat
 Ægyptium, aut unguentum ex ma-
 labathri indicæ arboris folijs com-
 positum, aut cum aliquo odorato
 unguine tusum cinnamomum: at
 his muliebres locos oblinito. Quòd
 si ex his fassile medicamen confe-
 tur, illud in uulua infundito, An-
 num quoque flatuum eductorijs in-
 ungito. Per clysteres quoque non
 acres, sed molles, uiscidos lubricos-
 que humores indito, ut stercorea so-
 lum eijciant, sedesque utero ampla
 uacuaque remaneat. Id succus al-
 theæ, fanigræciæ præstabit: fertu-
 lam uerò aut sampsuchum cum oleo
 decoquito. Cæterum si maiore ui,
 aut depulsione uulua cgeat,
 tunc ualida mulieris aut uiri
 benè



bene tenacis^m manibus hypochon-
drium comprimatur, aut fascijs ad-
stringentibus succingatur: quò in
angustum locus redigatur, neque
iterum sursum uersus uulua procur-
rat. Item naribus apprehensis ster-
nutamenta citentur: quibusdam
enim sternutamento & contentione
uulua in propriam sedem redire po-
test. In nares autem puluis inspire-
tur ex radice lanariæ, aut piperis, aut
castoris. Item leues cucurbitulæ in
feminibus, ilibus, coxis, inguinibus
attractendæ uulua causa defigantur.
Amplius & dorso inter scapulas stran-
gulatui subueniens admoueto. Siñ
à phlegmone strangulatus proueniat;
uenâ ad pubem ueniens scindenda
est, multumque sanguinis funden-
dum. Item faciei frictions, capillo-
rum euulsiones, ut mulier ad se rede-
at, simul bene facient. At si uel pa-
rum tolerare poterit, in decocto aro-
matum desidat, odoratisque suffu-
migetur. Ante cibos castorei pau-
lum bibat, & hieræ paulum cum ca-
storeo. Quòd si ferre ualet, lauetur,
& in tempore ad antiquos usus re-
uertatur: detque operam mulier, ut
quàm facillimè menses elabantur.

εὐαφῆς, ἢ διαζώσαι τὰ μίαια σφίγ-
γοντα. ὅπως τε διελάσει τὴν χῶρον ὡς
μὴ αὐθις ἀνωθέην. πικρὰς ποιεῖν τὰ
ἐπιλαμβάνοντάς τινας. τὰ γὰρ πικρ-
μῶ, καὶ τῆ ἐντάσι μετεξείεροισι ὑσέρη
ἐς χῶρον ἤξειε. φυσὴν δ' ἐς* οἶά γε ρι-
νῶν σρεθίς ρίχης, ἢ πεπέρεος, ἢ ἔκα-
σορος. προσβάλλειν δ' σικύας κέφας,
μηροῖσι, λαγῶσι, ἰχθίοισι, βαβῶσι, ἐλ-
κέντα τὴν ὑσέρην, πρεσβάλλειν δ' καὶ
πρεθῆς, ἐς ῥάχιν, ἐς τὸ μεσηγὺ τῆ ὠ-
μοπλατέων, τῆ πινγὶ δρηγόντα. καὶ δὲ
ἐπὶ φλεγμονῇ πίνγη, καὶ διαγράσαι
τὴν ἐπὶ τῶ κλενὶ* οἰκθυμὴν φλέ-
βα, καὶ ἀφαιρέειν συχρὸν αἷμα. ἀνα-
λείψεις δ' προσώπῃ, πλμοὶ τριχῶν,
ξυῶ ἐμποιήσει ἐς ἀνάκλησιν. καὶ δ' καὶ
μικρὸν ἐπανενέγκωσι, ἐς ἀφέψημα
δρωμάτων ἐνίξιν, καὶ εὐώδεα θυτὰ
* ἰσοθυμιῶ. πίσικειν δ' * πρεθῆ
σιπίων ἔκασορος, καὶ τ' ἰερεῆς μικρὸν
ξυῶν τῶ κάσορι. καὶ ἢ ἐπανενέγκη, λέ-
ειν, καὶ ἐς ὠρον ἐς τὰ ξυνήθεα * τρέπειν.
μελεδαίνειν δ' * τὴν ἀνδρωπον, ὅπως
ἀγῆ) τὰ ἐπιμυῖα εὐργα.

* ἴσως οὐκ αὐτὸ

* φερομένη

ἐπινοησὶ

* ὑπομείνει
* πρεθῆ

* πρεθῆ

* τὸν

* ἴσως

CVRATIO SATY-
riasis.

Caput XI.

NERUORUM in uirilibus inflamma-
tio penis tentiginem facit cum
appetitu contristationeque in actu
Venereo. Fiunt autem distentio-
nes neruorum conuulsioni perfimi-
les, nunquam mitigabiles. Quin &
ipso concubitu sedari non potest
ista calamitas. Mentis quoque alienatio
sequitur. Nam primum quidem impu-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΤΥ-
ριασεως,

Κεφάλ. ια.

Τῶν ἐν τῆς ἀρδούοισι νεύρων ἢ
φλεγμασίη* ὄρθιον ἀνίχει τὸ ἀρδού-
ον ξυῶ ἐπιθυμῆ καὶ λύπη ἀφροδισίων
ἔργων πρῆξιος. ἐντάσιες δ' γενῶνται
σπασμώδες ἐδάμα πρηνόμεναι.
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆσι ἀφροδισίοισι ἀμάλ-
θακτος ἢ ξυμφορῆ. προσεκμαίνον) δ'
καὶ τὴν γνώμην, τὰ πρῶτα μὲν ἐς ἀνα-
χυρτί-



χυνήλω, ἔπι παρρησίῃ ἔπιώμας.
 θαρσείας γὰρ σφείας ποίει ἢ ἀκυρίῃ
 ἔξυνοσις. μετέπειτα ἵπταν * ἀνα-
 λωφῆσωσιν, εὐτ' αὖ σφίσι ἡ γνώμη
 ἕλεον μίμνη. πάντων ὧν εἶνεκα, ἴαμ-
 νειν φλέβα τὴν ἐπ' ἀγκῶν, καὶ τὴν ἐπὶ
 τῷ σφυρῷ, καὶ πολλὸν ἀφαιρέειν, καὶ
 πολλακίς. εἴ γὰρ ἀκαιρον νῦν λεπτο-
 θυμὴν ἐμποιέειν, ἐς τὴν ἀρκὴν ἔξυνο-
 σιας, καὶ ἐς τὰς φλεγμασίης ξυνοδό-
 σιας, καὶ ἐς τὰς ἔθερμῶς ἔκαστ' αἰδοῖον
 πρηύσιας. αἴμα γὰρ πολλὸν, θερμα-
 σίης μὲν καὶ ἔλμης ἕξαψις καρτερή.
 φλεγμασίης ἵπποφῆ, ταραχῆς δὲ
 γνώμης καὶ ἀταξίης ἕκκαυμα. κα-
 θάρσειν ἵππὸν τὸ ξύμπαν σκῆνος φαρ-
 μακῶ τῆ ἱερεῖ. εἰ γὰρ καθάρσιος δέον
 μένον, ἀλλὰ καὶ φαρμακίης προσπι-
 νέος. ὁρῶ μὲν τὰδε ἀμφω ἱερεῖ
 δύνα. καλεῖλίσειν ἵππὸν αἰδοῖα καὶ
 τὰς ἱξύας, καὶ τὴν πληχάδα, καὶ τὰς ὀρ-
 χιας ἐρείοσι τῖσι δὲ οἷος ρυπῶσι.
 ῥοδίνω ἵππὸν οἶνω διάναι χεῖ τὰ ἔεια,
 καὶ τὴν γὰρ τὰ μέρεα πολλὸν πῖμαλ-
 λον τὰδε * καταμονεῖντα, ὅπως μὴτε
 θάλψις ἐκ τῶν ἐρείων ἔοι, ἀτὰρ ἡ ἔμ-
 φυλος θέρμη ὑπὸ ψυχρῆς δυνάμιος
 τῶν χυμῶν πρηύνη. τριάδε χεῖ καὶ τὰ
 ἐπιπλάσματα πθέναι, ἀρωξὺν ἀ-
 νωγλώσῃ χυλῶ τῆ βολάνη, καὶ σρυχ-
 νῶ, καὶ σέριδι, καὶ φύλλοισι μήκωνος, καὶ
 τοῖσι ἄλλοισι, ὅσαν * νάρκην καὶ ψύξι-
 ας ἐμποίει. ἀτὰρ κατὰ χεῖεν τοῖσι ἱ-
 κέλοισι τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν πληχάδα,
 καὶ τὰ ἱχία, κωνεῖω ξὺν ὕδατι, ἢ οἶνω, ἢ
 ὄξει, μανδραγορίῃ, ἀκακίῃ, καὶ ἀπόγ-
 γοῖσι αὐτῆ τῶν ἐρείων χεῖεσθ. μεσηγὺ
 ἵππὸν ἀποκλύζειν μαλάχης ἐψήματι,

ἔπιπαρρησίῃ

καταμονεῖν

ἀρωξὺν ἀνωγλώσῃ

dentes euadunt, dum casum suum
 licentiosè narrant : audaces enim
 eos coeundi insatietas efficit. Postea
 uerò cum affectus iste deserit; tunc
 ad se redeunt, & mente optimè
 constant. Igitur omnium, horum
 causa uenam in cubito & in talo ape-
 rias, & multum cruoris, ac sæpe de-
 trahas. Neque enim id temporis, in-
 tempestiuum fuerit & ad mentis stu-
 pefactionem, & ad inflammationis
 remissionem, & ad caloris uirilium
 mitigationem faciendam, animæ
 deliquium afferre. Quippe sanguis
 multus calorem & audaciam ualdè
 accendit, inflammationem alit,
 mentis perturbationem confusio-
 nemque ueluti esca ignem procreat.
 Omne corpus etiam medicamento,
 quod Hieram, id est, Sacram uocant
 purgato : neque enim purgatione
 solum egent, sed etiam leni medica-
 tione : utrunque autem præstare hie-
 ra potest. Insuper genitalia, & lum-
 bos, & locos inter femina & inguina
 (plechada Græci uocant) & locum
 inter anum & scrotum (perinæos
 Græcè dicitur) & testiculos lanis ab-
 oue detonsis adhuc sordentibus ob-
 uoluito. Sed lanas rosaceo ac ut-
 no perfundito : partesque istas mul-
 ta irrigatione madefacito, ne ab
 lanis caliditas oriatur : imò natius
 calor à frigida humorum potesta-
 te obtundatur. Eiusmodi quoque
 cataplasmata superdanda, panis
 cum plantaginis herbæ succo, &
 folano, & feride, & papaueris folijs,
 idque genus alijs, quæcunque tor-
 pore, frigoraque iniiciunt : nec
 non & similibus uirilia & locos in-
 ter inguina & femina, & coxas il-
 linito cicuta ex aqua, uel uino, uel
 aceto : item mandragora, aut acacia,
 & spongijs uice lanarū utitor. Interea
 subluenda alius est malux decocto,
 & olco,



& oleo, & melle, omnia uero acia
 uidentur. Desigantur in coxa, cu-
 curbitula, aut in abdomine. Opti-
 ma sunt autem & hirudines ad san-
 guinem deorsum attrahendum. Et
 super uulnera cataplasma impona-
 tur micæ panis cum althæa. Postea
 in aqua desiccat, ubi artemisia, saluiæ,
 coryzaque decocta sint. At si lon-
 giori tempore uitium extrahatur,
 neque multitudo secundum propor-
 tionem minuta fuerit, & neruorum
 conuulsionis metus adest, (nam fa-
 cile in his affectibus conuelluntur;)
 curandi rationem mutare opus est.
 Quippe calefacientia admoüenda
 sunt; glucinum scilicet oleum, aut
 scyonium pro rosaceo. Lanis au-
 tem mundis & cataplasmatibus repe-
 facientibus partes illæ contegendæ:
 quandoquidem neruorum inflatio-
 nes nonnunquam huiusmodi cura-
 tio mitigauit. Amplius & castore-
 um cum mulla bibitum. Cibaria
 parùm nutrientia, frigidaque sunt;
 pauca triticea: plurima olera; ma-
 lûa, bliton, lactuca, cucurbita elixa,
 cucumis maturus elixus, pepo suo
 tempore collectus. A uino, & carni-
 bus, longo temporis interuallo ab-
 stineto: siquidem uinum est neruo-
 rum calefactio, animæ remollitio,
 uoluptatis reuocatio, genituræ crea-
 tio, ueneris que excitatio. Hæc à me in
 acutos morbos remedia scripta sunt.
 Oportet autem & iuuenem Medicum
 ipsum suo Marte aliqua sibi compa-
 rare: neque omnia ex alienis com-
 mentarijs depromere. Hoc sanè pacto
 acuta uitia fiunt, ut ordine singulis,
 quæ scripta sunt, aut omnibus uti ua-
 leas.

ὁ ἐλαίω ἢ μέλιτι. ὄχι μὲν ὅτι πᾶν. ἀν-
 τερείδωσαν σκύου καὶ ἰχθῆ, ἢ ἡτρεῖα.
 ἀεὶ αἰθῆ ἢ ἐδέλαι, νέθεν ἐλκύσαι
 αἷμα. ἢ ἴππῶσι τρώμασι ἐπίπλασ-
 μα, αἰψίχες ξυῶ ἀλθαίη. ἐπέτα ἐνί-
 ζεν ὕδαπ δρεμισίης, * ἐλελισφά-
 κες, κονύζης ἐψήμαπ. ἢ εὐτ' ἐὼ προ-
 σωτέρω μὲν μήκει χρόνε, μὴ κατὰ
 λόγον δὲ τὸ πλῆθος ἐνδιδῶ, δέος δὲ
 πασαμῶ. μάλα γὰρ τι ἴππῶσι δὲ
 σσῶν). μετὰ βάλανον καὶ τὴν θεραπεί-
 ῆν ἴππῶσι θερμαίνουσι. χρόνος μὲν γλυ-
 κίνης, ἢ σκύωνος ἀντὶ ῥοδίνης. εἰρῆσισι ὅτι
 καθαροῖσι ἢ ἴππῶσι πλάσματα ἀλει-
 νουσι. ἐμάλαξε γὰρ κοτε τῶν νδύρων
 τὰς πηήσιας ἢ τῆ δὲ θεραπείη. ἀτὰρ
 ἢ πιπίσκην ἔκαστος ἐξὺν μελικρή-
 τω. προσφαὶ ἀσσοφοι, ψυχραὶ, βρα-
 χέα μὲν τὰ σιτώδη, τὰ πλείετα λά-
 χανα, μαλάχη, ἐλίτον, θριδακίνη,
 ἐψητὴ κολοκύνθη, σίκυος ἐφθός, πε-
 πῶν ὠραῖος, οἶνε ὅτι ἢ κρειῶν, μέσφι
 πολλῆς ἀναλήψιος φειδῶ. οἶνος γὰρ,
 θάλψις μὲν ἐστὶ νδύρων, μάλα θάξις ὅτι
 ψυχῆς, ἐπανάκλησις ὅτι ἡδονῆς, γο-
 νῆς γένεσις, ἢ πρόσκλησις ἀφροδισί-
 ων. τὰ δὲ μοι ἐστὶ τὰ ὀξέα γεγράφθη
 ἄκεα. καὶ ὅτι ἢ τὸν αὐτὸν πινὰ ξυωδ-
 πορέειν, μὴ πάντα ἀλλοτρίη ξυγ-
 γραφίη προσίχοντα τὸν νέον ἔτω τὰ
 ὀξέα πάθεα γίγνε), ὡς ἐν τάξει τὸ
 ἴππῶσι γεγραμμύοισι καὶ μένοισι, ἢ
 ἅπασι χρόνοις.

* ἐλελισφάκων.

ΑΡΕ-



ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΑΡΕΤΑΕΙ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ, CAPPA DOCIS DE

χρονίων νόσων θεραπευτικόν

uturnorum morborum

βιβλίον πρῶτον.

curatiuus

LIBER I.

Προοίμιον, Κεφάλ.	α.	Prooemium, Caput	I.
Θεραπεία κεφαλαίας, κεφ.	β.	Curatio Cephalææ, cap.	II.
Θεραπεία σκοτωματικῶν, κεφ.	γ.	Curatio vertiginosorum, cap.	III.
Θεραπεία Ἰπληψίης, κεφ.	δ.	Curatio morbi comitialis, cap.	IV.
Θεραπεία μελαγχολίας, κεφ.	ε.	Curatio Melancholiæ, cap.	V.
Θεραπεία μανίας, κεφ.	ς.	Curatio Furoris, cap.	VI.
Θεραπεία ᾠδύσπιος, κεφ.	ζ.	Curatio peruororum resolutionis,	VII.
Θεραπεία φθίσιος, κεφ.	η.	cap.	VII.
Θεραπεία ἐμπυϊκῶν, κεφ.	θ.	Curatio phthisis seu ulcerum pul-	VIII.
Θεραπεία τῶν ἐς τὴν πνεύμονα		monis, cap.	VIII.
ἄποσασιῶν, κεφ.	ι.	Curatio purulentorum, cap.	IX.
Θεραπεία ἀσματος, κεφ.	ια.	Curatio pulmonis abscessuum, cap.	X.
Θεραπεία πνευμονῶδων, κεφ.	ιβ.	Curatio asthmatis, cap.	XI.
Θεραπεία ἥπατος, κεφ.	ιγ.	Curatio pulmonariorum, cap.	XII.
Θεραπεία σπληνός, κεφ.	ιδ.	Curatio jecoris ulcerum, & effusionis	XIII.
(Θεραπεία ἰκτέρου, κεφ.	ιε.	puris, cap.	XIII.
Θεραπεία καχεξίας, κεφ.	ις.)	Curatio lienis, cap.	XIV.
		Curatio morbi regij, cap.	XV.
		Curatio cachexiæ, cap.	XVI.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.


Κεφάλ. α.

Εν τῆσι χρονίησι νόσοισι ἡ ἀμβολή τῆς ἰατρείης κακόν. ἡ ἀμβλακίης γὰρ ὀκέλλει ἐς ἀνήκεστα πάθηα. Φυσίως ἀεὶ ὠδίχαι, ὡς μὴ ῥηϊδίως ἀποφοιτῆσαι. ἡ ἐσβάλλη ἀπαξ. ἢ ἢ καὶ ἐκδηθῆναι, χρόνῳ καρτερά ἐσαι, καὶ ξυναποθνήσκειν γινεῖται* κοτε, καὶ (ἂ σμικρὰ μεζόνων ποιέει) διαδέξι-
 ας κήν τὸ πρῶτον ἐς κίνδυνον αἰσίνης ἢ, ὁ ἴσος τῆς δὲ γίγνεται ὀλέθριος. καὶ ὧν μήτε τὴν νοσέοντα σιγῆ, ἢ αἰδοῖ τῆ ἐλέγχου τῆς νόσου,

PROOEMIUM.

Caput I.

IN longinquis morbis dilatio medelæ mala est : nam ob cunctationem in uitia insanabilia prolabantur. Inflatio sanè ita habet, ut non facile recedat, si semel inuaserit : at si & diutius trahitur, temporis spatio uires acquirit : & nonnunquam euénit, ut commoriatur. Exiguos quoque morbos majores excipiunt : cumque priores discrimine uacarent, eorum soboles perniciofa exoritur. Itaque nullo pacto ægrotum silere conuenit, ne morbus deprehendatur, erubescens neque



neque aufugere vim curationis in-
 tentionem : neque Medicum pigrum
 esse, ignaumque oportet : utrun-
 que enim ad morbum insanabilem
 efficiendum consentit. Nonnulli
 autem sunt ægroti, qui presentium,
 nec non & futurorum ignoratione
 ad finem usque cum morbo degunt,
 Nam plerique neque pereunt, neque
 futuram mortem suspicantur : quo-
 circa neque se Medici fidei commit-
 tunt. Horum probatio ex cepha-
 læa colligitur : de qua prius sermo-
 nem instituiam.

μηδὲ ὑποδιδρῆσκειν δεῖ τ' ἰητρῆϊς,
 μήτε τὸν ἰητρὸν καταμβλακεῖν.
 ἀμφὼ γὰρ τ' ἀνήκεσον ξυνάδοι.
 μετεξέτεροι δ' ἢ καμνόντων, ὑπὸ
 ἀγνώσεως τῆς παρεούτων, ἢ τῆς αὐ-
 θις ἐσομένων, ἐς τέλος * ξυδιαγέ-
 ον) τῆ νόσω. Ἐπιγὰρ τοῖσι πλείστοις,
 ἔτε ὀλλυντο, ἔτε ὀρρωδεῖσι θάνα-
 τον. διὰ τὰ δέων ἰητρῶ σφέας αὐτὰς
 ἐδ' ἐπιτρέψαι. πῆσι δ' τὰ ἑών, κεφα-
 λαίη, ἢς ἀμφι, πρότερον φράσω.

CVRATIO CEPHALÆA

Caput II.

Caput quanto ad vitam magis
 necessarium est, tanto diffi-
 cilliori ægritudine laborat. Atque
 morborum capitis inuasio quidem
 tolerabilis est : nam parum dolent,
 aures sonant, grauitas ad est : at si
 intendantur, finis est mortiferus.
 Igitur exiguos dolores ne spernito :
 nam & exiguis medicamentis in
 quibusdam discussi sunt. Si plus
 temporis extrahuntur, maiores cru-
 ciatus superueniunt : propterea ue-
 na cubiti incidenda est : sed duobus
 ante diebus uinum bibat. Tantum
 autem sanguinis detrahito, quan-
 tum eius uires tibi coniectanti osten-
 derint. Verum non semel totum
 detrahere magnoperè expedit. Por-
 rò quorum uires copiosam sangui-
 nis detractionem patiuntur, his
 ipsis continuo morbi discutit-
 tur : atque id omnibus longis
 ægritudinibus conuenit. Tribus
 autem quatuorū diebus inter

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕ-
 ΦΑΛΗΣ,

Κεφάλ. β.

Κεφαλή δὲ ὀκόσον ἐς ζωὴν
 ἀναγκαῖον, τὸ νόσον ἐν νούσῳ χαλε-
 πωτάτη, ἢ τῶ ἀμφιτῶν δὲ νόσων,
 ἢ μὲν ἐσβολὴ εὐπαθῆς ἐπὶ μικρῶ
 ἀλγεί, καὶ ἡχοῖσι ὠτων, καὶ βα-
 ρεῖ. εἰ δὲ αὐξήσῃ πρὸς λάβοι, καὶ
 τὰ τέλη ὀλέθρια. μὴ ὦν μηδὲ τὰ
 μικρὰ ὑπερορῆν ἀλγέα. σμι-
 κροῖσι γὰρ καὶ τοῖσι ἀκεσι μετεξετέ-
 ρισι. ἰηθικῶ δὲ πρὸς ὡ μὲν ἡκῆ
 χροῖσι. μέζω γὰρ πρὸς ἐπιγίγνεται
 ἀχθεα. τὰ μνην τὴν ἐπ' ἀγκῶν
 φλέβα. πρὸθεν δὲ θυοῖν * ἡμέ-
 ραιν, οἶνον πῖσιπεν. ξυτεκμαιρό-
 μρον δὲ τὴν δύναμιν, τὸ πλῆθος
 ἀφαρέειν. ἀριστον δὲ μὴ ἐσάπαξ
 * ἢ ἡ δύναμις τε ἀνέχεται τὴν
 πλῆθὺν τῆς ἀφαρέσει, ξυμεχέ-
 τε τῆσι αὐτέοισι μοχλένται ἢ
 νοῦσῳ. ὡς δὲ μὲν τῶ πάσῃσι τῆσι
 χροῖσι νόσοισι ξυωδόν. με-
 σηγὺ δὲ τριῶν ἢ τεσσαρῶν ἡμερῶν,
 ἀδρότε-



ἀδροτέρως διαλύαν, ἐπειτα τὴν ἰερὴν κα-
καθαρίθειον ξυὼ μελικρήτω πίσ-
κειν. ἀπάγει γὰρ μάλισα ἡ δὲ ἀπὸ τῆς
κεφαλῆς τὴν ἐσθλὴν τροφὴν. πλῆθος
ἢ ἔξ φαρμάκων, ὁκόσον τέσσαρες, ἢ
πέντε ὀλκῆς δραχμῶν. κὴν εὐκαθαί-
ρη, λέντε κὴ οἶνον διδόναι, κὴ τὴν δύ-
ναμιν αὐξάνει. ἐπειτα αὐτὸς τὰ μνη-
φλέβα ἰατρικῶς ἐπιτῶ μετώπῳ τὴν ὀρθήν.
κυριωτάτη γὰρ ἡ δὲ ἡ ἀφαιρέσις. τὸ
δὲ πλῆθος ὅσον *κοτύλης, ἢ σμικρῶ
πλεῖον. λύειν τὸ μὴ περαιτέρω.
κενεαγγεῖν γὰρ ἐχρή. ἐπειτα τὰς κό-
μας ξυρῶ ἀφαιρέοντα, σκύλω τῇ
κορυφῇ πρὸς βάλανον πρὸς τέρω.
τὴν δὲ ἐτέρω τὴν μεσηγὺ τῶ ὠμο-
πλατέων ἐρεῖδειν *ἀναίμακτον, χά-
ζεν τε τὴν ἐπὶ τῇ κορυφῆς *ἀφαιρέ-
ως ἐς τὸ πλῆθος ὀλκῆν, κὴ ἐς τὴν ἔξ βα-
θείος ὀλομῆν κεφαλαίω γὰρ τὰ μέ-
γεις ὀσέων ὀνίησι ἰμάτα. ἢν δὲ ἐς
ὠτειλὴν ἡκῆ τὰ τρώματα, τὰς δὲ
μερίας ἐκτάμνειν. *διπλαῖ δὲ, αἰ-
μῶ κατόπιν εἰσὶν ὠτων σμικρῶν *π
πρὸς ὠτῶν, δὴ λαμῆ τὰς διασφύ-
ξοι. αἰ δὲ ἔξ ὠτὸς ἐς τὰ μ πρὸς ὠτῶν,
αὐτῶ πλῆσιον. παράγεται γὰρ τῶ
αἰνπετόχω. ἀτὰρ κὴ αἰδὲ δὴ λαμ
διασφύξοι. τὰ μνην δὲ πρὸς τοῖς
ὀσέοις τὰς μέζονας. αἰδὲ γὰρ ὀνίησι.
Ἰπικέα) καὶ ἑτεροῖς ἐκάστωι καὶ ἔτα
*λεπταῖ, ἄς ἐδ' ὄφελος ἐκλάμνειν.
ὁ δὲ τρώπος ἐν τῆσι χειρουργίησι λέ-
λεκ. μετα δὲ τὸ ἄκος, κεφαλαίη-
σι, κὴ ἐπιληψίη, κὴ σκιδώμασι, κὴ ξυμ-
βλήθειν *ἀπάσῃσι τῆσι τῇ κεφαλῆς
νοῦσοισι. Ἰπὶ πᾶσι δὲ φλέγμα α-
γὰρ κὴ πρὸς κενώσασθαι τὴν γαστέρα,

ἢ πλεονεξία.

ἢ ἀναίμακτον.

ἢ ἀφαιρέσις.

ἢ τὴν

ἢ ὀστέων.

ἢ π

ἢ πρὸς

ἢ πρὸς

jeotis liberalius alendi sunt. Dein-
seris purgatorium, hieram quod
uecant, cum mulsa propinandum,
ea enim a capite morbi alimentum
maximè abducit. Modus uerò me-
dicamenti quatuor aut quinque
drachmarum pondo esto. Quod si
benè purgauerit; tunc lauandus
est, & uinum exhibendum, & ui-
res augendæ. Postea iterum uena
frontis recta scindenda est. Hæc
enim est oportunitissima sanguinis
detraçtio. Modus autem esto he-
mina, aut paulò plus: neque ultra
sanguinem mittito, quoniam uasa
inanire non expedit. Deinde ca-
pillis nouacula detraçtis cucurbi-
tulam priorem uertici affigito, alte-
ram inter scapulas citra sanguinis
effusionem admoueto: & eam, quæ
in uertice fixa est, liberius scarifica-
to: quò sanguis uberius attrahas-
tur, & partes profundiores inci-
dantur. Remedia nanque ad ossa
usque penetrantia cephalzam ju-
uant. Quòd si uulnera cicatricem
ducant, arteriæ secantur: duplices
autem sunt, aliquæ post aures paulò
ulterius, proprijsque motionibus
produntur: aliæ uerò aurium arte-
rix prorsum uersus sitæ sunt auribus
proximæ: nam instrumento, quod
Antitrochon Græci nominant, ad-
ducuntur. Verùm hæ quoque pro-
prijs pulsationibus innotescunt. Nem-
pè majores ossibus uicinæ secantur:
hæ nanque utilitatem afferunt. Ad-
jacent & aliæ singulis auribus oppi-
dò tenues, quas incidere prorsus inu-
tile est. Modū uerò incidendi in libris
de manuū operationibus exposui. Cæ-
terum post medelâ incephalea, morbo
comitali, & uertigine, utq; semel dicā
in omnibus capitis uitijis (prius uētre,



ant purgatorio, quod deuoetur, aut
 clystere, euacuato) pituita euocan-
 da est modo è naribus per sctnu-
 tatoria, modo ex ore per ducen-
 tia pituitam. Species autem ster-
 nutamenta citantium sunt piper,
 radix herbæ sanatiæ, fibri testiculus.
 Hæc quidem sunt uulgata & com-
 munita. Ad læuorem autem terito,
 & cribrato, & calamo aut crassiore
 pennis anserinæ caule inspirato.
 His efficacius in attrahendo uiolen-
 tiusque euphorbium est cum aliquo
 ipsorum mixtum. Quin etiam cum
 oleis miscetur gleucino scilicet, aut
 scyonio, id est, ex cucumere sylua-
 tico, aut cum unguento ex styrace:
 redditur autem magnopere liqui-
 dum, ut fusile sit. Infunditur per
 nasi fistulam: hæc uero geminæ sunt,
 atque, ab uno canali cognatæ & co-
 hærentes adeo, ut semel utrisque in-
 fundendum sit. Neque enim tolera-
 bilis est alterutritus naris sigillatim di-
 latatio. Nam protinus caput accen-
 ditur, & acerbus dolor inuadit. Quæ
 autem per os pituitam eliciunt, hæc
 sunt: sinapis, granum enidium, piper,
 una taminita: id præstant uel mixta,
 uel singula. Cæterum quoniam &
 ipsa mandere, & expuere assiduum
 est: iccirco & cum aqua, aut mulla,
 aut posca permixta danda sunt: at-
 que os eluendum. Ad tonsillas enim
 impulsio humore extentoque collo
 expirationis flatu abluatur. Postea-
 quam pituitam, quantum libet, edu-
 xeris, permulta aqua calida lauan-
 dum caput, atque perfundendum:
 ut perspirabile atque diffilabile red-
 datur: ingentes enim obstructions
 sunt. Cœna frugalis & simplex esto:
 in qua & uinum ad stomachi restitu-
 tionem sumatur, siquidem & ipse
 magno dolore uexatur. Interea uero
 ubi uires ægri stabiliueris, lotio-
 ne per clysterem usitata opus est:
 in qua nitri multum inspergatur,

ἢ καὶ ποτὶ ὑπερλάτῳ, ἢ κλυσμῷ.
 ἄλλοτε μὲν ἐκ ρινῶν πιαρμικοῖσι,
 ἄλλοτε δὲ διὰ σώματος τῖσι ἀγασθ
 φλέγμα. εἰδητὲ, πιαρμικῶν μὲν,
 πέσσει, σπρβιθῷ ἢ ῥίζα, κάσφορος τῆ
 ὄρχιος. ταῦτα ἐξ ἑωῆ. ἐς λεπία ἢ κό-
 ψαντα, καὶ σπσαντα, καλάμῳ ἐμφυ-
 σήν, ἢ καυλῷ πλερῶ χηνὸς παχεί.
 ἀγωγότερον ἢ τῆσδε καὶ βιαγιότερον
 εὐφόρβιον ξυὸ πνι τῆσδε μιχθέν. ἀ-
 τὰ ἐξ ἐλαιόισι ἢ μίσγε) γλυσκίνῳ,
 σικωνίῳ, ἢ πῶ δ' ἀπὸ σύρακος μύρω. ὑ-
 γρὸν ἢ γίγνεται κάστα, ὡς ἐκχυθῶν.
 ἐγχεῖται ἢ διὰ ἔρινος γ' αὐλῆ. δι-
 θυμοι ἢ οἶδε, ξυμφυέες ἀπὸ μῆς εὐ-
 ροῆς, ὡς ἐσάπαξ ἀμφοτέροισι ἐγ-
 χέειν. ἐ γὰρ ἀναχετὴν ἢ διὰ σασίς ἐ-
 κατέρε μυκτῆρος ἰδίη καὶ ἰδίη. πῆ-
 πτα) γὰρ ἢ κεφαλῆ αὐτίκα, καὶ δριμύ
 ἀλγος αἰρέει. ταῦτα ἢ διὰ ἔ σώματῷ
 ἀγασθ φλέγμα, σίνηπι, κόκκος ὁ τῆ
 κνίδης, πέσσει, σαφίς ἀγρή. ταῦτα ἐξ ὑν
 ἀγρήλοισι καὶ ἰδίη. ἐπει ἢ καὶ τῶ μασ-
 σήσασθ μὲν αὐτῶ, καὶ τὸ πλῆεν ξυω-
 χέει ἐστὶ, καὶ ὑδαπὴ ἢ μελικρήτῳ, ἢ ὄξυ-
 κρήτῳ μίξαντα διδόναι, κλύζον τε τὸ
 σώμα, καὶ ἐς τὰ παρίσθια παρῶσαν-
 τα ἀνιάσι ἔ αὐχένος, τῶ τ' ἐκπνοῆς
 πνεύματι κλύζειν. ἐπὴν ἢ ἐς ὅσον θέ-
 λης τὸ φλέγμα ἀγάγης, λείπει καὶ
 κάλομονεῖν τὴν κεφαλὴν κάστα πολ-
 λῶ θερμῷ ὑδαπὴ ἐς διαπνοήν. ἰσχυραὶ
 γὰρ γίγνονται σφηνώστες δειπνοὶ ἐν-
 τελές. ἐσὼ ἢ καὶ οἶνῷ ἐς ἀνάκλισθ
 ἔσσομαχῶ. μάλα γὰρ τρι καὶ ὠσε
 πονεῖν. ἐπὴν δὲ μεσηγὺ τλω δύνα-
 μιν ἐδράσης, κλυσμῷ χεῖρῶ τῶ ξυ-
 νήθει, λίτρε πολλὸν ἐμπάσων,
 ἢ ῥητί.



* τριμυδίνης.

ἢ ῥηπίνης ἢ ἄπο τῆ * τερμίνθε τῆ δέν-
 δρεος ἐντήκων ὀλκῆς δραχμὰς δύο.
 ἐς τὴν Πιπύσαν ἡμέτην αἵμα τρι-
 νὸς ἐνδον ἀφαίρειν, ὡς εἶσω παρω-
 θεῖται τὸ ὄργανον, κατὰ δὲ εὐμη-
 κες, ἢ τὸ καλεόμενον σορύνη, ἢ εἰ τις
 ἐλλήπῳς πρὸς τὰ δὲ ἔχει, χηνὸς χεῖ
 πτεροῦ καυλῶ παχέος ἀπο γλύ-
 ψαντα τὰ μνην ἰανυθρα ἐς * ὀδόντα,
 ὅπως πρὶς ἡρα. ἢ τὸ δὲ ἐς ῥίνα καπέ-
 ναί, μέσφι τῶν ἰσμοειδῶν. ἐπειτα
 ἀμφοτέρωσιν χερσὶ κινέειν, ὡς * ξυγ-
 χαράσοιτε ὑπὸ τῶν ὀδόντων ὁ χῶ-
 ρθ. ῥηπίδι ἢ ἢ πολλῇ τῆ αἵματος ἢ
 φροῆ. φλέβες γὰρ ἰσχυρὰ τῆ δεξιάς
 σι, ἢ ἰσχυρὰ σώματα μαλακὰ ἢ εὐμη-
 τα. ἔασι ἢ ἢ τοῖσι δημόσι (πολλοὶ τῆ
 ἐγχαράξιος οἱ τρέποισι, ἢ ἑοτάνησι)
 τση χεῖρσι, ἢ φύλλοισι δάφνης ξη-
 ροῖσι, ἐνθέντες τὰ δὲ, ἢ πρὸ δακτύλοισι
 σι κινέειν εὐτόνωσ. * κενώσαντα δὲ
 * ὀκόσον χεῖ. ἔσω ἢ πλῆθος ἐς κοτύλης
 τὸ ἡμισυ. μάσαιν ἀπό γγοισι ἢ ὄξυ-
 κρητῶ, ἢ ξηρόν π ἰσχυρὸν ἐμφυσῆν,
 κηκίδα, ἢ χριστὸν συνηκίω, ἢ * βα-
 λαύσιον. ἢ ἢ τῆ τετέοισι ἢ κεφα-
 λαλγίη μίμνη, ἢ ἢ τε ἀπαυή, αὐ-
 τὸν χεῖ ἐς τέλος ἢ κεν τῆς ἰσχυρῆς. Φι-
 λυπόσροφον γὰρ κακόν, καὶ ἐν ἑδρῇ
 ἰζον τὰ πολλὰ φωλεύει. χεῖ ὡν ἀ-
 φαίρειντα ἰσχυρὰς κόμας ξυρῶ, ἢ γὰρ τὸ
 δεκεφαλῆ ὀνησίον. καίειν πρὶς ἢ
 καυτήρων, Πιπολῆς μῦ, ἐς μύας.
 ἢ ἢ μέσφι ὀσέξ ἐθέλης, ἀπάνδθεν
 ἢ τῶν μυῶν. μύες γὰρ καυθέντες, ἔα-
 σι σπασμῶν πρὸς κλήσιες. κην μῦ
 Πιπολῆς καύσης, οἶνον ἐνώδη λα-
 κὸν ξυρὸν ῥοδίνῳ καταιοεῖν ἄλλης.

* ὀδόν ὄν.

* ξυγχαράσοι
τ.

κενώσαν δὲ.
ὀκόσειν χεῖρ.

καλαύσιον.

aut resinæ à terebintho arbore pōnā
 do drachmæ duæ eliquentur. Postri-
 die: sanguis è nasi interioribus de-
 trahatur: intrò enim prælongum
 instrumentum immittitur, quod Ca-
 rejadion uocant, aut illud, cui Stoa-
 ryne nomen est. Aut si quis horum
 copiam non habuerit, pennæ anse-
 rinæ caulem crassiorẽ sumere de-
 bet, ejusque neruolam partem denti-
 culatim instar ferræ incidere, atque
 sic in narẽ usque ad ossa, quæ ob
 cribri seu colatorij similitudinem
 Ethmoeidẽ uocantur, immittere: de-
 inde utraque mãnu agitare, quò locus
 à dentibus inculpatur, ac uulnere-
 tur. Facilis est autem ac copiosus
 sanguinis cursus: nam graciles ue-
 næ hic desinunt, corporaque hac in
 parte mollia sunt, & sectioni habilia.
 Verùm & multos nares uulnerandi
 modos uulguis nouit, herbas scilicet
 asperas, & arida lauri folia naribus
 imponentes, aut digitis eas fortiter
 agitantes. Cùm uerò quantum satis
 sit, euacuaueris, quod erit hemina
 dimidium, coërcendus sanguis est
 spongijs & posca. Aut aliquod ari-
 dum, quod sistendi sanguinis uim ha-
 beat, naribus inspirandum, galla,
 aut scissile alumen, aut balaustrum.
 Verum enim uerò post hæc remedia
 siue dolor capitis perseveret, siue de-
 sinat; oportet ad finem hujus medi-
 cationis peruenire. Quoniam id
 malum sæpe reuertit solet, & in suo
 uigore consistens plerunque delitescit.
 Itaque nouacula de rasis capil-
 lis (quandoquidem & hoc capiti pro-
 dest) ferramentis candentibus uren-
 dum est, si in superficie, ad musculos
 usque peruenias: sin offetenus pe-
 netrare uelis, à musculis caueto. Nam
 musculi exusti neruorum distentiones
 cient. Quòd si in summa cute
 usseris, uinum odoratum album
 cum rosacco infundere satis est.

Pittari-



Pittacium uerò malefactum, per triduum supra crustas extendito. Quòd si crustæ altius descendant; porti comam cum sale tritam, linteoloque illitam superdato. Tertio die crustis summam cutim tantum occupantibus ceratum ex rosa: profundioribus autem lentem ex melle imponito. Sed quæ medicamenta cicatrici ducendæ sint, alio loco descripsimus, Nonnulli super frontem ea in parte, ubi futura est, quæ Corona dicitur; cutem offetenus inciderunt: illudque aut exterentes, aut excidentés usque ad meditullium (quam Græci Diploen nominant) ad carnis repletionem perduxerunt. Alij & ossa ad membranam usque perforarunt. Verùm id genus remedia temeraria sunt: nihilominus tamen adhibentur, si omnibus alijs tentatis adhuc cephalæa perseuerat, & æger est animosus, uel corporis robur excellit. Nempe si paulatim ad sanitatem accessio fiat; exercitationes recto corpore pectori humerisque adhibeantur, manuum fiat gesticulatio, alteres jacentur, saltu corpus moueatur, atque in his peritè corpus torqueatur. Primò & postremò crura fricentur, medio tempore caput. Picitio assidue picem inspergendo administratur. Item eaput rubrificandum nonnunquam sinapi cum duplo pane affricando, ne intolerabilis ignis excitetur: nonnunquam medicamenta simul illinendo, quale est illud, quod ex adarce, & euphorbio, & pyrethro componitur. Proficit autem & ad dolorem in tempore sedandum, & ad radicem mali extirpandam thapsiæ succus, & medicamina cum ipsa jungenda, quotcunque cutim tumefaciunt, & uaris similia tubercula excitat. Victus ratio in singulis dolorû generibus tenuis esto: exiguus potus, & aquæ potio ante ullâ

ὀθόνλω ἢ χεῖρ ἰτέγξαντα Ἰππεταν-
 νύαι τῆσι ἐχάρησι, μέσφι ἡμέρης
 τρεῖς. ἢ ἢ βαθεῖαι ἕωσι αἰ ἐχάρηαι,
 πρῶτα χεῖρ κόμην ξύν αἰ τρεῖς ψαν-
 τα, ἢ ἢ ἐς ὀθόνλω ἐγχεῖσαντα πθέναι.
 τῆ ἢ τρεῖς κηρωτῆν ἐκ ῥοδίνε Ἰππείσοι
 ἐπιπολαίοισι, ἢ φακόν ξυμέλινι,
 Ἰππείσοι βαθείοισι ἐχάρησι πθέναι.
 ὀκόσα ἢ Ἰππείσοι φάρμακα, ἀλ-
 λη πη γέγραψε. ἔταμόν πινεσ ὑπέρ
 μέτωπον κτλ. σεφάνην τὸ δέσμα
 ἀχρῖς ὀσέε, καὶ τόδε Ἰππείσοι, ἢ
 ἐπικόψαντες μέσφι διπλόης, ἐς σάρε-
 κωσιν ἢ γαγον. οἱ δὲ ἐς ἐσέτρωσαι τῶ
 ὀσέω μέσφι μῆνι γος. εὐτλμα δὲ
 τὰ ἀκεῖα. ἀλλὰ χεῖρ ἰτέγξαντα, κῆν Ἰππείσοι
 μὲν ἢ κεφαλαῖν Ἰππείσοι, ὃ ἢ νοσέ-
 ων εὐθυμος, ἢ ὀτόνος ἢ σώματος ἀ-
 γαθός. ἢ ἐκ παρσαγωγῆς ἕωσι,
 γυμνάσια ὀρθὰ ἐς σέρενα, καὶ ὠμῶς,
 χειρονομίη, * ἀλπίρων βολή, ἕξαλ-
 σις, καὶ ἢ ξυμβυαῖς δότος ἐν τετῶσι ἀ-
 νείλησις. τρεῖς τὰ πρῶτα καὶ τὰ ὑ-
 στα σκελῶν, κεφαλῆς ἢ ἐς μέσον.
 πιποκοπή τῶ * ἐμπάπειν ξυνεχῆς.
 * φοινίσαι ἢ καὶ τὴν κεφαλήν, ἀλλοτε
 μὲν σῖνη πξύν ἀξίω διπλόω ἐγχεῖσαν-
 τα, ὡς μὴ ἀφόρητον εἴη τὸ πῦρ. ἀλλοτε
 δὲ φάρμακα ξυναλείφοντα, ὡς τὸ
 ξύνθετον τὸ διὰ τὸ λιμνήστος καὶ εὐ-
 φορβίς, καὶ πυρέθρη. ἔχει ἢ καὶ ἀνοσλον
 ἀδείτε τὸν ἐν καιρῶ πόνον, καὶ ἐς μόχ-
 λωσιν τὸ ρίζης ἢ κακῆ. θαψίης ὃ ὀ-
 πός, καὶ τὰ ξυμ τῆδε * φάρμακα, ὀκό-
 σα ἐσοιδάινει τὸ δέσμα, καὶ ἰόνθοισι
 ἰκελα ἐκφύει βλασημάτα. διαίται
 δὲ, ἢ μὲν ἐφ' ἐκάστω τῶ ἀλγέων,
 * λεπτή, ὀλιγοποτή, καὶ ὑδροποτή

καυτέρω
 βολή.

ὡς ἐμπαπ-
 τειν.

φοινίσαι.

ἐγχεῖσαντα.

φάρμακα.

* λεπτή.

T Ἰππεί-



ὄπιθεν ἐν μάλισα ἀκέρως πινος, ξύμπαν δὲ δριμύων μὲν ἀφ' ἐξίς, κρομμύων, καὶ σκορόδων, καὶ ὅπερ τὴ σιλφίᾳ, σινηπίος ὅμη παγχυ, καὶ γὰρ τὸ δριμύ αὐτὲς, πρὸς τῇ ἔσομαχῶν ἄρεσιν, καὶ ἐς κεφαλὴν ἐκ ἀχαρῶν, φλέγμα χυόν καὶ διαπνέον, ἢ διαλαύνον κατὰ ὁσπριῶν κακίσειον καμμός, καὶ ἐς τὰ ἔδρα εἶδεα, πινος, καὶ ὠχρεῖ, καὶ δολιχοί, δριμύτερον, φακοί, οἷγε ἔχασιν μὲν πινος ἀρείας πέψις τε καὶ σκρητίσιος, κεφαλῆς ὅπλησιμιον καὶ * πόνος ποιητικόν. πλεῖ ἐψηθέντες ξύν πέσσει, ἐκ δὲ ποξενώλει. χόνδροι ὅτε πλεῖστοι χαλεπότες, ξύν οἶνω καὶ μέλιτι ὅσον ἠδύνα, καὶ τὸ σκρητίων ῥόφημα, καὶ οἱ ξύν ἀπλοῖσι ζωμοῖσι. καλοὶ γὰρ καὶ οἱ ἐν τῇ καρυκείᾳ καρποὶ, * κρεῖ, κοριάνθ, ἀνίσ, σελίν, καὶ τριτέων * κρεῖσων, ἢ ἠδύνα σμῦνη βοτάνη, καὶ γλήχων πρὸς τῶσι ἐυάδεσι, ἰχθεῖσι καὶ ἔρων * ἀγαθόν, καὶ φυσῶν ἔξοδον. κρεῖων δὲ, πόνος μὲν τὰ παλαιὰ πάντα. νεοφαγῆ ὅ, ἀλέκτορος, πλωῶν ἢ φάσα, ἢ πελαγία, καὶ τὰ ἄλλα ὀκόσα μὴ μάλισα πίνον, συῶν τὰ ἀκέρως, λαγῶς * ὀπθός. βοός ὅ, καὶ εἰός * παχύκοντέ, καὶ κεφαλῆς πλεῖσιμιον. ἐριφος ὅ, ἔπαντη κακός, γάλα καὶ τυρῆσι κεφαλαγέες ἰχθύων, οἱ πετρεῖοι, ἢ δὲ ὀκόσοι καὶ χῶριν, ἀριστοὶ λαχάνων ὅ * ἐφθῶν μὲν, ὀκόσα ἔρων καὶ κοιλία ἐυπαγωγὰ, μαλάχη, ἐλίτον, τεῦτλον, ἀσπαραγοί, δριμύ ὅ καὶ κρεῖ μῆ. ὠμά δὲ, θριδακίνη πάντων ἀρεῖων. ρίζαι δὲ πονηραὶ, καὶ ἐφθαί, ραφανίδες, γογγυλίδες, σαφυλίνοι.

Λι

* κρεῖ.
 * κρεῖσων.
 * ἀγαθόν.
 * ὀπθός.
 * παχύκοντα.

medelam, potissimum, adhibeatur. Ex toto uero ab acribus, temperet, cepis, allijs, & succo lazergith. Sinapi autem non penitus: siquidem ejus acrimonia, præterquam quod stomachi uim, roborat, capiti quoque haud ingrata est; pituitam fundens acidiffans, aut ad inferiora deturbans. Leguminum pessima faba est, & ejus species pisa, & quæ à Græcis ochti, & dolichi nuncupantur: illi cicerculæ folio similes, hi faseoli aut lobi à nonnullis uocantur. Secundo loco ponitur lens: quæ nonnullis concoctionis, excretionisque uirtutibus prædita est: sed caput replet, doloremque concitat. Nihilominus cum pipere elixa sperrenda non est. Farlotum haud ingratum est cum uino & melle, quantum ad condimentum satis sit: & ex ipso conflata sorbitio, & ejus femina in simplici jusculo decocta. Vtique bona sunt & in condimento, quod Græci caryceiam uocant, femina cari, coriandri, anisi: apij uero semen ijs anteferendum. Mentha herba, & pulegium præterquam quod bene olent: quandam uim habent, & urinam mouendi, & flatus per inferiora expellendi. Inter carnes uetustæ omnes damnantur, nuper interfecti galli carnes laudantur. Inter aues torquatus palumbus, columbus, & aliæ quæcunque haud ita multum pingues sunt, suum extremitates, lepus affatus. Bubula ouillaque caro crassum succum creat, & caput replet. Hædus non penitus malus. Lac & caseus caput dolore uexant. Ex piscibus saxatiles deligendi, & quotquot in ea regione optimi censentur. Olerâ elixa quidem ea assumantur, quæ lotium & uentrem citant, málua, blitum, beta, asparagi, acris uero & brassica est. At inter cruda lactuca omnium est optima. Radices autem elixæ prauæ sunt. Radiculæ, rapæ, pastinacæ urinam



urinam mouent, sed caput explent, iisarum flatus edit, & uentriculum tumefacit. Vinum album tenue dulce admittatur, tantum adstrictionis habens, quod aluum non remoretur. Omnia bellaria capiti inimica, quin præter & palmularum omne genus. Ficus autè & uua demulcent, & quicquid ea parte anni, quam Horam Græci uocant; bonitate præstat. Sed quibuscunque uel etiam iuuantibus satiari malum est, peior est cruditas: labores minus, quàm cruditas nocent: nihilominus & ipsi sunt detrimentosi. Deambulationes matutinæ aluo prius exonerata citra spiritus difficultatem bene feruntur, optimæ sunt etiam & à cæna gestatio longa per loca non uentosa conueniet. Atque ubi sol caput non feriat: ei nanque sirius officit. Vfus ueneris capiti ac neruis labem accersit. Peregrè proficiscatur agrotus in regiones calidiores ex frigidioribus, & in sicciores ab humidioribus. Confert & nauigatio, & in mari uitæ traduatio, & si quis sit maris accola, in salsa aqua frigida lauari, & in mari natate, & in atena uolutari, uiciumque ex mari quærere proderit. Doloris uerò capitis, quem Eterocraniam Græci nominant, eadem medicamina sunt: nam quæ toti capiti remedia conducunt, eadem singulis ejus partibus adhibere, bonum est. Quibuscunque uerò per hæc morbus depulsus non fuerit, ijs reliquum est, ut ueratro utantur, ut pote ultimo atque ualentissimo omnium remedio.

ἐρηπικὰ μὲν, πλήσμια δὲ. σίσαρον
 Φυσῶδες μὲν καὶ σομάχε ἐπαρπι-
 κόν. οἶνⓄ λυκός, λεπτός, γλυκὺς
 μὲν ἐγγεγράφθω, εὐψιⓄ ἔχων,
 ὡς μὴ ἴχεν τλιώ γαστέρα. πρᾶγμα
 παῖν, κεφαλαλγές, πλὴν φοίνικες
 πάσης ἰδέης. σύκων ἢ ὀπώρη καὶ σα-
 φυλὴ πρσοπνές, καὶ ὁ, πᾶν ἔπι τ᾽ ὥρης
 ἄριστον. πλησμονὴ πᾶντων καὶ τῶν
 *ὠφέλειων κακόν. κάκιον ἢ ἀπε- ^{φιλάται.}
 ψίη. κόποι ἀπεψίης μὲν αἰσινέεροι.
 ἔπι βλαβείες ἢ καὶ οἶδε. πρῶτα τι ἐω-
 θεν ἔπι τ᾽ κοιλίης ἐκκρίσει. *εὐπνοοί ^{εὐπνοοί.}
 ἢ εὐφοροί. ἄριστοί ἢ καὶ οἱ ἔπι τῶν δει-
 πνῶ. αἰώρη μακρὰ, νήνεμⓄ, ἀνήλι-
 ος τῆ κεφαλῆ. κακός γ᾽ αὐτῆ ὁ σεί-
 ερος. ὀμιλίη γυναικός κεφαλῆ, νεύ-
 ροις, κακόν ἔπι σπασσον. ἀποδημίη
 ἐς θερμότερον ἀπὸ ψυχρῶν, καὶ ἀπὸ
 ὑγρῶν ἐς ξηρότερον. ξύμφορⓄ δὲ
 πλοῦς, καὶ ἐν θαλάσῃ * ἐξαγωγή ^{καὶ διὰ γυ-}
 βίς. κῆν πρᾶξιός τις ἢ, ἀγαθὸν λέ-
 εἶται τε τῆ ἀλμυ ψυχρῆ, καὶ νήχεαδ
 τῆ θαλάσῃ, καὶ τῆσι ψάμμοισι ἐγ-
 καλινδρέεαδ, καὶ βιοτέυειν ἐς θάλασ-
 σαν. ἐτεροκρανίης ταῦτ᾽ ἄκεια.
 ὀκοῖον γ᾽ τῆ κεφαλῆ ὅλη ἄκεια
 πρόσφορα, τοῖσδε πρὸς ἅπαν τ᾽
 κεφαλῆς μέρⓄ χρέεαδ καλόν. ὀκό-
 σοισι ἢ ἐκ τῶνδε ἀφυκτρῆν ἔσⓄ,
 ἐλλεβόρω χρέεαδ, τῆ ἐσχάτῃ καὶ δυ-
 νατώτατῃ πάντων ἀγωγῆ.

CVRATIO VERTI-
 ginorum,

Caput III.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΟ-
 τωματικῶν,


Κεφάλ. γ.

Τ. 1. Καὶ



Καὶ ἐκ διαδέξις μὲν κεφαλαί-
 ης γίνεταί σκορδίνη. ἀτὰρ καὶ αὐτὴ
 πρῶτη ἐπ' αὐτῆσι φύεται, αἰμορροί-
 δων ῥόα Ἰπποχέσι, κῆν δὲ ῥῶος αἵμα
 μὴ ῥεῖ πρὸς ὄθεν ῥέον, ἢ μὴ διαπνεῖ
 ῥοκλίως, ἢ ἰδρωπὶ, ἢ πόνω πρὸς ὄθεν
 πόνου μύρον. καὶ μὲν (ὦν) Ἰππὶ τῆ κε-
 Φαλαίη ξυσῆ, (ἀδὲ χεῖ πρὸς ἄσιν ἐς
 ἴπιν, ὁκόσα ἐπὶ τῆσι κεφαλαίησι λέ-
 λεκ'). ἴσι δὲ καὶ βιαϊότερον ἰπὸς χεῖ
 ἐς τέλος τῶ ἀκείων, ὕστερον φεράσω.
 ἢν ὅ λπὸ τῶ Ἰπποχέσι ὕστερον ἢ ἕ-
 σος δὲ πρὸς. τὴν ξυσῆν ἐκκρεῖσιν κί-
 νέειν ὑγιεινὸν γὰρ τὸ φύσις ἢ παλιν-
 δρομίν. καὶ ὅ μὲν * μάλα, τὸ ὅ πα-
 θος αὐξή, Ἰππὶ μὲν τῆσι ἀλλήσι Ἰπ-
 ποχέσι ἴσι δια ῥῶος, ἢ ἰδρωπῶν, ἐλέ-
 βατάμνειν τὴν ἐπ' ἀγκῶν. ἢν δ' ἐπὶ
 ἡπάτι πλημμεύροντι ἢ σπλίνι, ἢ πνε-
 ῦτων ἐν τῆσι μέσοισι σπλαγχνῶν, ἀ-
 ρῆγον ἢ σκίβη. χεῖ δὲ ὁκόσον αὐτὸν ἐκ-
 φλεβὸς πολλὸν ἐκρεῖ, ῥοσὸν δὲ ἐκ-
 τῶν δὲ ἀφαιρέειν αἷμα. τὸ δὲ γὰρ τῆς
 πρὸς φάσις ἢ πρὸς φῆ, ὡς πρὸς δὲ καὶ
 γαστῆρ. ἐπὶ ὅ τῶ δὲ, τὰ τὸ κεφαλαίη ἀ-
 κέα ξυσῆ πλεν, φλέβα ἴπιν ἐπὶ τῶ με-
 τῶ πρὸς ῥῶος τὰ μνησῆ, ἢ τὰς ἐκατέ-
 ρωθεν τὸ ῥῶος πρὸς τοῖσι κληθῆσι, σι-
 κύλω τῆ κορυφῆ πρὸς σβῆλιν, ἐκ-
 κόπλεν τὰς δερμείας, ξυσῆν τὴν κε-
 φαλίω, φοινίσειν, φλέγμα ἀγειν
 δια ῥῶων πιαρμικοῖσι, ἢ δια σώματος
 ὁκῶς ἐλεξα. ἀπαντὰ πρὸς ἄσιν ἐν
 κόσμῳ τῶ Ἰππὶ τῆ κεφαλαίη εἰρημέ-
 νω, πλὴν ὁκόσον κυκλαμίνε χυλὸς,
 ἢ ἀναγαλλίδος ἐγχυτῆς εἰς τὴν ῥί-
 να ἐχθὲ τὴν πρὸς ὄσιν. ἐπὶ ἢν ὅ τῶ ἀ-
 φῆ τὴν κεφαλίη ἀκείων ἢ κῆ ἐς τέλος,

ET succedit cephalææ uertigō, &
 ipsa per se proprijs de causis ori-
 tur, si profluuium ab hæmorrhoidi-
 bus coëctetur, si enaribus sanguis
 non effluat, qui prius effluere con-
 fuerat, si corpus non diffletur aut
 sudore, aut labore antea fatigatum.
 Igitur si ab cephalæa ducit originem,
 ea medendi ratione uti debemus;
 quæ ad cephalæam supra exposita
 est. Quibus autem uolentius cum
 ultimis remedijs occurrendum sit,
 posterius explicabo. Sin ab aliqua
 humorum suppressione morbus in-
 eiderit, usitata excretio mouenda
 est. Naturæ nanque salutare est ma-
 teriæ recursus. At, si ista tardat,
 malum uerò increfcit, in alijs qui-
 dem suppressionibus aut sanguinis
 è naribus manare assueti, aut sudo-
 rum sanguis mittendus est è uena cu-
 biti: sin ab jecore multis humori-
 bus affluente, aut aliene, aut ab ali-
 quo ex uisceribus in medio corpore
 positis uertigo prodeat; cucurbitulæ
 subueniunt. Sed quantum ex ue-
 na defluit, tantundem per has san-
 guinis est detrahendum. Sanguis
 enim est causæ alimentum, quem-
 admodum & uentriculus. Deinceps
 capitis remedia subjungenda; uena
 frontis recta, aut nasi uenæ utrin-
 que in angulis secandæ; cucurbitula
 uertici affigenda, arteriæ inci-
 dendæ, caput radendum, rub-
 rumque faciendum: pituita è
 naribus per sternutatoria, aut ex ore,
 quemadmodum docui, euacuanda:
 omnia denique modo in cephalæa
 narrata administranda, duntaxat adij-
 citur cyclamini succus, aut anagalli-
 dis in nares fundendus. Postea-
 quam uerò medicaminum ca-
 pitis ad finem perueneris, deinde
 quot-



quotquot effraciora ad uertiginos inueniuntur, ea sunt adhibenda. Vomitibus à cæna, nec non uomitibus ab esu radicalarum uti postea decet : quin etiam ad ueratri assumptionem hæc præparatio fuerit. Nam præexercendus est stomachus, cum uehementioribus uomitorijs uti uolumus. Pituita quoque in præsentia magis attenuatur, & ad ueratrum benefunditur. Veratri exhibendi modi plures sunt, ut ualidioribus quidem succurrat ad magnitudinem amæ, id est, placentulæ, aut paulò crassius est incidendum : & cum farre loto, aut lente assumitur pondo drachmæ duarum. Imbecillioribus autem & gracilioribus decoctum cum melle propinatur. Duarum aut trium mystillarum modus esto. Quis uerò sit faciendi modus, alio loco declarabitur. Inter singula autem remedia æger cibis reficiendus est : quò ea, quæ interim incidunt, sustinere ualeat. In accessionibus quoque sic opitulandum est, deliganda sunt crura supratalos & genua & manus brachialia, brachiaque infra humeros propè cubita. Ad caput irrigandum facit rosaceum cum aceto. Oleo uerò incoquito serpyllum, aut spondylium, aut hederam, aut id genus alia fricentur extrema, & facies. Olfaciat acetum, pulegium, mentham, aliaque eiusmodi ex aceto. Inter dentes aliquid apertionis causa imponatur. Nonnunquam enim maxillæ colliduntur & cohærescunt. In tonsillis fiat titillatio : uomitus citetur. Nam interdum rejecta pituita æger à tenebris excitatur. Haftenus ad accessionis leuamen & tenebrarum


ὀκόσα διαμότερα ἐς τὰς σκοτώδεις, τὰ δὲ χρὴ πρῆσαι, ἐμέτοισι τοῖσι δὲ ἀπὸ δειπνῆς, ἢ δὲ τοῖσι ἀπὸ ραφανίδων χρέεσθαι, τὸ ἐν τῷ δέον ἐστὶ, ἀτὰρ ἢ δὲ ἐς ἐλλεβόρου ἄσρασκην. μελέτησι γὰρ χρὴ ἔσομαχεῖν, ἐπὶ τοῖσι δεινότεροις ἐμετρίοις. ἀτὰρ καὶ τὸ φλέγμα λεπτότερον νυκτὶ γίνεταί, καὶ ἐς τὸ ἐλλεβορον εὐχυται. ἐλλεβόρου δὲ δόσεις πλεῦνες. τοῖσι μὲν ἰσχυροτέροις δρῆσαι ἐς μέγεθος ἄμης. ἢ ὀλίγον ἀδρότερον τετραμήλαιον, ξυμὸν χόνδρον τὸ πλυτῶν, ἢ φακῶν ἢ δόσις. σαθμὸς δὲ ὀλικῆς δραχμῶν δύο. ἐπὶ δὲ τῶν ἀδενεσέρων καὶ ἰσχυροτέρων, τὸ ἔψημα ξυμὸν μέλιτι, μέτρον μουσίλαι δλύο ἢ τρεῖς. τῆσδε ποιήσιος ὁ τρόπος ἀλλήπη λελέξεταί, μέση γὰρ δὲ ἐκάστω ἄκεος* ἰωαννατζέφην τὸν νοσέοντα ἐς τὴν τῆσδε μέσων ἰσομονήν. δρῆγειν δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσι παροξυσμοῖσι ὡς δὲ. διαδέειν μὲν τὰ σκέλεα. ἰσπερ σφυρα (καὶ) γούνατα, καὶ χεῖρας καρπῶν τε καὶ βραχίονας ἐνεσθε τῶν ὤμων πρὸς τοῖσι ἀγκῶσι. τέγγεις κεφαλῆς, ῥόδιον μύρον ξυμὸν ὄξει. ἐνεψῆσαι ἢ χρὴ τῷ ἐλαίῳ, ἐρπύλλιον ἢ σπονδύλιον, ἢ κισσῶν. ἢ τὸ τιόνδε, ἀνάτριψις ἀκρων, καὶ προσώπου. ὄσφρησις ὄξεος, γλήχωνος, ἠδύοσμου, καὶ λάδε ξυμὸν ὄξει. ἐνεψῆσαι ἢ χρὴ τῷ ἐλαίῳ διάσασις τὸ γένουο. ἔσθ' ὅπη γὰρ ἐρείδασίαις γνάθος. γαργαρισμὸς παρισθμίων, ἐμέτερος πρόσκλησις. ἐπὶ γὰρ ἐκχύσει κατὰ φλέγματος ἀνέχροντο ἐκ τῆσδε ζόφου. τὰ δὲ μὲν ὦν ἐς τὴν ἔπαροξυσμῶν παρηγορίην καὶ σκέλασιν ἔ

ἰωαννατζέφην.



ζοφώδεσθ· διαίτης δὲ τῶν ἀπάσις
 τὴν ἢ θεραπείη κὺ τὴν αὐθις τῶν
 γινώσκω· ὑπὸ πελὺς, κακὸν δὲ
 κὺ αὐπνίη. πολὺς μὲν γὰρ νάρκα τὰς
 αἰδήσιας τὴν κεφαλῆς. ἀτμῶν
 πλημμύρα ὄκνος ἀπάσις πηξίσι·
 τῶν μὲν βαρέος κὺ ἤχων κὺ μαρ-
 μαρυγῶν (ἐστὶν) αἶπα, τῆς νεσστα
 ξύμβολα. ἀγρυπνίη δὲ ἀπεπιον, ἀ-
 τροφον, καματηρόν, τὰ σκηνεῖ ἄθυ-
 μον, εὐπρόσγωγος ἢ γνώμη. διὰ τῶν
 δὲ ρηίδως μαίνον), κὺ μελαγχολέ-
 εσιν οἶδε. ξύμφορος ἢ ὁ μέτριος ἐς
 τὴν τροφῆς οἰκονομίω, κὺ ἐς ἀνά-
 παυλαν τῶν δι' ἡμέρας καμάτων
 πρόνοια, κὺ ἐπιμονή. προσεδρίη τὴν κοιλί-
 ης ἐς ἀπόκρισιν. διαπνοῆς γὰρ ἢ μέζων
 αὐτῆς κοιλῆς. ἀνάτριψις αὐθις σκε-
 λῶν δι' ἡμιτυμδίων τσηχέων μέσοφ.
 φοινίξις, ἐπεὶ τὰ νῶτα κὺ πλευρέων,
 ὑστα κεφαλῆς. ἀπὸ τετῶν τῶν
 παρὶ, τῶν σπινέες μὲν δὲ χῆθεν κὺ ἐς
 ἀπόπασιν ἤπιτροχοὶ ἢ οἱ μέσοι, ἢ
 ρεμίη, κατὰ σπινέας ἢ πνεύματος ἢ
 τῶν τῶν παρὶ ἐσω. ἀναφωνέειν
 χῆ, τῶν βαρέσι φθόγγοισι μᾶλλον
 χρεόμυρον ἢ χέειν. ὀξέες γὰρ, κεφα-
 λῆς διασάσις, κροτάφων παλμοί,
 ἐγκεφάλω διασφύξις, ὀφθαλ-
 μῶν πηξίσις, ἤχων ἀκοή. μετρίη
 ὀξυφωνίη, κεφαλῆ ὀνήσιον. ἐπεὶ
 δὲ, κροτὸς αἰώσης, ἐς διαπνοὴν τῶν
 παντὸς κεφαλῆς βαρεσθ, πλήθου
 δὲ ἐσαι πολλόν, πλεὺ ὀκόσον ἀκά-
 ματον ἢ. ἢ ἐλιγμοῖσι τῶν ἢ χω-
 εῖς, μὴ δὲ ξυωχέσι καμπῆσι αἰώρη
 γινέσθω. ἰλίγγων γὰρ τῶν τῶν
 κλήσις εὐθέες δὲ καὶ μακροί, καὶ

discussionem dictum sit. At de uni-
 uersa uicis ratione tam in curan-
 do, quam post curationem hæc no-
 stra sententia est. Somnus multus
 æquè, atque insomnietas inimica
 sunt: multus enim somnus stupo-
 rem capitis sensibus iniicit: uapo-
 rum exuberantia torpet omnis actio.
 Hi planè grauitatis, & sonorum in
 auribus, & splendorum quorundam
 oculis obuersantium causæ, morbi
 uerò indicia sunt. Vigilia uerò cru-
 ditatem facit, alimentum subtrahit,
 laborem affert, corpus contristat.
 mentem labefactat: propterea faciliè
 furere, atque atra bile uexari isti
 consueuerunt. Mediocris autem
 somnus ad alimenti distributionem,
 & ad laborum diurnorum leuatio-
 nem utilis est. Aluo ad excretionem
 consulendum: nam distensionis cau-
 sa potior alius est. Iterum crurum
 frictio per aspera linteola usque ad
 ruborem, deinde dorsi & laterum,
 postremò capitis adhibenda. Ab his
 ambulationes circa initia & finem
 leniores, mediæ uerò acriores. Quies
 consistencia spiritus post ambula-
 tiones esto. Vocem leniter exerce-
 re oportet, grauibus uocibus uten-
 tem sonum ædere. Acutæ nanque
 uoces capitis distentiones, temporum
 palpitationes, cerebri pulsationes,
 oculorum inflationes, auriumque
 tinnitus efficiunt, mediocriter acu-
 ta uox ædita capiti prodest. Postea
 uerò gestationis tempus adest ad
 distendendam totam capitis grauita-
 tem opportunum. Longa sit autem,
 uerum citra fatigationem, neque
 in tortuosis regionis tramitibus,
 neque assiduis itineris flexibus
 gestatio fiat: quoniam sic uertigines
 oboriuntur. Sed rectæ & longæ &
 lenes



lenes (*deambulationes*) ac superioribus locis gestationes fiant. Siquidem prandere afflicti sint; optimum panem solū assumant, quantus exercitationibus impedimento ne sit. Prius enim concoctum esse oportet. Caput & manus exercendæ, horumque frictiones faciendæ. In his uerò leniter agendum: ut caliditas excitetur, & caro augeatur, & uires restituantur. Postea suum ipsius caput erectum fricato diutius hunc laborem sustinens. Quin & exercitationes ad ceruicis usus, & ad manuum agilitatem faciunt, si scienter fiant. Sursum uerò attollēdo caput atq; oculos exercere oportet. Manuum exercitatio fit, aut discorum iactu, aut certando cestibus, aut pugnis. Pila uerò parua & magna detrimento est. Nam capitis & oculorum circumuolutiones atque Intentiones uertigines afferunt. Optimè faciunt saltus & cursus. Omnia uelocia exercitia cruribus conueniunt, & omnia roborant. Frigida lauatio illuue, illuues autem calida lauatiōne melior, alstringere, densare, siccare caput frigida lauatio efficacissimè potest: & hic salubris status est humectare, soluere, tenebras offundere ualentissimè calida lauatio potest: & hæc capitis morborum causæ sunt. Tales sunt & austri auditui graues: exercitationibus quies succedat, ut perurbationem sedet. Capitis pressiones ad cutim poliendam faciunt. Aquæ aut aquati uini propinatio est res optima, prandiū frugale ac simplex est. Coma olerū assumatur, quæ uentre molliunt, malua, betæ, bliti. Liquamen bonum stomacho, ori suaue, aluum leniens, neque graue capiti, exthymo, aut thymbra, aut sinapi conficitur. Oua hyeme calida,

λαῖοι ἔσων, καὶ* οἱ φείπατοι. ἡ
 μὲν ὧν ἐν ἔθει ἔωσι δέξια, ἀριστερά
 νη* ὀρέγην. ὀκόσον μηδὲν ἐμποδῶν
 τοῖσι γυμνασίοισι ἐμμεναι. περ-
 πεπέφθαι γὰρ χεῖ. κεφαλῇ καὶ χεῖ-
 ρές, καὶ αἱ τῶν δὲ τρίψιες. Ἰππὶ δὲ τοῖ-
 σι οἱ τῆς νέως, ἐς ἀνακλιθῆσιν θέρμης,
 ἢ εὐσαρκίης ἢ τόνου. ἔπειτα κεφα-
 λῶν τρίβεαθ ὀρθιον ἐσωτέα μέζονι.
 ἰσπόμεθα. ἀτὰρ ἡ γὰρ γυμνάσια ἐς
 τραχήλας πρήσιας, ἢ ἐς δῶσμον χε-
 ρῶν συνήκει, εὐπαιδύτως. ὑπερανω-
 ξυῖται ἢ χεῖ τὴν κεφαλὴν, ἢ τὰς ὀψι-
 ας γυμνάζειν χειρονομίῃ, ἢ δίσκων
 βολῇ, φιλονεικῶντα πυγμῇ. κακὸν δὲ
 σφαῖρα, μικρῆτε ἢ μεγάλη. τὸ γὰρ
 κεφαλῆς ἢ τῶν ὀφθαλμῶν αἱ δυνή-
 σιες ἴε ἢ ὄνσάσιες σκοτώματα ποιεῖ-
 σιν. ἀριστον ἀφάλσος ἢ δρόμοι. τὸ ὀ-
 ξὺ μὲν παῦν, ἐς τὰ σκέλεα πάντων ἰο-
 νώσιες, ψυχρολασίη ἀλυσίης κρέσ-
 σων. ἀλυσίη ἢ θερμολασίης. σύψαι,
 ποικνώσαι, ξηρῆναι κεφαλὴν, ψυχρο-
 λασίη δυνατώτατη, ὑγείης ἢ κασα-
 τῶσις. ὑγρῆναι, λῦσαι, ἀχλυῶσαι,
 θερμολασίη δυνατώτατη. κεφαλῆς
 γὰρ νύστα αἱ περὶ φάσιες. τοιοῖδε καὶ οἱ
 νότοι, βαρυήκοοι. ἢ συχνή ἐπὶ τῶσι γυ-
 νασίοισι ἐς κατῶσα σιν ἔτραράχαι.* πί-
 εσις τὴν κεφαλῆς ἐς τὴν ἔδερματος
 ξύσιν.* προπόσιες ὑδάτος (πόσι) ἢ οἴνου
 ὑδαρέος, ἀριστον εὐτελές. λαχάνων
 κόμης τὰ μαλθακτέα, μαλάχης,
 τούτλη, ἐλίτη, ἔμβαμμα, εὐσό-
 μαχον, εὐσομον, κοιλίης μαλ-
 θακπὸν, ἀβαρές δὲ κεφαλῇ,
 διὰ θυμῶ, ἢ θρύμβρης, ἢ σινῆ-
 πιθῶ. ὧν, τὰ θερμὰ χειμῶνος.
 θέρειθ

* ὑπέρτατοι.

* ἄρσενον.

* κεφαλῆς.

* πίεσις.

* προπόσις.



θέρους ἢ τὰ ψυχρὰ, γυμνασῶσθε-
κώδεος, μὴ ὀπία, ἐλαίαι, φοίνικες, ἰα-
ριχος ὠραῖον, χόνδρος πλιθός, ξύν πι-
νιτῶν γλυκέων, ὀκόσον ἠδύναυ αἰρε-
τόν ἐπὶ τῷ σθεῖ ἄλες, ἡρεμῖν, ἡ συχίη ἔ-
ἀκοῆς, καὶ λαλιῆς ἀδείπατι, ἐνθα αὖ
εὐπνοον, εὐχαρὶ ἢ δένδρεσι, ἢ βόδιαν-
σι, ἢν ἢ ἐς δ᾽ εἶπνον ἤκη, μάλιστ᾽ αὖ
αὖθις ψυχρολίθειν, σμικρὸν ἔσο-
χρισάμυρον λίπαι, εἰδὲ μὴ, σκέλεα
μῆνον, τὸ δ᾽ εἶπνον σίλωδες οἷ τ᾽ ἰτρίον,
ἢ ῥόφημα χόνδρος, ἢ * πλισάνη ἀφυ-
σος, ἐψησει εὐπεπτός. Φάρμακα δὲ
ἰὰ ἐς ἠδονὴν τ᾽ πλισάνης, πᾶσι, γλή-
χων, ἠδύοσμον, κρομμύων, ἢ πρᾶ-
σων σμικρὸν, μηδὲ ὀκόσον ἐμπλεῦ-
σαι. * ὄξος ἢ τὸ δριμύ ξύμφορον, κρε-
ῶν, ἰὰ ἐκ πόνων μὴ πόνου. συῶν πόδες
καὶ κεφαλῆ. πλὴνὰ πάντα τῷ πλῆθει
ἢ τεκμαίρεσθαι, λαγῶς καὶ τὰ θηρῶ-
ν ἰὰ ἢ, ἀλεκτορὶς εὐπορος καὶ ξύμφορος.
πρᾶγμα παῦν κεφαλαγῆς, πλὴν
φοίνικος, ἢ τῶν ὠραίων σύκων, ἢ ἑα-
φυλῆς, ἢν ἀφυσος ὠν θρωπος ἔη, εὐ-
καλὸν ἐν τέτρως τοῖσιν ἢ δὲ πέμμα-
των εὐπεπτα, καὶ ἀκνισα, καὶ κῆφα,
ἀδείπατι, θυμηδία, ἐν ἡσυχίᾳ ἐς
ὑπνον ἀφesis.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ-

ληψίης,

Κεφαλ. δ.

Ἀκείων ὅ, ππερ μέγα καὶ δυνατῶτα-
ρον, ἐς ἐπιληψίην χρέεσθαι. * φυγή γδ ἔ-
μῆνον ἐπιπόνου παθεος, καὶ κινδυνώδε-
ος, ἐφ' ἐκάστης ὑπομνήσιος, ἀλλὰ καὶ
ἰδέης ἀίχρας καὶ ὀνείδεος τ᾽ συμφορῆς.
καὶ μοι δλοκέω, εἴπερ εἰς ἀλλήλους ἐν

* φυγή γδ
μῆνον.

estate frigida, putamine spoliata, non
osta præbeantur. Oliuæ, palmulæ,
falsamentum rectè conditum. (*opor-
tunum*) Alica elota cum aliquo dulci,
quantum condiendi causa assumi
debet. Posthæc sal adhibendus.
Ocium & quies ab audiendo & lo-
quendo. Ambulationibus utatur
sub aere perspirabili. Delectat au-
tem locus aut arboribus consitus,
aut herbidus. Vtique uertiginosus
cum ad carnem accedit, maximè ite-
rum in frigida lauetur, parum ungui-
ne corpus sublinens: si nolit, at cru-
ra tantum. Cæna triticea esto, qua-
le est Itrion, quod est placentæ genus,
aut sorbitio ex alica, aut pitifana fla-
tu uacans, per elixationem concoctu
facilis. Medicamenta uerò suaui-
orem pitifanam reddentia sunt piper,
pulegium, mentha, cepæ aut porri
paulum, neque tantum, ut innatet.
Acetum uerò acre utiliter assumit.
Carnes ex pinguibus animalibus non
pingues, suum pedes & capita. Vo-
latilia omnia, sed multitudinem con-
jectura metiri oportet. Lepus &
uenatio. Gallina in promptu habe-
tur, & iuuat. Omnia bellaria caput
dolore infestant præter palmulas aut
maturas ficus, aut uuas. Si flatibus
homo uacet, hæc bene facient. In
secundis quoque mensis utiliter ea
sumuntur, quæ facile concoquun-
tur, si nidore uacât, & leuia sunt. Postea
deambulatio, mentis hilaratio, in qui-
ete ad somnum conuersio adhibenda.

C V R A T I O M O R B I

comitialis.

Caput IV.

Ingentibus medicamentis atque
ualentissimis in morbo comitiali
opus est. Nam quoties ejus in men-
tem uenit, non modo laboriosum
malum, & periculi plenum, sed
etiam generis morbi fæditatem,
& calamitatis opprobrium exhorre-
mus. Atque ita existimo, si se mutuo in
accessi-




accessionibus spectantes ægroti, quæcunque patiuntur, cernerent; non ultra uitam ducere, tolerarent. Verùm quæ singulis atrocia facta- que insunt, sensus priuatio intuen- dique sublata facultas abscondit. Cæterùm medendi rationem naturæ facilitatem sequi optimum est: quando per ætatis mutationes in longe diuersum hominem permutat. Quoniam si uisus malo uictus, in quo morbus alitur, defierit, non ulterius hominem infestat. Simul enim cum priore uictus specie mor- bus recedit. Igitur si caput occu- pauit, inhabitat. Quocirca omnia quæ à nobis in capite de cephalæa relata sunt, facere necesse est: de- trahendo sanguine, & corpore pur- gando. Venæ autem & quæ in cu- bito, & frontis recta secundæ sunt, cucurbitula adiuuenda: non est autem usque ad uisus deliquium sanguis detrahendus: ciet enim morbum deliquium animæ. Ar- teriæ omnes, & ante, & post aures incidendæ. Inter hæc omnia excel- lens purgatio faciendâ purgatorio, quæ hiera uocant, atq; his, quæ e capite pi- tuitam eliciunt: sed multò ualen- tiora sint medicamenta, siquidem istorum habitus est dolorum pa- tiens. Hilaritas uerò & bona spes id genus ægros miseros reddit. Opus est etiam ignem capiti infer- re: proficit enim. Inprimis os perforare usque ad secundam lami- nam oportet: deinde ceratis cata- plasmatisque uti tantisper, donec membrana ob ossibus recesserit. Terebra nuda ossa circuncidere con- uenit: ac si paulum resistant, usque ad spontinam auulsionem per- fectuerandum, quousque nigra non- nunquã istorum, & crassa membrana

τοῖσι παροξυμοῖσι ἐνέβλεπον, ὀκό- σα πάχισαι οἱ νοσηῶτες ἐκ αὐτῆς πύ- λωιν * τλαῖεν αὐτὰ ἀλλὰ γὰρ τὰ δευτὰ ἐκάστω καὶ τὰ αἰχρὰ, ἀνααιθησίη καὶ ἀθησίη κρύπτει. Ξυνομαρτεῖν ἵτιμι ἰητρεινῆ τῆς ρασώνη τ' φύσιθ' ἀεὶ- σαν, εὐτε τῆσι μεταβολῆσι τ' ἡλικίης, ἐς μέγα ἀμείβει τὸν ἄνθρωπον. καὶ γὰρ ἡ Ξυνοθήης τὸ κακῶ διαταχθῆν ἢ ἐμβιοτεύει ἢ νεσος, οἰχεῖθ, ἐκπέπει- φοιτεύει (ἐς) τὸν ἄνθρωπον. Ξυνο- ποίχεθ) γὰρ τὸ πρῶτον ἐν ἡδίῃ. καὶ ὦν τ' κεφαλῆς λάβηται, ἐνοικεῖ. τῆδε ἀπάντα χεῖρ πρῶτον, ὀκόσα μοι ἀμ- φι κεφαλαίης λέλεκταμ. ἀμφι * τε τὰς ἑ ἀμάτος ἀφαιρέσιαι, ἢ δ' ἀμ- φι τὰς καθάρσιαι φλεβὰν τῶ ἐπ' ἀγκῶνθ, μετώπυ τ' ὀρθίαι. σικύης τὰς ἑ ἀφαιρέσιαι, μὴ μέσφι λειπο- θυμίας ποιεῖσθ. πρὸς κλησις γὰρ ἑ πᾶ- θεθ, λειποθυμίη δρμηίας τάμνειν ἀπάσαι, τὰς τε ὠτων πρῶτω τε καὶ ὀπίσω καθάρσιαι ἑ ποιεῖσθ. ἑ ὄχο- ας τετέων πάντων, τῆ ἰεσῆ τὰ καθαρμεῖω. καὶ τῆς κεφαλῆς τοῖσι ἄχισι φλέγμα. πολ- λῶ δὲ ἰδύνατώτερον ἐσθ φάρμα- κα. Φέρει γὰρ ἡ ἐξ ἰσίων δειξέ πόνυς. εὐ- θυμίη ἑ καὶ εὐελπισίη πῆσσι τὰς νοσέ- ούσας τλήμονας. χεῖρ καὶ πύρ φέρειν ἐς τὴν κεφαλὴν. ἀνύει γὰρ τετεῖναι ἑ χεῖρ πρῶτα τ' ὀσέον μέχρι διπλόης, ἐπὶ τὰ κηρωῆσι καὶ ἐπιπλάσμασι χεῖ- ρεσθ, ἐς τὸν ἡμῆν γέ τῶ ὀσέων δρμηῆ ἰερέσθω χεῖρ πρὸς ἰσίων τὰ γυμνά, κηρ ἐπὶ σμικρὰ ἀνέχῃ μέχρι αὐτομάτε * δρμηῆσιος, ἐως ὅτε μέλαινα κοτε τετέων



τετέων κὺ παχεῖν εὐρεθῆ ἢ μιλῶ γξ.
 * σίφι. καὶ ἐπὶ ἕς * μύδησιν, ἢ καὶ κάθαρ-
 * εὐρίθ. σιν τῆ ἰητῆ εὐτέλως ἀκεομύνη,
 εἰς ὠτειλὴν * ξυμβῆ τὸ τῶμα, ἄν-
 * σίφι. θρωπῶ εἰξήλθε τῶ νοῦσα. Ἐπὶ πᾶσι
 φοινίξιες κεφαλῆς, ξυμῆθες μῦ,
 * σίφι. ὀκόσαι μοι ἐν τοῖσι πῶθεν * εἰρέα-
 ται. δυνατωτέρη δὲ, ἢ διὰ τῶ καθ-
 θαρίδων. χεῖ δὲ Ἐπὶ πῶθεν τῶ χεῖ-
 σῶ τριῶν ἡμερῶν, πίνειν γάλα εἰς
 τὴν τῶ κύσι Ἐφυλακὴν. καθαρῆ-
 δες γδ, κἄρα σίνονται κύσιν. τὰ δὲ
 μῦ ὦν μὲν κεφαλῆ πεπόνθη. μὲν δὲ
 τὰ μέσα εἰσάγη τὴν αἰτίω, κὺ τὰ δὲ
 ἐπάγει τὴν νῆσον. ἡκισα δὲ τὰ δὲ
 γίνεται. ξυμπαθείε γδ κεφαλῆ τὰ
 μέσα μᾶλλον ὡς Ἐπὶ μεγάλω κα-
 κῶ, ἢ περὶ δὲ χεῖ τῶ νῆσα. ὅκως δ' οὐ
 ἴσχη, φλέβα τὰ μιν τὴν ἐπ' ἀγκῶ-
 νι κὺ Ἐπὶ τῶ δὲ. ἀπὸ σπλάγχων γδ
 ἢ ῥοή. ἀτὰρ καὶ καθαιρέειν τὰς δὲ
 μᾶλλον τῶ ἄλλων, καὶ τῆ ἱερῆ καὶ
 κνεώρω, κὺ κόκκω κνίδης. τὰ δὲ γδ
 φλεγμάτων ἀγωγὰ. τόδε καίριον
 αὐτέων ἢ σικύη. ἐπιθημάτων ἢ κὺ ἐπι-
 πλάσματων ὀφείζεις εὐδὲ λῶ, καὶ
 πᾶντι γράφειν ὡς ἴδον. εἰ μὴ ὀκόσον
 δύναμιν αὐτέων γνώσκειν, ὅπῃ χεῖ
 τῶ δὲ λεπιλῶναι, διαπνεῦσαι, εὐρεθῆ
 κὺ εὐπνοα ποίειν, κὺ πεπληθείσι φαρ-
 μάκοισι, θερμοῖσι, ξηροῖσι, κὺ ἔρων ἀ-
 γωγοῖσι χεῖ ὀμῶν, κὺ ἐν τροφῆ καὶ
 ἐν φαρμακίῃ. κρέσων δὲ πάντων
 κάσος Ἐ ὄρχις πινόμῶ ἐν με-
 λιχρῆτω πολλάκις Ἐ μιλῶς, ὀκόσα
 τὲ ποικίλα φάρμακα τω τὴν πρῆσ-
 σει, ἢ διὰ τῶ θηρίων ποικίλη, καὶ ἢ
 Ἐ μίθριδάτω Ἐπὶ ποικιλωτέρη.

inuenta fuerit. Cumque per pu-
 trefactionem uel etiam purgatio-
 nem audacter curante medico uul-
 neri cicatrix induta fuerit; agro-
 tus morbum euasit. Maximè omni-
 um capitis ad ruborem usque fri-
 giones ualent usitatæ quidem, quæ-
 cunque à me superius traditæ sunt:
 ualentior est autem, quæ fit per can-
 tharides. Sed tribus diebus ante,
 quàm his utamur; lac, ut uesica mu-
 niatur, bibendum est: cantharides
 enim magnoperè uesicam lædunt.
 Hæc abundè sint, cum caput affe-
 ctum est. At si medix corporis par-
 tes causam præbent, & ab his morbus
 exoritur: rarissimè autem ista fiunt:
 potius enim medix partes in con-
 sensu morbi trahuntur à capite, ut-
 pote ab ingenti malo, quod ægri-
 tudinis initium est: utcunque igitur
 res habeat, & in his uena cubiti
 soluenda est: à uisceribus enim ma-
 terix cursus est. Quin etiam isti
 magis, quàm alij, purgandi sunt &
 hiera, & ephedro, quam thymelæam
 uocant, & cocco gnidio, quæ chamæ-
 læa dicitur: hæc enim pituitam
 extrahunt. Per oportunitatem autem
 ipsis remedium est cucurbitula. Epi-
 thematum uerò & cataplasmatum
 sylvia omnibus perspecta est, & ea
 ubique scribere superuacuum duci-
 mus, nisi quatenus eorum uim nosse
 conueniat: quod scilicet ijs extenuare,
 per halitus digerere, fluxa, spirabi-
 liaque corpora reddere oporteat:
 item concoquentibus medicamen-
 tis calidis, aridisque, & urinam mo-
 uentibus in nutritione, & in medi-
 catione utendum: sed omnibus præ-
 stat fibri testiculus sæpius in mense ex
 aqua mulla potus. Præterea quæ-
 cunque ex uarijs composita medi-
 camenta idem præstant, adhibenda
 sunt, ex uiperis composita antidotus,
 & mithridatica ex pluribus
 constans, nec non & Byssini antidotus
 biben-




bibenda est; quandoquidem hæ con-
coquendi facultatem roborant, uti-
les, humores creant, & urinæ mo-
uendæ aptæ sunt. Nam quæcun-
que medicamenta simplicia scribere
opus esset, hisce continentur anti-
tidotis, cinnamomum, casia, folia
malabathri, piperis, fœselisque omnia
genera; & quod nam ex ualentissimis
remediis in illis compositis non re-
peries. Fama est & uulturis cere-
brum, & crudæ fulicæ cor, & dome-
sticos feles comefos morbum discu-
tere. At ego istorum periculum
non feci. Nonnullos autem uidi
nuper jugulati hominis uulnere pha-
lam subjicientes, atque inde hau-
stum cruorem bibentes. O ingen-
tem necessitatem, quem piam susti-
nere, malum malo, piaculo depelle-
re: atqui ex ea ad sanitatem nec ne
illu peruenierint, nemo uerè mihi af-
firmare potest. Quin & quendam
autorem legi, qui humanum secur-
epulandum apponi præcipiebat.
Sed hæc illis scripta sunt, qui, ad
hunc usque miseriæ terminum per-
uenierunt. Præterea & uisui opi-
tulandum est, & singulis remedijs,
quæ aut ab alijs, aut ab ipsomet ægro
fieri possunt. Utique in hoc casu
nihil spernendum est, nihilque te-
mere faciendum, maximè quælibet
exigua adhibendo, quæ penitus pro-
funt, nihil uerò lædant. Etenim spe-
ctacula non spectanda, & sermones
& edulia, & suffimenta plurima
morbum patefaciunt. Igitur omnia
diligenter consideranda sunt. Som-
nus multus crassitudo est, otium
nebula sensuum, bonum uerò me-
diocritas. Alui excretio à somno,
præcipuè flatuum ac pituitæ res
optima. Ambulationes longæ com-
modæ sunt, non flexuosæ bonum spi-
ritum reddunt, sub arboribus myrto,

πίειν δὲ καὶ πλωθέντων. εὐπεπτα γὰρ καὶ
εὐχυμα ταῦτα, ἔσονται ἀγωγὰ.
ὁκόσα γὰρ καὶ γράφειν τῶ ἀπλῶν
φαρμάκων, αἰθερῶν ἔχουσι αἰθρῶν
μικρὰ, κινάμωμον, καὶ κασίω, φύλλα
τὰ μαλαβάδρα, καὶ πεπέρεθρον, καὶ σε-
σέλευθρον, πάσας ιδέας, καὶ πὶ γὰρ
ἐκ αὐτῶν ἐν τῶνδε τῶν δυνατω-
τάτων λόγος ὅτι καὶ γυπὸς ἐγκέφα-
λος, καὶ αἰθρῆς ὡμῆς κραδίη, καὶ οἱ
* ἐνοικῶντες γαλεοὶ ἐρωθέντες λύουσι
τιμὸν νοῦσον. ἐγὼ δὲ τῶνδε μὲν ἐκ
ἐπειρήθην. ἐθεασάμην δὲ αἰθρῶν
γὰρ νεοσφαγῆος ὑποθέντος φιάλην
τῶν πρῶματι, καὶ δρυσαμύρας ἑαί-
ματος πίνοντας, ὡς παρεξέστης μεγά-
λης ἀνάγκης, τλήναι κακὸν ἀπέ-
σαδον μιάσματι κακῷ. εἶδεν καὶ ὑγί-
ες ἐν τέττα ἐγένοντο, ἀπρεκῆς οὐδεις
ἔχει μοι λέγειν. ἄλλη δὲ πρὸς γραφὴν
ἔφραζεν, ἦ παρ αἰθρῶν φαγεῖν.
ἀλλὰ τὰδε μὲν γεγράφηται ὅτι με-
χερὶ τῶνδε τλήμοσι. προσεδήγειν δὲ
καὶ τῆς διαίτης, καὶ ἐκάστοις τῶν γνομιῶν,
ἢ δὲ ἄλλων, ἢ δὲ αὐτῶν. νῦν ὅτι καὶ ἐδὲν
ὑπεροπλῆ, μηδὲ * πρῆσεν πὶ εἰκῆ, πρῆσεν.
μάλις μὲν ἐφ' ἐκάστοις μικροῖσι
πάντως * ὡφελῆντα. ἢ ὅτι βλάπτοντα ὡφελῆντα.
μηδὲν. καὶ γὰρ ὁράματα ὁκόσα μὴ θη-
νῶν, καὶ ἀκρόματα, καὶ γέυματα, καὶ θυ-
τὰ μυεῖα ἐλέγχει τὴν νεύσον φρά-
ζεσθαι ὡς πρὸς πάντων μάλα, ὑπὸ
πολλὸς παχυτῆς, δερμίν, ὁμίχλην δὲ
αἰθρῆς. ἀγαθὸν ὅτι ἔξυμμετερίη κοι-
λῆς * ἐκκρίσις ἐπὶ τῶν ὑπνοισι ἀριστον. ἐκκρίσις.
μάλις πνευμάτων, καὶ φλεγμάτων
πρὸς πάλαι μακροὶ εὐφύες, ἀνέλκιοι,
εὐπνοοὶ, ὑπὸ δένδρεσι μὲν μυερίνης,
ἢ δ' ἀφ-



ἢ δίαφνης, ἢ τοῖσι δριμέσι καὶ εὐώδεσι.
 *καλαμίνθη. βοτάνησι δ', *καλαμίνθη, γλήχονι,
 θύμω, ἢ θυόσμω. μάλιστα μὲρ τοῖσι
 ἀγρίοισι αὐτράτισι. ἢ δὲ κνήκων, καὶ
 ποιητοῖσι. ἐν τοῖσι καὶ ἀγρομακροῖ,
 καὶ αἰθέρευθές. ὁδοιπορήσει καλὸν
 χρέεωδ', μὴ πρὸς ἀποταμὸν εἰς τὸ ρέυ-
 μα ἐνορήν, ἰλίγγων γὰρ ποιητικὸν
 *κ. ῥόος. μηδὲ *ἐν κύκλω στροφόμενον,
 μηδὲ βέμβηκα δινδύμενον, ἀδενέσε-
 ρος γὰρ ἐδραῖον ἰσάναι τὸ πνεῦμα. ξυ-
 νελίσσει γὰρ τὸ κύκλω. δίνησι δ' σκο-
 τώματος, καὶ τὸ Ἰπληψίης ἀσκή-
 *ὄρουμα. σις. ἀπὸ τῆς αἰώρης, ἀσκήσεως * ἡγε-
 μαῖος. ἐπεὶ τὴν ἡσυχίαν, ἐς ἀποκατά-
 σασιν ἔσονται αἰώρητα ἑσάχα. γυμνά-
 σια δ' Ἰπληψίης πρὸς χεῖρας ἐνό-
 των τῶν ἀκρῶν ἀφ' ἡμιτυμβίε λινοῖσι
 * ὠμοῖσι. ἀλειμμα μὴ κάρτα * λι-
 παρὸν, τριψίς ἐν μελλήσει μὲρ ἑσά,
 σκληροτέρη δ' ἐς πύκνωσιν. οἰδαλέοι
 γὰρ καὶ παχέες οἱ πλείστοι. μεσιγὺ δὲ
 ὅλης τῆς τριψίος, κεφαλὴ ὀρθή τε-
 τείθω. γυμνάσια τὰ εἰς τὴν αὐχένα
 καὶ ὠμους, χειρονομία, πάντα ὁκόσα
 μοι ἐπὶ σκολωματικῶν λέλεκ'. ἄλις
 δ' ἐνθάδε ἔειπεν ὄρετα. πλὴν ὁκόσα
 ὀξύτερα χεῖρα τῶν δ' γυμνάσια ἐμ-
 μύρα, ἐς ἰδρωτὰ καὶ θερμῶν. τὰ δὲ γὰρ
 πάντα λεπύνει. ἀτὰρ καὶ ἐν τῷ παντὶ
 βίω χεῖρ ὀξύθυμὴν ἀσκήτων ἐμποι-
 *κακίη. εῖν. τρεοφαί πᾶσαι παχέσει ὁσπρίοι-
 σι *κακόν. σιλώδης δ' ἀέτοι ξηρότερος
 χόνδρος πλυτὶ καὶ τὰ ἐν τῷ δὲ ροφή-
 ματα. τὰ δὲ ἐς ἰδονὴν φάρμακα,
 ταῦτα τοῖσι πρόσθεν τῶν δριμέων δ' νῦν
 ἔσω πλεῦνα, πεπέριος, ζιγγιβέριος,
 λιβυστικῶν. ἐμβάσματα δ' οἰζέρος καὶ

aut lauro, aut inter acres & bene-
 volentes herbas calamentum, pu-
 legium, thymum, mentham, maximè
 quidem agrestes & spontè nascent-
 es: sin harum copiam non ha-
 beat, humano cultu procreatas.
 Inter has quoque gestationes longæ,
 & ipsæ rectæ fiant. Itinera facere
 bonum est non secundum fluvium,
 ne delabentem aquam intueatur:
 vertiginem enim aquæ fluxus affert.
 Neque ullum, qui in orbem volua-
 tur, neque turbinem, qui circum aga-
 tur, inspiciat. Est enim imbecillior,
 quàm ut firmum stabiliat spiritum.
 Nam simul cum circulo uertitur: cir-
 cumuolutio autem uertiginem, &
 comitiam morbum accersit. Post
 gestationem lenis deambulatio, po-
 stea quies: ut agitatio in gestatione
 contracta fedetur. Ad hæc exerci-
 tationes manuum fiant extremis su-
 dario ex crudis linis confectio inuo-
 lutis: inunctio non ualdè pinguis sit,
 frictio lenta quidem, sed durior
 densandi causa: tumidi enim &
 crassi sunt plurimi. In medio uerò
 totius frictiois caput erectum per-
 fricetur. Exercitationes ad ceruices
 & humeros pertinentes, manuum
 commotio: omnia, quæcunque à
 me de uertiginosis dicta sunt, admi-
 nistrantur, satis uerò hic ex copia
 ibi descripta positum est: præter-
 quàm quòd uelociores horum exer-
 citationes esse oportet ad sudorem
 mouendum, caloremque excitan-
 dum: hæc enim omnia extenuant.
 Verùm & in omni uita oportet ex-
 candescentiam iracundia uacantem
 iniicere. Alimenta omnia ex crassis
 leguminibus mala: triticeï uerò pa-
 nes sicciore præbendi: alica elota,
 & ex ea sorbitiones. Sed medica-
 menta uoluptatis causa eadem cum
 supra positis sunt: nunc autem plura
 ex acrioribus ponito piper, zingiber,
 libyiticū. Liquamina uerò ex aceto &
 cumino



cumino & suavia sunt & utilia. A carnibus quidem maximè in totum abstineant, sin minus, in curetione saltem: in refectiōne uerò carnes deligantur, quæcunque sunt natura leues: quales sunt uolatilium, præter anatem, & concoctu faciles, ut lepores, suum pedes, falsamentum, Et post hæc sitis utilis est. Vinipaulum bibatur albi tenuis odorati quod lotium mouet. Elixorum oleum assumantur quæcunque facultate acria extenuant, & urinam citant: qualis est brassica, asparagus, urtica; crudorum autem lactuca ea parte æstatis, quam Horam Græci medici nominant. Cucumeres autem & pepon uiro quidem robusto superuacua, nonnullis uerò gustatione tenuis præbenda. Mala est enim horum multitudo, cum frigida sint, atque humida. Fici uiridis & maturæ uuæ usus conuenit. Ambulationes, post eas animi oblectatio molestia carens iuuat. Iracundia utique & uenus noxiæ sunt. Effectus enim morbi similitudinem adducit. At nonnulli Medici de concubitu falluntur. Nam quoniam naturalis in uirum transitus aliquantum proficit, puerorum naturam intempeliuo concubitu uiolarunt, tanquam citius eos roboraturi. Sed isti à natura sponte præfinitum tempus, in quo omnia remedia fiunt, ignorant. Hæc enim singulis ætatibus propria simul oportunis temporibus creat. In tempore nanque concoctiones feminis, barbæ, canorum. Quis igitur Medicus naturæ commutationem seminum à principio, tum præfinitum singulis tempus uariauerit. Quin & in morbi naturâ impegerunt.

κυμίνε, καὶ ἡ δόξα καὶ χήσιμα. κρεῶν μάλιστ' ἀπειρῶν πᾶμπαν, εἰ δὲ μήγε, ἐν τῇ θεραπείῃ, ἐς δὲ τὴν ἀνάληψιν ἔσω ὀκόσα κῆφα ἢ φύσει, οἷόν τι τὰ πλιωὰ πλὴν νόσησι, καὶ τῇ πέψει ὀκῶσι λαγωοῖσι. οἷτ' πόδες τὰ εἰχος καὶ Ἰππὶ τοῖσι διψῶ ἀγαθόν οἶνον ὀλιγοποσίη, λυκῆ, λεπίθ, ἐνώδεσθ, ἐνόσμεσ, οὐρεομήε. λαχάνων ἐφθῶν, ὀκόσα ἐς δύναντιν δριμέα, λεπίλωα, οὐρεσ κινήσαι, ὀκοῖόν περάμβη, ἀσπάραγθ, κνίδη. ὀμῶν δὲ, Ἰριδακίνη ἐφ' ὄρεσ, σίκυθ ἢ καὶ πέπων, ἀνδρὶ μὲν κρατερῶ πειτῆα, πᾶσι δὲ δοτέον μέσφι γδῖσιθ. *κακόν γδ τῶδε ἡ πληθὺς, ψυχρῶν ἐόντων καὶ ὑγρῶν. σύκεσ χλωρῆ, καὶ σαφυλῆσ ἢ χεῖσισ ὀραῖος πείπαρι. Ἰππὶ τοῖσι δὲ, θυμηδῖν ἄλυπθ. ὀργῆ ἢ λαγνείη κακόν. καὶ γδ τὸ πηγμα, τὸ νόσσε φέρει τὰ σύμβολα. πᾶσι δὲ ἀπὸ ἔστε μετεξετέρεσ ἰατροῦσ συνεσίησ. ἐπεὶ γδ ἡ τῆσ φύσιος εἰσ ἀνδρα μεταβολὴ ἀγαθόν πεπῆσαι, μετεβιάσαντ τὴν παιδων φύσιν ἀώρω ξυωσίη, ὡσ θάσον ἀναρρώσοντες. ἀγνοέσι ἢ τὸ φύσιος τὴν ἀντμάττω πρεθεσμίλω, ἐφ' ἢ πᾶσι γίγνεται τὰ ἄκεα. ἡ δὲ γδ ἐκάσῃ ἡλικίῃ συντίκτει τὰ οἰκεία ἐν χρόνοισ ὀραῖοισι. ἐν χρόνῳ γδ οἷπεπασμοὶ ἀέσματσ, γενεῖσ, πολίησ. τίσ ὦν ἰητροῦσ πρεσ ἀλλάξαι τὸ φύσιος, τῆσ μὲν τὴν δρχῆθεν τῶσ πρεμάτων μεταβολῶ, τῆσ δὲ τὴν ἐσ ἐκάσῃ πρεθεσμίλω ἀλλὰ καὶ πρεσέκοψαν εἰσ τὴν φύσιν ἔνοσήματσ.

*κακόν.

αἰωάτη δ' τῶσ τε



* Υποκρίσις.

οὐκέτι γὰρ ἐγκαίρως πινές * εἶσι τῆ
 δόξη τῶν ξυνοσίων, ὡς οἰονόμοι ἀω-
 εῖν ἔπειματός. εἰοτεύειν δὲ χεῖρ
 ἐν χώρῃσι θερμῇσι ξηρῇσι. ψυχρὸν
 γὰρ καὶ ὑγρὸν ἢ νεῖσθαι.

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Μ Ε-
 λαυχολίης,
 Κεφάλ. ε.

Χρεὼ βουλήσ ἀμφὶ αἵματ^θ
 ἀφαιρέσει^θ ἐν τοῖσι μελαυχολι-
 κοῖσι, ἀφ' ἧ γίνεταὶ ἢ νεῖσθαι, ἀλλὰ
 καὶ κακοχυμίας. εἰδ' ἔπειτα μικρῶ τῷ
 πλήθει. καὶ μὲν ὠν ἡλικίης νέης λάβη-
 ται, καὶ ὠρεσ ἐαρένης, ἴμνεν φλέβα
 τὴν ἐπ' ἀγκῶνι τῷ δεξιῷ μέσον, ὅ-
 πως ἀπὸ τῆς ἥπατ^θ εἰς ἔπειτα
 ἢ ῥοῆ. τόδε γὰρ τὸ πλάγχθον αἵμα-
 τ^θ αἰπηγαί. χολῆς δὲ ἢ γένεσις,
 ἀμφω μελαυχολίης ἢ τροφῆ.
 ἴμνεν δὲ κῆν ἰχνοὶ ἔωσι καὶ λείφα
 μοι. σμικρὸν δὲ ἀφαιρέειν, ὁκόσον
 αἰσθητ^θ τῆς ἢ δύνάμις. ἐκ ἐλεγ-
 χθείη δὲ ἔπειτα τὸν ὄν. καὶ γὰρ εἰ πα-
 χὺ καὶ χολῶδες καὶ πεπηγὸς * εἰ
 τὸ αἷμα. καὶ μέλαν ὅπως ἀμόρη,
 ἀλλὰ τόδε (εἰς) τὸ φύσι^θ ὁ χῶρος
 καὶ ἢ τροφῆ. καὶ ὠν ἔπειτα δέοντες πολλὸν
 ἀφέλης, ἀτροφῆ ἢ φύσις ἔξισα^θ
 τῆς ἔδρης. καὶ δὲ πολύαιμ^θ ἢ, τὰ
 πολλὰ μὲν εἰς καὶ ἔπειτα γίνεταὶ πονη-
 ρόν, ἴμνεν δὲ τὴν φλέβα, καὶ μὴ
 αὐτῆμαρ ὁκόσον χεῖρ ἀφαιρέειν,
 ἀλλ' ἐκ διασάσι^θ, καὶ αὐτῆμαρ ἔπειτα
 δὲ πῆθος δηλώσασιν αἰ δυνάμις.
 μεσηγὺ ἢ ἀδρύτερος διαίτην, ἐς ἄλ-

Nondum enim in tempore quidam
 veneri dare operam cæperunt, ante
 immaturitate rei noxam accipien-
 tes. Vitam autem degere oportet
 in regionibus calidis & siccis. Siqui-
 dem res frigida atque humida hic
 morbus est.

C V R A T I O M E L A N-
 choliz,

Caput V.

N Vm sanguinem detrahere expe-
 diat, delibetatione indiget in me-
 lancholicis, ex quo humore mor-
 bus oritur : quin etiam ex non pau-
 ca malorum succorum (cacochy-
 miam Græci nominant) multitu-
 dine. Itaque si in juvenili ætate
 quis morbo corripitur, & ueris tem-
 pore; uena in dextro cubito media
 scindenda est : ut à jecore sit opor-
 tunum effluuium. Idem uiscus
 sanguinis fons est, & bilis generatio.
 Vtrumque uerò melancholiz ali-
 mentum. Cædenda est, inquam, li-
 cet sint graciles & sanguinis inopes :
 sed paulum sanguinis mittendum,
 quatenus uidelicet uenæ sectionem
 uires sentiant, sed nullam noxam
 earum tenor accipiat. Nam & si
 crassus & biliosus, & concretus, &
 ater, qualis amurca, sanguis est; ni-
 hilominus ipse naturæ prælium est
 atque alimentum. Quocirca si plus,
 quàm decet, sanguinis effuderis, na-
 tura cibi penuria de propria sede
 prolabitur. At si sanguine refertus
 est æger, plerunq; quidem non usque
 adeo malus sanguis est, uena tamen
 utique secanda est. Verum non eodem
 die, sed alijs diebus repetendo, quan-
 tū satis est, sanguinis, detrahatur : eodē
 uerò die modum sanguinis, mittendi
 uires declarabunt medio tempore, quò
 aliam



aliam euacuationem sustinere ualeat, liberalius nutriatur. Opus est autem & uentriculo ipsi quoque ægrotanti & laboranti opitulari. Eum uerò si atrabilis urget; per diem unum prius tenuiter nutrito ægro nigri ueratri pondo drachinæ duæ ex aqua mulsa præbeantur. Id enim bilem atram expurgat: nec non & thymi Attici coma & ipsa bilem atram educit. Commodissimum autem est singulorum partem, ut ex utroque drachmarum duarum pondo fiat, exhibere. Post purgationem lauetur, uiniq̄ue paulum bibat, & alia in cibis iucunditas concedatur. Stomacho enim ac uiribus laboriosa purgatio est. Posthac iterum ad media faciendus transitus, cum prius uerò cataplasmate atque irrigatione laxaueris; cucurbitulam jecori & uentriculo, aut ejus ori admoueas. Nanque hæc detractio multo, quàm sectio uenæ est oportunior. Tergis quoque inter scapulas cucurbitulam affigito: siquidem eo loco stomachus adhærescit. Deinde rursus reficiendus æger. Atque si alimentum uires instaurerit; caput radendum: cui postea cucurbitula affigenda est. Huius enim morbi inter alias prima ac maxima causa in capite est. Porro neque sensus ipsi à noxa immunes sunt: nam inde ipsorum exortus atque iníitium est. Commutantur igitur & ipsi, ægritudinemq̄ue participant. Vtique nonnulli & sensibus delirantibus corruptè sentiunt. At stomacho potissimū succurrendū est: cum & ipse malè habeat, & in ipso

λης κενώσι. ἰσομονίω. χεῖρ γδ καὶ τῷ σωμαχῷ δρῆγειν, καὶ τῷ νοσέοντι καὶ κάμνοντι. τῷ δὲ τ' μελαίνης χολῆς ἐγκρομήνης ἑπιπροσθεν μῆς ἡμέρης λεπῶς διατηθέντι, μέλαν ἔμβόρυον διοτέον ξυ μελικρήτῳ σαθμῆ ὀκόσον ὀγκάς δύο. ἰσάγει γδ ὅδε μέλαιναν χολῆν. ἄταρ καὶ ἔθυμῆ τῆ ἀπικῆ ἢ κόμη καὶ ἥδε ἄγει μέλαιναν χολῆν. ἀριστον δὲ ξυμμίσγοντα διδόναι ἐκάστω μέρῳ ἕνῃ ὀγκῶ δύο ἀμφοῖν, λένιν τῆ ἀπὸ τ' καθάρσι, καὶ οἶνον βραχὺ διδόναι, καὶ τ' ἄλλης τ' ἐν τῇ προφῆ χάριτ. σωμαχῷ γδ καὶ τῇ δυνάμει, καματηρὸν ἢ καθαρσις. μεταβαίνειν αὐθις ἐπὶ τὰ μέσα. ἄρει δὲ περὶ χαλάσαντα ἑπιπλάσματι καὶ τέγγει, σκύλω πρὸς τὴν ἥπαρ καὶ τὴν κοιλίαν, ἢ τὸ σῶμα ταύτης πρὸς βάλλειν. ἥδε γδ ἢ ἀφαίρεσις πολλὸν πῆκταιροῦ τ' φλεβοκυμῆς. πρὸς βάλλειν δὲ καὶ τοῖσι μεταφρένοισι, μεσηγὺ τῆ ὠμοπλατέων. ἐν ταῦθα ἔσωμαχῷ ἐστὶ ἢ πρὸς φύσις. εἴτ' αὐθις ἐπανατέθειν, καὶ μετὰ τῆ διαίτη βλασηθῆ ἢ δυνάμει, τὴν κεφαλὴν ξυρέειν, ἔπειτα σκύλω τῇ κεφαλῇ πρὸς βάλλειν. καὶ γδ ἢ πρῶτη καὶ μεγίστη τ' νέσση ἐν τοῖσι νέσοισι αἰτή. ἀλλ' οὐδὲ αἰ αἰσθήσις ἔσσι αἰσινέες. ἐκείθεν γδ σφύων ἢ δπόσασις, καὶ ἢ δρχή. ξυμτρέπον ὧν καὶ αἰδε κοινωναι ἔσσι τ' πάθης. μετεξέτεροι ἢ καὶ παραιδάνον, πρὸς φορῆ τ' αἰσθήσι. χεῖρ ἢ μάλισα τῷ σωμαχῷ ἀρῆγειν, καὶ τῷ νοσέοντι, καὶ ἐν τῷ δὲ τ'

ἔθυμῆ

ἀριστον



μελαίνης χολῆς ἐγκρομήνης. πίσι-
 κην ὠν χεῖ ἔχυλε ἔα ψιθίε ξυσε-
 χῶς δὲ σμικρῆ ἔμεγέθεσσι ἄξι-
 κυάμυ κώλυμα γδ ἔδε χολῆς γε-
 νέσιος. ἀγαθὸν ὅτι ἀλόη ἡδε γδ ὑπά-
 γει εἰς τὸ κάτω ἔντερον τῷ χολῷ.
 ἡ μὲν ὠν νεοτέρον τὸ πάθος ἢ· καὶ
 μὴ πολλὸν ὠνδρωπὸς ἐκτραπῆ,
 ἀλλῆς μὲν ἔπι τοῖσι ἰήσι. τὸ ὅλοι-
 πῆς διαίτης χεῖ ἔσ τε ἀνάληψιν
 ἔξει. καὶ εἰς καθαρσιν ἀκρεβέα
 ἔπαθεσσι, καὶ ἰσχὺν ἔδυναμι, ὡς
 μὴ παλινδρομέωσι αἰνέσοι. φράζω
 δὲ αὐτῆς τῷ ἐν τῇ ἀναλήψει βιο-
 τῷ. ἡ δὲ ἔπι τῶσδε σμικρὸν π-
 ὑποπῶξασα ἡνέσθ παλίνροσος
 ὀφθῆ, μεζόνων ἀκείων χεῖ. μὴ ὠν
 ἀμβολῆ χεῖ ὡς γινέσθω. ἀλλῆ μὲν
 ἔπι χεῖσσι * γυναικῶν κατὰ μηνίων,
 ἢ ἀνδρῶς αἰμορροΐδων ῥοσ ἡνέσθ.
 παρῆ ἐρεθίζεν τὰ χεῖα, ποσ χεῖεν
 πὶ τῆ ξυμῆθεσσι. ἢν δὲ μέλλη καὶ μὴ
 ἦκη, ἀλλῆ πητῆσ αἵματ μετάρρου-
 ἐντ, ἔπι παρῆ χεῖ ἡνέσθ, κενώ-
 σιασ ποίεσθ αὐτῶ, * ἡ γεόμηρον δὲ πὸ
 τῷ σφουρῶν. κῆν μὴ εἰς ὅσον χεῖ ἐν-
 τεῦθεν ἀφέλης, καὶ τὴν ἐπὶ ἀγκῶν
 τὰ μνην φλέβα. μεσηγὺ δὲ τριῶν ἢ
 τεσάρων ἡμερῶν ἀναδρέψι, τὴν
 ἰερεῖν τὸ καθαρτέλιον φάρμακον
 πίσι κειν. ἔπειτα σκύλω τοῖσι μέσοισι
 ποσ βάλην, τῶ ἡπαπ * ἐγχεῖσιν-
 τα, πρῆσεν τὰ ἔργα, ἢ τὰ χεῖ ἀνύ-
 οντα. σμικροῖσι μὲν γδ ἀκείσιν ἐπέθε-
 ται, κῆν εἰς τὰ μεγάλα ἰθύνη, ἐν ἔδρη
 ἰζει ἢ μελαγχολίη, καὶ ἢν πάντι τῆ
 σώματος ἐνοικήσῃ αἰσθήσεσι, γνώμη,

* γυναικῶν.

* ἀκρεβέσσι.

* ἐγχεῖσιν.

bilis atra resideat. Igitur absinthij
 succum ab exiguo incipiens ad fabæ
 usque magnitudinem assidue devo-
 rato. Idem enim ne bilis gignatur, im-
 pedimento est. Benefacit & aloë.
 Nanque ipsa ad inferius intestinum
 bilem deducit. Nempe si recens
 malum sit, neque multum homo à
 naturali statu discesserit; alia huic
 medela opus non est: sed reliqua
 uicinus ratione utendum, & ad prilli-
 num habitum recuperandum, & ad
 exactam mali purgationem facien-
 dam, & ad uim corroborandam:
 quæ omnia, ne iterum morbi reuer-
 tantur, efficiant. Vicium autem
 in refectioe conuenientem posteri-
 us exponam. Si ab his paulum de-
 bilitatus morbus denuò inualescere
 uisus fuerit; uehementiora medica-
 menta requirit: neque in aliud tem-
 pus differendum est. Verum si ab
 coërcitis mulierum mensibus, aut
 in uiro ab suppresso hæmorrhoidum
 profluuiio morbus creatus est; irri-
 tandi sunt loci, & aliquid soliti excre-
 menti profundendum. Si cunctatur,
 neque descendit, in aliam quampiam
 partem sanguinè prolapsò, morbus
 uerò exacerbatur, euacuatio facien-
 da est, & à talis incipiendum. Quòd
 si non, quantum satis est, sanguinis,
 inde manuerit; cubiti quoque uena
 secetur. Interjectis autem reficien-
 di causis tribus, aut quatuor diebus,
 Hieram, id est, sacram, quæ purgato-
 rium medicamentum est, potui dato.
 Adhæc cucurbitam medijs corporis
 partibus applicato, jecori uidelicet
 affigens. Sed maturanda negotia
 sunt, ac celeritas adhibenda. Exi-
 guis enim medicamenti morbus
 non obsequitur: si magnis autem non
 uincitur, sed resistit: tunc firma sede
 melancholia nititur. Quòd si penitus
 totum corpus occupauerit sensus, mētē,
 langu-



sanguinem, bilem, nervos etiam corripuerit; & ipsa insanabilis efficitur, & aliorum morborum corpori sobolem inserit, furoris, nervorum distentionis, resolutionisque. Quæ si à melancholia proueniunt; sanationem utique accipere nequeunt. Quamobrem ad hoc malum propulsandum ueratro utendum est. Sed antequàm ueratrum ægrotus accipiat; stomachum ad uomendum exerceat, & humores extenuet, & corpus fluxile reddat. Vomitiones autem hæc præstant nonnunquam jejuno stomacho, nonnunquam radice prouocati. Docebimus uero & modum & materiam: docebimus & ueratri species, & utendi rationem: item quo pacto singula & distingueret, & ordinare prius oporteat: & quo pacto in uomitionibus subueniendum sit, indicabimus. Incredible est autem nisi ab his funditus conuulsus est morbus, at multorum saltem annorum interuallo non sopiri. Plerunque enim postea melancholia rursum suboritur. Quod si jam firmas radices egerit, nihil iam ultra differendum est: sed quæ ad ueratrum pertinent, omnia administranda. Nempe ægroti omnes sanari non possunt: medicus enim Deorum potentiam anteiret. Verùm dolores sedare, morbos interciperet, atque obscurare, medico fas est. Itaque nimirum his, quæ posuimus, adhibitis, medici defatigantur, sequæ aliud quicquam facuros negant, Atque duas causas, aut morbum insanabilem esse, aut omnia se remedia tentasse prætexunt. Nihilominus tamen sacram ex aloë medicinam subinde præbere haud alienum est: siquidem opportunum melancholix subsidium affert, stomacho & jecori subuenit, bilemque deiciens mirifice prodest. Quin etiam malux feminis podo drachmâ ex aqua propinare optimum esse

αἵματι, χολῆ, λάβηται δὲ ἐν νύκτι, αὐτίτε ἐς ἀνήκεσον πρέπεται, ἐγκοτεῖτε τῶ σκηνεῖ ἐτέρων νοσημάτων τῆς, πασσμῆ, μαλῆς, τῶ δαλύσιος. κῆν ἐν μελαγχολίης (αἰδὲ γίγνη), τῶ Ἰππικυνοῦδρα ἀνήκεσα. ἐλλεβόρων ἡν χρεεῶς ἐς ἰσιν τῶ κακῆ. Ἰππικωθεν δὲ τῶ ἐλλεβόρον χηῆ ἔν τε σόμαχον μελετῶσαι ἴζεμεῖν, ἢ τῶ ὑγρα λειπῆναι, καὶ τὸ σκηνεῖ εὐροον ποιεῖν, ἐμεῖσι δὲ τῶ δὲ πρῆσῶσι, ἀλλοτε μὲν οἱ νήστες, ἀλλοτε δὲ ραφανίσιες. Φράσω δὲ τόντε πτόπον καὶ πῆν ὕλιν. Φράσω δὲ καὶ τῶ ἐλλεβόρον τῶ εἰδὲ αἰ τῶ χηῆσι τῶ πτόπον, ἢ ὅπως πρῶθεν κρινῆσαι ἕκασον χηῆ, καὶ ὅπως ἐν τῶσι ἐμεῖσι δρῆγειν. ἀπῆσον Ἰππικῶσι δὲ, εἰ μὴ ἐλύθη ἐς τὸ πᾶμ παν ἡν ἔσθ, ἢ πολλῶν ἐτέρων ἐχε διαλείψιας. τῶ πολλὰ γδ τῶ δὲ δπό τῶ κοί μελαγχολία. ἢν ἴεμπεδῶ ἦσθ, μὴ ἦσθ πρῶ μῆν. χηῆ ὦν τὰ ἐς τὸν ἐλλεβόρον ἀπαντὰ πρῆσῶσιν. ὑγῆ εἰς μὲν ὦν ἀπῆσῶσιν ἀδύνατον τῶς νοσῶντας * ἢ γδ αἰ ἰππῶς κρέσων θεῶ. ἀπῆνίω δὲ καὶ διαλείψιας, ἢ νύκτων Ἰππικῶσι, δρῆν θέμις ἰππῶσιν ἢ ὦν ἀπῆσῶσιν Ἰππῶσι δὲ ἢ ἀπαρνείσθ πρῶσι χολῆς ἀμφω τὸ ἀναλθεῶ, ἢ ἐς τέλος τῶσι ἐργοσι ὁμιλέειν. διδόναι δὲ καὶ τῶ ἰερῆς τῶ δὲ αἰλῶς ἀλλοτε καὶ ἀλλοτε, καμῆιον γδ φάρμακον τῶ μελαγχολίης τῶ δὲ, σόμαχῶ καὶ ἡπάτος, καὶ χολῆς καθάρσι τῶ ἀκῶ εἶν. ἀτὰρ καὶ μαλάχης ἀπῆσῶσιν ὁκόσον ὀκῆς δραχμῆν πῆσῶσιν ἐν ὕδατι, ἀεῖσῶν πείρη



πὶς ἴπρωσατ. μυρία δὲ τῶν ἀπλῶν
 φαρμάκων ἄλλα ἄλλοις * εἴη χη-
 σαί, ἴπιδε τοῖσι πόνουσι τοῖς δεῖς ἀ-
 νάληψιν ἀγειν. μετεξετέροις γδ, ἐς
 μὲν τὸν τῆς τριῆς καμρόν ἠνῆσθ, ἴξ
 ἔδρης δε ἐκινήθη, λὺ δεῖς ἀνιάπλα-
 σιν σαρκῶν καὶ δυνάμιθ ὠνθρω-
 πθ ἠκη, ξυωπηλάθη πάντα τῆς
 νῆσθ καὶ ἰχνια. δυνάμις μὲν γδ φύ-
 σιος, ὑγείαν πικτε. ἀσθένεια ὅ νῆσον.
 ἀπίτω ὠν ἐς ἀνάληψιν ὀνοσέων, πε-
 φυκοσί θερμοῖσι ὕδασι ἐνδιατώμε-
 νθ. καὶ γδ καὶ ἐν τοῖς δε φάρμακα,
 ὀνησία, ἀσφαλτθ, ἠθεῖον, ἠσυπή-
 ρην, πολλὸν πλεῦνες τετέων ἄλλαι
 δυνάμιες. ἀγαθὸν μὲν γδ ὑγρασίη
 ἴξ αὐχμῆ τῆς νῆσθ καὶ λαμπωρίη τῆ
 ἰήσιθ. ἀραιαὶ δὲ καὶ μαλθακαὶ σάρ-
 κες ῥηισαὶ πρὸς ἀφείν τῆ νοσήμα-
 τθ. ξηραὶ ὅ καὶ πυκναὶ τοῖς μελαγ-
 χολῶσι αὐ σαρκες, ἀλειμμα λιπα-
 ρὸν ἅμα τῆ ψίος εὐαφῆς, πολλῶ τῆ
 λίπαι * δέχοντα ἀετοὶ πλυτοί, ξυῶ
 πνὶ γλυκεὶ θηραῖω τῆ κρητῆ, καὶ σκυ-
 βελλίη τῆ παμφύλλω, ἠοῖνθ καὶ
 μέλι μίξιος παλαιῆς. ὠν καὶ ψυχ-
 ροτέρων καὶ θερμῶν τῆ γυμνῶν τῆ
 λπὸ τῆ ὄσρακώδεθ. κρεῶν τὰ μὴ
 πύονα, καὶ σμηγματῶδεα. συῶν μὲν
 πόδες καὶ τὰ τῆ κεφαλῆς, πύων
 τὰ πλερῶ ἀπύονα, θηείων, λαγωῶν,
 θροκάδων, πύωκός, ὀπώρης, ὀκοῖον π
 ἀείσον ἠ. ἴπιδε τῆ ἔσ μαχῆ ἀναφο-
 ρῆ πρὸς μὲν εὐεῶς πρὸ τῆ πρὸ φῆς,
 ὀκως μὴ καταποθεῖς ἀνεμῆται. δι-
 δόνα ὠν πρὸ πάντων σπύων, μελί-
 κρητον κυάθῆ ἠμισυ, καὶ πύοντα ἐξεμέφν

quidam experientia compertum ha-
 buit. Infinita præterea sunt simpli-
 cia medicamenta: quorum alijs alia
 utilia sunt. Post id genus laborēs
 demum reficiendus ager est: qui-
 busdam enim, quandiu medicatio
 adhibetur, tandiu morbus perma-
 net, quamvis labefactatus ac debilis:
 at si homo carnes refarciat, ac vires
 instauret, simul omnia morbi ue-
 stigia obliterantur. Nam potentia
 naturæ sanitatem, imbecillitas mor-
 bum parit. Propterea ad refectio-
 nem conuertatur ægotans in aquis
 sponte calidis sæpè commorans. Me-
 dicamenta enim, quæ in his sunt in-
 genita, opem ferunt, bitumen ui-
 delicet, aut sulphur, aut alumen, ac
 multò his plures aliæ facultates.
 Bona utique est humectatio morbi
 squallorem tollens, & curationis
 uexationem mitigans. Raræ autem
 ac molles carnes ad ægritudinis re-
 missionem maximè faciunt: uerum
 siccæ ac densæ melancholia labo-
 rantibus carnes sunt. Inunctio pin-
 guis cum leni fridione adhibeatur,
 cum multo autem oleo, hæc conti-
 neat * panes loti cum uino aliquo
 dulci theræo, cretensi & scybelli-
 te, quod Pamphyllum uocant: aut
 uinum & mel quæ jam diu permix-
 ta fuerint. Oua & frigidiora & ca-
 lida, putaminibus nudata: non
 pingues carnes uim detergendi ha-
 bentes: porcorum pedes, & capitis
 partes: auium alæ pingui carentes:
 uenatio, ut leporis, caprearum, da-
 marum carnes: fructuum autum-
 nalium quisquis optimus fuerit. Sto-
 machi subuersioni consulendum est
 ante cibum, quò minus deuoratus
 reijciatur. Quare ante omnes ci-
 bos mullæ cyathi dimidium dan-
 dum est, bibitumque per uomitum

redden-



reddendum, quo stomachi excrementa purgentur. Sic enim cibus in uentriculo firmus residet. Ad medicamina necessario educendorum purgatoria sunt pini fructus, & urticae semina coccali & piperis, amygdala amara. Meleis consistentiam praebet. Sin exiccare uolueris, optime proficit myrrha, & iridis radix, & medicamen ex uiperis, & Bistini, & Mithridatis Antidotus, & id genus alia propè infinita. Exterius apponenda sunt cataplasmata, quorum materia est fertula & papauer, & terebinthi lachryma, & hyssopum, & oleum ex rosas, aut ex oenanthe. Cetera autem haec omnia cogantur. Inunctio pinguis, gestationes, deambulationes, & alia, quotquot carnes reficiunt, & uires instaurant, & naturam in antiquum statum reuocant, administrentur.

ἐς τὴν ἑσπέρην καθαρίσιν. ὡς δὲ
 ἔσσι ἢ προφῆ ἐδραϊνῶν. Φάρμακα δὲ τῶ ἀναγκαίων καθαρτήρια, πῖτυ & καρπὸς καὶ κνίδος, τῶ ἀπερμάτων ἑσποκάλου, καὶ πεπέρι & ἀμυγδάλων αἰπικραῖ, καὶ μέλι τῶ δὲ ἑξύσασιν. καὶ δὲ ξηρῶν αἰθέλης, αἰσον σινερα, καὶ ἰρεως ἠρίζα, καὶ τὸ διὰ τῶ θηείων φάρμακον, καὶ ἡ ἑσπέρην καὶ μίθριδάτε, καὶ ἄλλα μυρία. Ἐπιθήματα δὲ, ἢ τῶ ἐπιπλασμάτων ἕλη, μελίλωτον, καὶ μήκωνες, καὶ θερμίνθε δάκρυον, καὶ ἰσωπον, καὶ λίπας τὸ ἀπὸ ρόδων, ἢ τὸ οἰάνθη. κηρὸς δὲ τετέων παύτων πάγυ. ἄλειμμα λιπαρὸν, αἰῶραι, ὡρίπατοι, ἄλλ' ὅσα σαρκῶν τε ἀνάπλασιν ποίεεται, καὶ δυναμι & ἰχὺν καὶ τῆς φύσι & ἐς τὸ δευκαῖον ἄποκατάστασιν.

ΘΕΡΑ-



νίας,

ris,

Κεφάλ. 5.

Παυλ. αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ιδ. Καὶ συν-
μνημονεύει τῶν ἀποληθίων πῖς μελαγχολ-
λῶσι. Θεραπεία σωμν. ἰδίως δὲ τῇ κεφαλῇ
τῶν ῥοδιῶν καὶ ἔξυροδιῶν προσοίσωμν.
καὶ τῆς πικρῆς ἀπιδότης καθάρωμν
προφλεβοτομήσαντες αὐτῆς. καὶ ἐδούλαις
κατὰ τῆς κεφαλῆς, χρησιμοποιεῖται. μάλιστα
δὲ αὐτῆς ὠφέλιμα ἰππμαρτίες ρίζα, καὶ
ἀέριμα πνύμνον ἐν ὕδατι. καὶ βρυωνίας
ρίζης δραχμὴ μία μετ' ὕδατος καθ' ἡμέ-
ραν. εἰ δὲ μὴ πείθονται τὰ καθαρτικὰ φάρ-
μακα πίνειν οἱ τῶν φρονήτων, καταμικτῶν
αὐτὰ λεληθῶς, ὅτε μὲν πῖς ἐδεσμοῖσι
αὐτῶν, οἷον βουκκίσις, ἢ ἐρασίσις, ἢ φοινίξις.
ὅτι δὲ πῖς πῖμασι. πρὸ δὲ γε πάντων ἡ σὺ-
δισμείωσι ἐν τῇ κλίνῃ. Διὰ τὸ μὴ κακόντι
δραῦ, αὐτῆς καὶ τῆς τυγχάοντις, ἢ ἐωρίωσι-
σαν ἐν κλινίδι, ἐνδοθεν γυργάει πνός ἐξ ὕ-
ψους ἀπρητηιδίω.

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Π Α -

θαλύσεως.

Κεφάλ. 6.

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ιη. εἶδε πύρεσις εἴη,
αὐτὸ πύρεσις τῶν ἡμερικῶν ἐνεργειῶν, πάν-
των τῶν μερικῶν ἢ ἐνίων, καὶ ταῦτα καὶ ἐκκενῶν
τῶν ἐνοχλῶντα χυμὸν ὅπως αὐτῆς κάπειτα δι-
δόναι τῆς ἐρεθῆς ἐκχῆσις καὶ κασορίης μέρος. ἀρχο-
μῆς δὲ τῶν ἡμῶσις δραχμῆς μετὰ ὀλίγη μέ-
λιτος καὶ θερμῆ ὕδατος ἀναλύοντις. ἢ γοιω καθ'
αὐτῶν προσπλέκοντις καὶ πεπύρεως χεῖμα τὸ
ἡμῶσι. κάπειτα διασηοῖσι τῆς ἡμέρας ὁ; προσά-
γειν πλείαν δραχμῶν. καὶ μετέπειτα μίαν καὶ ἢ
μίσειαν εἴπει δύο καὶ τρεῖς. καὶ αὐτῆς διασηοῖσι
πῖς αὐτῆς ἡμέρας προσφέρῃ τῆς αἰσῆς δραχ-
μῆς, εἴγε οἷος τὸ ὅτι πάχων λαμβάνειν. Δι-
βάλλοντις μέλιτος κοχλιάρον α. Διὰ δὲ τὸ
μύρια Διππθένα τῶν διαφορητικῶν φαρμά-
κων πνός, καὶ τῆς φοινίσις διωαμῶσις σὺν ἐπι-
βάλλοντις τῆς πῖς κασορίης, ἢ πεπύρεως, ἢ πυ-
ρέθρου, ἢ κάχρου, ἢ διφορέσις καὶ πρὸς γε τῶν
ἐμπερκαῖ διὰ πηρανίης ἐλαίης, ἢ σικιοῖς, ἢ
παλαίου. τροφῆσι τῶν ῥοφηματῶσις ἢ
ἀλλως, εὐπεπτοι. καὶ ἀπεοπτοι. σικίαι
κολλῶσι τῆς παρεθείσι μέρεσι.

Caput VI.

P. Aegin. lib. 3. c. 14. Mania laborantibus
perinde atque melancholicis succurritur.
Priuatim uerò horum capiti rosaceum, &
acetum rosatum adhibeantur : & picræ an-
tidoto, incisa prius uena, purgentur. Ad-
mouendæ etiam sunt capiti hirudines. Po-
tissimum autem auxiliatur ipsis erratici fœ-
niculi radix, semenque ipsius ex aqua epo-
tum, & bryoniæ radicis drach. cum aqua
quotidie sumta. Si uerò ad potionem phar-
macorum purgantium induci nequeant
mentis inopes, admiscenda sunt ea clancu-
lum, partim sanè ferculis ipsorum, uerbi
causa, buccellis, aut caticis, aut palmulis : par-
tim etiam poculentis adijcienda. Ante omnia
uerò uel in culcitra uinciendi sunt maniaci,
ne malè uel semetipsos, aut familiares quibus
incidunt, afficiant : uel gestandi in lectulo
intra gygartum, hoc est cubile quoddam men-
te captis consecratum, ex alto pensili.

C V R A T I O N E R U O -
rum resolutionis,

Caput VII.

P. Aegin. lib. 3. c. 18. Quod si principali-
bus anima functionibus illæsis, omnes uel
quædam corporis partes resoluantur etiam
hic qui infestat humor, qualiscunq; fuerit
euacuandus est. Mox hieram, quæ Castorij
partem admixtam habeat, porrigito : à dimi-
dio quidem drachmæ auspicans, cum mo-
mento mellis & calida aqua dilutam, uel per
se, & piperis dimidiato scrupulo adiecto :
post hæc quatuor diebus interpositis, inte-
gram drachmam exhibebimus; ab hoc sesqui-
drach. postremò duas ac tres, atque tum rur-
sum totidem diebus intercalatis quatuor
drachmæ sunt offerendæ (si modo per languē-
tem liceat) addito mellis cochleario. Membris
uerò quæ discutiendi facultatè habeant, quæq;
exasperando cruentum ruborem cutis excitare
possint, applicanda : quibus cum castorium, aut
piper, aut pyrethrum, aut semen torismarini,
aut euphorbium commiscebimus. Super hæc
uerò embrochæ etiam profunt, quæ oleo ruta-
ceò aut sycionio, aut alioqui peruetusto constât.
Esculenta conueniunt frumentacea, & quæ
sorberi commodè possunt, aut aliàs non dif-
ficilis concoctionis & superuacaneis retri-
mentis exortia. Cucurbitulæ partibus resolutis,
si plu-

si plures fuerint, diuisim : si pauca, uni adglutinentur. Post cucurbitularum usum, Cataplasmata ex pice, aut resina, aut manna, illinito. Ex re autem & usu fuerit, artemisia elixa cum nepeta, conyla & nitro aqua tantillo, quæ elixando consumeretur admixto. Alius denuð subducatur, uel cum aloë uel polypodio, uel scammonia, uel pulce ex colocyinthide. Vnguenta item profunt ex oleo ueteri illita, in quo scilla macerata dies quadringenta sub sole fuerit. Si huius copia non sit, scilla uncias duas in oleo coquito atque circumlinito, aut semen rorismarini similiter præparatum. Admiscenda uerò ceræ est uncia, ne diffluant. Quod si galbani quoque & castorij, euphorbij, adarces atque nitri, singulorum semuncia, assumferit, multò efficacius in medendo fuerit. Amussatim porrò quadrabit & rauunculus herba oleo elixa, & infolata. Conducunt potiones castorij drachmæ unius pondere, & oroponacis fabæ instar deuoratum. Mirum quantum opis afferat etiam sagapenum erui magnitudine in mullâ : castorium pariter cum oroponace succoque cyrenaico, milij quantitate. Confert etiam quæ è tribus piperuti enegribus constat antidotus. Quin & calorificis acopis apophlegmaticis que post decimum & quartum diem, plenioribus cibus utemur. Plusculo iam auxilij conciliato, balneo credemas. Post tricesimum diem dropace quoque utendum atque lauandum, deinde sinapi emplastri modo inducendum in his in quibus sensus atque motus perijt. Aduertentes tamen, ne (quoniam uisionem non sentiunt) plus satis perurantur. His uerò qui sensu minime destituuntur cutem cruentate duntaxat conuenit : post tumorem inductum in balneum inducere, & cerotis mollibus mederi. A cœna uomitione, uel radícula citata utantur. Gestationibus item fellæ, uel plaustrum manualis, aut rhedæ. Reliquo uero tempore in maturalia lauta deducantur. Magna postremò cum utilitate uictus siccior, potio- nis frugalitas, atque fricatio adhibetur. Epulis itaque ficcis uescantur, sitis pro uiribus tostantes.

εἰ μὲν πολλὰ εἴη, μεμελεσμένως. εἰ δ' ὀλίγα, ἐφ' ἑνὶ. καταπάσσειν δὲ μετὰ σικύας τοῖς διὰ πίσης, ἢ ῥητίνης ἢ μάννης. κάλλιπον δὲ ποιεῖ δεξιμίσι σμειβομένη καλαμίνθη, καὶ κόνυζα, καὶ νίτρον. ὕδωρ δὲ μεμίσθω ὀλίγον. καὶ αὐτὸ δὲ ἐν τῇ εἰρήσει, ἀναλιοκέδω. ἢ θεποιχία αὐτὸς σαγαπέδω, διὰ τε ἀλόης, ἢ πολυπόδης, ἢ σκαμμωνίας, ἢ τῆς ἀσκολοκιωθίδος πολλῆς. λιπασματὰ τε συγγρησά τιαύτα, ἐλαίῳ παλαιῷ ἐν ὄσκίλλια ἐνταριχέεται ὅτι ἡμέρας μὲν ὑφ' ἡλίου, εἰ δὲ μὴ παρῆη τῆτο. εἴβεις ἐν ἐλαίῳ δυο γο. α. ὑπερ ἔ μὴ ἀφάρρειν. εἰ δὲ καὶ χαλκωῆς καὶ κασορίας καὶ ἀφάρρεις καὶ ἀδάρκης καὶ νίτρος πρὸς λάβοι ἀνά το δ. φαρμακωθέρτερον ἐστίν. ὀθετεα δὲ ἀκρῆως καὶ βατραχίου βοτάνη ἐνεψομένη τῷ ἐλαίῳ ἐν ἡλίῳ ταριχευομένη. ποτίματα δὲ κασορίας ὄσον Ι. α. ὀποπανάκτου κυάμου μέγεθος καταπνόμενον. θαυμασῶς δὲ ποιεῖ καὶ τὸ σαγαπλῶν ὄροβου μέγεθος ἐν μελικράτῳ. καὶ τὸ κασορίον μετὰ ὀποπανακός, καὶ ὀποῦ δὲ κυρλωαϊκῆς, κέγγυος μέγεθος. ὠφελῆ καὶ ἡ διὰ τριῶν πεπέρων ἀπίδιον, χρησόμεθα δὲ καὶ ἀκόπος τοῖς θερμαίνεσι καὶ τοῖς ἀποφλεγματισμοῖς, μετὰ δὲ καὶ τῷ τεσσάρων καιδεκάτιν ἀδρότερος δρῶμεν. καὶ γνομῆς πολλῆς ὠφελείας, ὅτι βαλανεῖον ἀξωμῆν, μετὰ δὲ τετρακόςτω δρόπικα πρὸς φέρειν, καὶ ὅτι βαλανεῖον ἀγειν. καὶ ἔ λοιπὰ καταπάσσειν τῷ νάπτῳ ἐφ' ὧν ἦτε κίνησις καὶ ἡ αἰσθησις ἀπώλετο πρὸς χοντας διὰ τὸ μὴ σωμαδάνεσθαι εἰ μὴ ὑπερκαυθῶσιν. ὅτι δὲ τῶν μετεχόντων αἰσθησεως τὸς φοινιγρῆς μόνον δὲ ὠφελὰ λαμβάνειν. καὶ δὲ μετὰ τὸ οἰδέσσαι. ὅτι λετρεῖν ἀγειν, καὶ κυρωτῆς εἰπωλαῖς θεραπέυειν. καὶ τῷ ἀπὸ δλείπυς δὲ κερηδωσαν ἐμέτω. καὶ τῷ ἀπὸ ραφανίδων. ἐωραδωσαν τε καὶ διὰ δλίφρος ἢ διὰ χειραμάζης, ἢ διὰ ζόκτῆς. ἀγέδωσαν δὲ τῆς λοιπῆς, ὅτι τὰ αὐτοφυῆ λετρεῖα. δλίαιτα δὲ ξηροτέρα, καὶ ὀλιγοποσία καὶ τριῖς ἀρμοσεῖ. ξηροφαγείτων γοῦ ἀνεχώρητοι τῆς δίψης ἐφ' ὅσον ἐγχαρῆ.

δὲ

ποις

προσέχ

μάξι

ΠΕΡΙ



A R E T A E I
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΕΙΙΣ QVI LAXA-
χάλασιν ἢ κατὰ τὰσιν παρε-
θέντων. tione aut extensione reso-
luti sunt.

Ἐπειδὴ τὰ ὠδραλυθέντα μέγιστα ἢ ὀπασα-
ται ἢ χαλαῖται. καὶ τὰ τὸ ἢ δὸτὸ ἀληρώσεως,
ἢ δὸτὸ κενώσεως, πάλιν προσέχειν χρῆ, καὶ
πῆ μὲν ἀφαιρῆν τὰ αἵματ', πῆ δὲ οὐ.
κάπεται ὅτι μὲν τῶν κεχαλασμένων, πῆ
χαλασσι τὰ εὐφόντα μιν γίνεσθαι καὶ τὴν πρῆψιν
ὀπασαμένω ποιῆσθαι. ὅτι δὲ τῶν ἐναντίων,
πῆ χαλαῶσι μόνον χρῆσθῆν, μετὰ καὶ τὰ κα-
τατρέβειν μαλθακῶς, ἐχέτω δὲ τὸ ἔλαιον
ὅτι τῶν κεχαλασμένων συλλελοιμένων
ὀλίγον νίτρου καὶ σφέκλης. καταπλεῖσθαι
δὲ σφοδρῶς θερμῶ τῶ ὕδατι, καὶ μά-
λιστ' ἀπὸ θαλάσσης, ἐν ἢ ἀφειρήθησαν
δάφνη, ἢ ἀγνὸς ἔλασος, ἢ σάμψυχον, ἢ π-
πιῶτον. εἰ δὲ θερμῶ εἴη, καὶ νηχέωσθαι ἐν
τῇ θαλάτῃ, οἱ δὲ φοινίγμοι τῆσιν μάλιστ'
ἀρμόζουσι. πυγαροῦ καὶ τυπλεῖσθαι τὰ
μέγιστα νάρθηξιν, ἢ κνίδος κλάσιν. εἰ δὲ ὀπ-
ασαμένῃ ἢ ὠδραλυσί. χρῆ τὴν μετὰ τῶν ἄρ-
θρων κεχαλασμένων σάκκα ὀπασασαμένους
καίειν διαπερὶντὰς καντηρίοις μικροῖς καὶ
λεπτοῖς. πῆ δὲ σιωνηγυμνοῖς ὀπασαμένους χρῆ
συνεχῶς δρώπικα.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ Ε-
κὰσῳ μορίῳ σιωνηγυμνοῦ
παρέσεως.

Ἡ μὲν δὸτὸ διαίρεσεως γόρου γινομένη τῶν
μορίων πάρεσις ἀνίατὸς ἐστίν. ἢ δὲ δὸτὸ δυσπρα-
σίας ἢ χυμῶ ἰνὸς γινομένη (βοηθεῖ), κοινῶς μὲν
πῆσιν εἰρημνοῦσιν δυνάμεσιν. εἰσὶ δὲ καὶ ἰδία πῆσι
καθ' ἑκάστον αὐτῶν, ἀσὶν ὑποτάξομεν. ὅτι μὲν
οὐ τῶν κυνικῶσιν ὀπασαμένων ἐπίσης εἰς τὰ αἰ-
πτικέμενα ὠδραλυσοῦσα ἀπὸ τῆσιν φορκίας
προσαγορευομένης. ἀρμόσει καὶ ἀφαιρε-
σι αἵματος δὸτὸ τῶν ὑπο τὴν γλώττην ἀγ-
γείων. καὶ σικύαι κατὰ τὸ πρῶτον σπονδύλου.
καὶ δὸτὸ φλεγματομοῖ, καὶ ἀπὸ ῥινοεγχύτης
καθάρσεσι. εἰδέναι οὐ χρῆ ἢ τὴν φαινομένην
ὠδραπετράφθαι σιαγόνα. τὴν ὠδραλυσί
ἔχειν. ἀλλὰ τὴν αἰπτικέμενον. καταπό-
σεως δὲ παρεθέσης σικύαι τῶ ἀνθεράωνι
κολλητέον καὶ ἀαχρησέον πῆσιν ἀπὸ κα-
σοῦ, καὶ σιωνηγυμνοῦ, καὶ ὅτι παρεθικῆ.

QVONIAM autem artus resolutionem ex-
perti uel conuelluntur, uel relaxantur,
idque interdum plenitate, interdum uero
uacuitate, rursus attendendum est, partim
sanguinem esse detrahendum, partim uero
minime. Deinde in partibus quidem re-
laxatis, remedijs laxantibus ea quæ astrin-
gunt misceto. In contrarijs, relaxantibus
solummodò utendum, cum perfrictione
molli. Complectatur autem oleum, quod
relaxatis adhibetur, nitri contriti, fecisque
uini crematæ paululum. Fetus erunt ex
aqua admodum calida præcipue matina : in
qua elixentur lauri, uel agni germina, aut
sampsyichum, uel aliud quiddam eiusmodi.
Æstiuo uero tempore in mari natationes
et summæ cutis exasperationes, uel in primis
conferunt. Vapulent itaque partes afflictæ
ferulis, aut ramulis urticæ, si resolutio per-
seueret, oportet flacciscentem ac reso-
lutam inter articulos carnem attractam com-
burere, transfigentes caudentibus ferris exi-
libus & tenuibus : sed contractis partibus
dropacem continuò superaccommodare.

DE EA QVÆ VNO QVQVÆ
membro consistit, resolu-
tione.

QVÆ dissectis neruis accidit paresis,
nullo medicamine uincitur. Sed quam
intemperantia aut humor aliquis concilia-
uit, huic in genere quidem facultatibus præ-
dictis succurritur. Sunt uero peculiæres
quædam singulis ipsorum, quas subnectemus
medelæ. In his igitur qui canina conuulsio-
ne raptuè impetuntur, per phorceam in-
strumentum quod uocant ex æquo in di-
uersum deduces. Sanguinisque ex subje-
ctis linguæ uasis extractio competit. Cucur-
bitulæ item circa priorem dorsi uerrebram
adglutinatæ atque apophlegmatismi & per
narium infundibulum factæ purgationes
conferunt. Sciendum igitur est, non eam
quæ diuaticasse uideretur mandibulam, reso-
lutionem expertam, sed oppositam. Inguuie
uero uulsæ paresi, cucurbitulæ mento sunt de-
figendæ. Vtendum præterea, quæ castoreo, sa-
gapæno, & succo parthico, constat, illitionibus
Conferre



Confert etiam gargarismus ex rebus acribus. Lingua porro parsi infollata venæ ipsius secandæ sunt, cucurbitulæ mento apponendæ, utendum apophlegmatismis ex sinapi, & exercitationibus linguæ. Vocalibus uerò instrumentis resolutionem expertis, thoraci afferenda sunt præsidia, spirationis suppressione, exclamationeque utendum. In superciliorum vero paralyfi, palpebrarum inunctiones pariter conducunt: prodest etiam consutio. Vesicæ autem resoluta, siue lotium cohibeatur, siue citra uoluntatem excludatur, peccini & tauro medicamenta adhibenda sunt. Sedi uerò oleum rutaceum, aut scyonium adiecto butyro & castorio aut galbano aut opopanace, aut lasere infundendum: quæ quidem per colem uesicæ immiffa plurimum opis contulerunt, aut sola etiam suffecerunt. E centauryo præterea & colocynthide clysteres cum scyonio intestinis non inutiles sunt. Præsunt item pharmaca quæ lotium proritandi facultatem obtinent, epota & castorium similiter. Sed ante omnia ijs qui nihil lotij emittunt, id periphunculos uesicarios (quos catheteras Græci uocant) eliciendū est. Balneis porro relaxantibus insidendū & cataplasmatibus inde confectis utendum. Si uerò præter uoluntatem lotium excernitur, cum roborantibus præsidij adstringendum, alimenta arida & porus gelidos usurpandum. Quum instaurantur, tubores in summa cute concitare, & naturalibus balneis frigidis uti conuenit. Resolutio uerò spinæ ob uulnus, aut casum, aut laxationem uertebrae, lethalius symptomatis confluentibus nullo remedio eliditur. Quod si penis resolutus est, iisdem quæ ad uesicam pertinent utendum. In iisdem partibus atque lumbis etiam ijs quæ intendendi uim obtinent utimur. Improbatur, lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæcum cæteris oleribus. Recto autem intestino resoluta, quandoque ab inuitis oletulum excernitur, quandoquidem retinetur, iisdem utendum est remedijs, aliàs quidem eadem per clysterem immittendo, aliàs uerò astringentia: uerbi causa, decoctum cupressi, lentisci, rubi aliàs remittentia, cuiusmodi sunt adeps suillus aut anserinus aut oleum maluaceum: nonnunquam & mordentia, ueluti, salugo, aut colocynthidos, aut similia decoctū, perinde enim motiones, atque ipsa agitatio promouet. Si autē frigus apprehenderit, acopū ex Euphorbio cum oleo dilutum

ώφελει δὲ καὶ ἀναποχυλισμὸς διὰ τῶν δριμύων. καὶ τῆς γλώττης δὲ παρεθείσης, πὰς ἐν αὐτῇ φλέβας τμητέον. σικουαστέον τε τὸν ἀνθερωῶνα. καὶ ἀποφλεγματισμοῖς χρῆσθαι διὰ νάπυος. καὶ γυμνασίοις τῆς γλώττης. τῶν δὲ φωνητικῶν παρεθέντων, τῷ θώρακι πρὸς φέρειν τὰ βοηθήματα πνεύματος τεκαποχῆ, καὶ ἀναφώνησαι χρῆσθαι. Ἰππὶ δὲ ὄφριων, τῶν βλεφάρων συγχρῆσιματι ὁμοίως ὠφελει. Ἰππὶ τέλει δὲ καὶ ἀναρραφῆ: κύσεως δὲ παρεθείσης. εἴτε ἐπέχοιτο τὰ οὖρα, εἴτε αἰκισίως ἐκκρίνοιτο. τῷ μὲν ἡτρω καὶ πεινῶν τὰ φάρμακα πρὸς σενεγκτέον, ἐνετέον δὲ τῇ ἐδρα πηγάνιον ἔλαιον, ἢ σικουάνιον μετὰ βελήρη καὶ κασορίε. χαλβάνης ἢ ὀππάνανθου, ἢ ὀπῆ σιλφίε. καὶ τῇ κύσει δὲ ὠρα πεμπόμδρα ταῦτα διὰ τῆς καυλῆ, μεγάλως ὠνησεν ἢ καὶ μόνα ἤρησεν. καὶ τὰ διὰ κενταυρίε δὲ καὶ κολωνιδίου κλύσματι ἐντέρας, μετὰ σικουάνιε χρῆσιμα. εὐθετεῖ δὲ καὶ τὰ διερρητικὰ πινόμενα, ἢ κασορίε ὡσαύτως καὶ πρὸς γε πάντων καθητητέον τὰς μηδὲν ἀφροῦντας. ἐγκαθητέον δὲ καὶ καταπλαστέον πῖς χαλαστικῆς. τὰς δὲ ἀπαραίετως ἐκκρίνοντας, συππικῶς ἀκτέον, διὰ τῶν τινούτων βοηθημάτων, τροφῆς δὲ ξηραῖς καὶ ποτῶ ψυχρῶ χρῆστεον. εἰ δὲ ταῖς ἀναλήψεσι, καὶ φοιτωμοῖς, καὶ αὐτοφύεσι λατρεῖς χρῆσασαν ψυχροῖς. τὰς δὲ Ἰππὶ βράχεως τραύματι, ἢ πλώματι, ἢ ὀλιόδηματι σπινθηλά, θανατικῶν σινδρομῶν συνδρευουσιῶν. ἀδύνατον ἰάσθαι. εἰ δὲ καυλὸς παρεθείη πῖς Ἰππὶ κύσεως χρῆστεον. Ἰππὶ τε τῶν αὐτῶν μορίων καὶ τῶν ψοῶν. πρὸς στέπ δὲ καὶ πῖς ἐντατικῆς χρῆσιμα. ἀθετεῖ δὲ γαλα, τυρός, καὶ τὰ λοιπὰ πέμματα. θερδακίνας, καὶ τὰ λοιπὰ λάχανα. ἀπευθυσμὸς δὲ παρεθέντος, ἐφ' ἧς ποτὲ μὲν ἀκισίως ἢ κόπρος ἐκκρίνεται, πτε δὲ ἐπέχεται. πῖς αὐτῆς χρῆστεον. ποτὲ μὲν τὶ διὰ κλισῆρ ἐνίεναι. ποτὲ δὲ τὰ σύφοντα. οἶον ὠφέψημα, κυπαρίσσε, χροῖνε, βάττε. ποτὲ ἢ τὰ χαλῶντα οἶον σέαρ ὑειον, καὶ χήνιον, καὶ μολόχινον ἔλαιον. ἀλλοτε δὲ, τὰ δάκνοντα. οἶον ἀλμυ, ἢ κολωνιδίου ἢ τῶν ὁμοίων ἀφέψημα, εἰ δὲ γὰρ ἔτως ὠφελει πὰς κινήσεως, ὡς ἢ πικίλη μόχλευσις. εἰ δὲ ἀνίληψις εἴη ψύξεως, καὶ δι' εὐφορίε ἀκίπε ἔλαιον ἀνεθέντος ἐνίεθω,



ἐνέδω, πὰ δεκῶλα παρεθέντω μετὰ τῆς κρι-
νῆς ὀππυμελείας καμπιέδω καὶ τριβέδω. καὶ
ἐκτενέδω καὶ τὸν εἰρημῶν τρόπον. τὸ γὰρ
πλεῖστον τῆς ἐλπίδου, ἢ τριψίς ἐστίν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟ- λικῶ νοσήματι γινομένης πείσεως.

Κατὰ τὰς ἡμετέρας χρόνας, κολική τις ἀχλη-
σεν νόσος. ἐφ' ἣ καὶ μάλιστα τοῖς σωθήσεσθαι
μέλλουσιν, ἀκίνησια μὲν παντελῆς ἀκαταβῆ-
τῶν κῶλων ἢ δὲ τῆς ἀφῆς αἰσθητικῆς ἀβλαβῆς
διαφυλάσσεται ὡς εἰσιν. οἷον κερπικῆς πινός
ἐκ τῆς εὐθὺς μετὰ τῆς γινομένης. ὅθεν αὐ-
τομάτως ἐπανήλθε τοῖς πολλοῖς ἢ κίνησις ἐν
χρόνῳ τὰς δὲ γε δυσιαπύνας καὶ τὰ ἀπώλετα
τῶν λεχθέντων ἰάσατο συγχερισμῶν. ἐξ αἰρέσε-
δε τὰς εὐρέθη, τὸ τε δια τῆς αἰγείρας, καὶ τὸ
διὰ τῆς ἐλάτης ἀκόπον. πολλὰς δὲ καὶ τὰ νοσοῦντα
καὶ μετρίως ἐποψύχοντα, μεγάλως ὠνήσεν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΘΙ- σι,

Κεφάλ. η.

Ὅπως ἐν νηὶ καὶ γαλήνῃ, καὶ γὰρ εἰ διπ-
λοῖσι ὀνοσῶν, ἐν θαλάσῃ γίγνοιι αὐ-
αἰώρη καὶ βιοτή, καὶ γὰρ πῆξιν ἐστὶ ἐλ-
κεα ξυνοδῶσι ἀλμύ. ἀπὸ δὲ τῆς αἰώ-
ρης ἐφισυχάσονται, χρεῖα δὲ μὲν λι-
παρῶν λιπαί. Ἐπι τῆσι τρεῖς εἰσὶ ἐξε-
χῆς καὶ ὀνοσῶν ἀπὸ ὀλίγου ἐκ πρῶ-
σαγωγῆς, ἐσ κοτύλας πέντε ἢ ἕξι, ἢ
πολλὸν τι πλεῖον. ἢν δὲ μὴ, ἐκόσον τις
δυνή). πολλὰ καὶ γὰρ τὸ δεμένον αἰπὴ
πάσης τροφῆς ἤκεσε. γάλα δὲ ἰδὸν
μὲν προσάραδ. πείν δὲ ῥήσιον, σερρόν
δρῦλαι, καὶ τροφῆς ἀπάσης ἐκ παι-
δὸς ξυνηθέσεν. ἰδὸν δὲ τερπνὸν τῆ
χρῆσιν. φάρμακον δὲ δετρεῖν ἀκερ-
χον, διαπλεῶσαι βρόγχον, ἀγαπ-
φλέγμα εὐπνοον, ὀλιθῆρον δὲ τὴν
κάτω διέξοδον. ἐλκεσι δὲ φάρμακον

immittito. Membra postremò resoluta,
communi cura flectito, perfricato, & quem-
admodum diximus, distendito, summa namq,
spes in frictione sita est.

DE PARALYSI EX colico morbo contracta.

Colica quædam affectio nostra ætate in-
cerudit, quam (& præcipuè eos qui
euasuri erant) motionis exacta quædam
membrorum orbitas comitabatur, sensu ta-
ctus incolumni, ut uideatur, conseruato, tan-
quam iudicatorio aliquo transitu ex corporis
profunditate in extremas particulas facto.
Proinde citra medicamentorum subsidium
ultra plerisque motus postlimino reuersus
est: alios uero qui difficilioris curationis fue-
re etiam simpliciora ex præductis unguenta
perlanauere. Præcipua uero his inuenta sunt,
tum id quod è populo nigra, tā quod ex abiete
concinuatur acopon. Plures uerò medica-
menta quæ robur inserunt, & mediocriter re-
frigerant, magnificè iuuant.

DE CURATIONE Phthisis, seu ulcerum pulmonis.

Caput VIII.

Quemadmodum in nauis & tran-
quillitate. Nam si rectè habue-
rit ægrotans, in mari gestatio fieri
poterit: atque ibi uitam deget. Cum
ulceribus enim quiddam siccum
marina salfugo communicat: à ge-
statio quiete concessa utendum in
præsentia pingui oleo. Post frigidio-
nes oleum cum aceto infundatur,
paulum primo deinde adijciendum
utque ad heminas quinque aut sex,
aut multo plus etiam: sin minus, at
saltem quantum quis ferre poterit.
Multoties enim uel id solum pro omni
alimento satis fecit. Lac uerò assumtu
suauis, potu facillimum, nutritu soli-
dū, & qualibet esca à pueritia familia-
rius est: præterea uisui colore delecta-
bile, medicamen arteriâ non asperans,
guttur lauigans, ad eijciendam pituitâ
facilem spiritum reddens, inferiorem
exitum lubricum efficiens, ulceribus
dulce



dulce subsidium, & quolibet alio benignius. Si quis multum lactis potat, nullo alio eget alimento. In morbo enim bonum medicamen est lac, ejusdem & alimentum efficitur. Nam hominum lacte uescentium nationes frumentum non edunt. Optima uerò est cum lacte & puls, & bellaria & alica lota, & quæcunque edulia ex lacte fiunt. Quod si & alia esca indigeat, ejusdem generis esto. Ptisanae cremor concoctu facilis, tenuis materiae est. Eatenus uerò condiendus erit, quatenus absorptu facillimus sit. Siquid etiam saporis jucunditatem afferens capiat; & illud medicamentum esto: qualis est ligustici coma, pulegium, menta, salis exiguum, acetum aut mel. Si uentriculus non concoquit, hujusmodi exhibenda sunt. At si nihil uentriculo tale exhibere necesse sit; omnibus ptisana praestantior est. Licet & ptisanam in alicam permutare: minus enim flatuosa, & concoctu facilior est, si quemadmodum & ptisana externa deglubitur. In humidioribus rejectionibus faba ulcera purgat, sed flatibus redundat. Item pisum & ochrus, qui & quanto pauciores flatibus citant, tanto minus ulcera purgant. Itaque medicus conjecturis ductus, prout praesentia postulant, his uti debet. Istorum quoque condimenta sunt, quotquot de ptisana memorata sunt. At qua ex igne quidem aquea calida, sed ex animalibus nuper edita optima sunt, priusquam eam.

γλυκύ, κὶ ἄλλα παντὸς διμυμέερον. ἢν μὲν ὦν πρὸ πολλὸν ἔδε πίνη, κὶ μί-
 ης τροφῆς ἄλλης χρέος. ἀγαθὸν γὰρ
 ἐν νεώτῳ ἐνὶ φάρμακον γάλα τω-
 τὸν γίγνεσθαι, κὶ τροφῆν. κὶ γὰρ ἀνδρῶ-
 πων τῶν γαλακτοφάγων τὰ ἔθνηα,
 σίτην ἐκ ἔδει. ἀριστον δὲ ξυὸ γάλακτι
 κὶ πολτοῖ, κὶ ἰσρία κὶ χροῖνοι πλυτοῖ,
 κὶ ὀκόσα ἔδεσθαι ἐν γάλακτι (γίγ-
 νεῖ). καὶ τροφῆς ἢν ἐτέρης δέη, ἔσω ὀ-
 μοίη, πλισάνης ὀχυλός, εὐπεπίθη,
 λιτή. χεῖρ δὲ τοσόνδε ἡδυνῶθαι, ὀκόσον
 ῥυμφάνεσθαι ἐσὶ ρήϊση. ἢν δὲ τῶν ἐσὶ ἡδο-
 νῶν τὴν λαμβάνη, καὶ τὸδε ἔσω φάρ-
 μακον, λιγυστικὸν κόμω, γλήχωνα,
 ἡδύοσμον, ἀλῶν βραχὺ, ὄξος ἢ μέ-
 λι. ἢν μὲν σόμαχθαι ἀπεπλήη, τὸδε
 παρέχειν. ἢν δὲ μηδὲν ὄδε πωροσα-
 ναγκάζη, πάντων ἐστὶ πλισάνη κρέσ-
 σων. ἔξεστι δὲ τῶν πλισάνων ἐς χόν-
 θρον ἀλλάξαι. ἀφυσότερος γὰρ καὶ
 εὐπεπιότερος, ἢν κὶ ὡς πλισάνη μιγ-
 ματώδης ἐπιπίθω. ἐν τῆσι ὑγρολέρησι
 ἀναγωγῆσι κύαμος καθαίρη ἔλ-
 κέα, ἀλλ' ἐστὶ φυσώδης. πισὸς καὶ
 ὠχρος ὀκόσον ἀφυσότερα τοσόνδε
 ἐλκείων ἀκαθαρτέτερα. ξυυτεκμαι-
 ρόμυρον ὦν πρὸς τὰ παρῆοντα. τοῖς δὲ
 χεῖρα. ὄψα δὲ αὐτέων, ἄσα καὶ ἐπὶ
 πλισάνη λέλκε. ὡὰ δὲ ἐκ πυρὸς μὲν
 ὑδρέα θερμά. ἀριστον δὲ ἐκ ζῶων δε-
 τίτοκα, πρὶν τῶν *

CVRATIO PVRV
 lentorum,

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΜΠΥΙ-

κῶν.

Caput IX.

Κεφάλ. θ.

X. Π. Αίγ.



Π. Αιγ. βιβ. γ. κεφ. λ β. Δεῖ πίνω
 αεῶν μὲν τῆ πέψει ἔμπυήματος συνεργεῖν.
 Διὰ τε ἀόγγων πυριῶντας. καὶ καταπλάσσον-
 τας δι' ἀλδύρων κριθῆς σὺν ἰσάσιν ἐφθαῖς, καὶ
 ῥιπίνῃ ὀλίγη, καὶ πείσεων κόρα, καὶ νίτρο καὶ
 ἑβίσκω. στυεργῆ δὲ τῆ ρήξει καὶ ἢ πλὴ τὸ ἀπαθές
 πλάστρον κατακλις. καταρροφείτωσαν ἢ ἐκ
 διασημάτων μελικράτον, καὶ χυλὸν πρισάνης
 μετὰ μελιτος. οἷδε ὑπὸνέτροι πινέτωσαν καὶ
 ἀπόζεμα ὑσώπε καὶ θυμὸς μετὰ μελιτῶ.
 στυεργῆ δὲ πρὸς τὴν ῥήξιν καὶ ταριχαφαγία,
 καὶ τῆς διὰ κολοκινθίδῶ. ἱεράς καταπίπια
 πρὸς κούτην λαμβανόμενα. δεξάμενος δὲ ἐκ-
 κρέινεται ἔπειτα αὐθις δίδοναι τὸ ἀπόζεμα τῶ
 ὑσώπε, καὶ ἱερωσὶ καὶ γλυκυρίζης ἐψηθέντων
 ἐν μελικράτῳ ἢ τὴν γλυκυρίζαν λειωθῆσαν
 μετὰ σησάμω. καὶ καταπλάσσειν γύρει ἐν με-
 λικράτῳ καὶ ἐλαίῳ ἐψηθείῃ. θυσανακαθάρατε
 δὲ τῆς ἐλκώσεως οὐσης, πῖς στυεπίς χρῆσθαι.
 οἷον ἐστὶ τὸ τε διὰ πρῶσις ἀπλῆν καὶ στυεπην.
 καὶ τὸ δι' ὀρόβων. τὸ δὲ δωδεκαθεόν καὶ τὸ φι-
 λοξέως πρῶσι γορευόμενον. πῖς δὲ εἰς φθισιν
 μεταπίσσει. διδὲ κεφαλωτὰ πρῶσα στυε-
 πηκότα πῖς ἀπὸ χόνδρου ἢ πρισάνης ροφήμασιν,
 ἢ ὅλη δὲ καὶ ἐαυτὰ δὲ ἐψημένα δροπῶν.
 τὸ δὲ πνομόρον ὑδωρ ὀμβρονέσῳ, καὶ μελί-
 κροτον ἐξ αὐτῶ. καταπλάσσειν δὲ κατ'
 δεξάστων ἀέσεων πῖς διὰ λινοσπέρμη καὶ
 γύρεως δι' ἀφειψήματῶ τήλεως, ἢ μαλα-
 χῆς, ἐλαίῳ τε καὶ μελιτῶ. καὶ φύλων ἀλθαίας.
 χρῶν δὲ τὸ δαλφινύθωτος. ἢ πῖς κηρωτῆς
 μεταβατέον, πῖς διὰ βετύρη καὶ κυπρίνη καὶ
 δαφνίη ἐῖρωσ. καὶ τήνασῶς δὲ χρῆσθαι
 ἐμπαλάσφω. ρευματιζομένη δὲ τῶ θωρακί τῆς
 διὰ ἰπῶν ἴππιδεῖον. πρῶσι πῖς ἐν αὐτῶ, πῖ
 ἐμπροσθεν ἴππιδεῖον τῶν ἐμπύων ἀπὸ ἀλεγεμῶνα.
 καὶ πῖ τῶν στυεπῶν. τῆς δὲ βηχὸς χαλεπῶς
 ἴππιδεῖσης, θυμὸν ἐ ὑσώπε μετὰ χυλῶ
 γλυκυρίζης, μελιπ ἀπέφθω ἀναλαβῶν, καὶ
 πλάσσειν, ὑπὸ τῆ γλώτῃ δίδεκακράτειον δε-
 μόσει δὲ αὐ αὐτῶ, καὶ ἢ μίθελάτῳ ἐκ διφ-
 λειμάτων ἀντίδοτῶ, καὶ ἢ διὰ ἐχυρίων.
 ἀρῖον δὲ τῶ τῶς βόθημα, καὶ ἢ ἀρμενία βῶ-
 λῶ πνομόρη καὶ ἢ ἐσδρα ἀντίδοτῶ, ἐδὲν
 ἢ ἴον τῶν εἰρημῶν.

δύο

P. Eg. lib. 3. c. 32. Ante omnia, puris
 collecti maturatio promouenda est spongi-
 arum fotu, cataplasmatibus ex farinis hordea-
 ceis cum caricis discoctis & resina exigua &
 stercore columbarum, nitroque & hibisco.
 Adjuuat autem rupturam, in larus sanum
 decubitus. Sorbeat præterea ex tempo-
 ris interuallo, mulla & cremor ptisanæ ad-
 mixto melle, sed quibus plus roboris
 inest, jus hyssopi & thymi melle adiecto bi-
 bant. Promouet etiam rupturam uomicae
 salsamentorum esus & catapotia hieræ ex co-
 locynthide sub somnum, in cubilis ingressu
 sumta. Vbi pusexpectorari cæperit, hyssopi
 denuò & iridis atque glycyrrhizæ decocto-
 rum in mulla potionem repete. Vel glycyrrhi-
 zam cum sesamo tritam exhibe: aut polli-
 nem in mulla & oleo percoctum cataplasma-
 tis modo inducito. Cum autem huius ex-
 purgationi per superna renititur, ad compo-
 sitorum usum deueniendum est: uerbi causa,
 medicamenti quod ex marrubio constat tum
 simplicis tum compositi. Et ejus quod ex
 eruis constat & quod ab ingredientium nu-
 mero Græcè dodecatheon dicitur. Item
 quæ ab autore Philoxeni nomenclaturam
 sortita est, confectionis. Porro qui in tabem
 eecidunt, his porra capitata in chondri acpti-
 sanæ forbitionibus liquefacta, dato. Iam ue-
 rò & hæc per se bis decocta exhibenda sunt.
 Potus sit aqua pluuia, & aqua mulla ex illa
 parata. Ab initio uerò remissionum, cata-
 plasmata exhibeantur ex lini semine ac polli-
 ne, cum decocto fœnigræci aut maleæ, oleo-
 que ac melle & folijs althææ. Tempore ue-
 rò progressu, ad cerata transeundum est, ex
 butyro, & cyprino, & laurino & inde. Sed et
 Mnasæ emplastro utendum est. Thorace
 uerò fluxionibus infestato, emplastrum ex sa-
 licibus imponendum est. Præbiant etiam
 antea relata ad suppuratos simplicia & qua-
 dam ex compositis. Cæterum tussi grauior
 obtinente, thymum & hyssopum cum gly-
 cyrrhizæ succo melle cocto excipe & effor-
 mata sub lingua tenenda præbe. Conuenit
 ipsis etiam Mithridatis antidotus ex inter-
 uallis & quæ ex uiperis paratur. Optimum
 uerò his auxilium est Armenij boli potus,
 & antidotus Esdra, non minus quàm
 prædicta.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣ
 ΤΩ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΥΣΑΣΙΩΝ.
 Κεφάλ. ι.

CURATIO PVLMO-
 nis abscessuum,
 Caput X.



P. *Æg.* lib. 3. c. 30. Peripneumonia in flammatio pulmonis est plerumque ex defluxionibus fortibus, aut anginis, aut anhelationibus, aut pleuritide, aut alijs morbis oboriens: quandoque uero ipsa per se affectionem auspicatur. Sequitur hos spiritandi difficultas, febris acuta & ardens, grauitas & tensio pectoris, impetus & perceptio multæ repletionis circa faciem, materia sursum uersus impetum faciente instar ignis. Rubicundæ igitur ipsis apparent malæ, & oculi tument, & cutis supercilij incumbens deorsum nutat, & corniformis tunica subpinguis apparet: si uero signa ad maiorem ardorem inclinant, inflammationem facti ignis naturam habere in pulmone putandum est. In ijs igitur qui ex transmutatione aliorum morborum ad hunc deueniunt, uenæ sectionem reprobare oportet, & præsertim, si diuturni fuerint, aut etiam ab initio uenam secuerint. Verum in remissionibus insulam per clysterem in alium mittatur, quæ ægri subducipoteest. Et cucurbitæ affigantur: ad pectus & ad latera, si nihil prohibeat, atque hæc multa cum scarificatione. At si statim ab initio peripneumoniæ affectio auspicetur, permittentibus numeris ad hoc requisitis, uena secetur: sin minus, etiam ijs saltem cucurbitæ affigantur, ita ut pro uiribus sanguinis euacuationem faciamus. Sorbitiones autem accipiant ex pituitæ aut alicæ succo cum melle, aut ex amygdalis amaris, cum similagine aut alica, ex jucundis potionibus aliqua admixta, hydromelo, aut fauorum cremore cocto, aut hydrososato. Commodum est & butyrum recens: trium cochleariorum mensura. Præbiant autem ficuum cum hyssopo decoctum, aut iridis coctæ in aqua mulsæ, aut iridis tritæ cochleariorum duorum mensuram inspersam aquæ mulsæ, hoc etiam deorsum purgat. Verum ad uirium conseruationem frequentius potentiaquam mulsam per se & cum nucleis nucis pineæ & cucumeris semine. Verum ad torum thoracem ac costas laterum imponere oportet ceratum cyprinum, iridem inspersam habens: aut ceratum ex oleo rutaceo & iride sicca: aut id quod ex cera, resina, medulla, butyro, cælyro, iride sicca, & unguento nardino præparatur.

Π. *Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. λ.* Ἡ πνευμονία, φλεγμονή ἔστί πνέμονός ἐστιν ἡ πλῆθὺ μὲν ἴσθι κατάρροις ἰσχυροῖς, ἢ σιωάχαις, ἢ ἀσθμασιν, ἢ πλῆθεισι, ἢ ἑτέροις γινόμενῃ νοσήμασιν. ἐστὶ δὲ ὅτε καὶ αὐτὴ κατὰρχεται ἔπιθας. παρέπειται δὲ ταῖσι δυνάσιν πυρετὸς ὄξυς πῆ καυσώδης ἐστὶν. τὴν καὶ τῶν ἑσθῆβες ῥωγμὸς, ἡ πολλῆς τῆς ἴσθι το πρῶσσωπὸν πληρώσεως ἀντίληψις ἀνάσσωπὸν πικρῶδης πλῆθὸς ἡμῶν τῆς ὑλῆς δίκλυ πυρός. ἐρυθρὰ γοῦν αὐτοῖσι τὰ μῆλα φαίνονται καὶ τὰ ὄμματα διασθῆκε μετὰ ἔπι κατὰ νεύειν τὰ ἴσθι σκύνια, καὶ οἱ κεραταειδεῖς ἴσθι σκύνια φαίνονται. τῶν δὲ σημείων ἴσθι τὸ καυσώδεστρον ἀσθκινόντων, ἐρυσσιπλατώδῃ πλῆθὸν φλεγμονῶν τῆ πνέμονος. ἴσθι πλῆθὸν ἐν τῶν ἐκ μεταπλάσεως ἑτέρων νοσημάτων εἰς τὸ πρῶτον γινόμενῶν, πλῆθὸν φλεβοτομίαν παρατητήον, καὶ μάστιγα, εἰ χρονοῖσιντες εἶεν, ἢ ἔπι φθασσάντες ἐν δόχῃ φλεβοτομηθῆναι. κλυτέον δὲ πλῆθὸν κελίαν ἐν πῆσι ἐν δόσσει. δυσποβίβασσάντων, ἢ σκυασέον μηδένος κωλύοντῶ κατὰ ἔπι σθῆβες καὶ τῶν πλῆθων, δόμεγεθεσι καὶ πολλαῖσι σκύνιασ μετ' ἐγχαράξεως. εἰ δὲ τὸ τῆς πνευμονίας δόθος ἐξ ἀρχῆς ἴσθι ἔσθι ξατο πῆθῶ. ἴσθι πρῶτον μὲν τῶν εἰς τὸ πρῶτον δόθῆτων, φλεβοτομητέον. εἰ δὲ μῆ, σκυασέον γοῦν καὶ τῆσ, πρῶσ πλῆθὸν δυνάμιν πικρῶδης πλῆθὸν ἄματῶ κένωσιν. ῥοφήματα δὲ λαμβανέτωσιν ἀπὸ χυλῆ πρῶσπῆσ. χόνδρα μετὰ μέλιτῶ. ἢ ἀπὸ πικρῶν ἀμυγδαλῶν μετὰ σκύνιασ ἢ χόνδρα, τῶν ἡσθῆων πνός πρῶσπῆσ μινυμῶν πμάτων, ὑδρομήλε, ἢ ἀπὸ μέλιτος, ἢ ὑδροσοσῆσ. ἀγαθὸν δὲ καὶ πρῶσφατον ἐσθι τυρον ὄσον κοχλιάριον γ. πρῶσπῆσ δὲ αὐτῆσ σκύνια μετ' ὑσώπῆσ ἀφειψήματα ἢ ἴσθι εἰσθῆσ ἐπὶ μελικράτῶ. ἢ ἴσθι εἰσθῆσ ὄσον β. κοχλιαριῶν ἐμπασσῶν μελικράτῶ ἔπι καὶ κατὰ καθαίρει. πρῶσ ἢ φυλακῆν τῆσ δυνάμειωσ, σκύνια πρῶσ πρῶσπῆσ τῶ μελικράτῶ κατὰ μόνιασ, καὶ μετὰ πνυτῶδων. ἔσθι σκύνιασ ἴσθι πλῆθῆσ δὲ κατὰ ὄλα ἔπι θῶσρακος ἔπι τῶν πλῆθων. καὶ κυπρίνην κηρωτῶν, ἐχασσῶν ἴσθι εἰσθῆσ ἐμπασσῶ μῶδῆσ, ἢ κηρωτῆν ἀπὸ πηραῖνασ ἐλαῖασ καὶ ἴσθι εἰσθῆσ ἔσθι πρῶσπῆσ καὶ ῥητῆνασ, μυελὸν πῆ καὶ ἐσθι τυρῆσ καὶ ὑσώπῆσ, ἔσθι ἴσθι εἰσθῆσ καὶ ναρδῆνασ μύρα.

CVRATIO ASTH-
matis.

Caput XI.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘ-
ματος,

Κεφ. λ. ι. α.

X 2 Ο τῆσ



Ὅτις τῶν ἀσθματικῶν θεραπείας σκοπός ἐστὶ
 ἐκκαταρῆσαι τὴν γλίχρον καὶ παχυῶ χυμὸν διὰ
 τῶν λεπυλόντων τε καὶ ρυτίοντων Φαρμάκων.
 ἔξ' ὧ πίνω αὐτοῖς ἀρμόσει σκιλιτικόν. καὶ τ'
 διὰ τῆς σκευαζομένης ὀξυμέλι πινόμενον,
 αὐτὴ τε ἡ σκίλλα ὀπῆ, λεία μετὰ μέλιτι ὧ καὶ
 τῶν ἀντιδότην ἢ ἱερῶ. Ἐκθαλασσι συνεχῆς
 διὰ Φαρμάκων ἰσχυροτάτων. καὶ διὰ ῥαφα-
 νίδων ἔμετοι. δριζολοχία τε, σρογγύλη πενο-
 μύη. κενταυρία ἔμεγάλη ἢ ῥίζα, σπονδυλία.
 ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα. καλαμίνθη ὁ καρπὸς, ὕσσω-
 πον, ἴρις, μελαιθιον, ὄνων τῶν ὑπο τῆς ὑδρίας.
 ἔξ' ἑλῶ, βαλῶν εἰς ἀγγύ' κερραμεοῦ, φρύγε-
 ἔπ' ἀνθεράκων. λυκανθένης ἢ τριβε, ἔμελιτι
 ἐφθ' ἀναλαβῶν, διὰ μύσρον πρὸ τροφῆς ἔ-
 μετὰ τροφῆ. εἰ δὲ χρεία καππίοιο, καὶ φλέ-
 σα τέμνε πρὸ τῶν ἀπάντων, ἔμεν καὶ δύ-
 ναμιν. Ἐπιὺ κελίαν κλυσμῶς ἐρεθισίον. ἔξ' α-
 θεν διὰ τὴν θώρακα. καταπλαστέον ῥα διὰ σό-
 κων, καὶ ἱερῶ ἀλδύρα καὶ κελθία, ἔχον καὶ ῥη-
 νίω καὶ κηρὸν καὶ μέλι. ἐμπροσθέν δὲ αὐτῶ
 καὶ ἴρις καὶ μάννα. ἐν ἀζησος διὰ καὶ ἡ ὠμὴ λύσις
 μετὰ ῥητίνης καὶ κηρῶ καὶ ἴριος καὶ μάννης. ἀλεί-
 μασι δὲ χρῆστέον θερμότεροις, ἰερίω ἀνηθίω,
 πηρανίω. ἰδιαίτερον τῶν. κισθήρεως ῥα α.
 σφέκλης ἢ πρὸ τρυξ οἴνω Κ. μ. δ. δρσενίω
 μ. α. ροίω ἀθρα μ. ε. ἀλκυονίς μ. α. ἀ-
 φρονίτης μ. ε. καὶ ψας σίσας ἀναλαμβάνει τῶ
 ἀλείματι. καὶ ἐν τῶν ἀντιδότην τὰ πρὸ τὴν
 θώρακα καὶ μαλάγμασι δὲ χρῆστέον τοῖς ἐλκῶ
 τὰς ἰσχυροῦς δυναμῶσι.

ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΙΣ

πόμα.

Πολίς, ἀεροπίνω, κασορία, χαμαιπίτυ' ὧ,
 ἀμμωνιακῶ θυμιάματι ὧ, ἴσα μέλιτι φρε-
 σαις διδῶ. Ἄλλως. Ἐδοσάν πνίς, ἀφρονίτης καὶ χ-
 λιαρίον τρισὶ κυάθοις μελικράτη. Ἄλλο. Ἀφρο-
 νίτης L. β. πεπέρως L. α. σιλφίς L. δ. καχ-
 λιαρόν ὕδραπ. Ἄλλο. κασορία, ἀμμωνιακῶ
 θυμιάματι ὧ αἰά L. ε. πεπέρως κόκκοι μ.
 γλυκῆ ἀναλαμβάνει. καὶ διδῶ κυάμα ἴσον σὺν
 μελικράτῳ Ἄλλο. Συναπέως L. α. νίτης ἀφρο-
 νίτης ὄλον. ἐλατηρία δίχαλκον ὅ ἐστιν ἡμισό-
 λιον. πλάσας τὸ πᾶν εἰς τροχίσκω η. διδῶ ἢ ε.
 ἐφ' ἡμέρας δύο καθαίρονται γὰρ ἀνω αἰλύπως.
 Πρὸ τῶν πνιγμῶν διδῶ ἀφρονίτης L. γ.
 μετ' ὑδρομέλιτος κυάθων τριῶν, καὶ μετὰ καρ-
 δαμῶμα ἐνίοτε καὶ πρὸ τῆς ῥημά ἑσθη. ποτὶ δὲ
 καὶ ἰσχυροῦς.

Asthmaticorum curationis scopus est,
 consumere crassum ac viscosum humo-
 rem per attenuantia ac extergentia medica-
 menta. Acetum igitur ipsis conuenit scil-
 liticum, & acetum mulsam ex hoc paratum,
 potum : & ipsa scilla assata trita cum mel-
 le, & ex antidotis hiera, & purgatio assidua
 ex medicamentis fortissimis. Et uomitus
 ab acceptis raphanis & aristocholia rotun-
 da pota, centaury magni radix, spondilij se-
 men & radix, calamintha coma, hyssopum,
 iris, melanthium. Asellorum sub hydrijs de-
 gentium sextarium in fictile uas conijcto &
 ad prunas torreto : dealbato autem terito,
 & melle cocto exceptos, mystri mensura
 ante & post cibum dato : si uero necessitas
 urgeat, etiam uenam ante omnia haec seca-
 to & pro uiribus euacuato. Alius quo-
 que per clysterem infusis irritetur. Cata-
 plasma uero extrinsecus thoraci imponatur
 ex ficis & loliacea & ordeacea fatina cum re-
 sina, cera, melle adiectis. Inspargatur ipsi
 etiam iris & manna thuris. Non inutilis est
 & cruda ordeacea fatina cum resina, cera, iride,
 & manna. Unguentis autem utendum est
 calidioribus, irino, anethino, rutaceo : priua-
 tim uero hoc, pumicis partem unam, fecis
 uini uisae partes quatuor, arsenici partem
 unam, floris iunci rotundi odorati partes
 duas, alcyonij partem unam, aphronitri
 partes duas : tusa, cribrata unguento exci-
 pito, & ex hoc partes circa thoracem con-
 fricato. Sed & malagmatis utendum est
 quae serolos humores trahere possunt.

ANHELOSIS PO- tiones.

Polij abrotani, castorij, chamæpityos, am-
 moniaci thymi amatis, singulorum æqua-
 les portiones melle subactas daro. ALIA.
 Quidam aphronitri cochlearium unum in tri-
 bus aquæ mulsæ cyathis dederunt. ALIA.
 Aphronitri drachmas nouem, piperis drach-
 mam unam. Silphij drachmæ dimidium, dato
 cochlearium cum aqua calida. ALIA. Ca-
 storij, ammoniaci thymiamatis, singulorum
 drachmas sex, piperis grana quadraginta : ex-
 cipe passio & fabæ magnitudinem præbe cum
 aqua mulsæ. ALIA. Sinapis drachmam unam,
 spumæ nitri obolos tres, elaterij dichalcon
 hoc est, oboli dimidium. Totum hoc in
 pastillos octo digere, & duos ad dies, duos præ-
 be : purgant enim sursum citra molestiam.
 Verum in ijs qui suffocantur, aphronitri drach-
 mas tres cum aquæ mulsæ cyathis tribus præ-
 be, & aliquando cum cardamomo, & statim
 auxiliatur. Facit & ad coxendicum morbum.

CVRA-



Caput XII.

TRall. lib. 5. c. 4. Vir quidam calculum exquisitè figuratum expuit, non crassum humorem, & uiscosum sed reuera calculum, non asperum. Sed etiam ualde leuem, durum & renitentem, ut in terram quoque proiectus, sonum ederet. Hic uir longo tempore tussi uexatus, non potuit, ne ualde tussiret, liberari, quousque calculum expuisset. Utebar autem uictu temperato, humectante & potius refrigerante mediocriter: erat enim & curis deditus & habitu tenuis, ut hoc etiam rabidis ipse responderet. Et nisi his usus fuisset, puto illum similiter illis, qui tabe laborarunt, interiturum fuisse. Meminit etiam cuiusdam diuinissimus Galenus, qui non calculum, sed grandinibus similia expuerat: item aliorum quorundam, qui similia bili colore sputa reiecerant. Ac miror quomodo ipse nullo refrigerantium uti uoluerit, sed hæc quidem uitarit, calidam autem potius curandi rationem adhibuerit. Nam & Mithridatium ipsis offerebam, inquit, pariter & Athanasiam, & quæ adhuc magis siccate posse, theriacam, omniaque alia antidota ad suspiriosos inscripta, quæ acribus quibusdam & extenuantibus medicamentis constant. Atque ea se non solum in uno uito, sed etiam compluribus uidisse dicit. Nullus autem eorum quibus eiusmodi acciderunt, mortem effugere potuit, sed omnes cum pauld longiore tempore aut breuiore perdurassent, interierunt. Ac re ipsa uerum est hoc quod ille de Archigene prodidit: difficile enim est homo eum sit, non etiam in multis aberrare, qui nonnulla prorsus ignorauerit, nonnulla etiam negligentiùs conscripserit. Atque hæc dicere de tam sapiente uiro ausus non fuisset, nisi ueritas confidenti me esse animo incitasset, atque ego rursus impium esse silere censuissem. Nam medicus cum id, quod sibi uidetur arripit, & non explicat, ualde alios offendit & impietatem exercet, magnoque errori imprudens seipsum spontè implicat. Verum illud agendum est, quod (inquit) Aristoteles dixerit. Amicus quidem Plato, amica uero etiam ueritas: duobus autem propositis ueritas præferri debet.

Κεφάλ. ιβ.

ΤΡΑΛ. ΒΙΒ. Ε. ΚΕΦ. Δ. ἔπιυσι πῆς ἀνὴρ λίθον πῶ ἰδέαν ἀκρίβως, ἔχει παχυὴν χυμὸν καὶ γλίχρον, ἀλλ' ὄντως λίθον ἔτραχυν, ἀλλὰ καὶ πανυλεῖον, καὶ σκληρὸν καὶ ἀντίτυπον, ὡς καὶ κτύπον ποιεῖν ῥυτίβομόρον τῆ γῆ. οὗτος ὁ ἀνὴρ πλυθρόνον ὀχληθεὶς ὑπὸ τῆς βηχῆος, ἐκ ἠδυνήθη βήσας ἐν ἰσχυρῶς ἀπαλλοαγήναι, ἕως ὅτι τὸν λίθον ἀνέπιυσεν. ἐξέρωμιον δὲ καὶ διαίτη δεικρῆτω καὶ ὑγραίνεση καὶ μάλλον ψυχρῶς μετρέως. ἰὼ γὰρ καὶ φροντιστικὸς καὶ λεπτὸς πῶ ἐξιν ὡσεὶ καὶ εἰσκέναί αὐτὸν πῆς φθινώδεσι καὶ εἰ μὴ τῆτοις ἐξρησάμιον οἶμαι ὅτι αὐτὸ ἀπώλετο ὡς ἀπλησιας τῆς φθόγης νοσήσασιν. μέμνηται ἡ καὶ ὁ θεῖος τῆς γαληνὸς καὶ λίθον ἀναπίυσαν τὸς πνος, ἀλλὰ χαλαζῆσι ὡς ἀπλησια, καὶ ἄλλων πνῶν ἀναπίυσαντων εἰκότα χολῆ πῶ χροῖαν. καὶ θαυμάζω πῶς αὐτὸς ἔδεν τῶν ἐμφυχόντων ἠδυνήθη χροῖσας, ἀλλὰ ταῦτα μῶ ἐφυγεν. ἐξρησάτω ἡ μάλλον τῆ θερμαινέση ἀγωγῆ. πῶ πὲ γὰρ μισθιδάττον αὐτῆσι περιέχον, ἀσάυτως, φῆσι, καὶ πῶ ἀθανασίαν καὶ πῶ ἐπὶ μάλλον ξηραίνεῖν διωαρμένην θηριακῆν, καὶ πῶ τῆσι τῆς ἀλλοῦς ἀντιδοτῆσι τῆς πρὸς τῆς ἀσθματικῆς ἀναγεγραμμένης διὰ δριμύτων πνῶν καὶ λεπτινόντων συγκεκιδύσας, φαρμάκων. ἔμόνον δὲ τῆ ἐνὸς κιδρός, ἀλλὰ καὶ δὲ πλειόνων ἐωρακέναι αὐτὰ φησιν. εἰδὲς δὲ ἠδυνήθη τῶν πῶ τοιαῦτα παχόντων ἐκφυγῆν τὸν θάνατον, ἀλλὰ πάντας ἀπολέσασιν, ὀλίγω πλείονα, χροῖνον ἠ ἐλάττονα διακρῆσαι διωηθέντας. ἀλλ' ὄντως ἀληθῆς ἐστὶν ἐκείνο τὸ λεχθέν ὑπὸ αὐτοῦ περὶ ἀρχιγῆνης. χαλεπὸν γὰρ αὐθροπον ὄντα μὴ καὶ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, πῶ μῶ ὅλας ἀγνοήσαντα, πῶ δὲ ἔαμελεσέρως γραψάντα. καὶ ταῦτα ἡ λέγειν ἐκ αὐτῆ ἐτόλμησα περὶ τηλικῆτος ἀνδρὸς εἰς σοφίαν, εἰ μὴ τῆ. πῶ ἀληθῆς αὐτὸ θεῖον ἡσά με προεῖρεψάτο, καὶ τῶ σιωπῆσαι πάλιν εἰσεβῆς νομίσαντα. καταλαμβάνων γὰρ ἰατροῦ τῶ δοκῶ αὐτῶ, καὶ μὴ λέγων, ἀδικῆ πῶ μεγάλα, καὶ ἀσεβῆ, καὶ μεγάλῳ πῶ πῶσιματι περὶ ἀλλῶν ἐαυτὸν ἐκὼν λαμβάνει. ἀλλ' ἐκείνο δὲ πῶ ἀπῆεν, ὅπερ, φησιν, δρισοτέλης εἰρηκῆ φίλος ἔξ ὁ πλάτων, φίλη δὲ καὶ ἠ ἀλήθεια, δυοῖν δὲ περὶ κειμένων, περὶ κριτόν πῶ εἰλήθην.

σε

MB



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Κεφάλ. ιγ.

Caput XIII.

Π. Αιγ. βιβ. γ. κεφ. μς. πρὸς μὲν ἐν τῇ θερμῷ ἢ ἡπατὶ Ⓞ. δυσκρασίαν χρηστὸν τοῖς ἐμφυχασιν καὶ τὸν ἄσπιτον μετρίως τὸ σπλάγχνον οἷα περὶ ἐστὶν ἢ τὸ σίσις ἢ τὸ κίχουρον, πρὸς μὲν ἄμὸν ἐστὶν ἄμὸν. πρὸς δὲ ἢ φηρὸν σὺν κεραιῶν καὶ τὸ ἀφείρημα δὲ αὐτῶν πινόμενον ἢ ὁ χυλός. ἢ μένον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ξηρὸν ἢ πρὸς τὸν μελικράτη. πρὸς δὲ τὰς θερμὰς καὶ ψυχρὰς δυσκρασίας ἢ ἡπατὶ Ⓞ. ὠφελῆ. καὶ τὸ ἰντυβὸν δὲ καὶ τὸ τρώξιμον ἢ ὁ σόγχο Ⓞ. τῶν ὡραπαρῶν αἰσί. πρὸς δὲ ἢ κίτριον χυλὸν κύαθου ἢ μελικράτον ἢ πλείως ὁμοίως. εἰ δὲ ἢ σὺν ἐμφυχάσει μετρίως γένηται ἢ δυσκρασία, δι' οἶνον τῶν λεπτῶν πινὸς ἢ δι' ἔρητικῶν αὐτὰ δίδοναι, ἢ κατὰ πτόπον δὲ λαμβανόμενον κίχουρον L. δ. χαμακτύτος ῥίζης L. δ. ἢ μέλιτι ἢ φθῶ δίδει καὶ κίτριον μέγεθος, ἢ ὕδωρ ἢ πρὸς φάτω θερμὸν καὶ τὸ δι' ὅτις δὲ ἢ σπέρματⓄ ὕσκαμα πρὸς πτόπον αὐτῆς. ἢ αὐτὸν τὸν τῶ φιλῶν Ⓞ. ἀντίδοτον. ἢ φ' ἄν δὲ τὰ τῶν θερμῶν ἢ πρὸς τὸν ὡς ἔπι κάλιον αὐτῆς, ἢ μὲν γινώσκον δίδοναι πίνειν τροφῶν δὲ χυλὸν πρὸς σάνης, ἢ χόνδρον, σὺν ὑδροροσάτω λαμβανέτωσαν ἢ ἄρτον ὁμοίως ἐξ ὕδατος Ⓞ, μετὰ πρὸς τῶν ποιῶτων, ἢ δειῶν πομάτων. ἢ ἀλλῶς οἰπῶν τὰς ἐμφυχάσεις μετρίως, χωρὶς ἢ ἐμφυχάσειν τροφῶν λαμβανέτωσαν. οἶνον τὸ ὡραπαρῶν ἀπαχρῶν, πρὸς εἰ μὴ δι' ἔτεραν αἰτίαν, οἶνον ἀπὸ τῶν σομάχων, τῶν τε χρηζοιεν. ἢ τῶν λεπτῶν ἢ ὀλιγοφύων. πρὸς ὕδαρῶν δίδοναι. ἢ τὸ ἐν ἡπατὶ δὲ ἐρυσίπελος ὡραπαρῶν θερεπυτίον. ψυχρὰς δὲ τῆς δυσκρασίας ὑπερχύσης δὲ τῶν ἐναντίων ἰέναι. ἄρτον τε ἐν αὐτῆς σὺν οἶνω δίδοναι, ἢ τὴν δισφθον ἢ τριφθον κρῆμα. κασάνων τε γενέσθωσαν ἢ σφιδῶν ἢ ὄρνιθⓄ. κατὰ τὸ δρῶν ἢ οἶνον πνέτωσαν. πρὸς πτόπον δὲ αὐτῆς τὸ ἡπατόριον, ἢ τὸ ἄσπιτον ἢ τὸ δὲ πεπερεως. κακτῶν ἐμπερσθεν πρὸς κίχουρον τε καὶ δυσεντερικὸς ἀναγορεμῶν, ἢ πλεκτέον τὰ πρὸς φρα. αἰ δὲ κυφουαῖς καὶ κρῆμα, πρὸς μὲν τὰς θερμὰς δυσκρασίας, ἢ δὲ ὅπως ἀρμόζουσιν, πρὸς εἰ μὴ ὀλίγη τις ἢ θερμὴ σὺν ὑγρότητι πρὸς οἶνον γένηται. πρὸς δὲ τὰς ψυχρὰς ἄρτα βοηθήματα καὶ μάλλον εἰ σὺν ὑγρότητι, ἢ ἐμφυχάσει γὰ

P. Aegin. lib. 3. c. 46. Ad calidam hepatis intemperiem utendum est perfrigerantibus ac corroborantibus viscus moderatè, qualis est feris & cichorium, quandoque crudum comestum, quandoq; coctum cum coriandro. Decoctum item ipsius potum, & succus, & ipsum adeo siccum aquæ mullæ inspersum, & ad calidas & ad frigidas hepatis intemperies facit. Intybum autem troximam appellatum & sonchus ex consimilibus sunt. Facit & citrij succi cyathus ex aqua mulla & silicis succus similiter. Si uerò etiam cum moderata obturatione intemperies fiat, cum uino aliquo tenui & urinam ciente, illa dato. Catapotium uerò sumitur hoc: Cichorij drach. 4. radicis chamæ ptyos drach. quatuor. Excipe melle cocto & nucis Ponticæ magnitudine præbe, & aquam calidam insuper sorbeat, & ex opio ac hyoscyami semine facta ipsis præbibenda dentur, & ipsa Philonis antidotus. In quibus autem calor intenditur, etiam rosaceum optimum aut melinum ipsis bibendum dato, Cibum uerò ptisanæ succum, aut alicam cum hydrosafato accipiant, & panem similiter ex aqua cum aliqua eiusmodi jucunda potione. Et in summa, cibos moderatè perfrigerantes citra obturationem sumant: à uino in totum abstinentes, præterquam si ob aliam causam, uelut est stomachi debilitas, utantur, & tunc tenue quoddam, & parum aquæ ferens, aquosum ipsis detur. Sed & ignem sacrum in hepato similiter curare oportet. At uerò si frigida est intemperies, per contraria procedendum est. Panis igitur ipsis cum uino detur, & bis aut ter cocta brassica; castaneas item gustent, & uuas passas, & de gallinis quod factis est, & uinum bibant. Præbibendum uerò ipsis detur eupatorium, aut asarum & medicamentum ex pipere, & ex descriptis antea ad cæliacos & dysentericos commoda deligantur, at confectiones cyphiformes appellatæ, ad calidas quidem intemperaturas omnino non conueniunt, nisi modicus quidam calor cum largiore humiditate fiat: uerum ad frigidam optima sunt auxilia, & magis si cum humiditate aut obturatione hepatis fiant, si uerò à crassis & uiscosis humo-



humoribus obturatio fiat, myacantha & maximè ipsius fructus detur & radicis lauri cortex, & eupatorium ex aceto mulso, aut lupinorum amarorum decocto cum ruta & pipere. Facit & farina lupinorum pota & radicis capparidis partes duæ, colti pars una cum uino, & medicamentum ex cacano, ad crasforum & uiscosorum humorum obturationes: itis item & pistaciorum fructus ac cortex, & marrubium & amygdalæ amaræ, & pastillus ex ipsis, dracontij quoque, ac ariradix, & agaricum & acetum scilliticum & acetum mulsum. Hepar autem lupi siccum trigram cochlearij mensura datum, omnibus hepatis affectionibus conducit, cum uino dulci: quin & Theodoretus antidotus optimum est medicamentum & in obturationibus hepatis, & in scirrhis induratis & in diuturnis inflammationibus, in colicis item ac morbo regio: similiter & picra ex aceto mulso Cibi porro his dandi sunt calidiores & ab obturatione liberantes, uelut est portum ex aceto mulso, & palustris asparagus, & capparidis similiter. Sed & reliqua obsonia cum aliquo ex calefacientibus ac aperienti uim habentibus condimentis cocta. Et uinum sit tenuè & uetus, ita ut crassi succi omnia uitemus, & balnea assidua, & maximè post cibum. Diuturna uerò euadente affectio- ne, etiam uenæ sectionem ac purgationem allumemus, si nihil prohibeat. Inflam- mato uerò hepate citra dilationem uena secetur de cubito dextro, & multus sanguis detra- hatur, uiribus sufficientibus. Forinfecus autem cataplasma imponatur uisceri, ex farina ordeacea, fœnugræco, semine lini cum palmulis, aut malis cotoneis, & flore meliloti & absinthio & chamæmelino. In uniuersum ita ut mollitorijs astringentia admisceantur. Epithemata uerò sint, Nili, & odora- tum, & Philagrianum, & Apollopphanis & ex melilotis, & tusile, copton appellatum. Ad maximas autem inflammationes ualde multæ experientiæ hoc est: comæ absinthii, nardi celticæ, asari, croci, singulorū uncia una: iridis, myrrhæ, styracis, bdellij, amoniaci thymiamatis, singulorum sextans: medullæ uitulinæ triens,

νοίτο ἔηπατ. ἰσπὸ δὲ παχέων καὶ γλιχρῶν χυμῶν τῆς ἐμφράξεως γενόμενης τῶν τε μυά- κανθαν ἑτάλιαι τὸν αὐτῆς διδόναι καρπὸν, καὶ δίαφνης τῆς ρίζης τὸν φλοιὸν. τὸ, τε δι- πατόριον δὲ ὄξυμέλιτ. ἢ ἀφειψήματ. θέρμων πικρῶν μετὰ πηλῶν ἢ πεπέρεως. ἢ τὸ αἰθέρων δὲ τῶν θέρμων πνύδρον. ἢ καπ- πάρεως ρίζης μ. ἑ. κρ. μ. α. μετὰ οἶνε καὶ τὸ Διά βακάνε πρὸς τὰς ἰσπὸ παχέων ἢ γλιχρῶν χυμῶν ἐμφράξεις. ἢ τε ἴρις, ἢ ὁ τῶν πιτακίων καρπὸς, ἑ τὸ λέπ. πρᾶσιον τε ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ ἢ ὁ δὲ αὐτῶν τροχίσκ. δρακοντίς ἑ ἀρ. ἢ ρίζα ἑ τὸ ἀγαρικόν, ἢ τὸ σκυλληπικόν ὄξ. τε καὶ ὄξυμέλι. ἢ παρ δὲ λυ- κκ ξηρὸν λειωθέν ἢ διδοῦδρον, ὅσον κοχλιαρείς πρὸς ἀπίσις τῆς ἔηπατ. ἀρμόζει διαθέ- σει μετὰ γλυκέως οἶνε ἢ ἡ θεοδωρητος ἢ ἀ- πιδντ, τῶν θέρμων ἐστὶ φαρμάκων, ὅππῃ τε τῶν τῆ ἔηπατος ἐμφράξεων ἢ τῶν σκίρρων καὶ χρονίων φλεγμονῶν. ὅππῃ τε κωλικῶν, καὶ μετρι- κῶν ὁμοίως δὲ καὶ ἡ δὲ ὄξυμέλιτος πικρὰ. τρο- φᾶς δὲ τῆς τῆς, θερμοπέρας τε καὶ ἐκφρακτικᾶς δοτόν, οἶον πρᾶσι δὲ ὄξυμέλιτος, ἢ τὸν ἔλειον ἀπαράχρον ἑ κάππαρεν ὁμοίως. καὶ τὰ λοιπὰ δὲ ὅσα Διά πν. τῶν θερμαινόντων τε καὶ ἐκφρακτικῶν ἀρτυμάτων ἐψόμνα καὶ οἶνον λεπὸν καὶ παλαιόν. φυλατιομῶν τὰ παχύχυμα, καὶ βαλανεῖα, σιωεχῆ, καὶ μάλισται μετὰ τροφῶν. χρονίζοντ. δὲ τῆ πάθος καὶ φλεβοτομίαν καὶ καθαροὺν πα- ραληπῆον, μηδενὸς κωλύοντ. φλεγ- μῶνοντ. δὲ τῆ ἔηπατ. φλεβοτομητικῶν ἀντιπεθέτως ἀπ' ἀγκῶν τῆ δριξίς καὶ συχρὸν. ἀφαιρετικῶν τῆς διωάμεως ἐξαρκέ- σης. ἑ ἔξωθεν τε καταπλαστον τὸ ἀπλάγχο- νον ἀλεύρω κελθίνω ἑ πήλεως ἢ λινοσπέρ- μω μετὰ φοινίκων, ἢ μήλων κυδωνίων ἢ μελιλώτων ἀνθους ἑ ἀψινθίας ἢ χαμομηλίνης, ἢ καθόλου τοῖς μαλακτικῶς ὀπτικ- τέον, ἢ τὰ σύφοντα. ὅππῃθεματα δὲ. τὸ, τε νειλέως ἔσω ἑ τὸ εὐώδες, τὸ, τε φιλαργια- νόν, ἢ τὸ ἀπολλοφάνους. τὸ, τε Διά μελιλώ- των, ἢ τὸ κρηπὸν. πρὸς δὲ τὰς μεγίστας φλεγμονὰς, πάνυ Διά πολλῆς πείρας ἐστὶ τῆτο. ἀψινθίς κόμης, νάρδις κελπηῆς, ἀσίρης, κρόκας, ἀνά Γο. α. ἴριως, σμύρνης, σύρακ, ἑδελίς, ἀρμονιαῖ θυμιαματος αἰά Γο. ἑ. μυελῶ μοχίς Γο. δ. κρηωτῆς



κηρωτής χυμίνης λι.δ. ὄξυμελί τε δοτίον αὐπίσ.
 ἀπλάπε βουθήματα, οἷον ἄσαρον, νάρδον,
 κελπκην, ἢ ἰνδικίω, ροῖνον, πετροσέλινον.
 καὶ δεῖ ἐρεθίζεῖν τὴν γαστέρα διὰ τῆς ἀκαλύ-
 φης ἢ λινοζώσεως, ἐδοιμομένων ἐφθῶν. κατὰ
 δὲ τὰς ὠδυσμας καὶ ὀπιθύμας καὶ πολυποδὶς δι-
 δόναι ἐν μελικράτῳ καὶ διὰ κλυστήρος δεκενοῦν
 τὴν κοιλίαν, ἐν δόχῃ ἢ μὲν διὰ μελικράτος σὺ
 αἰλὸν ἢ νίτρον. ὠδυσμας δὲ γενομένης μίγνυε
 ὕσσωπον ἢ ὀρίανον, ἢ κνίκον, ἢ κενταύριον καὶ
 κλοκωθίδα καὶ καθόλα τὰ μύρσμά τ' ἥπατος.
 διὰ τῆς κοιλίας. τὰ δ' ἕκαστα, δι' ἕρων ἐκκαθαί-
 ρει. τροφήν δ' ἐπί τῆς χυμῆς πτωσάνης δοτίον, ἐν
 ἢ σελινον καθήψηται. τῆς δὲ φλεγμονῆς ἐρυσ-
 πελατώδους γενομένης, τὴν θεραπείαν ἐμ-
 προσθεν εἰρήκαμν. ἀποσάσεως δ' γενομένης,
 στυεργητίον τῆ σὺρρήξει κατακαταπίπτει μὲν
 τῷ τριπύρρω μετὰ ῥητίνης, μανίνης, πύσης,
 αἰθαιας ρίζων, ἀειστερῆς κέρας, στυράδων
 αἰγῶν. ἀποσπίζοντα δὲ ἀφέψημα πολὺ κα-
 πτῆς ἐν τῆς κριθαῖς, ἀποτριτωθεν. ἀφέψη-
 μα θλάσσεως, ἢ κίχως, καὶ χαμαίθρους ρίζης
 πνέτω. σὺρρήξεως δὲ γενομένης μελικράτῳ τε
 καὶ τὰ ὀπιθῶν ἐλκωθέντων νεφρῶν εἰρημύα.
 ἔξωθεν δ' τὸν μασαίει τὰ λοιπὰ μαλακτικά.
 καὶ ἰκτίον ὀπιθῶν ἢ τὸν διὰ ἰπῶν. Σκίρρω-
 θέντος δὲ τ' ἥπατος ὀλίγη μὲν ἢ τῆς ἰάσεως ἐλ-
 πης εἰς ὕδρον μεταπιπίσεως τῆς διὰ θέσεως.
 ὅμως δὲ τοῖς μαλακτικοῖς ὀπιθῶν. ἀμμω-
 νιακὸν, ἐδέλιον, μυελός τε καὶ σέατα, καὶ τὰ
 τέτοις ὁμοδωμάμα. πτόζιν δ' τὰ ἐκφράσσον-
 τα καὶ διὰ ῥύπτοντα τὸ ἀλάγχθον, οἷα πῆρ
 εἰσιν τὰ τε διαρηπτικά, καὶ λίθων θρύπτικα. καὶ
 μετὰ τ' ὀπίως πρὸς τὴν ἥπατος ἐμφρα-
 ξιν εἰρημύων. καὶ τῆς τροφῆς δηλονότι καταλ-
 λήλως ἀρμοδείσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑ- ΤΟΣ.

Κεφάλ. ιγ.

Ἡπατὲς ἔλκος ἔοι ὀλέθριον. ἢ χα-
 λεπωτάτη δ' ἐστὶν γαστέρα ξύρροια
 τ' ἴσως, μὲν τὸν σόμαχον ἴχει ὀδὸν ἐς
 τὴν ἀνω φορὴν. τροφήν γὰρ αἰτῆ τ' ἴσιν.
 τροφῆς δὲ ἠγεμὼν ὁ σόμαχος.
 ποτὶ καὶ τὰ φάρμακα ὀδε τοῖσι εἴσω
 διαφέρει.

cerati lentiscini lib. 4. Dandum etiam ipsi
 acetum mulsum & simplicia auxilia, uelut
 est asarum, nardus celtica aut indica, juncus
 rotundus odoratus, petroselinum. Et uen-
 trem irritare oportet per urticam & mer-
 curialem, cocta in cibo accepta : in declina-
 tionibus etiam epithimum ac polypodium
 dentur in aqua mulla : per clysterem quo-
 que aluus euacuetur, in principio ex aqua
 mulla infusa cum sale aut nitro : uerum de-
 clinatione contingente misce hyssopum aut
 origanum, aut Cnicum aut centaurium &
 colocynthidem : & in summa, sima hepatis
 partes per uentrem, gibbae per urinas, ex-
 purgantur. Cibus uero his detur pitifanae
 succus, in quo apium coctum est. Quod si
 inflammatio speciem sacri ignis praeferat,
 curationem ante diximus. Si uero abscessus
 fiat, ruptionem ejus adjuuabimus cataplasma-
 te ex tripermo, cum resina, manna thuris,
 pice, althaeae radicibus, fimo columbino, ster-
 core caprino. Praebendum uero detur de-
 coctum polij, fumariae circa sepes nascentis
 ad tertias redactum : item & thlaspis de-
 coctum, aut cichorij, & radicis chamædyos.
 Ruptione autem facta aqua mulla & quae ad
 ulceratos renes relata sunt. Forissecus
 emplastrum Mnaeae & reliqua mollitoria,
 & icesium imponatur, aut quod ex salicibus
 constat. At si in scyrrhum induratum est he-
 par, modica curationis spes est, ad aquam inter-
 cutem affectione translabente, attamen ad
 mollitoria admiscenda sunt ammoniacum,
 bdellium, medullae & adipis, & quae his pa-
 rem uim habent. Bibenda uero dentur quae
 ab obturatione liberant, & extergunt
 ipsum uiscus, uelut est piper : urinam ci-
 entia & calculos atterentia cum ijs quae paulo
 ante ad hepatis obturationem relata sunt : ci-
 borum quoque esu conuenienter exhibito.

CURATIO IECORIS ulcerum & effusionis puris.

* Carens principio & fine.

Caput XIII.

IN jecore ulcus perniciosum insit. Pe-
 riculosisissimum autem est qui in uen-
 trem fit, saniei confluxus; si stomachum
 occupet, qui uiam superiora petenti-
 bus praebet. Alimentum enim uitae
 causa est : ipsius uero alimenti dux
 est stomachus. Insuper medicamenta
 intimis corporis partibus stomachu
 distri



distribuit. Quapropter si ad quælibet deutoranda malè se habeat; celerius agrum morbo atque fame consumi necesse est. Hæ sunt cuiusque loci, quo se pus conuersurum est, inter se differentes notæ. Nam si per intestina delabatur; tormina uexant, aluus liquida est, pituita & bilis fertur. Deinde eruentum uirus circumfluens, aut humiditas aquæ similis, in qua crudæ carnes dermersæ lotæque fuerint. Si pus in uesicam defluit, grauitas in renibus lumbisq; sentitur. Ac primò lotium multum & bile infusum, postea turbulentum, nullam subsidentiam continens, quam Græci ὑπόστασιν dicunt, inconstansque decurret, ad extremum uerò & sedit men album apparebit. Sin ad stomachum sursum uersus pus rapitur; tunc orietur nausea, odium cibi, uomitus pituitæ, aut bilis, defectus animæ, uertigo usque eò donec pus erumpet. Præcipuum sanè fuerit in aliam partem auertere. Praua enim hæc uia est. Quod si pus uiolentius feratur, omnia facienda sunt, stomachoq; succurrendum, escis, medicamentis, uictusque ratione, sed omnia leniter adhibenda. Medicamentis quidem ut sinus effringatur, studendum est. Herbam itaque hyssopum cum mulsâ potui dato, & marrubij comam ipsam quoque cum mulsâ & succo absinthij. Hæc utique quo humores extenuentur, & uia lubricæ reddantur, & purulenta corpora facile rumpan- tur; ante cibos bibere expedit. Dandū tot & asininū lac lene, nō generans bilē, bene nutriens, in caseū non spissescens: quæ lactis uirtus est. Adhæc ægrotanti gratificandum in cibo & pōtione, quos etsi paulo deteriores iuuatibus sunt, nihilominus tamen concedito. Nam stomachus nauream mouēti & contristanti humori transitus erit. Siquidem nonnullos puris exitus offendit. Cauendum est etiam ne jejuni sint: cumque aliquid cibi capiunt, id purum sincerumque sit. Opus est etiam & in cæteris effluuijs

διαφέρει. ἢ ὡν πρὸς ἀπαντὰ μὲν ὀκ-
νη καὶ πόσιος ἔλθη. θάσσον ἐν θα-
νεῖν ἀνάγκη νόσῳ τὲ καὶ λιμῶ. γνώ-
ματα δὲ ἐκάστου χώρου, ὅπῃ τὸ πύον
πρὸς ψεῖ ἕτερα καὶ ἕτερα, ἢ τε δι' ἐν-
τέρων ἢ κη, σφοφοί, γαστρὸς ὑγρῆ,
φλέγματα καὶ χολή, ἔπειτα ξὺν πε-
ριρροῇ αἰμαλώψ, ἢ ἀσπιτύσιος ὀ-
κοῖν κρεῶν ὠμῶν. ἢ ἔς κύστιν ἢ ἐν βάρ-
ρος ἐν νεφροῖσι καὶ ὀσφύϊ. τὰ μὲν ὡν
πρῶτα πολλὰ καὶ χολοβάψια. ἔπει-
τα θολερὰ, ἀνυπόστατα καὶ ἀκατάστα-
τα. ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ ἡ ὑπόστασις λευκὴ
παρεῖν. ἢ δὲ ἐς σόμαχον ἀνωρέτη,
ναυτή, ἀποσιτή, ἐμετι φλέγματος,
ἢ χολῆς λειποθυμῖα, σκοροδινὴ μέσ-
φι ξυρραγῆ. μάλιστα μὲν ὡν ἀποτρέ-
πειν τὴν ὀπονηρῆ γὰρ ἡ ὁδός. ἢ δὲ τὸ
πύον βιαιότερον εὐρη, χρὴ πάντα
ποιεῖν, καὶ τῷ σόμαχῳ δρῆγειν, καὶ
τροφήσι καὶ φάρμακοῖσι, καὶ διαίταις,
πάντα μελέχως φαρμάκοις ἐς τὴν
ἐκόλπε ραγῆν. βόταν τὴν τὴν ὑσώπε
ξυῶ μελικρήτῳ πιπίσκειν, καὶ πρῶσις
τὸ κόμης, καὶ τὸ ξυῶ μελικρήτῳ καὶ
χυλῶ τὸ ἀψίνθε. τὰ ἢ μὲν τὴν ἀσπὶ τῶ
σιπῶν πίνειν χρεῶν, ὡς λεπία μὲν τὰ ὑ-
γρά γίγνη), εὐροα ἢ τὰ χωρία, εὐ-
ρηκα ἢ τὰ ἐμπυα σώματα. διδόναι καὶ
ὄνα γάλα λαῖον, ἀχολον, εὐτροφοῦ
ἐς τυρόν ἀσύστατον. ἢ ἐπὲρ ἐστὶ γάλακτος
δρῆν. προσπίθει ἢ καὶ χάριτας πόμα-
τος καὶ σίτῃ. κῆν μικρῶ χείρω τῶ ὀφε-
λεόντων ἔωσι διδόναι. ἔσαι γὰρ διέξο-
δος ναυπῶδει ὑγρῶ. μάλιστα εὐερεσ γὰρ *
ἢ ἔπος διόδος βλάβαι, μὴ πωπ καὶ
ἀποσιτοῖ ἔσον). κῆν πλάβωσι εὐηγέ-
ες. καὶ ἢ καὶ ἐπὶ τῆς ἀλλοσι ἐκροῆσι,
παντίλω



ἰσχυρὴν μελέτην ἔσομάχου ποιεῖται
 ὅθεν γὰρ ἡ παύτων φαρμάκων ὁδὸς.
 μεμνηθεὶς δὲ καὶ ἔπιπασσῶν, ἐν-
 θατῶν ἐλκῶν ἐστὶ ἡρίζα. καὶ ἔστι κυσ-
 τιν ὁρμῶν οὐρητικοῖσι δὲ ἀγειν ἀσάρα
 ἔριζης, καὶ φε, καὶ ἀδιάντα καὶ μεία τῶν
 ἐμπότων. καὶ δευτέρω ξυμὲν μελικρή-
 τω πίπασκειν. ποικίλον μὲν τὸ ἐπιπασ-
 σῶν φάρμακον καὶ τὸ διὰ τῶν φουσαλί-
 δων ἀεῖσον. ἢ δ' ὁκόσα διαπέρις τῆ-
 σι ἐπαινεῖται. καὶ ἔστι δὲ ἐντέρων ἀγῆς τὸ
 ἀγωγὸν ἔχεις γάλα, μάλισα μὲν
 ὄνη. καὶ δὲ καὶ αἰγός, ἢ μήλων. χυλοὶ
 ἔστι ὀλιωθροὶ καὶ σμηγματῶδες, ὅπως
 πλισάνης, ὄψα, πέπερι, ζιγγίβερι,
 λιγυστικόν. ἀθρόον δὲ εἰρηθεῖς ἀμφὶ
 πάσης διαίτης, ἐπιπάση συρρήξῃ, τρε-
 φαί μὲν εὐχυμοί, εὐσόμαχοι, εὐπε-
 πτοί, ἢ χυλοὶ ἢ διὰ γάλακτος πόλ-
 ται, ἀμυλοὶ, ἰτεία ξυμὲν γάλακτι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΛΗ-
 νός.

Κεφάλ. ιδ.


Σκίρρος ἔστι ἐπὶ σπλῆνι λύσος ἐπι-
 σαι. καὶ δὲ καὶ ἀπότοκοι τῶν ἐνεύσοι
 γένον, ὕδρωψ, ἢ καχεξίη, ὁκέλη τὸ
 κακὸν ἐς ἀνήκεσον τὸν ἰητρον τὸν σκίρ-
 ρον. ἢ ἄλλοι καὶ ὡν ἀποτέπειν γιγνομέ-
 νος, ἔστι λύειν ἀρπὶ δρχομύρας. ἐνί-
 σταθεὶς δὲ τῆσι φλεγμονῆσι καὶ περὶ οἱ
 σκίρροι διάδοχον ἐς διαπνοὴν ἀγῶν-
 ται τὴν ἀπόστασιν. καὶ δὲ γὰρ φλεγμα-
 σίς ἰητροῖσι ἔστι καὶ ἔστι. ὁκόσα μοι ἐν
 τῆσι ὀξείησι λέλεκται. καὶ ἔστι πάντα σοι
 πρῆσόντι ἐν φλεγμασὶ ὁ σκίρρος
 ἐμμένη καὶ πυρὶ κέλοισι καὶ ἐς

diligentissimam stomachi curam sus-
 cipere, quandoquidem ipse omni-
 bus medicamentis iter præbet. Me-
 minisse quoque jecoris oportet, ubi
 ulcerum radix est. Porro si pus in
 vesicam impetum facit, urinam ci-
 tantibus eliciatur: ut puta asari ra-
 dice, phu, adianto, & meo potabili-
 bus, hæc enim ex muisa potui danda
 sunt. Bistini utique varium medi-
 camentum, & quod ex vesicario so-
 lano conficitur, & quotquot experi-
 mento aliquibus probantur: optima
 sunt. Verum enimvero si per intesti-
 na educere malis, tibi lac educatorium
 esto, præcipue quidem asinæ, id si non
 adsit capræ, aut ovis, succi autem lu-
 brici & abstergentes præbeantur, qua-
 lis est ordeaceus, obsenia sunt piper,
 zingiber, ligusticum, utque semel de
 omni vietus ratione absoluam, in qua-
 libet puris eruptione alimenta sint
 boni succi, stomacho utilia, conco-
 ctionem facile admittentia: ea uero
 sint aut cremores aut ex lacte pultes,
 & cibi ex amylo & bellaria cum lacte.

C V R A T I O L I E-
 nis.

Caput XIV.

Scirrhii in liene geniti discussiones
 non facillimæ est. Quod si & ab
 hoc oriundi morbi proveniant ut po-
 teaqua Intercus, aut malus habitus,
 insanabile malum effectum est. Hac
 ratione uero scirrhii medicus opem
 ferre debet: orientes auertere & nu-
 per incipientes discutere oportet:
 inflammationibus autem resisten-
 dum. Siquidem scirrhii inflamma-
 tionibus ad difflationem tendentibus
 ueluti hæreditario jure succedunt,
 hæc enim inflammationis germina
 sunt. Porro ijs remedijs utendum est,
 quæ à me in sermone de acutis mor-
 bis relata fuerunt. Si tibi omnia fa-
 cienti in inflammatione scirrhus im-
 maneat, igni quoque similibus ad
 mollien-



moliendam duriciem utitor, irrigationibus ex aceto, oleo & melle. Sed lanæ uice panni lintei complicati accipiantur. Sic unguentariæ glandis pulvis cribratus inspergendus est, & cataplasmatibus quam mollissimis *

CVRATIO SPLENIS.

P. Aegin. lib. 3. c. 49. Inflammatione præsentē, uena de sinistro cubito secetur, aut circa summam manum, eo quod ex longiore distantia reuultio fiat, aut etiam ob naturalem quandam cognationem. Deinde imponantur cataplasmata attenuantia citra manifestam caliditatem, ita ut etiam nunc aliqua astringentia admisceamus. Talis autem est ex sua natura salis flos appellatus. Est & hoc cataplasma admirandum. Fœni græci trientem, farina ordaceæ, nasturcij, singulorum unciarum unam, ficuum pinguium libram unam, herba uerbenacæ siccæ unciam unam, ficus aceto acertimo macerare oportet & cum alijs prius contulis coquere & postea rursus coquere : aut stercus caprinum cum cryda ordeacea farina, in posca coctum imponito, habeat autem si uoles etiam salis florem. Vbi uero prius Cyprino cum aceto in odico foueris, utere malagmatis primum simplicioribus quale est hoc : ceræ sesquilibram, adipis taurini libram unam, nitri quadrantem, terebinthinæ, feminis uiticis, corticis radices capparis, singulorum quincunem, costis que liquari possunt, sicca inspergito. Sed et Nili malagma optimum est. Si uero inflammatio in scirrhom delabatur, fortioribus utendum est, ut etiam cutem lancinanti quale est quod ex hercore caprino paratur, & citrinum & Machætionis & Tonsoris & quod ex lauri baccis constat & quod ex salicibus. Hoc uero ipse etiam cum successu expertus sum : auri pigmenti sextantem, sandarachæ sextantem, ceræ, terebinthinæ, singulorum libram unam, picis siccæ libram unam, galbani unciam unam, oropanax unciam unam, corticis radices capparis, myrobalam, singulorum trientem, ammoniaci thuyri aithariæ sexuncem, nardini aut cypriini, quadrantem. Sed & ammoniacum cum aceto illicum spleni sæpe profuit. Itemque rotam scrupulorum, trium aut quatuor pondere, cum castorij scrupulo uno in balnei solio, ubi caritas præmanducarunt &

μάλθαξιν τ' σπιρρίνης, λέγξοσι δι' ὄξέος, κ' ἐλαίας κ' μελιτος, ἀντὶ τ' εἰρίων, πύγματ' ἔσω δ' ἀπὸ λίνου, ἐμπάσων ὄσπερ τ' μυρσβαλάνου σεοσπυρρίνης, ἑπιπλάσμασι τε τῖσι μαλθακωτάτοις *

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΛΗΝΟΣ.

Π. Aig. C. B. γ. κεφ. μθ. φλεγμονῆς πάσης φλεβοπηθῆσαν αὐτὸν ἀπ' ἀγκῶν ὅθεν εἰσερεθῆ κατὰ τὴν ἄκρην χεῖρα, διὰ τ' ἐκ μακροτέρου διαστήματος γινέσθαι τὴν αἰτίαν. ἢ ἔτι ἀπὸ φυσικῆ συγγένειαν. εὐτα καταπλάσσειν ἀπὸ τῶν λεπτιωόντων, αὐτὸν ἔτι σαφέως θερμαίνειν. τὸ δὲ καταπλάσσειν πινὰ καὶ τὴν τῶν σφύροντων. τοῖσδε ἐστὶν ἀποφύως, τὸ καλκιδρόν ἀλὸς αὐθός. ἐστὶ δὲ καὶ ἔτι θουμάσον τὸ καταπλάσμα. τηλέως Γο. δι. κρηθίνης, καρδάμυς ἀνά Γο. α. σίκων λιπαρῶν λι. α. σπείρεων ὅπως ξηρῆς Γο. α. τὰ σικα δὲ εἰς τὸ σπῆρον ὅξει δριμυτάτω κ' εἴψιν μετὰ τῶν ἄλλων ἡδύη. περικομυθῶν κάπειται αὐτῆς εἴψιν ἢ γοῖν κ' ἔπειρον αἰγίαν μετὰ ἀμῆνης λύσεως εἴψιος ἐν ὄξυκράτῳ, καταπλάσσει. ἐχέτω δὲ εἰς βάλει, ἔτι ἀλὸς αὐθός. περικομυθῶντα δὲ τὰ κηρύσι μετ' ὀλίγου ὄξους κηρύσι τῆς μάλθαξιν. πρῶτον ἢ τῆς ἀπλῶστεροις, ὁποῖον ἐστὶ τὸ κηρῆ λι. α. δ. πύρις λι. α. τῖς Γο. γ. τerebinθίνης, ἀγνε ἀπὸ πλάσσειν. καππαρέως ρίζης φλοῖα ἀνά Γο. ε. εἴψιος τὰ σπῆρον ἐμπάσων τὰ ξηρὰ καὶ τὸ σπῆρον δὲ, καλκιδρόν. τῆς δὲ φλεγμονῆς ἑπὶ τὸ σπῆρον δὲ μετὰ πλάσσειν, τῆς ἰσχυροτέρου κηρῆς τὸν ὄξυ κ' τὴν ἑπιφάνειαν ἀμυδαρῶν ἴσον ἐστὶ. τὸ δὲ τῶν σπυρρίων τῶν αἰγίαν ἔτι κηρῆς, ἑπὶ τῆς δὲ τῶν μαχαμῶν, κ' τὸ ξηρῆς, κ' τὸ διὰ δαφνίδιον κ' τὸ διὰ ἰτιάων ἔτι δὲ κ' ἀντὶς πειρασῶν ἐπέτυχον. δεσενίης Γο. β. σπυρρίων Γο. β. κηρῶν τerebinθίνης λι. α. πιδίης ξηρῆς λι. α. χαλκιδρόνης Γο. α. ὄππανάκος Γο. α. καππαρέως ρίζης, φλοῖα, μυρσβαλάνου ἀνά Γο. δ. ἀμμωνιακῆ θυμαμάτης Γο. ε. ναρδίης ἢ κυπρίνης Γο. ε. κ' τὸ ἀμμωνιακὸν ὁμοῦς ἐπὶ τῆς ξηρῆς κατὰ πλάσσειν, πλάκας ὄνησιν κ' πινόμενον ὅσον Γο. γ. ἢ δ' ὁμοῦς ἀκασκῆς ἐν τῇ ἐμβάσει τῆς ἀπλῶς, ἀπὸ τῶν σπυρρίων αὐτῶν ἰσχυρὰ κ' ὄξυ κ'.



ὀποπιουσάνταν, ἢ ἀμμωνιακῆ μ. α. κασορέα
 ρῆ. α. δίδε L. α. ταῦτα κ' ὄν' σκίρρωθέντας
 ὀνίησεν. ἴσπερ κ' ὁ τῆς καππαρέως Φλοιὸς ὄξυ
 λειωθεὶς, κ' καταπλασθεὶς. ὅς ἐστι κ' πινόμενος,
 δι' ὄξυς ἢ ὄξυμέλιτ' ὄν', κενὸν παχεῖς κ' γλί-
 χρες χυλῆς, εἰδ' ὅτι ἐστὶ κ' αἷμα. κ' ὁ τῆς ἰπ-
 εας Φλοιὸς ὁμοίως καταχρῆεται. κ' ἡ πύρεα
 τῶν χαλκείων καταπλασσομένη σὺ ὀμῆ
 λύσει δι' ὄξυμέλιτ' ὄν'. κ' ὅτ' κενταυρία χυ-
 λὸς ἔξωθεν ὀπιτιβέμερ' ὄν'. κ' πινόμενος κ' θέρ-
 μων πικρῶν τ' ἀφείψημα μετὰ πηγάνη κ' πε-
 πύρεως, πινόμενον. κ' τ' ἄλδρον αὐτῶν κατα-
 πλασσομένη. κ' ὕδωρ ἐν ᾧ πλάκας ἐναπε-
 θέσθη σίδηρ' ὄν', πυρέψασθαι καθ' ἑαυτὸ δι' ὀ-
 μέρον K. γ. ἀπυρετῆς δε μετ' οἴνου κ' μετ'
 ὄξυς K. α. ἢ λαπαθῆ ἀγρία ρίζης μετὰ σκίλ-
 λης, πριώβολον. ἢ χαμαίδρον ὄν'. ἢ ἐρπύλλης,
 ὄξυβαφον πάντα, ἢ ὄξυμέλιτ' ὄν', ἀναγαλλίδος
 τῆς τρυκανὸν αἰθ' ὄν'. ἐχέσσης χυλῆς, διώβολον,
 πόπιζε μετ' ὄξυκράτης. ἢ ὄξ' ὄν' σκίλλη πικρῶν, ἢ
 ὄξυμέλι. σὺθετα δὲ ταῦτα. πάντα κ' ρίζης.
 ἀμμωνιακῆ θυμιάματ' ὄν', καππαρέως ρίζης
 Φλοιὸς, σρεπίης, σκίλλης ὀπῆς ὄν'. ἴσα δὲ L.
 α. πικρῆ κ' ἀοσμαπικρῆς, κ' ὕδροπικρῆς.
 Ἄλλο. μυρίκης καρπῆ L. δ. πύρεως L. δ.
 ναρδοσάχου L. β. ἀμμωνιακῆ θυμιάματ' ὄν'.
 L. β. λεία ὄξυ σκίλλη πικρῆ κ' σίδηρ' L. α. ὄξυμέ-
 λιτ'.

expuerunt. Aut ammoniaci partem unam,
 castorij partem unam : dato drachmam unam.
 Hæc etiam in scirrhum induratis pro-
 sunt, quemadmodum etiam capparidis cortex
 aceto tritus ac impositus, qui etiam bibitur
 cum aceto, aut aceto mulso, & crassos &
 viscosos humores euacuat : quandoque uero
 etiam sanguinem. Salicis quoque cortex
 similiter illinitur. Facit & cinis ex officina
 fabrili, cum cruda ordeacea farina impositus
 ex aceto mulso. Et centaurij succus forin-
 secus impositus & potus. Et lupinorum
 amarorum decoctum, cum ruta & pipere
 potum & farina ipsorum procataplasmate
 imposita & aqua, in qua sæpe ferrum extin-
 ctum est, febrientibus per se data cyathorum
 trium mensura : non febrientibus, cum
 uini & aceti cyatho uno. Aut rumicis syl-
 uestris radicis cum scilla obolos tres, aut cha-
 mædryos aut serpylli acetabulum, omnia
 cum aceto, aut aceto mulso : aut anagallidis
 caruleum florem habentis succi obolos du-
 os cum posca bibendos dato. Aut acetum
 scilliticum, aut acetum mulsum. Composita
 uerò hæc : radicis panacis, ammoniaci, thymi
 amaris, corticis radicis capparidis, herbæ la-
 nariæ, scillæ affatæ internæ partis, singulorum
 æquas partes permisce, & præbe drachmā unā
 facit & ad anhelosos ac hydropicos. Aliud. My-
 ricæ fructus drach. quatuor, pipēris drach. qua-
 tuor, spicæ nardi drach. duas, ammoniaci thymi
 amaris drach. duas : utere cum aceto scillitico
 & præbe drachmam unam ex aceto mulso.

ΠΡΟΣ ΕΣΚΙΡΡΟ-
ΜΕΡΟΝ ΑΣΠΛΙΩΑ.

Κυκλάμινος L. κ. βρυωνίας L. γ. δικτάμνος L. β.
 σκίλλης ὀπῆς L. η. σρεπίης L. σ. καππαρέως
 ρίζης L. δ. δίδε τρεχισκόον, περιβολιαῖον ὄξυμέ-
 λιτ' ὄν' ἢ ἐρίκης ἢ τρεχισκος, ἐπιήδειος ἐστὶ
 τρεοφαί δε τῆς τοῦ λεπτιωπικ' θριμεία ξηρακῆ
 πικρῆ ὀλίγισον. γυμνάσια κ' τριψίς ὄν' συνα-
 πσομοὶ τ' ὄξυ λαμβανέσθωσαν. εἰδ' ὅτι δε ὄξυ-
 κύαι μετ' ἐν χαρῆξωσ' ὄν'.

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΚΤΕΡ-
ΤΕΡΟΣ.

Π. Αἰγ. β. γ. κεφ. ν. Τῆς μὲν ἐν θερ-
 μῆς δυσκρασίας ὄν' ἡπάτ' ὄν' κ' τῆς φλεγμονῆς
 αὐτῆς, κ' τῆς τῶν διωάμεων ἀδενείας πύρεα
 ραπίαν, ἔμπεσοθεν ἐν τῷ πύρεῳ αὐτῆς λόγῳ
 διήλθομερ'. ἢ ὄξυ ἀσπλάκτως ἐν ταῦτα με-
 πνευκτόν, ἵνα μὴ ταυτολογώμερ'. Ἐμπι-
 φραγματῶν δὲ τῶν πόρων τῆς χοληδόχου κύστεος

AD INDURATVM
SPLENEM.

Cyclamini drach. uiginti, bryoniz drach. tres.
 dictamni drach. duas, scillæ affatæ drach-
 mas octo, herbæ lanariæ drachmas sex, ra-
 dicis capparidis drach. sex : dato de his pastillum
 tritum obolorum cum aceto mulso. Quin
 & ex erica pastillus commodus est. Cibi
 horum sint attenuantes, acres, sicci, & pat-
 tissimus potus. Exercitia item ac frictions
 & sinapismi assumantur : quandoque etiam
 cucurbitæ cum scarificatione.

CURATIO MORBI

P. Ag. lib. 3. c. 50. Calidæ epatis intem-
 periel & inflammationis ipsius & faculta-
 tum debilitatis curationem antea intracta-
 tionē de ipso recensuimus, quæ etiam cetera
 permutationem huc transferenda est, ut
 ne eadem sæpe dicamus. Obturatis au-
 tem uescicæ bilem suscipientis meentibus
 utrisque



utrisque aut altero solo, uena secetur in cubito dextero. Quidam uerò & in his & in illis qui ob inflammationem hepatis morbum regium contraxerunt, uenam propè paruum digitorum dextræ manus secant. Cataplasmatibus autem inflammationem arcen- tibus utendum est, & ipsi per hieram purgan- di sunt. Commodi sunt etiam clysteres. Præbendum uero detur morbo regio af- fectis apij, aut adianti, aut rumicis aut serpyll- i ad tertias decoctorum decoctum : aut ab- sinthium potui inspergatur. Summè uerò faciunt succi raphani cyathi duo cum uini cyatho uno poti, itemque succi cichorij cyathi duo aut tres, per se, aut cum uino. Ve- rum ob hepatis inflammationem ictericis uinum multum bibendum præbe aut deco- ctum aristolochiæ tenuis, aut hyperici, aut adianti, aut herbæ lanariæ, aut rubiæ tinctorum : aut ramenti cornu ceruini drachmam unam cum uino : aut pastinacæ in uino ad tertias coctæ decoctum, aut sulphuris uiui drach. unam in ouis forbeant. Hæc etiam ob obturationem ictericis magnificè profunt, feminis autem atriplicis scrupuli octo, cum Chrysatrico, aut alio passo in balnei folio poti, sufficientem euacuationem faciunt. Re- ctè etiam picra datur & arida, & ex aceto mulso constans, & Theodoretus antidotus & ex amaris amygdalis pastillus. Dato etiam Cinamomi quantum tribus digitis præhendi potest in uini mulsi cyatho uno, aut aqua temperata, aut myrrhæ magnitudinem fabæ, cum piperis granis quinque, parique cina- momo. Qui uerò ob calidam solidorum corporum intemperiem icterici sunt, simpli- cibus frictionibus, & exercitijs moderatis & unctiōe & balneis utantur, & humectan- te & moderatè frigefaciente uictu, ptisanæ succo, intybis, feride, cichorij, piscibusque, ac uino tenui aquoso. Cæterum de ijs qui ex ueneni potu, aut obuenum eiaculanti- um morsum, ad hanc affectionem deuen- runt, libro quinto dicetur. Porro bile circa oculos & faciem recepta, clarerij erui magni- tudinem cum lacte muliebri infilla in nasum in balneo, & statim in folium dimitte, ac præci- pe ne caput mergat, & post balneum rectori- o misit dato, rursus in nares infunde in sole. Facit & cyclamini succus & marrubij & melan- thij : sed & acetum acerrimum naribus attra- hat dum sedet in folio, & parumper nares com- primat & mirificè euacuabitur.

ἀμφοτέρων, ἢ καὶ πατέρα μόνον, φλεβοτομηθῶν αὐτὰς ἀπ' ἀγκῶνος δεξιᾶς. τίνες δὲ ἐ τῶν καὶ τῶν διὰ φλεγμονῶν ἔπατος ἰκτερικῶν, τὴν ἐγγύς ἑμικρῆ δακτύλου τῆς δεξιᾶς χεῖρος τίμ- νουσι φλέβα καταπάσματος ἢ, πῆς ἀφλεγ- μαίτις χρηστῶν, καὶ διὰ τῆς ἱεράς αὐτὰς καθαρ- πῶν. ὅππῃ δειοῖ ἢ, ἔοι κλυστῆρες. ποσποστῶν ἢ τὰς ἰκτερικὰς, σελίνας, ἢ ἀδιάντας, ἢ λαπάθας ἢ ἐρπύλλας, ἀποτριτωθέντων ἀφέψημα. ἢ ἀψίν- θιον ἐμπασσεῖσθαι ποτῶ. ἀκρωσῶν ποτιεῖσθαι φάινε χυλῶ Κ. β. μετ' οἴνου Κ. α. ποτιεῖσθαι καὶ χ. κ. κ. κ. κ. κ. ἢ γ. καὶ ἰδιαν καὶ μετ' οἴνου ἑστῶ ἢ ὅππῃ φλεγμονῆ ἔπατος ἰκτερικῶν, πῶτις ἐοῖ- νο μέλιτι, ἢ ἀφέψηματι δρισολοχίας λεπῆς, ἢ ὑπερλικῆς, ἢ ἀδιάντας ἢ σραθίας, ἢ ἐρυθροδάνου ὁμοίως, ἢ κέρστος ἐλαφίς ρινήματος L. α. μετὰ οἴνου, ἢ σαφυλίνου ἐν οἴνω ἐψηθέντος εἰς ἀποτρι- τῶσιν, τὸ ἀφέψημα, ἢ θείας ἀπύρα L. α. ἐν οἴσις ροφήτωσιν. πάντα ἑστῶ ὅππῃ ἐμφραξῆς μερῶ- λως ἀφελῆ. ἢ ἰσώματος τῆς ἀτραφάξους Γο. η. μετὰ χρυσοπίκου ἢ ἄλλου γλυκέως ἐν τῇ ἐμβάσει πνοῦμα, κένωσιν ἰκανῶν ἐργάζεται. καλῶς δ' αὖ ἢ πικρὰ δοθεῖν ἢ τε ξηρὰ καὶ ἢ δὲ ὄξυμέλιτος καὶ ἢ θεοδώρητος. καὶ ὁ διατῶν πικρῶν ἀμυγδάλων τροχίσκος. διδῶ καὶ κινναμώμου ὅσον πῆς τρεῖσιν δακτύλοις ἄραι ἐν οἴνω μέλιτι Κ. α. ἢ ὕδατι κεκραμῆν, ἢ σμύρνης κυάμου μέγιστον μετὰ πεπύρεως κόκκων ε. ἴσον τε κιν- ναμώμου. ἑστῶ ἢ διὰ θερμῶν δυσπρασίαν τῶν στερεῶν ἰκτεριουῦτας, ἀπαλαῖς τρεῖψασιν, καὶ γυμνασίαις συμμέτροις, καὶ αἰλοφῆ καὶ λετροῖς. ἀκτίον, καὶ τῇ ὑπερμενῶσῃ τε, καὶ μετρίως ἐμψυχῶ- σῃ τροφῆ καὶ πῆσιονης, καὶ ἰντύβων, καὶ σέρως, καὶ τῶν κικωρίων, ἰχθύων τε, καὶ οἴνου λεπῆς ὕδα- ρῆς. πῶτι δὲ ὅππῃ δηλητηρίαι ποσασιν ἢ ὅππῃ ἰη- ξεσιν ἰοσόλων εἰς τὸ πῆσθαι ἐλθόντων κατὰ τὸ πέμπτον εἰρήσεται βιβλίον. ἐν ἀπειλημῶν δὲ χολῆς πῶτι ἑστῶ ὀφθαλμῶν καὶ τὸ πῶσσωπον ἐ- λατηρίαι ὀροβιῶν μέγιστος μετὰ γάλακτος γυναικείας ἐνσαξε τῇ ρινή ἐν βαλακείῳ καὶ ὀθείως καθεῖν εἰς τὴν ἐμβασιν, κελύων μὴ καταδύων τὴν κεφαλῶν, καὶ μετὰ τὸ λετρον ἀναληπτικῶς διαμήσας αὐθις ἐγγχει τὸ ἔρρινον ἐν ἡλίῳ. πῶτι ἢ καὶ κυκλαμίνου χυλὸς ἑστῶσις, καὶ μελαν- θίας, καὶ ἑστῶ δὲ ὀρμύματα ἀνελκῆτω τῆς ρι- σῆς ἰσῶσθαι ἐν τῇ ἐμβάσει, ἑκαστέτω καὶ ἑστῶ μυκτῶρας εἰς ὀλέγας ἑστῶμασῶς κενω- θήσεται.

CVRATIO CA
chexiæ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΧΕ-
ξίης.

Υ ΚΙΦ.



Caput XIII.

Π. αἰγ. βιβ. γ. κεφ. μζ. τῶν δὲ χλω-
 τῶν ὑδροπικῶν παθῶν καχεξίαν καλεῖν εἰσ-
 μιθα θεωρεῖται δὲ αὐτῶν χρεῖ. φλεβοπο-
 μῶτας, εἰ μὴ πικρῶσι, μεμελομένως ἀρε-
 τήτης ἔπιπύτης ἡμέρας ποιῶντας τῶν ἀ-
 φαιρέσιν. κενώτιον δὲ μάλιστα εἶναι δι' Ἰππρά-
 σιν αἰμορροϊδῶν ἢ κατμινίε καθάρσεως εἰς τὸ
 πάθος ἐμπέσοντας, ὡστερ οὐ εἶναι διὰ πλῆθους
 κενώσεως, ἀφεκτίον τῆς φλεβοπομίας. πάντως
 ἢ καθαρπύον τῆ ἀφ' κολοκινθίδος ἰερά. ἢ ἢ δι-
 αμπε εἰς ὡλεπὴ ἔξηραίνεσθαι. ἔξησις αὐ-
 φυῶν ὑδάτων ὡραλαμθανείδω, συπληρω-
 δῶν, ἢ νιτροδῶν μάλλον, εἶτα θειωδῶν. τὸ ἢ ἄλ-
 λολατρῶν, ἔκ μακροτέρων διαστημάτων πα-
 ραλαμθανείτων. ἢ γυμναζέσθωσιν παντ-
 θαπῶς. μάλιστα ἢ δια τῶν καλουμένων ἰατρα-
 λείπιων. εἰς ὑπερον ἢ ἔλλεβορζέσθωσιν, θαυ-
 μασιῶς ἢ οἰνήσιν αὐτῶν, ἢ ὡροπισμὸς ἀ-
 ψινθίε, ἔκ πιαβισμοῖ, ἢ δρωπακίε. εἰ ἢ τὸ πα-
 θος εἰς ὑδρωπα μεταπέσει τῆ τῶν ὑδροπικῶν
 ὑπαζέσθω θεωρεῖται, ἢ τὸν ἐκπιθησόμενον
 τρέπον.

γαλ. βιβ. ιγ. θερ. μεθ. κεφ. ε. πῶς ἐν χρεῖ
 σε εἶ παντὸς σώματος Ἰππμελεῖσθ μοχθηρῶς
 Διακειμένη. λέλεκται μὲν οὐ ἐπ' ἰλίγα, ἔξ δια-
 τῶν ἐμπεσῶν ἐρητιῶν, καὶ τῶ πει πλῆθους
 χρεῖματι, ἔνυ δ' εἰρήσεται πὶ κεφάλαια
 τῶν λόγων, ὅταν μὲν γὰρ ὁμοτίμως ἀλλήλοις ἀ-
 ξηθῶσιν οἱ χυμοί. πλῆθος εἶ τὸ ἢ πλῆθῶσαν ἰνο-
 μάζωσιν. ὅταν δ' ἤδη ξανθῆς χολῆς ἢ μελαίνης
 ἢ φλέγματος ἢ τῶν ὀρρωδῶν ὑγρῶν μετὸν γέ-
 νηται τὸ σῶμα, κακοχυμίαν ἢ πλῆθῶσαν κα-
 λῶσι τῶν τριαύτων διαθεσιν. ἢ μὲν εἶ πλῆθῶσαν,
 δια πτῆς εἰσ αἵματος ἀφαιρέσεως θεωρεῖται
 τῆ, ἢ δια λατρῶν πλεονῶν ἢ γυμνασίων καὶ
 τρέψωσιν, εἶπε δὲ φαρμάκων διαφορέων καὶ
 πῶς τῆσι ἀπασιν ἀσπίας. ὑπερῶν ἐν τῆσι
 ὑγινοῖς ὑπομνήμασιν εἰρητιῶν πλεως. ἢ κακο-
 χυμία ἢ δια τῆς οἰκίας ἐκάστῃ τῶν πλεονα-
 ζόντων χυμῶν καθάρσεως εἰρητιῶν ἢ εἶ πύ-
 της ἐν τῶ περφυλακικῶ μέρει τῆς ὑγινης πσαγ-
 ματίεας. οἰεῖται ἐν αὐτῆ μεταφέρειν ἐν πύ-
 θα σκοπέμενον ὅτω βέλπον ἐξ αὐτῶν χρεῖσθ.

P. Aeg. lib. 3. c. 47. Principium affectio-
 nis hydropicorum, malum habitum uocare
 consueuimus. Curare uero ipsum oportet
 uenae sectione si nihil prohibeat, paruita san-
 guinis detractione ad tertium usque ac quar-
 tum diem faciendo detractionem. Eua-
 cuandi autem maxime sunt, qui ob haemorr-
 rhoidum aut mensium purgationis suppres-
 sionem in affectionem collapsi sunt : quem-
 admodum qui ob plenitudinem humo-
 rum a uenae sectione abstinere debent.
 Omnino autem purgandi sunt per hieram
 ex colocynthide. Victus tenuis sit & refic-
 catorius & naturalium aquarum usus assuma-
 tur, aluminosarum ac nitrosarum magis,
 deinde sulphurentatum. Reliquum uero
 balneum ex longioribus interuallis assument,
 & uarijs modis se exercent, maxime per ja-
 traliptas, unktionis doctos medicos, postea
 etiam ueratro utantur. Mirifice etiam ipsis
 prodest absinthij præparatio & sinapismi
 & dropaces. Si uero ad hydropem affectio
 delabatur ad hydropicorum curationem de-
 ducatur, juxta modum, qui referetur.

Gal. lib. 13. Methodi mediæ cap. 6. Ergo
 quid nam medenti agendum sit, si totum cor-
 pus male sit affectum & dicta prius tum in
 libro de plenitudine, & nunc summas eorum
 quæ dicta sunt recensebimus. Vbi enim
 æquabiliter succi inter se sunt adacti, id &
 πλῆθος & πλῆθῶσαν Græci uocant : nos
 plenitudinem & succorum redundantiam
 dixerimus. Vbi uero uel flaua bili, uel nigra,
 uel pituita, uel serosis humoribus repletum
 corpus iam fuerit, eum habitum κακοχυμίας,
 quasi succorum uitium dicas, non plétho-
 ram nominant. Ergo plethorata sangui-
 nis missione curatur, tum frequenti balneo,
 tum exercitatione, tum frictione : præterea
 digerentibus medicamentis & præter hæc
 omnia inedia, de quibus in ijs quæ De tuenda
 sanitate sunt prodita, dictum abunde est
 Succorum uitium purgatione, quæ cuique
 succo superanti fit accommodata, corrigitur.
 Dictum porro & de hac est in ea parte ope-
 ris, de sanitate tuenda, quæ De uitandis mor-
 bis est instituta. Illinc igitur huc ea transferas
 oportebit, ac consideres quo nam ex ipsis uti
 maxime expediat.

ARE-

ΑΙ ΠΡΟΣ

ΟΙΤΙΝΟ



ARETAEI ARETΑΙΟΥ

CAPPADOCIS MEDICI ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ

De diuturnorum morborum curatione.

χρονίων παθῶν θεραπευτικόν

βιβλίον β.

LIBER II.

Curatio hydropis, id est, aquae intercutem, Caput I.

Curatio Diabetis siue urinae profluuij, cap. II.

Curatio calculorum & ulcerum in renibus, cap. III.

Curatio vitiorum vesicae, cap. IV.

Curatio Gonorrhoeas, id est, seminis profluuij, cap. V.

Curatio vitiorum stomachi, cap. VI.

Curatio uentriculi affecti, cap. VII.

Curatio colicorum, VIII.

Curatio dysenterias seu difficultatis intestinorum, cap. IX.

Curatio laxitatis intestinorum, cap. X.

Curatio affecti uteri, cap. XI.

Curatio morborum in articulis & coxendice, cap. XII.

Curatio Elephantiascos, cap. XIII.

Θεραπεία ὕδρωπος, κεφάλ. α.

Θεραπεία διαβήτης, κεφ. β.

Θεραπεία τῶν κατὰ τὰς νεφρὰς παθῶν, κεφ. γ.

Θεραπεία τῶν ἐν κύσει, κεφ. δ.

Θεραπεία γονορροίας, κεφ. ε.

Θεραπεία σωματικῶν, κεφ. ς.

Θεραπεία κοιλίης δεαθέσιος, κε. ζ.

Θεραπεία κωλικῶν, κεφ. η.

Θεραπεία δυσεντερίας, κεφ. θ.

Θεραπεία λιεντερίας, κεφ. ι.

Θεραπεία ὑσερικῶν, κεφ. ια.

Θεραπεία δρεθρίπδος καὶ ἰχιάδου, κεφ. ιβ.

Θεραπεία ἐλφάντιασιος, κεφ. ιγ.

CVRATIO HYdropis.

Caput I.

P. Aeg. lib. 3. c. 48. Hepate uehementer perfrigerato, quandoque primaria affectione, aut inflammato, aut in scirrhum indurato, aut alio quopiam modo affecto, quandoque per consensum cum alijs partibus sanguificationis successus non contingit, & uocatur affectio aqua intercus. In qua aliquando flatus copia cum paucissima humiditate coaceruatur, inter membranam peritonæum appellatam, ac intestina, adeo ut si uerberetur superior uenter, instar tympani sonum edat. Vnde etiam tympanites hydrops uocatur, conflatus ab inflatione circa stomachum & uentrem & colon & a febribus diuturnis. Quandoq; uerò etiam a duritia peritonæi membranæ, aut uteri in mulieribus, aut scirrhii indurati: aliquando uerò uice uersa humoris copiam cum paucissimo

ΘΕΡΑΠΕΙΑ Υ

δρωπῶ.

Κεφάλ. α.

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. μη. τὸ ἥπατῶσφονδρῶς καταψυχέντος, ὅτε μὲν κατὰ πρῶτη πάθειαν, ἢ τοι φλεγμώαντος ἢ σκίρρωθέντος, ἢ ἄλλως πως αὐτῷ παθόντῶ. ὅτε δὲ κατὰ συμπίθειαν ἐπὶ τῶν μορίων. Διποτυχία τῆς ἐξαιματώσεως γίνεται, καὶ καλεῖται τὸ πάθῶ. ὕδωρος. ἔφ' ἧ ποτὲ μὲν πλῆθῶ πνεύματῶ μετ' ἐλαχίστης ὑγρότητῶ ἀθροίξεται μετὰ τῶν ποναίῶ, ἔντερον, ὡς τε πλῆθῶ μέρων τῶ δρεθρίπριον ἢ χεῖν δίκην τυμπάνη, διὸ καὶ τυμπανίας ὕδωρος διὰ τῆς πρῶτης γορεύεται. σπιγμάμωρος, διὰ τε τῶν πῶ σπασμῶν, καὶ τῶν κοιλίῶν καὶ τῶ κώλων ἐμπνῶματώσεων, καὶ πυρετῶν χρονίων. ἔφ' ὅτε δὲ καὶ διὰ σκληρίας πῶ εἰτοναίῶ, ἢ μήτερας διὰ γυαμικῶν ἢ σκίρρωσῶ τῶ δὲ τὸ αἰάπαλιον πλῆθος ὑγρῶ αὐτῶ ἐλαχίστῶ



ηδύματι εν τῆς αὐτῆς ἀθροίζεται χωρεῖσι
 ὡπερ εν ἀσκή τῆνι Φυλασσόμῳ. ὅθεν
 τὸ παθῶ ἀσκήτης ὑδρὸς ὀνομάζεται σπι-
 τῶνδρῳ καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν εἰρημῶν αἰτίων.
 τὸ δὲ παθεῖσθαι ἀπὸ σκληρίας καὶ σκίρρα πρὸ τὸν
 σπλῆνα ἢ τὸ ἥπαρ καὶ τῶν πρὸ τὰ ἐντερά χρο-
 νίων ῥοδμάτων, ἢ τῶν συνθεσῶν τῶν μὲν
 γαστέρα ἐξογκῶσθαι, τὸ δὲ λοιπὸν ἐκτῆκεσθαι
 σῶμα, μὴ τρεφομένον. ἐστὶ δὲ ὅτε καὶ καθ' ὅλον
 τὸ σῶμα τὸν ὄγκον ψυχρότερον τε ἢ φλεγ-
 ματικώτερον αἷμα περιέχεται, πῆρ' ἀπὸ τῆς
 ἥπατος τῆς τρεφομένης. πῆρ' δὲ ἢ πάσης τῆς
 σπληνός τῆς σῶματ' οἷον ἐξυδρατμῶν πικ-
 τῶνδρῳ. ὡς τε λυκὸν καὶ φλεγματῶδες τὸ
 σῶμα φαίνεται νεκρῶ πρὸς ἀπλήσιον, καὶ κα-
 λείπεται λυκοφλεγματίας, ἢ σπληνικήδρῳ
 ὑδρῶ, ἢ ἀνασάρκεια σπληνῶνδρῳ ἀπὸ τῆς
 πυρετῶν μακρῶν καὶ σμάχρα καχεξίας καὶ
 ἰσχυροῦσθαι χρονίων αἰμορροΐδων, καὶ γυ-
 νακεία ῥε, καὶ δυσουρίας, καὶ ἀλόγων ἀρρηπιῶν,
 καὶ τῶν τρεποῖς ἐμπερῶν αἰτίων. θεραπέυον-
 τας ἔν αὐτῶν κρινῶν μὲν ἀπὸ κενώσεως ἀρ-
 χόμεθα. καὶ ἰσχυρῶν ἀσκήτης καὶ τυμπανίας,
 ἀπὸ τῆς τῶν ὑδραγωγῶν φαρμάκων ἐξο-
 σσεως, ἰσχυρῶν ἀνασάρκεια, ἀπὸ φλεβοτομίας.
 μάστιγα δὲ ἰσχυροῦσθαι αἰμορροΐδων, ἢ καθάρ-
 σεως ἐμμελίας, οὐκ ἀντὶ τῆς πάσης, ἀλλ' ἐν
 μὴ φθάσειεν ἐν καχεξία γενόμενοι φλεβο-
 τομηθῶσι. καὶ ταῦτα οὕτως, ὡς ἰσχυρῶν κα-
 χεκτικῶν, δεῖ κατὰ μέρος ταμιῶσθαι τῶν
 κενώσων, εἴτε ἐξ ὅσων ἐστὶν ἀγγελαίας ξηρῶν,
 ἀκρῶς λειώσας, εἴτε ἐν ὄξυκράτῳ ἢ ὄξυ-
 μέλιτι ἢ θείῳ τὸ τέταρτον μέρος πρὸς ἐμπε-
 σας, ὅλῳ τῶν τῆς γαστρός ἰσχυρῶν κῦτες, ἢ ασυ-
 ράθρα αἰγῶν ἐν ἔρω παιδῶν, γλοιῶ πύχος καὶ
 πλάσσει. ἀπὸ γαστρός ἀκρῶν αὐτῶν καθάρση, καὶ
 τῆς ἀπὸ ζύμης ἢ ἐξ ὀξυκράτων, ἢ πίνων, ἢ νίτρων,
 καὶ ἰσχυρῶν, καρδαμῶνα τε καὶ θείον ἀπύρα καὶ ἀμμο-
 νιακῶν, δαφνίδων τε καὶ τῆς ἀγρίας σαφίδος καὶ
 τῆς τῶν ἀγρίων περιετρῶν κόπρος, ἢ πάντων ἢ πιν-
 ῶν, ἐκ τῶν δὲ ὄξυμέλιτι χροῦσθαι κατα-
 πλάσμασι. μετ' αὐτὸ ἀπὸ τῆς αἰγίας κόπρος
 σπογγίον περὶ σπληνῶνδρῳ ἰσχυρῶν, θαυμα-
 σίως κετὶ τῶν ὑγρότητα, ἀπὸ τῶν ἀδύλων πύ-
 ρων ἢ ἀπὸ γαστρός. ὅ ὑπερον τῆς ξηραίνσεως
 ἰσχυρῶν ἐμπερῶν τῶν ἀπὸ πίνων, τῶν ἰσχυ-
 ϶ν, ἢ τῶν ὄξυκράτων, ἢ τῶν ἀπὸ δαφνίδων, ἢ τὸ πύ-
 λυαρχιον, ἢ τὸ ἀπὸ σπληνῶνδρῳ ἰσχυρῶν. καὶ τῶν
 ἢ θαυμασίων ἐστὶ, ἀπὸ πύρα καὶ ἀπὸ γαστρός τὸ
 ὑγρὸν λίθος πυρίτης L. i. ἢ θείον ἀπύρα L. i. ἢ

statu in iisdem locis coaceruatur, uelut in
 utre quodam comprehensa. Vnde affectio
 Ascites hydrops nominatur, conflatu &
 ipse ex relatis causis. Plerunque uerò à du-
 ritate & scirrho circa splenem & hepar, &
 à diuturnis circa intestina fluxionibus, in
 quibus uentrem in tumorem eleuari con-
 tingit, reliquum autem corpus alimentum
 non sentiens consumi. Quandoque etiam
 per totam corporis molem frigidior ac pi-
 tuitosior sanguis continetur, qui interdum
 ab hepate talis adfertur, interdum etiam
 omni corporis parte uelut ex aquescente ge-
 neratur, adeo ut album ac pituitosum appareat
 corpus, mortuo simile, & uocatur Leu-
 cophlegmatias hydrops sub carne, aut inter-
 cus conflatu à longis febribus, & malo sto-
 machi habitu, & diuturnis hæmorrhoidibus
 suppressis, & à fluxu muliebri & spirandi
 difficultate & uigilijs præter rationem obor-
 tis, & ab alijs his similibus causis. Curantes
 igitur ipsos in communi quidem ab eua-
 cuatione initium facimus, uerum in ascite
 ac tympanite per medicamentorum aquam
 ducentium exhibitionem: in intercute uerò
 per uenæ sectionem maximè, si ob hæmor-
 rhoidum aut menstruæ purgationis suppres-
 sionem conflatu fuerit affectio, nisi, dum
 in malo habitu constituti fuerunt uenæ se-
 ctionem præmiserint. Et tunc igitur uelut
 in malo corporis habitu euacuationem par-
 tiri oportet. Deinde bubulum bouis ar-
 mentarij sterces siccum exactè tritum, in
 posca aut aceto mulso coquito, & sulphuris
 quarta parte inspersa, toti uentris capacitati
 imposito: aut caprinum sterces in urina
 pueri aut capræ ad strigmenti spissitudinem
 redactum impone. Hæc per uentrem sum-
 unt ipsos purgant: quin & ex fermento ea-
 taplasmatu, & ex caricis & calce & nitro, &
 iride & nasturtio & sulphure uiuo, & ammo-
 niaco & lauri baccis, ac staphide syluestri, &
 syluestrium columbarum stercore, aut omni-
 bus aut quibusdam ex his assumtis cum aceto
 mulso utendum est. Post hæc epithema spon-
 giola appellatum, ex caprino stercore, mirificè
 humiditatem euacuat, tū per obscuros meatus
 tum per uentrem. Postea uerò resiccantia
 emplastra imponantur, id quod ex salicibus
 constat, icesium, rosfortis, ex baccis lauri, aut
 epithema polyarchiū, aut ex seminibus. Sed et
 hoc mirum in modum efficax est, ex profundo
 enim abripit humiditatem. Lapidis pyritæ drachi-
 duodecim, sulphuris uiui drach. duodecim,



ammoniaci thymiamatis drach. duodecim, cumini drach. sedecim nitri drach. 12. excipe modica cera ac terebinthina & pelli industa per totum ventrem impone. Præbibenda uerò ipsis detur sambuci radix in uino tota, aut cucumerem syluestrem in uino austero maceratum, ad triduum dato, ita ut de uino cyathum unum bibat additione quotidie facta usque ad cyathos tres. Multæ uerò mixtura hoc est: Balsami, nardi, casia, cumini, glycyrrhizæ, hyperici, junci rotundi odorati, asari, dauci, amomi, smyrnij, perroselini, calami aromatici, piperis, felis, spondilij singulorum æquales partes. Faciæ & unum quodque ex his per se, similiter etiam omnia urinam cientia. Citra grauitam uerò urinam ciet scilla assata, cum melle trita, & uelut eclegma delingenda exhibitæ. Potest etiam aquis quæ bibuntur incoqui. Bonum est & hoc. Internæ scillæ partis lib. duas in uini austeri sextarijs tribus ad tertias coquito, & de uino bibendum dato quotidie, initio à mystro facto usque ad unciam unam. Optimum est & hoc ad ciendam urinam. Aluminis liquidi magnitudinem fabæ aqua diluito, & per linteam excolato & ad triduum aut alternis diebus bibendum dato. Conuenit etiam his picra ex aceto mulso, & antidotus Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus. Cæterum aquam ducentia plura sunt, experimento uerò cognita hæc: Grana cnidia quagringa aut quinquaginta, aut lathyrides uiginti uel triginta, aut euphorbij siliquæ quinq; aut septē, aut squamæ æris drach. duæ aut tres. Excipiuntur micis panis, & in catapotia efformantur. Aut corticis radices sambuci succus potus cum condito. Aut foliorum chamelææ & squamæ æris, & anisi singulorum pares partes dato ex aqua, ab initio quidem drach. unam, interposito autem interuallo, etiam duas & plures. Sed & hæc catapotia admiranda sunt. Aloes, euphorbij, grani cnidij, singulorum unciam unam, thei unc. dimidiam: excipe brassicæ succo, & catapotia efforma. Dato de his siliquas septem aut nouem. Quin & antidotus ex caryophyllo mirificè aquam ducit. Sed & ut uinum aquam ducens ipsis demus conandum est. Est autem optimum hoc. Scillæ quadrans, seminis apij, capparis radices corticis, piperis singulorum drach. quatuor, grani cnidij decorricati drach. una folij Malabathri pillulæ duæ. Vini optimi heminæ duodecim, mellis crudi lib. 6. confusa ac cribrata uino macerantur: scilla uerò simul conteritur. Dantur huic cyathi tres. At post humoris euacuationem etiam theriaca utendum est. Bubuli quoq; stercoreis ulsi cochlearij

ἄμμωνιακῆ θυμιάματ' L. i β. κυμίνῃ L. iς. νίτρον β. ἀνάλαβε κηρῶ βραχέϊ καὶ περιδωθίνῃ, καὶ εἰς δέσμα ὑπὸ πλάσας, ἀπόθε. δι' ὅλης τῆς γαστρὸς. προσπορίζειν διὰ αὐτὰς καθιέροντα πλὴν ῥίζαν τῆς αἰθιαίας ἐν οἴνῳ, ἢ σικκὸν ἀγρίον ἐν οἴνῳ ὑποβρέζας αὐτηρῶ ἡμέρας. γ. διδῶ κύαθον α. προσπιθείς καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἀγρίο κύαθον γ. πλουμίγματον διὰ τὸ το. βαλοσκίμα, νάρδος, κασιόνας, κυμίνῃ, γλυκύριζης, ὑπερικῆ, χροίνῃ, ἀσάρῃ, δαύκῃ, ἀμάμῃ, σμύρνης, πετροσελίνῃ, καλάμῃ δρωματικῆ, πεπέρεως, σεσέλευς, σπονδυλίου ἴσσι. ποιεῖ διὰ καὶ ἑκάστον καθ' ἑαυτὸ. καὶ πάντα δὲ πρὸ διαρηπτικὰ ὁμοίως. διχα διὰ βάρῃ πλὴν οὐρησιν κινεῖ, σκίλλα ὀπίη, μετὰ μέλιτ' λειανθεῖσαι, ἔως ἐκλειγμὰ διαδρομῆ. ἐνεψήθει δ' αὐτὴ καὶ τοῖς πινόμενοις ὕδασι. καὶ ἔτο διὰ ἄγαν καλόν. ἔς ἐν τὸς τῆς σκίλλης λι. β. εἰς οἶνῃ αὐτηρῶ ἔγ. ἐψήσας ἕως ὑποβρέζας, διδῶ ἐκ ἔο οἶνῃ καθ' ἡμέραν, δέξασθ' ὑπο μύστρου ἕως το. α. διαρηπτικὸν διὰ ἔτο καλλιστον. σηπηρεῖας ὑγρῆς ἡλικὸν κύαμιν, ὕδασι διαλύσας διήθησας τε δι' ὀθόνης πόπιζε ὑπὸ τρεῖς ἡμέρας ἢ ἑξάμιαν. ἀρμόζει διὰ τῆς τοῖς, ἢ διὰ ἔο ἐξυμέλιτ' πικρῆ, ἢ τε θεοδώρητος. καὶ ὁ διὰ τῶν πικρῶν ἀμυγδαλῶν τροχίσκ' ὑδραγωγῶ διὰ πλείονά εἰσιν. πεπειραμῆναι τὰυτὰ. κινίδιοι κόκκοι μ. ἢ πενήτηκοντα. ἢ λαθυρίδες. κ. ἢ λ. ἢ εὐφορβίῃ κερ. ε. ἢ ζ. ἢ λεπιδ' χαλκῆ L. β. ἢ γ. μετὰ ψυχῶν ἀναληφθεῖσαι καὶ καταπότα γενόμενα. ἢ τῆς ἀκτῆς ῥίζης ἔφλοιῖς ὁ χυλὸς πιθείς μετὰ κενότις. ἢ χαμελαίας φύλλων καὶ χαλκῆ K. ἀνήσας τὸ ἴσον, διδῶ ἐν ὕδασι, καταρχῆς ῥζ L. α. διαψήσας ἢ καὶ β. καὶ πλείω. καὶ ταῦτα ἢ θαυμαστὰ καταπότα, ἀλῆς, εὐφορβίῃ, κέκκη κινίδῃ ἀπὸ το. α. ῥέξ το. δ. ἀναλαμβάνει χυλῆ κράμης καὶ πλάσσει καταπότα, διδῶ κερ. ζ. ἢ θ. καὶ ἢ διὰ ἔο καρυόφυλλῃ δὲ ἀπὸ τοῖς ὕδασι ἄγει θαυμαστῶς. καὶ οἶνον ἢ πειρατῶν αὐτοῖς ὑδραγωγὸν διδόναι. ἐστὶ ἢ καλλιστος ἔτος. σκίλλης το. γ. σελινωσπέρματος, καπνοῦ ἀρωγῆς, ῥίζης, φλοιῖς, πεπέρεως ἀπὸ L. δ. κέκκη κινίδῃ λελεπτομύκῃ L. α. φύλλῃ L. α. μαλαβάθρῃ σφαμερία β. οἶνῃ καλλιστῇ κροτόλῃ β. μέλιτος ὡμῆ λι. γ. κόψας, σήσας, ἐμβρέχε τῶ οἴνῳ. πλὴν δε σκίλλαν συλλέανει. ἢ δόσις K. γ. μετὰ ἢ πλὴν ἔο ὑγρῆ κενωσιν, καὶ θηριακῆ χρῆσει. καὶ ἔο βολβίτῃ ἢ κενωσίν, ὅσον κοχλιάριον δι' οἶνῃ πινόμενον καθ' ἡμέραν



ἡμέραν, μετὰ τὴν ὄννησιν. καὶ κλύσμασι διὰ
 χρῆσιν δριμυτέροις, πλὴν εἰ μὴ τὰ τῆς γαστρὸς
 αὐτομάτως ἐξυγραίνονται. τινικαὶ αὐτὰ γὰρ μάλ-
 λον ὀπιζηραίνειν αὐτῷ προσήκει. ὅτι δὲ γυ-
 ναϊκῶν ὑδρωπιστῶν καὶ πρὸς χρῆσιν τῶν δι-
 ἀνήσ, καρδαμώμα, κυμίν, νίτρο, ἀριστολοχί-
 ας, πήλεως, γλήχων, σύκων, ἔντρος, ἰσα ὄσ-
 σίνα ἀγαθὴ φέρονται προσπιθέσθω. μετὰ ἣ παύται
 καὶ τοῖς αὐτοφύεσι χρῆσιν ὑδρασι ὀπιμῶν,
 καὶ τῶν ψαμμίσμων, τῶν δὲ ἄλλων λυτῶν ἀν-
 ὄσιν ἀφεκτικῶν. εἰ ἣ ποτὲ καὶ λυτῶν, χρῆσιν
 ἐν τῶν λυτῶν τοῖς διὰ νίτρο, καὶ αἰλῶν, καὶ νά-
 πους, πᾶν τε καὶ τῶν ὀπιμῶν ἐμπρο-
 σθῶν. παύται μὲν γὰρ καὶ χωρὶς λυτῶν χρῆσιμα,
 ἔξω πρὸς ἐλαίῳ τῆς γαστρὸς προσπιθέσθω.
 ὅτι δὲ τῶν αἰσάκων καὶ τοῖς λοιποῖς μερῶσι
 γυμναζέσθωσαν τε καὶ ὄσον εἶον τε καὶ ἔξω τε
 εἰσάσθωσαν ἐν ἡλίῳ καὶ ἡ λοιπὴ ἣ διαίτα ἔξω τε
 πικρὰ ὀπιμῶν λαμβανέσθω. περιχρῶν ἐν εἰ-
 θιῶσιν, καὶ νάπη, καὶ σκόρδι, καὶ τῶν ὀρέων τὰ
 ἀγρία καὶ ἔξω. Ἐλαχάνων, ἀσπάρθρον, γιν-
 γίδα, πρῶσα, σιγήπα, καυκαλίδας καὶ τὰ λοι-
 πὰ τῶν ἀγρίων, καὶ τῶν αἰλῶν τῶν θηριακῶν, ἣ τῶν
 ἰαμβλίχων τοῖς ὄποις ὀπιμῶν γυμνῶσαν, οἶνω τε
 χρῆσιν παλαιῶν λεπτῶν διερητικῶν. εἰ ἣ πα-
 ρείη, τεθαλασσωμένῳ ἀπεχόμενοι πλέονος μὲν
 πρὸς πάντες, ὑδατος δὲ τὸ ὀπιμῶν. οὐ
 πυρετῶ δὲ σιωπῶν καὶ ὑδρωπιστῶν, τῶν μὲν
 θερμῶν καὶ δριμυτέρων ἐδεσμάτων τε καὶ ἑσθ-
 θημάτων ἀφεκτικῶν, ὀπιμῶν τε τῶν χρῆ-
 σιν προσπιθέσθω ἐν πρῶτῳ ἐνισχυόμενος. ὅτι
 δὲ τῶν τυμπανίτων, τὰ καθαρικὰ καὶ τὰ τῶν
 ὄλων σώματος σωτηρικὰ, ἀειμετέον. Ἐτῶν
 διερητικῶν, τὰ δραστήρια. τοῖς δὲ λεπτύνειν τε καὶ
 διαφορεῖν τὰ πρὸς διωαμῶν, ἔσθωθεν τε
 καὶ ἔξωθεν χρῆσιν, ἣ σικύας καὶ φασ σιωπῶν
 κατὰ πάσης γαστρὸς. ὄσιν δὲ τὸν ἀσκήτων ἔχον-
 τας, εἰ μὴ τοῖς εἰρημῶν ὀπιμῶν ἐσθῶθεν
 σιν, ὅτι τὸν ὀπιμῶν ἀκτικῶν, ἐδὲν τῶν
 ἄλλων ὑδρῶν ἀρμόζονται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑ- ΒΗΤΗΣ.

Κεφάλ. 6.


Ἰδρωπὸς ἰδίη τῆς διαβήτης
 πάθος αἰπὴ καὶ διαβῆσι, χωρὶς δὲ
 μὲν διάφορον, ἐνθα τὸ ὑγρὸν ἐκρέει.

mensura, quotidie ex uino pota, magnopere
 prodest. Infusus etiam per clysterem uten-
 dum est, nisi alius sua sponte liquida egerat
 tunc enim magis reficere eam conuenit.
 Porro in mulieribus hydropicis etiam pessum
 hoc subsiditio ad uuluum utendum est. A-
 nisi, cardamomi, cumini, nitri, aristolochiz,
 fœni græci, pulegij, ficuum internæ pattis,
 singulorum partes portiones salino excepta
 apponantur. Posthæc etiam naturalibus bal-
 neis utendum est perseveranter, & arenæ in-
 gestione : ab alijs uero balneis abstineant,
 & ubi lauerint, in balneo utantur inspersio-
 nis ex nitro, sale, sinapi, calce & similibus.
 Atque hæc quidem etiam citra balneum
 commoda sunt, si sicca cum oleo uentri af-
 fricentur. At in hydrope subter cutem, eti-
 am alijs partibus se exercent, quantum
 eius fieri potest, & sicca frictione in sole u-
 tantur. Sed & reliquis uictus sicciore assu-
 matur. Salsamenta igitur edant, & sinapi &
 allium, & ex uolucris syluestres ac siccas.
 Et ex oleribus asparagum, gingidium, por-
 rum, sinapi, caucalidas, & reliqua syluestria,
 & salem theriacum, aut Iamblichij obsonijs
 aspergant. Vinoque utantur ueteri, tenui,
 urinam ciente, & si adsit, mari mixto : ita ut
 ab omni largiore potu abstineant, & ab aqua
 in totum. Si uero cum febre consistat hy-
 drops, ab omnibus calidioribus & acriori-
 bus eduljis ac auxilijs abstinendum est : ue-
 rum mixtim his utendum aduersus id quod
 urget instando. Cæterum in tympanite hy-
 drope & purgatoria, & quæ totum corpus
 colliquant tollantur, & quæ efficacius uri-
 nam cient. Quæ uero status attenuare &
 discurrere possunt, intrinsecus & extrinsecus
 utenda dentur & cucurbitæ leues assidue
 toti uentri affigantur. Qui uero hydropem
 ascitem habent, si non relatis cesserit auxilijs,
 ad perunctionem deducantur, quæ nulli alijs
 hydropi conuenit.

DE CURATIONE Diabetis.

Caput II.

Vitium Diabetem, quod uocant, si
 causam & affectum consideres,
 hydropis species est : sola corporis
 parte, per quam humor exit, differens.
 Nam



Nam ascitæ conceptaculū membrana illa est, quam Græci peritonæo uocāt: neq; humoris exitum habet, sed eodē loco residens, inundat. In Diabete humiditas ab affecto corpore eodē modo fertur, & liquefcētia mēbra tabescunt. In renes autē ac uesica ut illac fiat exitus, humores decurrunt. At in aqua intercutē laborantibus, si morbus ad sanitatē inclinat, per hanc uiam humor dilabitur, bona est autē causā conuulsio, non sola oneris leuatio. Hos autem sitis uehementior discrutiat. Effluens namque humiditas aridum corpus destituit. In hoc morbo colliquatio per eas rationēs submouetur, per quas & aqua intercutem. Ad sitim uerō extinguendā magno medici artificio opus est, siquidem in eiusmodi malo hoc cætera tormenta longē superat. Atqui si humorem biberint, urina citatur: quæ in super & excurrens ea quæ in corpore sunt liquefaciens secum euocat. Remedijs igitur sitim lenientibus opus est. Sitis enim magna uehat, & in explebilis adest potandi auuiditas. Neque enim, etiamsi quantum libet æger biberit, siti mederi potest. Prorsus autem stomacho, unde sitis fons emanat, succurrendum est. Igitur ubi sacro medicamento uentrem solueris, nardum, mastichen, palmulas, cydonia mala cruda superdato. Nempe horum succus cum nardo & roseo unguento ad irrigandum optimè facit: cataplasma uerò ex ipsorum carne cum mastiche & palmulis conficitur. Sed cera & nardino unguento hæc benè excipiuntur atq; miscentur aut acaciæ & hypocythidis succos ad irrigationes & cataplasmata sumito. At ei potio sit & aqua ubi roma decocta sint. Alimentum sit lac, & cum eo cibi, amyli, alicaq; & ex his fiant sorbitiones. Vina astringētia exhibeantur, quo uentriculo tenor cōparetur, eadem sint benè diluta, ut alij humores attenuētur ac eluantur. Salsi enim sitim excitant. Vinum uerò astringens, simul & refrigerans corpus immutat ac benè temperat.

ἀσπίτη μὲν γὰρ δοχεῖον τὸ περὶ τὸναι-
ον. ἐδ' ἐκροῦν ἴχει, ἀλλὰ μίμνον τῆ-
δε πλημμυρεῖ. διαβήτεω δὲ φορῆ
μὲν ὑγρῆ ἢ ἀπὸ τῆ πάχοντος ἢ
ἔωυτῆ καὶ σιωπῆς. ἐς δὲ νεφ-
ροὺς καὶ κύστιν ἢ ξυώδους τὰ περὶ ἐ-
ξοδὸν φέρεται. ἢ δὲ τοῖσι ὑδρεῖωσι ἢ ὁδὸς
ἐπιγίγνεται, ἢ ἐς ἀγαθὸν ἢ ἐς σὸς τρέ-
πη). ἀγαθὸν δὲ ἡ λύσις τ' αἰτίας. καὶ
μὴ ἔσθ' ἀχθεὸς ἐλαφρὴ μῆνον. διψὸς
ἴσχυεσι μέζον. ἐκρέον γὰρ τὸ ὑγρὸν
ἀναίνει. ἐστὶ τὰ ἀκεα ἐς τὴν ἴσχυ-
σιν τ' ξυωτήξιος τὰ ὠντὰ τοῖσι ὑδρω-
ψι. ἐς δὲ τὸ διψὸς μεγάλης ἰσχυρίας
χρέος. τὸ δὲ γὰρ ἐν τῷ εἶδει ἀλγέων
πάντων μέζον, καὶ λέωσι τὸ ὑγρὸν.
περὶ κλησις ἐρήσιος. ποτὶ καὶ ἐκθεον λό-
δε ξυωπαγάτῆκον τὰ ἐν τῷ σπῆνεϊ.
φαρμάκων ὧν ἀδιψων χρέος. διψὸς
γὰρ μέγα ἀκοεῖν ποτῆ. ποτὸν γὰρ ἐδ'
ὅσον γίγνεται διψέος ἀκος. πάντα δὲ
τὰ σομάχω δὲ γαίνεθαι ἔσθ' ἀδιψέος
αἰπηγαί. ἢ ὧν τῆ ἱερῆ καθάρης, ἴπ-
θήμασι χρέο, νάρδιω, μασιχη, φοίν-
ξι, μήλοισι κυδωνίοισι ὠμοῖσι. τῷ ἴ
ὁ χυμὸς μὲν ξυὺ νάρδιω καὶ ρόδιω
ἀεῖσον ἐς τὴ γέιν. ἴππασμα δὲ ἢ
σάξξ αὐτέων ξυὺ μασιχησι καὶ φοί-
νιξι. ἐν κηρῷ δὲ καὶ νάρδιω τὰ μύρω ἢ
τετέων μίξις ἀγαθὴ ἢ οἱ χυλοὶ, ἀ-
κακίης τὲ καὶ ὑποκύσidos, ἐς τὲ τὰς
λέξιαις. καὶ ἐστὶ ἐπιπλάσματα. ἀτὰρ
καὶ ὑδωρὸ ποτὸν, σὺν τῆσι ὀπώρησι ἐ-
ψείδω. τροφαὶ ἴ καὶ γάλα καὶ ξυὺ τὰ-
δε σιτία, ἀμυλοι, χόνδροι, ροφήμα-
τα, οἶνοι σύφοιτες ἐς τὸν ἴσχυ σομάχου
νον, ἀκρηλῆς εροι μάλλον, ἐς τὴν τῷ ἀλ-
λων χυμῶν ἐξήρωσίν τε καὶ διάνηψιν.
ἀλμωδέ-



αίλωδεςσι γδ διψος οἶνος ἢ σύφωνθ' ἄμα κ' ψύχων μετὰ βολῆ τε κ' δίκρα σιή ἐς δύναμιν ἢ κήν οἶνος γλυκὺς ἐκ κοῖος αἷμα ἐπ' ἐς τὴν αὐτὴν γέννασι. Φάρμακα ποικίλα τὰ αὐτὰ, ἢ διὰ τῶν θηριῶν ἢ τῶν μυθριδάτεω, ἢ διὰ τῶν ὀπωρέων, τὰ τε ἀλλὰ ὁκόσα ὑδρώπος ὀνήσια, ἀτὰρ κ' ἢ ξύμπασα διαίτα κ' ὁ βίβω υῦτες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣ
σεως κ' ἐλκώσεως νεφρῶν.

Κεφάλ. γ.

Ἀμφὶ μὲν φλεγμοσίν κ' αἱμορραγίαις κ' ὁκόσα ὀξέως ἀπὸ νεφρῶν κτείνει, ἐν τοῖσι ὀξέσι γεγράφα'. αἱμφὶ ἢ ἐλκώσιως ἢ δὲ λίθων γενέσιος, ὁκόσα τὰ πολλὰ ξυμπαθνήσκει πρὸς βύτησι, μάλιστα νῦν γράφω, ἀγχι αἱμφὶ ἐς ἀκροσιν, εἰ ἢ μὴ, οἷσι ὀγεπαρηγορήσει'. λίθων μὲν ὧν διφυή γέννασι ἐς ἀγόνον πρὸς ψαῖα δύνατον, ῥηότερον. μὲν γδ μήτε ἄτοκον θέμεναι, ἢ νεφρὰς λιθιῶντας ἀλίθως, ἐς διέξοδον ὁκως δρῆγειν χεῖ. καὶ ὧν ἐν ἐδρῇ ἴζωσι οἱ λίθοι, τὰ ἀκροσφρασίω, καὶ ἔτα γδ ὀδμησόν', ποτὶ κ' εἰς ἐθανον σρόφοισι κ' εἰλέω κώλω, κ' ἰχχερίη. ξυμπαφεία γδ ἀλλήλοισι νεφροῖ τε κ' κώλων. καὶ γδ λίθων ἐν σάσιες ἔωσι, ἐπὶ ἢ τοῖσι ἰχχερίη τε κ' σρόφω, τὴν ἐπὶ τῶν σφυρῶν τὰ μιν φλέβα τὰ κατ' ἴξιν εἰνεφρῶ. αἱ γδ εἰ αἱματος. ἀπὸ νεφρῶν ἐκροίαι ἀνιάσι τῶν λίθωντας σφύξιας. φλεγμονὴ γὰρ δῆσασα ἴχει τὰ πάντα. φλεγμονῆς δὲ κενεαγγεῖη λύσις.

Ad vires autem instaurandas vinum etiam dulce, qualis est sanguis, optime facit, sanguinem enim procreat. Medicamenta ex varijs composita eadem sunt, quod ex uiperis constat & Mithridaticum, aut ex porris confectum: & alia, quotcunque hydropi subsidio sunt. Quin etiam uniuersa uitae ratio ac uita eadem instituitur.

DE CALCULI RENVM
atque ulceris curatione.

Caput III.

DE inflammatione & sanguinis effluuio & alijs renum uitijs, quotquot celeriter enecant, in libris de morbis acutis comprehensum est, sed de ulceribus, & calculorum creatione, quæ plerumque senibus comoriuntur, in presentia maximè scribimus, quam proximè poterimus ad salutem acquirendam collimantes; sin minus eam assequi ualuerimus, at saltem ut mali acerbitas leniatur enitemur. Nempe ut innata calculorum fecunditas ad sterilitatem commutetur, fieri non potest. Facilius enim uterum concipiendo factui inhabilem quis reddat, quam calculis generandis aptos renes, à calculorum generatione prohibeat. Quapropter ad transitum calculis expedendum utcunque opem ferre decet. Igitur si summam sedem occupant, auxilia monstrabo. Nam uehementer dolent. Interdum etiam torminibus & laxioris intestini uoluulo, & urinae retentu consumti sunt. Renes enim & laxius intestinum sese contingunt. Itaque si calculi urgeant, præterea non feratur urina & intestina torqueantur, uenam malleoli, quæ rectè affecto reni opposita sit, incidito. Nam sanguinis è renibus effusiones calculorum astrictiones relaxant, quoniã phlegmone ceu uinculo astricta occupat omnia. Vasculorum autè inanitio phlegmonè soluit.

Lumbos



Lumbos quoque, ubi renū sedes est, madefacito, sed in oleum, seu uetus seu recens sit rutam iniicito. Urinæ autem eliciendæ conuenit anethi coma, rosmarinus, aut sampſuchus, amaracus uē. Aquæ uerò ubi hæc incocta sint, locum affectum perfundito. Parum enim inundationes facerent. Veruntamen his etiam fouere oportet, bubulis uescicis chamæmelino oleo repletis, cataplasmatum ad hunc morbum materia cum farinis eadem esto. Nonnunquam & sicca cucurbitula calculorum uexationem sustulit: optimum quoque fuerit, si super inflammatione scarificaueris. Cæterum si hæc te faciente adhuc remanent calculi, in oleum hominem demittito. Id enim simul omnia præstat. Nam tepor relaxat, & quodammodo lentorem affert. Acrimonia uerò ad excernendi promittitudinem irritat. Hæc utique ad calculorum exitum faciunt, ipsosque prouocant. Inter simplicia uerò medicamenta radices hæc potui dandæ sunt: phu, mei, asari. Herbae autem, betonica, trisſagoiue, aut petroselinū, aut sium. Inter uaria ea unguenta deligito, quæcunq; constant ex nardo, cassia, myrrha, cinnamomo. Ducendæ cicatrici sinapi auxiliabitur, & ab igne crustæ, & epithemata quæ supra diximus. At uictus ratio, & inundatio, & nauigatio, & in mari uitæ traductio, hæc omnia renū morbis subueniunt.

τέγγειν τὴν ψῆας ἐνθα τῷ νεφρῶν ἢ χῶρη. λίπας ἢ παλαμόν ἢ τῆν ὀν ῥύτιν ἴχετο. ἐρητικὸν ἢ κῆ ἀνήθε ἢ κόμη κῆ λιβανωπίς ἢ σάμψυχον. τῆς ἢ χῆ ὅπως ὕδωρ καταμονεῖν. σμικρὸν γῶ ἀι χησίτες. ἀτῆρ κῆ τῆς δε πυρρῆ. Ἐοίησι κύσει ἐγγχεόντα ἔλαιον ἀνθέμιδος, ἢ πηπασμάτων νεῦ ὕλη ξὺν τῆσι ἀλίτρισι ἢ ὠπῆ. ἔλυσε καὶ σικύη κῆ φηκοτὲ τῷ λίθων τῶ ἔνστασιν. ἀρισον ἢ κῆ ἐπὶ φλεγμοσίς χάσις. ἢ ἢ τῶ δέ σοι ποίεον πῆ ἐπὶ μίμνωσι οἱ λίθοι, ἐς ἔλαμον τῆν ἀνδρωπον καθίενα. τὸ γῶ τῆ αἵμα πάντα ποίει. ἀλήμῃ χαλᾶ. πῆ ἢ ἐγγλιχραῖνε τῶ δριμύ ἢ ἐς πρῶθυμῆω δάκνει. τῶ δέ μῆρ τῆ ἐξοδα λίθων καὶ σφῶν περὶ κλήσις, πίνειν δὲ φαρμάκων τῷ ἀπλῶν μῆρ ρίζας, φου, μεῖον, ἀσαργν. Ἐοίησας ἢ τῆν πριονίτην ἢ περὶ ῥόσελι, ἢ σίον, ποικίλων ἢ μύρα μῆρ ὀκόσα ἴχθῆ νάρδον, κασίην, σμύρναν, κινάμωμον. ἀπελώσῃ σίνηπι καὶ ἐπὶ πυρὸς ἐχάρακι κῆ ἐπιθήματα, ἀ πρῶσθὲν μοι λέλεκῆ. διαίτα ἢ κῆ ἀλειψίς κῆ πλῆς κῆ ἢ ἐν θαλάσῃ βιοτῆ ἀπῶντα τῆσι ἢ πῆ νεφρῶν ἐστὶν ἀκεα.

DE RENVM AC VESICÆ affectionibus.

Caput III.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ

ἐν κύσει παθῶν.

Κεφάλ. δ.

Paulus Aegineta lib. 3. capit. 45. Ordinem hunc docendi persequi nos cogit morborum cognatio. Commune enim est colicis & lapidem in renibus habentibus, ut & ab initio alius sit adstricta, & uehementer doleant, &

Π. αἰγ. βιβ. γ. κεφ. μ. τῶ πῆν τῆς διδασκαλίας ἡμᾶς ἀναγκάζει παρεξέειναι τῶν νοσημάτων ἢ συγγένεια. κωνὸν γὰρ ἐστὶ κολικῶν τε καὶ τῶν λίθων ἐχόντων ἐν τῷ νεφρῷ τῶ, τῆ κατὰ δεξιάς ἐπέχεατῆ τῶ γαστέρα καὶ σφύδρῶς ἐδυαῶσθ, καὶ ἀνορεκ-



ἀνορεκτείν και ἀπεπτείν και εροφῶσαι ἰδιον
 δε τῶ τοῖς μῦρ κολικαῖς ἴππι πεταμῦμα ταῦτα
 πάντα μᾶλλον γίνεαδ. τοῖς δε νεφρητι-
 κοῖς ἤπρον και τοῖς μῦρ κολικαῖς κατα τῶν δε-
 ξιαυ λαγῶνα μᾶλλον εἶναι ὀδωῖλω τῶν και
 ἀπέναι μέχει σμαχῶ και ἥπατ @ και
 σπλῆνῶς και τῶν κόπρον ἐπέχεαδ παντι-
 λῶς, ὡς μήτε φύσας διεξίνα. ὅτε δε πρὸς
 ἀνάγκη ἐκκερῖνωσιν, φυσῶδη αὐτῶ
 εἶναι, Ἐάλβίτω ὡς ἀπλησίως. και ποτε και
 ὑαλώδες ἐκκερῖνεαδ φλεγμα και τὸ ἔρον
 παλῆον και φλεγματῶδες ἐκδίδοαδ. τῶ
 δε νεφρητικοῖς, τῶ μῦρ ὀδωῖλω κατ αυ-
 τῶν τῶν νεφρῶν ἐσηρῖχθαι βαρεῖαι δίκλι
 σκόλωπ @ ἐμπεπερῖνῶς, ἔρον π κατ εὐθύ
 διδυμον ὀδωῖαδ. και νάρκη γίνετα μῆρε, ἔ
 κατ ἴξιν. ἐκκερῖνει τε και αὐτομάτως μῦρ
 κατ τὸ σάνιον, πάντως δε ἴππι κλίσμασι,
 τῶν κολιαν, φύσας τε και κέπρον χολωδέ-
 ερον τὰ δε ἔρα ὀλίγα και ψαμμῶδη μᾶλ-
 λον ἐκδίδοαδ, ἔ σύφραδ τῶν ερηπκῶν πῶρον.
 τῶν τῶν ἐν τῶς νεφροῖς λίθων τεμῆρα,
 τελείως μᾶλλον αἰδρασι γινόμενα. ἢ δε κατα
 κύστι τῶν λίθων πῆξις, παιδίως μᾶλλον γί-
 νεαδ φιλά. σημεῖα δε ἐ τῶν ἀπεπθῶν τε
 ἔ σπολευκῶν ἔρον μετὰ ψαμμῶδες ἰσσοῶ-
 σεως. κνῶντα σιωεχῶς και ψηλαφῶσι τὸ
 αἰδρῆον ἢ ἐντέναι, και σιωεχῶς εἰς ἔρον ἐ-
 πείγοντα, και εραγγυρῶσιν. ὑλικῶν μῦρ ἐν
 αἴπρον τῶς τῶν λίθων γενέσεως ἐστῖν, παχύς και
 γεώδης χυμός, πηηπκῶν δε πυρῶδης θερμα-
 σία τῶς νεφρῶν ἢ τῶς κύσεως. ἀλλ. ἴππι μῦρ τῶν
 νεφρῶν, τῶς θρύπῃσι τῶς λίθως ἢ πέμῃσι χεῖ-
 αδ φαρμάκοις, ἀνδ ἔ θερμαίνεν ἴππι φανῶς,
 ποιαῦτα ἢ εἰσιν, αἴτε τῶν βασιλικῶν ἀσπαρά-
 γων ρίζαι ἢ ἔ βάτα. ἢ ὑαλός τε κεκαυμένος ἢ
 ἀχρῶσεως ρίζα ἢ ἀδιδάπιν ἢ ἐδίλλιον, δάφνης
 τε τῶς ρίζης ὀφλοιός, ἢ ἀλθαίας τὸ σπέρμα, ἔ
 τὸ ἐρερῖνθαι εἰ μέλαιες κεραῖ, οἴτε τῶν ἀπύγ-
 γων λίθοι ἢ τὸ σκιλληπκῶν ὄξος, ἔ φῶ. ἔ μήον,
 ἢ ἀσπρον ἢ καρπῆσια ἢ σιζι φραγῆς. τὸ ἴσιον
 ἢ ἐδιδόμῃον ἔ πνέμῃον, σκελύμῃ τε ρίζα, και
 ἐρύσιμον, ἢ πριονίτις. λετρεῖς δε σιωεχῶς
 χεῖσῶσαν. ἢ μετὰ τὸ λετρεῖν ὀδῶς πνᾶ τῶν
 εἰρημῶν πνετωσαν. ἐμροχαῖς τε και κατα-
 πλάσμασι ἢ πυρῆαις, και ἐγκαθίσμασι, τῶς
 χαλαστικοῖς τε ἔ παρηγορῶσι χεῖσῶν ἐκ τῶν
 κολικῶν αὐτὰ μεταφέρουσι. σῶθετα δε πό-
 ματα. πηρόναι ἀχρῆς, και μαλάχης ἀχρῆς
 και σελῖνῃς τῶς ρίζας ἐψῆσας μετ' οἶνῃ,

sbūm fastidiant, & non concoquant, &
 tormina habeant. Proprium uerò colicis
 quidem ut hæc omnia magis intenta fiant,
 nephriticis uerò minus: & quod colicis circa
 dexteram lateris mollitudinem magis sint
 dolores & ascendant ad stomachum usque,
 & hepar ac splenem: & quod stercus peni-
 tus sit suppressum, ut neque flatus penetrent,
 & si ad necessitatem ipsum excernant, quod
 flatuosum sit, similiter uelut hybulum, &
 quod aliquando pituita uitreo excernatur,
 & urina copiosior ac pituitosa reddatur, Ne-
 phriticis autem dolor circa ipsos renes fir-
 matus est grauis instar pali impacti, & testem
 è directo dolent, & torpor femoris è directo
 fit, raroque sua sponte alius excernit, omni-
 no autem infusus per clysterem immisiss,
 flatus & stercus biliosus, urinæ uero pauca
 & arenosa magis redduntur, & meatus uri-
 narius est strictus. Hæc sunt calculorum
 in renibus signa quæ in uiris perfectis magis
 fiunt, at calculorum in uesica coactio, pue-
 ris magis fieri solet. Notæ horum sunt cru-
 da & subalbida urina cum arenosa subsiden-
 tia, Fricant assidue & contrectant puden-
 dum & arrigunt & assidue ad urinam red-
 dendam urgentur, & urinæ stillicidium ha-
 bent. Materialis igitur calculorum gene-
 rationis causa est crassus ac terreus humor,
 efficiens uerò fetuida renum aut uesicæ ca-
 liditas. Cæterum ad renes atterentibus cal-
 culos & secantibus medicamentis utendum
 est absque hoc ut manifestè calefaciant. Ta-
 lia autem sunt asparagorum regionum radix,
 & rubi radix, & nitrum ustum & graminis
 radix, & adiantum & bdellium, radice lauri
 cortex, althææ semen, ciner nigrum arietini-
 cum, lapides spongiarum, acetum scilliti-
 cum, phu, meon, alarum, carpesia, laxifraga,
 sion & comestum & potum, cardui radix, ery-
 simon, & prionitis. Balneis etiam assidue
 utantur & post balneum statim aliqua ex re-
 latis bibant, irrigationibus quoque & ca-
 taplasmatibus & fomentis ac infessibus la-
 xatorijs ac mitigatorijs utendum est ex
 colicis ipsa transferendo. Compositæ po-
 tiones sunt. Rutæ syluestris, maluæ syluestris,
 & apij radices, concoquito in uino
 & ex-



& expressum liquorem aqua temperato, & cyathos duos bibendos dato. Insperfile uero hoc est : fructus balsami, lapidis spongiarum, pulegij sicci, seminis maluae agrestis, singulorum æquas portiones contundito & cochlearium unum cum uini diluti cyathis duobus dato. Sed & siccatus sanguis hircinus, & cicadae sicca sine alis & pedibus, & lapis Iudaeus siue tecolithos ex uino mulso, in calido balnei folio dentur, & quæ ex ipsis parantur, composita medicamenta, & posca nephritica & condita ad hoc composita. Quin & troglodytes laudatissimum auxilium existit, est autem auicula siue passerculus omnium uolucrum nimis, solo regulo excepto. Nam ut paruus sit, illo tamen solo maior est & ipsi similis, colore inter cinereum, & cum uiore pallidum tenui rostro præditus in parietibus maximè ac sepibus degens. Hic totus sale seruatus, & crudus assidue comestus, & calculos natos per urinam expellit, & de cætero generari uetat. Sed & uili totius uiuentis una cum pennis cinis, totus per se, & cum pipere, & folio modico ex uino mulso potus idem efficere solet. Cæterum ad dolum acumen & uigilias antidotus, sutura, & phijonis bona sunt pharmaca. Venæ quodquæ sectio adhibita, sæpe dolorem leuat uelocem lapidis excretionem faciens. Præseruantiæ uero à calculi generatione sint primum hõni succi & moderatus cibus & exercitia, deinde à leguminum omnis generis, & à frumenta- cæorum assiduo usu prohibentur, & à castoreo & lacte & obscuris quæ ex ipso parantur. A uino tremuligo & carniuni multi- tudinis & insumma ab omnibus crassi succi cibis abstineant & à ualde calidis & acerbis hydrogaris inquam, ac conditis, & similibus. Hæc enim non solum nondum generatos lapides concresecere prohibent, sed etiam jam generatos atterere & excernere solent. Bibant autem acetum mulsum cum aliquo ex simplicioribus urinam cientibus, adian- ti, apij graminis decocto : & post balneum ieiuni, ante uinum, aquam temperatam bibant, & in medio prædicio frigidam, insu- per forbeant, si nihil prohibeat. Si uiciatorum humorum copiam simul sentiant per uonæ se- ctiõ nem aut purgationem euacuentur. Omnium uero optimũ est ad præseruandos calculos post

καὶ τὸ ὑγρὸν ἐπιβλήσας, ὕδατι κερσάσας δι-
 δεικχλιαριον Ε. κατὰ πλάσιν διετῆτο. Βαλ-
 σάμης καρπῆ, λίθου τῆ ἐν τοῖς ἀπόργοις, γλή-
 χανος ξηροῦ, μαλάχης ἀργείας τῆ ἀπέρμα-
 τῶ ἴσα κόψας, διδεις κοχλιαριον, μετ' οἶνον
 κερσασμένης κοχλιαριων Ε. καὶ τὸ ξηρανθέν
 διετρήγειον αἶμα, καὶ οἱ πέπηγοι ξηροὶ χωρὶς
 τῶν πτερῶν. καὶ τῶν ποδῶν, ἃ οἱ τρεσλιθοὶ, δι-
 οἰνομέλιτῶ ἐν τῇ τῆ λατρεῖ θερμῇ διεξαμμένη
 διδοσθῶσιν, ἃ τὰ δι' αὐτῶν σκευάζοντα σω-
 θετε φάρμακα. ἢ τε νεφριτικῆ φέσκα, καὶ τὰ
 πρὸς τῆτο σωθιθέμρα κενδῖτα. καὶ ὁ τρα-
 γλαδύτης διε τῶν ἀγαν ἐπαυνομένων ὑπάρ-
 χει βοηθημάτων. ἐστὶ δὲ σφραγιαν ἀπαύτων τῶν
 ὀρνέων τὸ σμικρότατον. πλεῖν τῆ λογγρομένη
 βασιλίσκη, μικρὸν γὰρ ἐκείνη μόνη μείζον
 ἐστίν, καὶ αἰσοσοικῆς αὐτῶ γρῶαν μετὰ τῆ
 φρου καὶ χλωρῆ, λεπτοσάμφον ἐν τοῖχοις,
 μάλιστ' καὶ φραγμοῖς διαταμνόν. ὁ πτε-
 ροθῆν ὄλον, ἁμὸν τε συνεχῶς ἐσθιόμενον τῆς
 τε γονότας λίθου ἐξερηθῆσαι ποιεῖ καὶ τῆ
 λατρεῖ γεννάσθαι κωλνεῖ. καὶ καυθέντῶ διε,
 τῆτῆ ὄλα σου τοῖς πτεροῖς ζῶντῶ, ἢ τε φρα-
 γμοῖς καθ' ἑαυτῶν τε, καὶ μετὰ πεπερωσῆσθ
 φύλα συμμέτρη δι' ἀκρατομέλιτῶ πνο-
 μῆν, τὸ αὐτῆ πεφυκεν δρῶν. πρὸς δὲ τῶν ὀξυ-
 τητα τῶν ὀδυῶν, καὶ τῶν ἀργυρίων, ἢ πὶ σῶ-
 λείρα, καὶ ἡ φίλωντῶ, ἀγαθὰ φάρμακα. καὶ
 φλεβοτομία διε τῶν ἀλειφθῆσαι, τῶν ὀδυῶν
 πολλὰκις ἐξεκφίσει, ταχέϊαν ἔλιθου πικρῆ
 τῶν ἐκκρῶσιν. πεφυλακτικὰ δὲ τῆς τῶν λί-
 θῶν γενέσεως ἔστω, πρῶτον μὲν, εὐχυμὸς τε καὶ
 σύμμετρητῶ τροφή, καὶ γυμνασία, ὁσπερὶων τε
 παντοίων καὶ τῶν σιτωλῶν τῆς συνεχῆς γρη-
 σῆως. τῶν τε καὶ γαλακτῶ, καὶ τῶν δι' αὐτῆ σκε-
 υάζοντων ὄψων, οἶνον τε μέλαντῶ καὶ κρεῶν
 πηλῆος, καὶ πάντων ἀπολῶς τῆ πικρυχυμῶ.
 δόσχη ἔ τῶν ἀγαν θερμῶν καὶ δριμέων, ὑδρο-
 γάρων φημί καὶ κενδῖτων, ἔ τῶν ὀξυπλησι-
 ὶων. ἔ γὰρ ταῦτα ἔ μόνον τῆς μήπω γονομένης
 λίθου κωλνεῖ συσκέσαι. ἀλλὰ ἔ ἔστω ἡ δὲ γα-
 ρονότας θρύψαι, ἢ ἐκκρίνειν πέφυκε. πινέ-
 τῶσιν δὲ τὸ ὀξυμέλι μετὰ πινῶ τῶν ἀπολῶ
 ῶν διερηπικῶν, ἀδιάντη, σελίνῳ, ἀργεῖστος ἀ-
 φειψήματῶ, καὶ μετὰ βαλανθῶν νήσεισ πρὸ
 τῆ οἶνον ευκράτον ὑδροπινέτωσαν, καὶ τῶ μέσῳ
 τῆ δόσις ψυχρὸν ὑπὲρροφῆτωσαν, εἰ μὴ πικρῶ
 ῶν καὶ πηλῆος τε καὶ κρυμῆς σωμαθ' ἀνὸ μῶροι,
 διε φλεβοτομία, ἢ καθάρσεως κενεθῶσιν.
 πινῶν καὶ λίσσον εἰς πεφυλακτικῶ λίθων, τε
 μετὰ



μετὰ Γαλανίον, πρὶν οἶνον ἢ ἑσπερίης ἐπιπέσει λα-
 βάν, ὕδαρ εὐκρετον πίνειν. καὶ σπυρὶ ἐν κύσει ἢ
 λίθας ἑπιτῶν παιδῶν πῖς ἰσχυρωτέροις κα-
 πρῶσθι βοηθήμασιν ἐκτῶν εἰρημῶν ἐκλέ-
 γων αὐτῶν. ὑπεραυξηθέντος δὲ τῆς λίθης ἢ καὶ
 τὸν τραχηλὸν ἐμφραχθέντος τῆς κύστεως, τῶ
 Διάσεισμων καθετηροσμῶ, ἢ καὶ τῆ λιθοτομῆς
 ὡς ἐν πῖς χειρουργικῶσις εἰρησῆ, χρῆστον.

balneum, priusquam uinum aut alium
 cibum capiant, aquam temperatam
 bibere. Porro uesicæ calculos in pue-
 ris, fortioribus auxilijs conficies, quæ ex
 relatis deliges. Nimium uerò aucto lapide,
 aut etiam juxta uesicæ collum obturato,
 catheteris instrumento, aut etiam lapidis
 extractione utendum est, uelut in Chirurgia
 dicitur.

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Γ Ο

νορροίης.

Κεφάλ. Ε.

Καὶ τῆ ἀτερπέος τῆ πάθεος εἶνε-
 κεν, καὶ τῆ κατὰ σπυρῆξιν κινδυνώδους,
 καὶ τῆς διάδεξιν γένεος χρεῖης, λύειν.
 χρῆμὴ βροχίως τὴν γονόρροϊαν,
 πάντων κακῶν ἔσαν αἰτίω. πρῶτι-
 σα μὲν ὧν ὅπως ρεῦμα κοινὸν ἰηθῆαι
 σύψει τῶ ἀμφὶ τὴν κύστιν καὶ τὴν
 ροιὴν τῶ χρωαίων, καὶ ἐμψύξει ψυ-
 ῶν, λαγόνος, αἰδοίων διδύμων, ὅπως
 μὴ ρεῖ ἐς πολλὸν ἢ γονή. εἶτα αὐθις
 ἀλειψαὶ τὸ παῖ, ἐς τὸ τὰς ἀφόδους
 ξηραίνειν. σύψει μὲν ὧν καὶ τὴν γέξει
 ἔξιον μὲν, τὸ δὲ τὸ οἶος. ξυτὸις λυ-
 μασι. λύπας ἢ τὸ ρόδιον μῦρον, ἢ τὸ
 διατὸ οἶναίθης ξυτὸ οἶνω λουκῶ ἐνώ-
 δεῖ, ἐκ πρῶσαγωγῆς δὲ ἀλεαίμοντα
 λίπας τὸ κοινὸν, καὶ μελίλωτον ἐκζε-
 θέν σὺν αὐτῶ καὶ σάμψυχον καὶ λι-
 βανωτῶν, ἢ κόνυζα, ἀρεισον καὶ αἰθήρα
 κόμη, καὶ ἐπιμαλλον ἢ ῥητῆ. τοῖς ἢ ἐς τὰ
 ἑπιπλάσματᾶ χρεῖο, κριθῶν καὶ ὀρό-
 βων ἀλίτσι καὶ ἐρυαίμα τῆ ἀπέρμα-
 τος καὶ νίτρον. μέλι ἢ ἐς τὴν ἀπάντων
 ξύμπνοιαν καὶ ξυνάφειαν. τοῖα δὲ καὶ
 ἑπιπλάσματᾶ, ὁκόσα φουίσει, καὶ
 ἰόνθους ἐγείρει, καὶ τὸ ρεῦμα παρο-
 χεῖν, καὶ ἀλεαίνει τὴ χρωαία. τριόνθῶ

CURATIO PROFLU-
uij seminis.

Caput V.

Gonorrhæa, id est, feminis proflu-
 uium, quæ malorum omnium causa
 est, haud cunctanter soluenda est, tum
 propter morbi turpitudinem tum
 propter colliquationis periculum,
 tum propter successorum liberorum
 procreationis necessitatem. Ac
 primum quidem, quemadmodum
 communis fluxus, sananda est me-
 dicamentis adstringentibus partes
 uesicæ & fluentibus locis propinquas,
 atque refrigerantibus lumbos, ilia,
 pudenda, testiculos, ne diu genitura
 diffuat. Deinde rursus uniuersum
 corpus calefaciendum, ut excremen-
 ta siccantur. Adstringunt igitur &
 irrigant, ab oue succida lana & un-
 guinosum rosaceum unguentum, aut
 œnanthinum cum albo uino odora-
 to : sed sensim calorem excitando, o-
 leum commune & melilotum cum
 eo seruefactum & sampsuchum, &
 libanotum aut conyza. Optima est
 & anethi coma & multo magis ruta.
 His autem ad cataplasmata utitor,
 ordei & erui farinis & irionis semi-
 nis. Nitrum quoque, mel uerò ad
 omnium conspirationem & con-
 nexionem. Talia etiam sunt cataplas-
 mata, quæcunq; rubefaciunt, & jon-
 thos, id est, postulas cient, & fluxionē
 deriuant & locos tepesciunt. Tale est
 cata-



cataplasma uiride et quod ex lauri fructu conficitur. Callorem quoque frequenter bibendum & de radice halicaccabi, quantum drachma pondo pendet & mentha decoctum. Ex uarijs medicamentis quod ex pipere gemino conficitur, Symphonis item & Philonis antidotum optimum: & quod ex fera, quae linchus appellatur ad portionem paratur pharmacum, & Bystini antidotum, & quod ex serpentibus uiperis conficitur. Vniuersum autem uictus rationi tribuendum: concedendum, & credendum est, exercitationibus, & ambulationibus, & gestationibus. Haec enim habitum ad calorem conuertunt, quo affectui est opus. Quod si temperans sit rerum uenerarum, & frigida laetetur, spes est fore ut homo celerrime uirilem habitum induat.

τὸ χλωρόν Ἰπίπλασμα, καὶ τὸ διὰ τῆ καρπῆ τῆ δάφνης. πιπίσκων ἢ καὶ τῆ κάσσορος συχρόν, καὶ τῆ ρίζης τῆ ἀλικακ καὶ δευκόσον δραχμῆς ὀλίγης, καὶ τῆ ἡδυόσμου τῆ ἔψημα. ποικίλων δὲ τὸ διὰ τῶν δύο πεπερέων, ἢ σύμφωνος, ἢ φίλωνος ἀείσον, καὶ διὰ τῆ σίνχης τῆ θηεία φάρμακον ποτόν καὶ ἢ τῆ ἐστίνε, καὶ ἢ διὰ τῆ ἔχιδῶν τῆ ἔρπετῶ. τὸ ξύμπαν ἢ διαίτη διδόναι, Ἰππτεῖπεν τε καὶ πτεῦν χεῖ καὶ γυμνασίους καὶ ἀειπάτοι καὶ αἰώρησι. τὰ δε γὰρ πῆν ἔξιν ἐς θερμασίην τρέπει ὅπερ ἐστὶ τῶ πάθει χέρος. εἶδε καὶ σώφρων ἔοι Ἰππ τοῖσι ἀφροδίσοισι, καὶ λυοῖτο ψυχρῶ, ἐλπίς ὡς ὠκίσα ἀνδρωθλιῶσαι τὸν ἀθρωπον.

CVRATIO LABORANTIIUM STOMACHI VITIO.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΜΑΧΙΚΩΝ.

Caput VI.

IN alijs morbis post curationem diata ad uires & robur corporis, bona concoctio est: stomachi affectibus laborantibus solis haec uitiosa est. Quonam igitur haec comparetur, dicam. Nam gestationum, deambulationum, exercitationum, declamationum, & alimentorum concoctionem adiuuantium quod satis est, prodest quidem ad debellandum stomachi cibos fastidientis uitium: sed id concoquendi longam imbecillitatem tollere non potest, nec maciem corporis in corpulentiam conuictere: multo uero magis proficiat aegrotantibus, si gratificetur, & pariter omnia faciat, ac cupiditatibus eorum indulgeat medicus in rebus, quae non magnopere laedunt. Est enim id optimum,

Κεφάλ. 5.

Ἦεν τοῖσι ἄλλοισι πάθει μετὰ πῆν θεραπείην διαίτα, ἐς ἰχμὴ καὶ κέρως τῆ σώματος διπεψίη ἀγαθὴ. στομαχικοῖσι ἢ μένοισι ἢ δε γίγνεται πλημελής. ὅπως ὦν αὐτῆ γίγνοιτο φρέσω. ἰκανὴ γὰρ αἰώρη, ἀειπάτοι, γυμνασίη, φωνασίη, τροφαί ἐς πέψιν ἀγαθαί ἀναμαχέσαδς πλεῖτῆ στομαχικακοσίη, ἀδιώατον δὲ τὰ δε καὶ ἀπεψίην λῦσαι μακρὴν, καὶ τῆν ἄκελετὴν πλεῖτῆ σκῆνε ἔυογκον σάρεκας ποιῆσαι. πολλὸν ἢ μέζον ἐπὶ τῆ ἔων ἐσω αἰ τοῖσι κάμνοσι χάρηες καὶ τὸ καθαρῶς ἀπανδραῖ, καὶ τοῖσι ἰπθυμίησι ἐπεαδς τὸν ἰητρον, μὴ μεγάλα βλάπλοντα. ἀείσον γὰρ τὸ δε

Z. ἢ μὴ



ὡ μὴ κάρτα ὠφελόντων ὄρεξις ἤ-
κη. Φάρμακα δ' ὑπότα, χυλοί, ἀψίν-
θιον καὶ νάρδος τὸ μύρον, καὶ ἡ δια-
τῆς ἐπειρῶν καὶ ἐν πέτραις ὁ καρπός.
καὶ ζιγγυβέριος, καὶ πεπέριος, καὶ σεσέ-
λιος. τὰ δὲ πεπλήσια καὶ κατὰ τὴν σέρως
ἐς σύψιν ἐπιθήματα, νάρδοι, μασίχα, αἰ-
λόαι, ἀκακίαι, καὶ μήλων κυδωνίων
ὄχυλός καὶ αὐταὶ δ' τῶν μήλων αἰ-
σάρκες ἀμφιθλασθεῖσαι ἐν φοίνι-
ξι ἐπιθήματα σύφον. ἀτάρ καὶ τὰλλα
ὁκόσα μοι ἐς διαβήτεω γεγράφα)
ἐς δὲ ψεῦ ἀκ. τὰ αὐτὰ γὰρ καὶ ἴσι
δίψ. γίγνε), ὁ δὲ τόν. τὴν σο-
μάχ. ἀδύψον σομαχικοῖσι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΙ- λιακῶν.

Κεφάλ. ζ.

ἢ ἴσται ἀκρίσις. Ἦν τῶν στίων * ἀκρίσις ἡ κοιλίη, *ἢ ἴσται ἀκρίσις.* διαρρέη δ' ἡ τροφή ἀπεπτος * ὡ μὴ καὶ
μηδὲν εἰς τὸν ὄγκον ἀνίη, κοιλιακὸς
ἴσος δὲ κικλήσκοντο. ψύχει μὲν ἐμ-
φύτω τῶν τ' ἐς πέψιν θερμασίης, ἀ-
τνή δὲ τ' ἐς ἀνάδοσιν δυνάμιος. καὶ
ὧν τὴν κοιλίην πρὸς πᾶσι μὲν πόνων
ἀνιέναι, ἠρεμίη, καὶ ἀποσιτή. ὡ δὲ γὰρ
παλινδρομέσαι αἱ δυνάμιες. ὡ δὲ
καὶ πλήθος τῶν ἐν τῷ σωμαχῷ φαν-
τασίη, νήσεσι, ἐμέτεσι καὶ ἐξ ἀφ'
ὑδατος ἢ μελικρήτη. τὴν κοιλίην δ'
σκέπειν καὶ τέγγειν ἐς σύψιν ἐξοι-
σι μὲν τῶν ἐξ οἴου πιναροῖσι. λιπαῖ
δ' ῥοδίνῳ μύρῳ. ἢ τῶν διὰ τὸ οἶνάνθη. ἢ
μηλίῳ. ἀριστον καὶ ἂν δὲ τὴν χοιρῶν, καὶ
ὑποκύστιδι, ἢ ὀμφακίῳ. ἐξ ὧν ἴσι δὲ

nisi rerum ualde iuuantium appeti-
tu moucantur. Medicamenta po-
tui danda sunt, succi, absinthium,
nardinum unguentum, theriaca, pe-
trofelini fructus & zingiberis & pi-
peris & seselios. Hæc ad concoctio-
nem ualent, etiam pectori ad ad-
stringendum imposita, nardi, masti-
chæ, aloæ, acaciæ, & malorum cydo-
niorum succus. Ipsæ quoque ma-
lorum carnes contusæ cum palmulis
epithema est astringens. Quin etiam
alia quæcunque in diabete ad sitis se-
dationem mihi commemorata sunt.
Eadem enim & his & illis sitim pro-
uocant: tametsi stomachicis con-
stitutio stomachi sticulosa mini-
mè fit.

CVRATIO COELIACO-
rum, id est, uentriculo laborantiũ.

Caput VII.

SI uentriculus digerendorum cibo-
rum impotens fuerit, diffluat au-
tem alimentum non coctum, non
mutatum, crudum, nihilque ad
corporis molem transeat, coeliacos
hos appellamus, refrigerato nimi-
rum intus innato calore, quo minus
coquat, & uiribus quæ distribuunt
alimenta debilitatis. Uentriculus igitur
primum quiete & inedia labores
remittat oportet. Ita enim eò uires
recurrunt. Si uerò multitudo eo-
rum quæ stomachus acceperit subesse
uideatur, jejunis, nauseis ex aqua
uel mulla utendum est. Uentricu-
lus autem contegendus, & ut ad-
stringatur, rigandus lanis ab oue suc-
cidis, ac unguinoso rosacco unguento,
aut œnanthino aut melino. Optimum
quoque si & lentiscino, hypocystide, eti-
am aut omphacio. Cum his etiam
cataplas-



Cataplasmata superdentur, ad ta-
ctum quidem calida, sed facultate
acerba, & astringentia. Præterea si
qua in parte jecoris, aut in porta
ventriculi distentiones, inflamma-
tionesque incumbant, cucurbitulam
affigito, & incidito. Ac nonnullis
id solum remedium fatis fuit. Po-
steaquam uerò ceratis uulnera cicat-
rice obducta fuerint, duritiemque
contraxerint, eo bestiolas hirudines
admouetò. Deinde concoctoria epi-
themata imponito: quale est, quod
ex seminibus constat. Si chamæle-
ontis radicem habet, optimum est, &
in quo lauri baccæ permiscantur:
nec non & malagma uiride, quod
uocant, acmeum, quod mysterium,
id est, arcantum, uoco. Nam hæc
mollunt, & uellicant, & calorem ex-
citant, & uiscerum flatus discutunt,
quibus ad constrictionem opus est.
Verum & sinapis & Limnestis, id
est, Adarce, & Euphorbium, & omnia
quotquot ejusmodi sunt, refrigerationem
quidem arcent, calorem autem
reuocant. Ejusmodi quoque
medicamenta astringendi causa pro-
pinanda sunt. Imprimis quidem
plantaginis succus oportunus est ex
aqua myrtis aut cotoneis malis astri-
cta, optimum est & semen acini ui-
nacei ex uua immatura. Deinde &
uentri opitulantiæ medicamenta po-
tabilia quotquot ex zingibere, & pi-
pere, & apij syluestris in saxis nascentis
semine conficiuntur: quod ex
ueris uiperis constat summoperè
coagmentatiuum. Quod si per hæc
nihil aut parum proficiatur, vomitionibus
per raphanos laceffitis utitor. Verum si &
albi ueratri radicem in his per noctem unam
abdideris, ualentissima tibi purgatio

Ἰππλάσματα θερμά μὲν ἐς θί-
ξιν, ἐς δὲ δύναμιν δὲ στυφνὰ. καὶ ἰὼ πη-
τῆ ἥπατος ἢ τῆς κοιλίης κατὰ σῶμα.
ὄντα σῆς, ἢ φλεγμασίαι ἐσοσι, σικκίλω
προσβάλλοντα ὄντα μιν, καὶ ἐστὶ οἷσι
τόδε μῆνον ἤρκεσε. ἐπὶ δὲ κηρωτῆσι
ἐς ὠτειλὴν ἢ κηλὰ πρῶματα, ἢ δὲ ἐπὶ
σκληρῇ κραινῇ, τῇ δὲ ἐδὲ λλας τὰ θη-
ρία προσβάλλειν, ἐπεὶ τὰ Ἰππλήμα-
τα πεπικὰ πθέναι. ὁκοῖον τὸ διὰ τῶν
σπερμάτων ἢ νίχην χαμαιλέοντος ῥί-
ζαν, ἀεισον καὶ ἐνθα οἱ τῆς δάφνης
ἕασι καρποὶ, καὶ τὸ μάλαγμα Ἰππ-
κλήσιν τὸ χλωρόν, καὶ τοῦ μόντο μύ-
σηλον. τὰ δὲ γὰρ μαλάσσει τε καὶ
ἀμύσει, καὶ θερμασίω ἐγείρει, καὶ
ἀφυσάτα σπλάγχνα ποιεῖ ὧν περ
ἐς σύψιν χρέος. ἀτὰρ καὶ σίνηπι καὶ λίμ-
νησι, καὶ εὐφόρβιον, καὶ ὁκόσα τὰ δὲ
πάντα τὴν μὲν ψύξιν κωλύει, ἀνά-
κλησιν δὲ θερμῆς ποιεῖ. τὰ δὲ χεῖν
καὶ πίπσκειν φάρμακα ἐς σύψιν χρέ-
ος μὲν πρῶτα, ὅ ἔστι δόκο γλώσσε
χυλός ξὺν ὕδατι ἐσυμμύω μύρτοι-
σι, ἢ κυδωνίοισι μήλοισι. ἀεισον καὶ
γίγαρτον σαφυλῆς ὀμφακίπιδος,
οἶνοι τῶν κάρτα στυφόντων. ἐπεὶ τὰ δὲ
τὰ ἀλθαινόντα τὴν γαστέρα φάρμα-
κα, ποτὰ ὁκόσα διὰ ζιγγιβέριος καὶ
πεπέριος, καὶ σελίνε ἔκαρπε τῆ ἀ-
γρίε τῆ ἐνπέτριαι, τὸ διὰ τῶν θηρίων
τῶν ἐχιδνῶν πηκτικώτατον. ἢ δὲ ἐπὶ
τοῖσι μηδὲν ἢ σμικρὸν ἐνδιδῶ, τοῖσι
δὲ πρὸ ραφανίδων ἐμέτοισι χρέο. ἰὼ
δὲ καὶ ἐγκρύψης ταῖσδε ἐλ-
λεβόρε τῆ λουκῆ ρίζαν ἐς μίλω
νύκτα, ὅταν ὠτάτη ἀν σοι γένοιτο ἢ
Z 2 καθαροῖς



τοιοσδε

κάθαροι, έστε τλω τω υγρωντων
 ψυχρων καθαριν τε και εκκρυσιν και
 έστλω εξαψιν τε θερμω. αταρ και η
 διατα η ο βιος τωσδε έσω ξυμμε-
 τρα. οι πανοι νυκτωρ μη, δι ημερης
 η πατατοι αναφωνησιες, αιωση η-
 τε εν δαφνησι η σμυρινασι, η θυμω.
 εχει γδ πη διαπνοη η αναπνοη τοι-
 ονδε φαρμακον πεπηλεον. γυμνα-
 σια, τριψιες, χειρονομια, αλθρων
 βολαισι τε θωρηκος, και τ κοιλης
 κοποι παροπισιες. σμικροτατα γδ
 εις τονον βυσαλες αετος. ηπι τωνδε
 φοινηξις, πατατογραθυ *

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Κ Ω-
 λικων.

Κεφαλ. η.

Π. αιγ βιβ γ. κεφ μ γ. τας ιδω εν δια
 ψυχρας πε και γλιχρας και παχεις χυμεις,
 οδωιας ιαοδω παροσηκει, ε θερμαινοντας σφο-
 δρωσ. παρ γαρ των θερμαινοντων ικανωσ χεον-
 τη η πνευματωωπη μαλλον οι τοιστοι χυ-
 μοι. παροσηκει τινω αυτω τεμνειν τε ε πετ-
 ταν, δια των αφυσων, η λεπυωνων και η η-
 ρων. φαρμακων, χωρις ε θερμαινειν σφοδρωσ,
 κατ δεχαις ε νοσηματος, παροσηκει πεωσαντας
 εν τω ραστρα τοις αρμοδιοις κλυσμασι, εν-
 πον ελαιω εν ω εναφειηται, κυμινον η πηρα-
 νον μετα σεατ @ χηνωσ η ορνιθωσ, η δια ριζων
 σικυσ αρεις αφειηματος η σμυρνησ L. a. ε
 μελιτωσ, ε ελαιωσ, η δια σμυρνησ ε μελιτωσ η ε
 σικυωνις ελαιωσ, ε τω ελαιω δε τω κωνω πλ-
 λαιωσ ενεθεν π σωκερβεν υαλωδεσ φλεγ-
 μα. παρ χρημα τλω οδωιωσ επαυσειν. ει η δια
 το σφοδρον της οδωιωσ ε το ενεμα κατεχοιεν,
 βαλανιςτον αυτω δια μελιτωσ, κυμινωσ, νι-
 τρωσ, πηρανωσ απερατωσ η ηρα κραμυησ καυλω
 καλωσ εξεσρωω η αλμη εμφοραχενπ. η πιφ-
 ρα κραμυησ μελιπ φουραθειση, η κωλοκυθιδι
 λεια σω μελιπ η νιτρω η κυμινω. τα δε βα-
 λανια δακτυλων εσω σ. οπωσ παροσηκειση

successerit, per quam & frigidi hu-
 mores purgabuntur, & excernun-
 tur, calor autem accendetur. At ui-
 dus quoque ratio, uitaque ipsa hac
 moderatione ducatur, noctu dor-
 miatur, interdium ambuletur, uox e-
 xerceatur. Gestatio aut inter lau-
 ros, aut inter myrtos, aut inter thy-
 mum fiat. Siquidem perspiratio,
 atque spiratio medicamentum quod-
 dam coctionem adiuuans secum ha-
 bet. Exercitamenta adhibeantur,
 frictions, alterum iactibus manuum
 iactione, pectoris ac uentris labo-
 res, praebitiones. Nam minimè
 promptus ad robur addendum panis
 est. Ad hæc ruboris per medica-
 menta excitatio. Deambulationes
 lentæ.

C V R A T I O C O L I-
 corum.

Caput VIII.

Paulus Aegineta lib. 3. cap. 43. Dolores
 igitur ob frigidos & uiscosos ac crassos
 humores sanare conuenit, non uehemen-
 ter calefaciendo, nam a calefacientibus
 multum diffunduntur, & magis inflantur
 tales humores. Conuenit igitur ipsos se-
 care ac concoquere per ea quæ status discu-
 tiunt, & attenuant ac siccant, citra uehemen-
 tem caliditatem, ab initio morbi. Stercori-
 hus igitur ex uentre per conuenientia in-
 fusa prius eductis, infundendum est oleum in
 quo coctum est cuminum aut ruta cum
 adipe anserino, aut gallinaceo aut radicum,
 cucumeris syluestris decoctum cum myrrhæ
 drach. una, & melle ac oleo. Sed & oleo sa-
 pe communi infuso, pituita uitrea coexcreta
 statim dolorem sedauit. Si uerò ob dolo-
 ris uehementiam, etiam infusum retineant,
 glandula indatur ex melle, cumino, nitro,
 rutæ semine sicco. aut brassicæ caulis probè
 derafus & muria maceratus, aut brassicæ
 cinis melle subactus aut colocynthis trita
 cum melle & nitro aut cumino. Sine autè glan-
 dulæ digitorum sex, quod musculû adstrictoriû
 transgre-



transgrediantur. Illinatur etiam sedes cy-
clamini succo, cum melle & nitro, aut
centaurio cum melle & nitro. Dolore per-
secuerante, supra relata infundatur resinæ
terebinthinæ uncia una, aut opopanacis
drach. una, aut galbani drach. quatuor, bi-
tuminis tantundem, cum nitri drachma una
& aquæ uncia una, & olei rutacei quincun-
te, aut amplius. Irrigationes autem partibus
dolentibus adhibeantur ex oleo rutaceo,
aut anethino, aut sicyonio. Cataplasma sit
ex medicamento trisperno, cum cumino,
baccis lauri, apij semine. Epithemata sint
& quod ex seminibus constat, & quod ex
baccis lauri, & quod ex meliloto paratur, &
polyarchium: insideant autem in decocto
scenigræci, althææ, chamæmeli, artemisiæ,
anethi, lauri & similium. Sed & in oleum
calidum, aut aquam & oleum demittendi
sunt. Potiones sint absinthium & cuminum
æquis portionibus: aut panax cum aqua aut ca-
storium & anisum, aut piperis drach. una
cum aceto mulso. Dolore uerò non remit-
tente, medicamentum ex tribus piperis ge-
neribus bibendum detur, aut theriac: Sed &
sinapismo & dropace utendum est, in remis-
sionibus & balneis naturalibus. A balneis
autem aquæ potabilis abstineant, nisi ob do-
loris afflictionem cogantur, quando sanè præ
immissio aliquo ex relatis medicamentis la-
uare oportet, & jubere ut calorem admittant
intra feruidos parietes, insperfis quibusdam
nitrosis sinigmati. Si uerò dolor uehemens
est, etiam moderatè mitigantibus utendum
est: uelut est pastillus ex castorio, tum infusus
tum potus, & medicamenta eiusdem generis.
Nam uehementia stupefactoria uitanda sunt
ut quæ ad breue quidem tempus mitigent,
diuturniorem autem affectionem faciant, cæ-
quod materiam crasse faciunt & intestini me-
atus densant. Attenuata uerò jam pituita per
hieram, amarâ ipsos purgamus, aut per
hæc catapota: Aloes, euphorbij, grani cnidij
puri, scammoniz singulorum æquales partes.
Dantur huic scrupuli duo. Victus autem cali-
or & siccior his conuenit, ut qui ab initio à ci-
bo abstinent, postea uerò etiam acrium esum
assumunt. Porrum igitur his dandum est co-
ctum cum condito, & apium, & asparagus pa-
lustris, allium crudum, maximè ijs qui hæc non
molestè admittunt: & ipsum conditum
bibant, & panem ex ipso accipiant. Pos-
tea uerò etiam reliqui boni succi &

τὸν σφιγκτικῶν, διαχρεῖεν πλὴν ὕδατος, κωπ-
λαμίνης χυλῶ σὺ μέλιτι καὶ νίτρο, ἢ κενταυ-
ρίῳ σὺ μέλιτι καὶ νίτρο. ἔνεμα δὲ τῆς ὀδύ-
νης ὀπιπρόσθετος πρὸς τοὺς εἰρημνῶν ἔσω. ῥηθί-
νης πρεβινθίνης Γο. α. ἢ ὀποπάνακος L. α. ἢ
χαλβάνης L. δ. ἀσφάλτης τὸ ἴσον μετὰ νίτρο
L. α. καὶ ὕδατος Γο. α. καὶ ἐλαίου πηρανίνης Γο.
ε. ἢ πλεόν. ἐμβροχῶς δὲ κατὰ τῶν ἀγούτων
ὀπιπλητίον, διὰ κυμίνης, ἢ ἀνηθίνης, ἢ σικυωνίης
ἐλαίου. καταπλαστῶν δὲ τῶν τριπάρτων μετὰ
κυμίνης, διαφνίδων. σελίνης ἀπέρματος. ὀπιπθέ-
ματα δὲ, τὸ, πὲ διὰ ἀπέρματος ἔσω, καὶ τὸ διὰ
διαφνίδων, τὸ, πὲ διὰ μελιλάτων καὶ το πολυάρ-
χιον. ἐγκαθίστην δὲ αὐτῶν ἐν ἀφειψήματι
πήλεως, ἀλθαίας, χαμαιμήλων, δερμίσιας,
αιθήθων, διάφνης, καὶ τῶν ὀξυαπολησίων. καὶ εἰς
ἐλαίον δὲ θερμὸν ἢ ὑδρέλαιον αὐτῶν ἐμβιβα-
στῶν, ποτῆματα δὲ, ἀψίνθιον καὶ κύμινον ἴσον,
ἢ πάνακα μετ' ὕδατος. ἢ καστορέϊα, καὶ ἀνήσκα.
καὶ πεπέρων L. α. μετ' ὄξυμέλιτος, μὴ ἐν δρι-
μύσει δὲ τῆς ὀδύνης, ποτῆζειν αὐτῶν τῇ διὰ
τριῶν πεπέρων. ἢ τῇ θηριακῇ. καὶ σωματισμῶ
δὲ ἐδρόπακι χρεῖσθαι ἐν ταῖς ἀνάεσσι, καὶ αὐτο-
φυέσι λυγροῖς, τῶν δὲ δι' ὕδατος ποτῆμα λυ-
γρῶν ἀπεχέδωσαν. πλὴν εἰ μὴ διὰ τὴν πεί-
ρασιν τῆς ὀδύνης ἀναγκάζονται. ἡνίκα δὲ
παρασύνετες αὐτῶν πνί τῶν εἰρημνῶν φαρ-
μάκων, λένει καὶ περὶ αὐτῶν κελύειν ἐν ταῖς
διὰ πύροις πύχοις, ἐμπαιτιομῶν πνὰ τῶν νε-
κρωδῶν συνηγμάτων. ἰσχυρῶς δὲ τῆς ὀδύνης
ἔσης, καὶ τοῖς μετρίως ὀξυαπολησίμοις, χρεῖσθαι
ον. οἷός ἐστιν. ὅ, πὲ διὰ ἔκαστορ καστορέϊα ἐπι-
μῶν πὲ καὶ πνόμεν. καὶ τὰ τέσσαρις ὁμογενῆ
φάρμακα, τὰ γὰρ ἰσχυρὰ τῶν ναρκωτικῶν φυ-
λακτίον. πρὸς ὀλίγον μὲν ὀξυαπολησίμοις,
χρονιωτέρων ἢ πλὴν διὰ θεσιν ἐργαζομένων, τῶν
παχυῶν πλὴν ὕδατος, καὶ τῶν πικρῶν ἔκ τῆς
πύρας, ἢ δὲ ἢ λεπτιωθέντος ἔκ φλεγματος. κα-
θάρω μὲν αὐτῶν διὰ τῆς ἰσχύος πικρῶν, ἢ
τῶν καταποτίων τῶν. ἀλοῆς, εὐφορβίας, κνι-
δίας, κέκκη καθαρῶ. σκαμμωνίας τῶν ἴσων. ἢ δρι-
μισ Γο. ε. διαίτα ἢ θερμότηρα πὲ καὶ ξηρότητα ἰ-
στῆς ἀρμόσθ. κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτῶσιν. ἐπὶ τῆ
καὶ δριμυφαγῶσιν. παρασύνετον αὐτοῖς δοτῆ
ἐφθὰ μετὰ κωνδίτη καὶ σελίνα, ἔκ τῶν ἐλθόντων ἀσπ-
ραγον, ὡμὰ σκόρδα, καὶ μάλιστα πῆς μὴ πρὸς
πύρα δύσχεραίνουσιν. καὶ αὐτῶν δὲ ἔκ κωνδίτη πνί-
τῶσιν. καὶ ἀρτα σὺ αὐτῶ λαμβανέτωσαν. εἰς
ὑπερον δὲ καὶ πῆς λοιπῆς δύχμης πὲ καὶ



ὡς πηλίκαι αὐτοῖς δοτιόν τροφάς. Φυλαττομένης
 πλησμονῆ τε ἑσπερίας. Εἰ δὲ πνεῦμα φυ-
 σῶδες εἴη, τὸ πλὴν ὀδυῶν ἐργαζομένη, μετὰ τῶν
 ἀφουσι τῶν ἐνεμάτων τε ἑσπερίας, καὶ σικυά
 ὡς μέγιστα διὰ πυροὺς κολληθῆσαι καὶ φαι καθ'
 ὅλα ἑπιγραφίς πολλὰκις ἤρκεσαν πρὸς θερα-
 πείαν. Φλεγμονῆς δὲ καὶ τὸ ἐν πρὸν ἔσσης, Φλε-
 γοπομήσωμεν ἀπ' ἀγκῶν. εἰ δὲ τῆς δυσ-
 ρείας ἑπιπράτῃ, καὶ πλὴν ἐν τῷ σφυρῷ τήνωμεν,
 καὶ τοῖς εἰρημνοῖς χρῆσώμεθα βοηθήμασι, πλὴν
 τῶν δριμύων ἑ τῶν καθαρόντων ἰαχυράς. τοῖς
 δὲ πρᾶν ἔσσης μᾶλλον ἐνεμασι τε καὶ καὶ πάλαι-
 μασι ἑπιπράτῃ, καὶ τῆς εἰς ἐλαίον ἐμβάσει,
 χρῆσώμεθα, σικυάς τε καὶ τῶν πρὸς ἐλάω-
 μιν κηρωτῶν τε κατὰ τῆς ἑπιπράτῃς θήσωμεν ἑ-
 χασαν κηρῶ Γο. ε. χαμομηλίνας Γο. ε. ροδίνας
 Γο. ε. φαβατῖνας ἀλβύρας Γο. δ. κροκά ὠν ε.
 καὶ λινοσπέρμα λεῖα. λεπτιῶς τε καὶ πυρεκτικῶς
 αὐτὰς διατῶμεν, ἀλλοιῶς Φλεγμονῆς. εἰ
 δὲ διὰ δριμύς καὶ δακνῶδες ὀδυῶνται χυμῶς,
 ἔσσης αὐτὰς ἐλαίω, ἐν ᾧ ἀφῆψηται τήλις ἢ
 αἰλθαία σὺν ἀπαλῶ ἑσπερίας νεαρῶ χλωδῶ, ἢ ὄρνι-
 θος, ἢ καὶ χυλῶ πησάνης σὺν ροδίω. ἢ ἑ χυλῶ
 λινοσπέρμα. ποτῆρον τε αὐτῶν πλὴν διὰ τῆς ἀ-
 λῶς πικρῶν αὐτῶν. λεπτῶς τε χρῆσῶν διὰ
 γλυκέων ὕδατων. ἑ τρῶφάς βοφηματοῦσιν,
 ἐκ χόνδρος ἢ πησάνης, χρῆσῶν, ἰχθύων τε τοῖς
 πετρεαίοις. ἑ τὸ σὺμπαν ἀπὸ τῆς διαίτης ὑ-
 γρότερον ἔσσης ἑ ψυχρότερον. ἀπέχεσθαι δὲ τῶν
 δριμύων ἀπάντων ἐδεσμάτων τε ἑ φαρμάκων,
 καὶ τῆς δι' ἐμβροχῶν τε ἑ καὶ πλάσμάτων πυρί-
 ας, οἷνας τε πρῶτος, ἑ μάλιστα παλαιῖς. ἑπιπρά-
 τῆς ἢ τῆς ὀδυῶς, ἑ τοῖς πλὴν αἰσθησιν νερκε-
 σι, χρῆσῶν. ἑ λάπει γὰρ ἤμισυ τῶν ἄλλων πρὸς
 ποιῶντας διὰ θείας, παχύνοντα ἑ μετρίως ἐμ-
 ψύχοντα σὺν λεπτιῶς ἑ δακνῶδες χυμῶς.
 Οἷμαι δὲ καὶ πλὴν νυῖ ἑπιπράτῃσι καὶ κελῶ
 διὰ θεσιν, ἑ τῶν τοῖς γενεῶς χυμοῖς, χρῆσῶμε-
 να ἢ ἑ πᾶθος, ἀπὸ τῶν κατὰ πλὴν ἰταλίαν χω-
 ρίων, καὶ ἐν ἄλλοις ἢ πολλοῖς τῆς τῶν Ῥωμαί-
 ων πολιτείας φοιτήσαντες τόποις, κατὰ λοιμῶ-
 κλῶ πνᾶ μεταδοσιν. ἐφ' ᾧ πολλοῖς μὲν εἰς ἑπι-
 ληψίαν, ἐπέροις ἢ εἰς ὄραλυσιν τῶν κῶλων,
 σαζομένης τῆς αἰσθησεως. ποτῆ δὲ καὶ εἰς ἀμ-
 φότερα γέγονεν ἀποσκηψίς. καὶ τῶν μὲν
 εἰς ἑπιληψίαν μεταπέσσαντων, εἰ πλείους
 ἀπέθανον. τῶν δὲ εἰς ὄραλυσιν, οἱ πλείους
 ἐσώθησαν, ὡς ἐν κείνῃ μεταστάσει τῆς
 αἰτίας. σὺν οὖν ἔσσης νοσησῶντας ἰατροῦς πρὸ

concoctu faciles cibi ipsis dantur, ita ut ui-
 tent repletionem & cruditatem. At si fue-
 rit spiritus flatuosus, qui dolorem efficit,
 post infusa & potiones flatus discutientes
 etiam cucurbitæ maximæ leues, ignitæ, per
 totum superiorem uentrem affixæ, ad cura-
 tionem sæpe suffecerunt. Si uerò inflam-
 matio in intestino sit, uenam in cubiti fle-
 xura secabimus, & si urinæ difficultas in-
 ualescat, etiam eam quæ ad malleolum est
 secabimus, & relatis auxilijs utemur, ex-
 ceptis acerbis ac uehementer purgantibus.
 Verùm mitigantibus magis infusis & cata-
 plasmatis & irrigationibus, & demissione
 in oleum utemur, cucurbitasque etiam his
 affigemus. Ceratum quoque superioxiuen-
 tri imponemus, quod habet ceræ quincun-
 cem, olei chamæmelini sextantem, rosacei
 sextantem, fatinæ fabacæ uncia dimidium,
 uitellos ouorum quinque cum succo semi-
 nis lini trito. Victum autem tenuem &
 febricitantium ipsis constituimus, usque ad
 inflammationis solutionem. Quod si ob
 acres & mordaces doleant humores, in-
 fundatur ipsis oleum, in quo coctum est scæ-
 num græcum aut althæa cum simplici adipe
 recenti anseris aut gallinæ, aut etiam ptisanæ
 succus cum rosaceo aut succus seminis lini.
 Detur ipsis in potu amara ex aloë antidotus:
 & balneis utantur aquarum dulcium: & cibis
 forbilibus, ex alica aut ptisana, piscibusque
 petrosifis. Et in summa totus uictus humidior
 sit ac frigidior. Abstineant autem ab acti-
 bus omnibus edulij ac pharmacis, & ab irri-
 gationum & cataplasmatum fomento, ui-
 ni que potu, & præsertim ueteris. Inuale-
 cente uerò dolore, etiam sensum stupefacien-
 tibus, utendum est. Minimè enim præ-
 alijs has affectiones lædunt, ut quæ tenues &
 mordaces humores crassifaciant, & mode-
 ratè perfrigerent. Postquam arbitror etiam eam
 quæ nunc inualuit colicam affectionem, ex talibus
 humoribus generatam esse, quæ ab Italiæ
 quidem regionibus, initium cepit. Sed & in
 alijs multis Romanæ reipub. locis grassata est,
 pestilenti quadam distributione: in qua ple-
 risque ad morbum comitalem, alijs ad artu-
 um resolutionem, seruato sensu, quibusdam
 ad ambo, delapsus contigit. Et qui quidem
 ad comitalem delapsi sunt, plerique periē-
 runt: qui uerò ad resolutionem, plerique ser-
 uati sunt, uelut in iudicatione causa trans-
 lata. Sic igitur ægrotantes Medicus quidam



quidam in Italia curavit, incredibili quodam ac temeratio frige-factorio uictu constituto. Lactucas enim ipsis exhibebat non coctas, frigefaciens ipsas, intybaque similiter supra satietatem edenda, unas item & mala & pisces durae carnis, omniaque testa intacta, & pedes bubulos & bulbos & similia : non solum potentia, sed & tactu frigida. Vinum uerò raro, aliquando tamen dabit, & frigida aqua miscebatur. Sed & frigidam aquam aut etiam poscam frigidam dabit, ab omni alio calido ac medio cibo abstinens : & plurimos hoc modo praeter omnem opinionem sanavit, & ex his aliquos qui iam ad comitialem aut resolutionem delabi coepissent.

κατὰ τὴν ἰταλίαν ἐθεράπευσεν, ἀπίστῳ πινυ ψυκτικῶ ὀπίσηθίαισι καὶ πληροτέραν τὴν διαίτην. θρυδακίνας τε γὰρ αὐτοῖς παρέχεν ἀνεφθες, ψυχρῶν αὐτὰς, ἴντυβα τε ὁμοίως ὑπερ κέρον ἐδίειν, σαφυλάς τε καὶ μηλά, καὶ τῶν ἰχθύων σὺν σκληροσάρκας, πῆτε ὄσρα κὸ δερμα πάντα, καὶ πόδας βοῶν, βολβός τε καὶ πὰ ὤσρα πλῆσια. εἰ μόνον τῆ διωάμει, ἀλλὰ καὶ τῆ θίξιει ψυχρῶ. οἷα δὲ πικρῶς μὴ, ὅτε ἢ παρέχεν, ὑδάτι ψυχρῶ ἔτο σίονα. καὶ ἢ ψυχρὸν ἢ ὑδρα ἢ καὶ ὄξυκρατον ψυχρὸν ἐδίει, πῆσις ἐτέραις θερμῆς τε καὶ μέσης ἀπέχων προσφῆς, καὶ πλεῖς ἐς ἄνω καὶ ἢ ὄξυδοξον ἐξάσαι, ἢ πῆς εἰς ὀπίσηθίαιν ἢ ὄξυλουσιν ἢ δὴ πινάς ἀρχαμύνας μεταπιώσεως.

CURATIO DYSEN-
teriae.

Caput IX.

P. Aegin. lib. 3. cap. 42. Dysenteria est exulceratio intestinorum, quandoque ex renescimi transmutatione, aut alicuius exrelatis alui exturbationibus ortum habens: quandoque uerò ipsa affectionem auspicatur, & in ipsa excretionibus fiunt: primum biliosa, uaria: deinde pro ratione cruentae, & ad finem saniosae, quales à mortuis corporibus defluere solent. Quae uerò ab atrabile initium sumit dysenteria, lethalis est, cum exulceratione cancrum indicans. Si igitur ulcerationis signa stercorei admixta excernantur cum doloribus ac torminibus, in tenuibus intestinis ulcerationem esse scito, quae auxilijs per os acceptis maximè opus habet. Si uerò sine mixtura stercus exeat, crassum est intestinorum ulceratio, quae infusis per clysterem magis cedit. Quum uerò multi sanguinis per se excretio contingit, affectionem ipsam sanguinolentam dysenteriam uocant. Excernitur tamen quandoque sanguis nigrior quam pro natura sua & splendidus, hepate non potè concoquente alimētum quod distribuitur, quin & ob debilitatem eccentricis, aut alectaticis ipsius factulatis, excernuntur per uentrem similia carnium recens mactatarum lotura. Hepaticam hanc uocant dysenteriam, quae uerò si sit in tenuibus intestinis, ubi sit...

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥ-
SENTEΡΕΙΑΣ.
Κεφάλ. θ.

Π. Aeg. lib. 3. cap. 42. Ηδυσεντερία ἐλκώσις ἐστὶν τῶν ἐντέρων, ποτὲ μὲν ἐκ μεταπιώσεως πικρῶ, ἢ τῶν εἰρημῶν τῆς γαστρὸς ἐκταραχῆων τινὸς γινομένη. ποτὲ δὲ ἔσται πῆσις αὐτῆ καταρροϊκή, ἐφ' ἧς δότωκρίσεις γίνονται. πρῶτον χολαίται, ποικίλαι, εἶτα πρὸς λόγον αἰματώδεις, ἢ δὴ τέλει ἰχωροειδείς, ὅπῃσιν ἀπὸ τῶν νεκρῶν εἰώθεσι ρεῖν σωμαμάτων. ἢ δὴ ἀπὸ χολῆς μελαίνης δρχαμύνη δυσεντερία θανάσιμος ἐστὶν, ἢ μετ' ἐλκώσεως δηλοῖται καρκῖνον. εἰ μὲν οὖν ἀσμεμιγμῶνα τῆ κόπρω τὰ τῆς ἐλκώσεως ἐκκρίνοιντο σημεῖα, μετὰ πόνων τε καὶ σρόφων, ἐν πῆσι λεπτοῖς ἐντέροις γίνωσκται τὴν ἐλκωσιν, τῶν ἀπὸ σίματ' ἀμάλισσα βοηθημάτων χρῆξασαν. εἰ δὲ αἱμωγῆς ἢ κόπρω διεξέρχεται, τῶν παχέων ἐστὶν ἐντέρων, πῆσι ἐνέμασι μάλλον πειθαμένη. ὅταν δὲ πικρῶ κατὰ μόνος ἐκκρίσις αἰματ' ἢ γένεται, ἢ πῆσι αἱματηρῶν δυσεντερία λέγεται. ἐκκρίνεται μὲν ποτὲ καὶ αἷμα μελαίντερον ἢ κατὰ φύσιν καὶ σροπὸν, μὴ πέπλον τ' ἀλλὰ καλῶς τὰ ἥπατ' ἐλκωσιν ἀναδιδομένη προσφῆ, καὶ δι' ἀσπίαι δὴ τῆς κατεκτικῆς ἢ τῆς ἀλλοιωτικῆς αὐτῆ διωάμειως πλεῖστα ἐκκρίνεται. ἀπὸ γαστρὸς ὅμοια κρέων νεοσφάγων δασοπύματα. ἠπατηρῶν δὲ πάντων καλοῦσιν δυσεντερίαν, κατὰ τὴν ἀρχαμύνην μεταπιώσεως.



ωει ης εν τῷ ωει ηπατ ① λεχθήσεται λόγως
 κοινῶς ὡς ἐν τοῖς ὄπτι κοιλιακῶν τε καὶ τῶν
 ἄλλων τῶν Φύσιν ἐκκρίσεων ἐρημιόμοις χρη-
 σίον. ἰδίως δὲ λημνία σφραγίς. Ἐπιὴ δὲ
 νιμοδρίων ἰατρῶν δυσεντερίας πνοιδρή τε καὶ
 ἐπιεμὴν περαποκλυθέντ ②. Ἐντέριον με-
 λικράτω προπρον, κάπειτα ἄλμη. καὶ ἀνδράχ-
 νης χυλός. ὅπτι ἡδεις δυσεντερικῶς πνοιδρῶς.
 καὶ αὐτὴ ἢ ἀνδράχνη ἐφθὴ ἐν ὄξυκράτῳ ἐσ-
 θιωμένη. ἀρμύνη δὲ ἐ δένυγλωσσον. καὶ
 βάτα καρπῶν καὶ τὰ φύλλα. καὶ ἀλθαίας τῆς
 ῥίζης τὸ ἀφείψημα. ἵππωνεις δι' ὕδατ ③, ἢ
 εἰς πνοιδρῆ. καὶ ὁ χῶ. αὐτῆς. μορίας ἄωρ ④
 ὁ καρπὸς ξηραυθεις. καὶ τέτα μάλλον. τὰ βᾶ-
 πνα μόρια ὁμοίως ξηραυθέντα. ξηραυθὴ δὲ τὰ
 κατὰ πλὴν κοιλιαν ῥόματα, καὶ ὡς δι' ὄξυς
 εἰψηθέντα καὶ βραυθέντα. βέλπον δὲ εἰ μίξας
 αὐτῆς πνα τῷ πρὸς δυσεντερίαν παγλώσις,
 καὶ διὸς φαγῆν. χρησιμώτατον δὲ εἰς πρὸς τῶ-
 ν ομφάκι, ῥῆς ἐρυθρῶς, καὶ ὄχυλός αὐτῆ,
 σίδικα, κηκίς, γιγαρτα, μίσιπια, μύρτα, κρέ-
 νια, κοχλιῶν ὄλων ὄπτι θέντων ἢ πέφρα. σῶ-
 θετον δὲ τῶν, τῆς τῶν κοχλιῶν πέφρας μὲ δ.
 κηκίδ ⑤ μ. β. πεπέρως μέρ ⑥ α. χροῶδεις
 ποιήσας τοῖς ὄψοις ὄπτι πᾶσι, ἢ ἐν ὕδατι ἢ εἰ-
 νῷ λῶκῶ ὕδαρῆ διδῶ πίνειν. ἡμναίως ὡφελῆ
 δυσεντερικῶς, ὅσις ἐδὲ πω σηπεδονῶδεις
 ἔλκος γέρονεν. καὶ ἢ τῶν ὄσι φαγησίντων δὲ
 κωυῶν κῶπρος ξηρῶ, σῶ γάλακτι πτυρωμένῳ
 διὰ τῆς τῶν καχλήκων καθίστως, πνοιδρῆ,
 μεγαλῶς ὀνήσιον. σῶθετα δὲ ὁ, τῆ διὰ τῆς αἰ-
 γυπίας ἀκαυθης προχίσκος. εἰ καὶ ὁ Φιλίππου.
 καὶ ὁ διὰ ἔλαφίς κέρστος ὁ, τῆ διὰ σπερμά-
 των. καὶ ὁ τρέγανος, καὶ τὰ διὰ ἔ μακρῶς κα-
 ταπέτα θαυμασὰ καλλίστες δὲ ἐ ἔτ ⑦. ὄπις,
 κρόκω, λυκίω ἰνδικῶ, ἀκακίας, ῥῶς, λιβάνω,
 κηκίδ ⑧, ἔσοκουσίδος, σιδίων, σμύρνης, ἀλόης,
 ἴσπ. ὕδατι διδῶ τρώβωλον. Ἄλλο. ῥῶς L. η.
 κηκίδος, σιδίων ἀνά L. δ. διδῶ κοχλιῶρον ὠ.
 οἶνω. Ἄλλο. ῥῶς L. η. κηκίδος, ἀκακίας, κῶμ-
 μίως ἀνά L. β. ὄπις L. α. διδῶ L. α. ἐν οἶνω
 κεκρασμένῳ ἐκλειγμάτῳ αὐτῆς ἀρμύνη ἔπ.
 μύρτων μελανῶν ξ. α. ῥῆ συρακῶ ξ. α. Φοι-
 νικῶν θεβαϊκῶν λι. β. μήλων κωδωνίων τῶν
 σιρκῶν λι. α. ροίας ὄξείας σῶ τῆς κελύφοις
 ὁ οἶνω φρυφόντος ξ. ι. β. εἴς ἔως τῆ τρίτην
 λειφθῆ καὶ διηθίως ἐμβαλε μέλιτος λι. γ. Ἐ-
 ψήσας ἔως πάχως διδῶ ἐκλείχειν. δῆλον ἢ, ὅτι
 καὶ καταπλάσματα διὰ τῶν συνηκῶν ἔσπ.
 τῶν ὡν πλὴν ὕλων ἔχεις. ἐνέματα δὲ τῆς

de qua in sermone de hepate dicitur. In
 communi igitur ijs quæ ad cæliacos & alias
 præter naturam excretiones relata sunt, uten-
 dum est : priuatim uerò Lemnium sigillum,
 etiam depascendo proserpentem iam dysen-
 teriam sanat & potum & per clysterē infusum,
 intestino prius per aquam mulsam eloto, de-
 inde per muriam : & portulacæ succus
 commodus est dysentericis potus : & ipsa
 portulaca cocta in posca, comesta. Conue-
 nit etiam plantago, & rubi fructus ac folia
 & radis althææ decoctum, hippuris ex aqua
 aut uino pota, & succus ipsius, mori imma-
 turus fructus siccatus : & hoc magis rubi mo-
 ra similiter siccata. Siccant etiam fluxiones
 per aluum oua aceto cocta & comesta : melius
 autem est si miscueris ipsis aliqua ad dysente-
 riam commoda, & in sartagine fricta ad
 edendum dederis. Vtilissimum est adhæc
 Omphacium, thus ruber, & succus ipsius, ma-
 licorium, galla, uinacea, mespila, myrti bacca,
 corna, cochlearum integrarum ustarum
 cinis. Compositum uerò hoc : cochlearum
 cineris partes quatuor, gallarum partes
 duas, piperis partem unam : in puluillum
 redacta obsonijs inspergito, aut in aqua aut
 uino albo bibenda dato. Generosè hoc au-
 xiliatur dysentericis quibus nondum putre-
 dinosum factum est ulcus : sed & canum qui
 ossa comederunt sterces siccum, cum lacte
 per candentes silices immixtos feruesfacto
 potum, magnopere prodest. Composita
 uerò pastillus ex spina Ægyptia, & Philippi
 pastillus, & qui fit ex cornu ceruino, & qui
 ex seminibus, & trigonus : & ex macere cata-
 potia admiranda sunt. Optimus est & hic,
 opij, croci, licij Indici, acaciæ, rhois, thuris,
 gallæ, hypocystidis, malicorij, myrrhæ, aloes :
 singulorum æquales portiones aqua excipe,
 & obolos tres præbe. Aliud. Rhois drach.
 8. gallæ malicorij, singulorum drach. quatuor,
 dato cochlearium unum ex uino. Aliud.
 Rhois drach. 8. gallæ, acaciæ, gummi, singu-
 lorum drach. 2. opij drach. 1. dato drach. unā
 in uino diluto. Eclegma uerò ipsis conuenit
 hoc : Myrti nigrae baccarum sextarius
 unus, rhois syriaci sextarius unus,
 palmularum Thebaicarum lib. duz, carnis
 malorum Cydoniorum libra una, mala Pu-
 nica acida cum ipsis corticibus decem. Vini
 astringentis sextarios duodecim, coquito ad
 tertias, & excolato, ac inijcito mellis lib. sex
 & ad spissitudinem coquito, ac delingenda
 dato. Manifestum uerò est quod etiam
 cataplasmata ex astringentibus erunt, quorum
 materiam habes. Infusa autem per clysterem
 dysente-



dysentericis commodant, propter tenesmos uexantes, succus oryzae, aut alicae, aut alicuius huiusmodi, cum adipe caprino aut hircino & quae in capite de tenesimo relata sunt. Si uero sanguis destillat, infundatur succus polygoni, aut plantaginis cum acacia aut hypocythide, aut tali quopiam. At si res urgeat, etiam ex sanguine sistentibus aliquod infundatur: uelut est cinis lanarum succidarum, aut spongia noua, picce liquida, aut sanguine bubulo, aut alumine liquido, aut stercoris asinini succo imbuta & usta. Sed & Andronis pastillus bonum medicamentum est, & Musae inscriptus, & consimiles. Sed & subdititia collyria, ex efficacissimis existant, maximè in quibus etiam dolores circa excretionem fiunt. Ulcere uero depalcente circa intestina consistente, quod & factore & putredine eorum quae excernuntur cognoscimus, & quoddam non statim ab initio, sed post tempus fiat, crustam inducentibus infusis utemur: uelut sunt pastilli Faustini appellati & qui ex charta fit & Bythinus, & Thronius & qui ex subere patatur, per lenticulae aut alicuius ex adstringentibus decoctum per clysterem infusi. Sed & hoc infusum ex ijs est quorum multam experientiam feci. Omphacitidis uista (est autem cauum illud ex quo quercina glans enascitur, quo coriarij utuntur) auri pigmenti, symphyti, Rhois syriaci, singulorum aequales portiones. De his contulsis cochlearia duo excipe succo oryzae, aut succo anchusae, quae spinosum & latum ac nigrum folium habet, quam charospelethron, id est iugerum porcinum uocant: & candido quorum: ita ut de singulis ex aquo sextantem aut quadrantem accipias: & per clysterem immitte. Epithemata uero faciunt quae ad coeliacos relata sunt. Sed & uentris illitiones, quae astringentem & siccantem materiam habent cum aliquo ex glutinosis gummi, thure, glutine, polline in ijs quae cataplasmatibus similes sunt, locum habeant. Cibibus ijs ab initio sit lacouis permixtum, deinde ex frumentaceis sorbitiones, per se & cum lacte cocta. Ipsum quoque lac moderate coctum optimum est. Olerum usus non est necessarius: attamen gustanda dentur, seris cocta, intybus, & plantago & brassica bis cocta & ex fructibus astringentes carnibus ipsorum sputo rejectis aut ijs quae alias intestina exasperare possunt. Si uero multa fuerit calida intemperies, etiam intybus crudus detur & aquam frigidam sorbeant.

δυσεντερικαῖς ἀρμόσει διὰ τῆς ἐνοχλοῦσας τενεσμούς, καὶ ὀρύζης ἢ χόνδρου, ἢ ποιῆται πίνος, μετὰ σταυροῦ αἰγίαι, ἢ τραγίαι, καὶ τὰ ἐν τῷ πρῶτῳ πνεσμῷ λεχθέντα. εἰ δὲ αἷμα ἀποστρέξει ἐνεπιόν χυλὸν πολυγώνη ἢ δένδρογλώσση μετὰ ἀικακίας, ἢ ὑποκυκίδος, ἢ ποιῆται πίνος, εἰ δὲ ἐπιέρησι, Ἐἰχαμὸν ἐπιέναι, οἷον πύρεθρον οἰσπηρῶν ἐρεῶν, ἢ ἀπόγγυον κενὸν ἐραχέντη πύρεθρον ἢ ἄματι βοσείῳ, ἢ συπληρία ὑγρὰ καυθέντες, ἢ ὀνίδος χυλῶ καὶ ὄξυ ἀδρῶνος ἢ τροχίσκος, ἀραθὸν φαρμακὸν ἐστὶν ὁ πύρεθρος, Ἐοὶ ὠδραπλησίῳ. Ἐποθετὰ δὲ κοιλίῳ, τῶν πάντων περακτικῶν ἐστὶν. ἐφ' ὧν μάλιστα καὶ πόνοι πρὸς τὴν ἐκκρῆσιν γίνονται νομῆς δὲ συστάσης πρὸς τὴν ἐν πρῶτῳ ἀποστρέφον τῆς πύρεθρου σῶδια καὶ σῆψαι τῶν ἐκκρῆνομένων, καὶ τὸ μὴ κατὰ δέχασθαι, ἀλλὰ μετὰ χερόν αὐτῶν γένεσθαι πρὸς ἐξαρωπικοῖς τῶν ἐνεμάτων χηρσάμεθα. οἷοι ἐστὶν οἱ πεφασμένοι περὶ συρροῦν ὀνίδος τροχίσκος, Ἐὶ διὰ χάρτη, Ἐὶ ὀβιθυκῆς, ὁ πεθρόνιος καὶ ὁ διὰ τῶν φελῶν διὰ φακῆς ἀποστρέφεται ἢ πίνος τῶν συφόντων, ἐνεπιόν. καὶ τὰ δὲ τῶν πάντων πεπειραμένων ἐστὶν τὸ ἐνεμα. ὀμφακίδος κεκαυμένης, ἐστὶ δὲ τὸ κῆλον, ἐξ ἧς ἐκπέφυκεν ἡ τῆς δρυὸς βάλανος, ἔσπερ οἱ ἐν τῷ χερόνι δένδρον, συμφύτης, ἢ ἄρα καὶ, τὸ ἴσον. τῶν κοπέντων ὅσον κοιλιάσθαι. ἀναλαβῶν χυλῶ ὀρύζης, καὶ χυλῶ ἀρχέσης τῆς ἀικανθῶδες καὶ πλάτυ καὶ μέλαν ἐχέσης φύλλον, ἢ χοιροσπέλεθρον καλῶσι καὶ τῶν ὠν τῶν λυκῶ ἐξ ἴσης ὅσον Γο. Ἐ. ἢ πρὸς ὠδραπλησίῳ. Ἐπιθέματα δὲ τῶν ἐπιτόμων, κοιλιακῶν ἐπιθέματα. καὶ τὰ κατὰ τῆς γαστρῆς, ἢ κατὰ τῆς ἐξέσεως τῆς συφῆσης καὶ ἐξερῆσης καὶ ὑλῆς ὑπάρχοντα σὺν τινὶ τῶν ἐκελευσῶν κόμμεως, λιθῶν, ταυροκόλλης, γύρεως. Ἐπιθέσεις ὠδραπλησίῳ καταπλάσασαι χερόνι ἐχέτω. προφῆ δὲ τῶν ἀράγα τῶν δέχων ἐστὶν καπτεῖται τὰ διὰ τῶν στωδῶν ῥοφήματα. καθ' ἑαυτὰ δὲ καὶ σὺν γάλακτι ἐπιθέματα. καὶ τὸ γάλα δὲ μετρίως ἐπιθέματα ἀριστὸν ἐστὶ λαχῶν ἢ ἐκ ἀναγκαῖα μὴ ἢ χερόνι ὅμως δοτικὸν ἀπογευσῶν, ἔρεως ἐφθῆς, καὶ ἰντύβου ἢ δένδρογλώσσης, καὶ τῆς δισφῆς κρέμης, Ἐ τῶν ὀπωρῶν πρὸς συφῆσης ἀποπυρῶν, τῶν σερκῶν αὐτῶν ἢ ἀλλῶς τραχύνειν ἐν πρῶτῳ διαμαμένων. πολλῆς δὲ τῆς ἐπιτόμων δυσκράσιος ἐστὶ, καὶ ἰντύβου δόλιον ὠμὸν καὶ ὕδατος ἀπὸ ῥοφῆσαν ψυχρῶν. τὸ ἀλλὰ



ἢ ἀλλοῦ δὲ πὸν ὕδωρ ἔμβροτον ἔστω κεκμηκός
 ἢ Ἐσμάχου· καὶ εἶνος, εἰς ὕπερον δὲ καὶ τῶν πηγῶν
 τὰ ἔσπερα· Ἐυπέπια λαμβανέτωσαν, καὶ λυ-
 τρεῖς ἢ γλυκασίαν γλυκέσιν, εἰ δὲ ρευματί-
 ζοῦντο πρὸς αὐτῶν, ἀπόγγον μέλαν, ἢ ψίχας
 ἀρτε σλιγνίτη βρέξας οἶνον ἀσκαλωνίτην· ἢ
 πνιτῶν συφόντων θερμῶν ἑπιθετίον καθ' ὅλα
 ἢ ἑπιπρασπίου, καὶ ἑπιπρασίου, ἔτω λάεαθ' κέλευε.

Reliquus uero potus sit aqua pluuialis. Lan-
 guente uero stomacho etiam uinum, pos-
 stea uero etiam de uolucibus siccores &
 concoctu faciles sumant, & balneis utantur
 dulcibus. Si uero ab ipsis fluxione in festen-
 tur, spongiam magnam, aut panis siliginei mi-
 cas, uino Ascalonite aut aliquo adstringente
 calido imbutas per totum superiorem uen-
 trem imponito, deligato, atque sic lauare ju-
 beto.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΠΝ-
 ΤΕΡΕΙΩΣ.

CURATIO LEUITA-
 tis intestinorum.

Κεφάλ. ι.

Caput X.

ρίνη
 Π. Αἰγινέτα εἶβ. γ. κεφ. μ. Διήτης ὑπερ-
 χέσης τῆς λειπντερίας τῆς μὲν δι' ἑπιπέλαιον
 ἔλκωσιν τῶν ἐντέρων, κατὰ πνας δὲ καὶ δι' ἄλλην
 ἐν δυσεντερίας τὰ πολλὰ, ἢ ἐξ ἐντέρων γνομένης
 ρευματισμῶν. τῆς δὲ δι' ἀπνίαν τῆς κατ' ἐχέσης
 πλὴν προσφύω ἐν τῇ γαστρὶ διωάμειος, πλὴν δευτέ-
 ρην εἶμαι διαφέρειν τῇ κοιλιακῇ λεγομένη
 συμπλέκειν διαθέσει, καὶ γὰρ ἑπι ταύτης, ἀπ-
 νέσης τῆς γαστρὸς πέθειν τε καὶ ἀναδιδόναί τε σι-
 τία, λῆια τε καὶ ἀπέπια Ἐκάθυρα Διαχωρεῖσι.
 ῥόματι ζουμένης ἑπι πάντων τῆς γαστρὸς. ἀλλ'
 ἑπι τῶν λειπντερικῶν, ἢ δι' ἐξέδοξ τῶν σιπῶν
 παχέα γίνεται, καὶ τὰ τῆς ἀπεψίας ἑπιπέπια
 μῦα μάλλον ἐστίν, ὡς τε Διαθλάσθ' πλὴν λειψ-
 θέσων προσφύω καὶ τέτων μάλισα Διακρίνονται
 τῶν κοιλιακῶν. καταπλαστέον ἐν αὐτῆς λινο-
 πτέρμα μετὰ Φενίκων, ἀκρωσ δὲ πιεῖ καὶ χυῖνος,
 καὶ βάπτει σινεψιδμή τῶ ἐχυμέλιτι. ἐμπύ-
 ματώσεως δὲ σωῆσης, καὶ κυμίνου καὶ αἰθῆρα καὶ
 πηλῶνα μικτόν. ἐπαυξομένη δὲ ἔρρωματισ-
 μῶ, σινεψιδμῶ μῦα κυδώνια, συπληρίαν
 ὕδαρ, ἀκακίαν, ἑποκυτίδα, κηκίδα, ἢ πνα ἢ
 πάντα κρηωτῆ δὲ διὰ μυσσίνου μετὰ πνος τῶν
 συφόντων οἶνων. ἑπιθέματα ἢ θερμάπρασμῶ
 ῥό, τε διὰ δαφνίδων καὶ τὸ διὰ σπερμάτων. συ-
 πλικώπρασμῶ δὲ, ῥό, τε διὰ οἰκάνθη, καὶ ῥό διὰ
 γυλῶτων, καὶ ῥό αἰθῆρα καὶ τὸ ἐρυθρίου δὲ θαυ-
 μαστῶν. ῥεονίζεσης δὲ τῆς νόσου, καὶ δρόπαι
 ῥεονίζεσον κατὰ τῆς κοιλίας, καὶ πλὴν διὰ νάπυ
 κρηωτῆ καὶ αὐτῶ τῶ νάπυ. πηπύματα ἢ ἀπλά-
 μῶ, ῥεονογλώσσου σπέρμα, ἢ λαπάθου σπέρ-
 μα, ἢ ροιῶσ σίδια ἢ ἔα ἑπρά, ἢ ὄμφακα ἑπρον, ἐξ
 ἀμυῖας σαφυλῆς, ἔσσην τρεῖς ὄλεον, ἀπυρέτιου,
 cura

Paulus Aegineta lib. 3. cap. 40. Cum da-
 plex sit intestinorum læuitas, altera ob
 superficialiam intestinorum ulcerationem,
 uel, (ut aliqui sentiunt) ob cicatricem ex dy-
 senteria plerumque, aut ex alijs fluxionibus
 obortam: altera ob facultatis cibum reti-
 nentis in uentre debilitatem: secundam dif-
 ferentiam arbitror cum cœliaca affectione
 topulandam esse. Nam in hac debili existen-
 te uentre ad concoquendos ac distribuendos
 cibos, læuia & cruda ac liquida egeruntur,
 alio in omnibus fluxione laborante. Verum
 in læuitate intestinorum, & transitus cibo-
 rum uelox fit & cruditas magis intenta est,
 ut acceptus cibns manifestus fiat: & per hæc
 maximè à cœliacis discernuntur. Imponen-
 dum igitur ipsis est lini semen cum palmulis.
 Egrege facit etiam lentiscus & rubus, si in
 aceto mulso coquantur. Si uero etiam infla-
 tio adest, cuminum & anethum & ruta ad-
 misceantur. Augescente autem fluxione, ad-
 ijcimus etiam mala cydonia, alumen liquidum,
 acaciam, hypocyfidem, gallam: aut quædam
 ex his, aut omnia. Cerata faciunt ex oleo
 myrteo, cum aliquo uino astringente. Epi-
 themata autem calidiora, & quod ex baccis
 lauri paratur, & quod ex seminibus. Magis
 autem adstringunt & quod ex ænanthe fit, &
 quod ex uinaceis, & Antylo inscriptum. Sed
 & id quod erythron inscribitur, mirificè fa-
 cit. Diuturno uero euadente morbo, etiam
 dropace ad uentrem utendum est, & cerato
 ex sinapi, & ipso sinapi. In potiones conue-
 niunt, simplicia quidem, plantaginis se-
 men, rupicis semen, malicorium, sor-
 ba sicca, uua Aminza acerbâ sicca, tri-
 um obolorum pondere: febre carentibus,
 cura



cum uini austeri cyathis sex. febricitibus cum aqua pluuiali. Minus autem stomachum offendit uentriculus gallinarum siccus potui inspersus. Sed & urinam cientia, apium, adiantum, & similia si bibantur, fluxionem transferunt. Ex compositis autem est sigillum Polyide, & pastillus ex succino, & ex spina Aegyptia, & clidion appellatum & ex feminibus constans. Sed & hoc optimum est. Seminis rumicis syluestris unciam unam semis, feminis plantaginis unciam unam, succi hypocystidis drach. sex, gummi aut acaciz drach. tres. Excipe malorum cydoniorum decocto ad tertias redacto. Aliud. Cumini, piperis, rhois syriacæ, balustij singulorum unciam unam semis, malicorij unciam unam. Silphij unciz dimidium aut pulueris eius sicci drach. unam : inspergito in potum aut aceto mulso admixto, dato mane ac uesperis. ALIUD. Myrti baccatum nigrarum cochlearium unum semis, anisi, togularum siccatum, ananthes, singulorum cochlearij dimidium, palmulas uiginti : fac pastillos & prabe drach. unam cum aqua aut uino diluto. Theriaca quoque e uiperis optimum ijs auxilium est. Cibus si acris & biliosa est excretio ex alica, chondro, & oryza, ac similibus fit, ita ut adstringentium quid simul coquatur, pitum, malum cydonium, mespila & similia. Coctum quoque lac his conuenit. Potus autem, uel uinum aquosum tenue, aut aliqua ex iucundis fit potionibus. Si uero pituitosiora excernant, ad contraria cibum transmutamus & semina quaedam stomacho grata admiscemus, anisum aut euminum, aut apij semen : sed & lenticula bis cocta saepe ipsis profuit, comesta cum modico aceto, aut aceto mulso : brasica quoque & ipsa bis cocta. Praestat autem secundum ipsorum cocturam in posca facere. Vinum uero uetustius ac calidius bibant.

συνὸν αὐτῆρ ὑκυάθους ε. πυρέσασθι δὲ συνὸν ὑδατι ὀμβρῶ ἥσον δὲ σωμαχικῆ ἀπλετα, ἀλεκτορῶν κοιλία ξηρὰ ἐμπασομῶν τῶ ποτῶ καὶ τὰ διαρηπικὰ δὲ, οἶον σέλινον, ἀδιαντον, καὶ τὰ ὅμοια πνιόμενα μετοχέτωσιν ἐργάζεσθαι. συνθετα δὲ, ἢ τε πολυεῖδες, σφραγίς ἐστὶ καὶ ὁ δὲ τῆ ἡλέκτρα προχίσκη, ὅτε δὲ τῆς αἰγυπθίας ἀκαύθης καὶ τὸ κλειδίον καλαμῶνον, καὶ ὁ δὲ σπερμάτων. καὶ ἔτο δὲ κάλλιόν ἐστὶ. λαπίθς ἀχρῖς σπέρματ Γο. α. S. δρυογλώσας σπέρματος Γο. α. ὑποκυσίδος χ. L. ε. κόμεως ἢ ἀκακίας ἀναλάμβανε κυδωνίων ὑποτριταθέντων τῶ ἀφειψήματι. Ἄλλο. κυμίνης, πεπέρως, ῥόδου συριακῆς, θαλαυσίης ἀνά Γο. α. S. σιδῶν Γο. α. σιλφίης Γο. S. ἢ ξηρῶ L. α. ἐμπασε τῶ ποτῶ, ἢ φυρῶν ὄξυμελιτι πρῶτῃ καὶ ἰσπεράς. Ἄλλο. μύρτων μελανῶν κοχλιαρέων α. τὸ S. αἰθήρας, ῥόδων, ξηρῶν, οἰναύθης αἰὰ κοχλιαρῆς S. φοινικοθαλάνης κ. ποίε προχίσκας καὶ δίδε L. α. μεθ' ὑδατος ἢ μετὰ κρέματος. καὶ ἢ δὲ ἐχιδνῶν δεθηρακῆ τέτοις ἀχρῖς ἐστὶ βοήθημα. ἢ δὲ τροφή. δριμείας μῦν καὶ χολώδες ἔσσης τῆς ὑποκυσίδος, δὲ τῆ χόνδρου ἔξ ὄζυρης, ἀλικῆς τε καὶ τῶν ὑδατολησίων γίνεσθαι. σπειρομῶν αὐτῆς τῶν ἐυφόντων πνός, ἀπῆς, μήλα, κυδωνίς, μεσσίλια ἔ τῶν ὀμοίων. ἔ τὸ ἀπεφθον δε γάλα τέτοις ἀρμύσας. ποτὸν ἢ ἢ οἶν ὑδαρῆς λεπτός, ἢ π τῶν ἡστέων ἔσω πμάτων. Φλεγματοκώτερος ἢ αὐτῶν ἐκκρινόντων ἔπὶ πᾶν τὰ πλὴν τρυφῶν ματρηγῶν. σπέρματὰ τε πᾶν τῶν ὑποκυσίαν παρραμυγνίωτες, αἰθήσον, ἢ κύμινον, ἢ σελίνας. σπέρμα. καὶ ἢ φακῆ δὲ δις ἐψηθεῖσα πολλὰ κίς αὐτῆς, ἠννησεν ἐπιδομῆ συνὸν ὄξει βραχέι, ἢ ὄξυμελιτι αἰτε κρέμασαι, δίσσεφθοι ἔ αὐτῆ. κάλλιον δὲ πλὴν ὄξυπέρων ἐψήσιν αὐτῶν ἐν ὄξυκρέτω γίνεσθαι, οἶνον δὲ πᾶν τῶν παλαιωτέρων καὶ θερμωτέρων πνέτωσαν.

ἐπίσης

CVRATIO AFFECTI ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΣΤΕ-
uteri. ρικῶν.

Caput XI.

Κεφάλ. ια.

P. Aeg. lib. 3. c. 60. Plerisque purgatio mensium contingit circa decimum quartum annum, paucis citius, circa decimum tertium aut duodecimum, non paucis autem tardius quatuordecim annis. Tempus uero unicuique purgationi statutum non est. Multae enim ad duos aut tres, plurimae ad quinque dies purgantur, aliae ad septimum usque diem,

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ξ. πῆς παλίσαις ἢ καθάρσις γίνεσθαι πᾶσι παρραρεσκαθῆκατον ἔτ. ὀλίγαις ἢ ἥσσον, καὶ τὸ τελοσκαθῆκατον ἢ δωδέκατον. σὺν ὀλίγαις δὲ βραχέων τῶν δεκαποσάρων ἔτων. χρόνος δὲ ἐκάστη καθάρσει πεπεγμῶς σὺν ἔστιν. πολλῶς δὲ ἔπὶ δύο ἢ τρεῖς, πῆς παλίσαις δὲ ἔπὶ πέντε ἡμέρας ἐκκρίνεσθαι καὶ ἀλλαις, δὲ ἀχρῖ ἐπίσασπασίαι



παυαίαι δὲ καὶ ἄρχη δωδεκάτης ἐπαθάρθησαν. παύονται ἢ τῶν καθάρσεων καὶ ἢ πέντη-
 κος ἔτος. παυαίαι ἢ μέχρι τῶν ἑξήκοντα. ἐνί-
 αις δὲ ἀπὸ πέντε καὶ τριακοντα. Ἐ μάλιστε τῆς
 καταπιμέλαις, λήγειν ἤρξατο καταπιμέλαια.
 σραγγευομένης ἐν τῆς καθάρσεως, λέγειν περὶ
 τῶν περθεσμίων καὶ περπορίζειν, ἢ σισάμω ἢ κε-
 Φαλωτῶ πρῶτος, μετὰ πεπέρως καὶ πηγάνω
 εἰς τὸ αὐτὸ ἐψημένους, ἢ ἢ ποσὶς Διὰ γλυκέως
 γινέσθω κρητικῶ, καὶ τῶν δὲ πῖσαι, περπύταις
 κινεῖτο τὰ ἐμμύλια, ἐδιέτω ἢ τὰ θύδια, σηπέ-
 αις, πολυπόδαις, καὶ ὅσα ἔσονται γένεσι. Ἐ γὰρ αἱ-
 ματος ἰδίως εἰσι παρακκικά.

ΠΕΡΙ ΕΠΟΧΗΣ

ἐμμύλων.

Π. Αἰγ. Βιβ. γ. κ. ζα. Επέχειται ἢ ἐμ-
 μύλων καθάρσις πότε μὲν ὅλας ἔσονται
 ἀρρώστιας Διακρινόμενα, πότε δὲ τῆς ὑστερας αὐ-
 τῆς ἰδίων παθῶν αἰαδεδεγμένης, Διὰ ψύξιν
 ἐντόπιον, ἢ ἀληγῆν, ἢ δυσκρασίαν ἐκ γεννη-
 τῆς ἢ ὀπτικῆτον κακωσιν. ὡς τὸ πολὺ δὲ ἐκ τῶν
 ἀμβλώσεων, Ἐ Διὰ τι μέρος τῶν κυριωτέρων
 περτοπαθῆσαν, οἷον ἢ παρ, ἢ κελίαν, ἢ θώρακα
 ἢ ἰσθμίων ἰσθμίων ἐν χρονίω χρόνῳ παθῶν ἐπαρθεῖ-
 σαι ἢ πολλῶν καὶ χρονίων παθῶν εἶθην αἴτια γί-
 νεσθαι, ὅταν μὲν ἐν δια τινῶν ἐντοπιδίων περ-
 τοπαθῆσαν ἐπαρθεῖται ἢ ἐσραγγεῖται ἢ καθάρσις,
 περργαίαι τὸν ἢ ἔσπερτοπαθῆσαν τὸς ἐστὶν θερα-
 πεία, καὶ μετ' αὐτῶν ἢ τῆς ὑστερας ὑπόμνησις. τῶν
 ἢ ἰσθμίων σημείωσιν ἐν τοῖς ἐμπροσθεν εἰρηκαρμῶ.
 ὅταν ἢ μηδὲν ἐκείνων παρῆ περτοπαθῆσαν ἐστὶν αὐ-
 τῶν περτοπαθῆσαν τῶν ὑστεραν. μὴ κωλύσεως ἐν
 ηλικίας, ἢ ἔξεως, ἢ ἐτέρω πινός, Φλεβοτομία
 χρῆσθαι, μὴ περ τῆς ἐμμύλων περθεσμίας.
 παρελθόντος δ' ὀπτικῆς ἐσθῶσαν ἡμέρας δέκα.
 ἀφαιρέσθω ἢ μήτε πλέον Ἐ. S. λιτῶν, μήτε
 ἔλαττον μῖας, εἴτε Φλεβοτομήσασθαι, εἴτε μὲν,
 τῆ Διὰ κολοκινθίδος ἰερά καθάρσειν, διδόν-
 τας δύο δραχμῶν καλῆθαι ἐν Ἐ. K. μελικρά-
 τα πύρεθ' ἢ παρόντ' Ἐ, τῆ μὲν ἰερά χρῆσθαι ἐκ
 ἐγχωρεῖ. εὐκαιρον δὲ ἐστὶ Φλεβοτομῆσθαι ἐν τῆς
 περτοπῆς ἔσπερσε ἐν ἡμέραις. μετὰ δὲ τῶν κα-
 θαρσιν ἀναληπτερον ἐπ' ὀλίγας ἡμέρας ἐν δὲ
 τῆς ἐξῆς γυμναζεσθαι περπύταις, τρέψαι τῶν
 κάτω, καὶ λέσθω. τροφαὶ δὲ ἀρμόζουσιν Ὀδοί-
 κητοι Ἐ ὑγραὶ, λαχάνα τὰ γλυκέα ἅπαντα,
 ἰχθύων οἱ περταῖοι, πηλῶν τὰ ἀπαλώπερα,
 γυλακτοπόσια, μελιτώματα, οἶν' Ἐ λέπ' Ἐ
 λωκῆς, μὴ πάνυ παλαιός, ἄθετα κρέα, καὶ

paucæ etiam ad duodecimum usque purga-
 tæ sunt. Desinunt autem purgari aliqua
 circa quinquagesimum annum, paucæ usque
 ad sexagesimum: quibusdam à tricesimo quin-
 to anno & maximè pinguibus, menses desine-
 re cœperunt. Si igitur remoratur purgatio,
 circa præfinitum tempus lauato, & sesamum
 aut portum capitatum præbendum dato
 cum pipere & ruta simul coctis. Edat
 autem loligines, sepias, polypos, & qua-
 cunque eius generis sunt. Priuatim enim
 sanguinem turbant.

DE MENSIVM SVR-
 pressionē.

P. Æg. lib. 3. c. 61. Supprimatur men-
 strua purgatio aliquando toto corpore
 malè affecto, aliquando ubi uterus ipse
 propriam affectionem suscepit, propter loci
 frigiditatem, aut plagam aut intemperiam
 ex natiuitate, aut ob acquisitivam uexatio-
 nem. Plerunque uerò ex abortibus, & ob
 partem aliquam principaliorem primariò
 affectam, uelut est hepar aut uentriculus aut
 thorax, aut eiusmodi quædam in diuturna
 affectione constituta. Suppressa uerò mul-
 tarum & diuturnarum affectionum causa fie-
 ri solet. Quum igitur ob aliquam uiscerum
 interaneorum affectionem primari-
 am purgatio intercepta fuerit, aut moram
 traxerit, maximè operæ precium est prima-
 riò affectam partem curare, & post ipsam
 uteri meminisse. Notas autem illarum partium
 affectarum in superioribus tradidimus,
 ubi uerò nihil eorum affuerit, manifestum
 est ipsum uterum primariò affectum esse. Si
 igitur non prohibet ætas aut habitus corporis,
 aut aliud quiddam, uena secetur, non ante
 præfinitum mensium tempus, sed præterito
 jam dies decem adijciantur. Detrahatur au-
 tem non plus duabus libris & dimidia, neque
 minus una, si sanè uenam secuerimus: sin
 minus, hiera ex colocynthide purgentur, dua-
 bus drachmis datis in sex cyathis aquæ mul-
 sæ. Febre uerò præsentē, hiera uti non ex-
 pedit. Commodum autem est uenam secare
 in primis febrilium diebus: post purgationem
 reficiantur ad paucos dies. In sequentibus autē
 exercentur deambulationibus, frictionibus
 infernarū partium & lauentur. Cibi conueni-
 unt qui facile concoqui ac distribui possunt &
 olera humida ac dulcia omnia: expiscibus
 petrosi, ex uolucris tenetiores: lactis
 potus, dulciaria ac mellita liba, uinū tenue, al-
 bum, non ualde uetus, ineptæ sunt carnes &
 legumi-

B3



legumina exēprāfīana. Vbi uerō propinquum est prāfinitum tēpus ex marinis dentur cartilaginea ac mollia uelut dictum est, & testa intacta : & porrum capitatum cum ruta & pipere coctum & decoctum ipsorum bibant, tunc quoque ligamentis infernas partes adstringant ad tres aut quatuor dies. Instante autem prāfinito tempore, ligamenta quidem tollantur, prābiant autem myrrhæ obulum, aut fabæ magnitudinem, aut castorium ex passio, aut aqua mulsa, aut artemisiæ decoctum, aut saluix post balneum, ex passio & uino absinthite. Absinthites autem uinum per totam curationem prābatur. Præterito autem tempore prāfinito, et nulla, aut non memorabili purgatione facta ad malleolum uena secetur, & repetita detractio fiat : post septimum uerō aut octauum diem, purgatione ex hiera utatur, & post quartum diem dropacem adhibeat ad pectinem, lumbos ac femora. Et ubi per triduum aquam bibit, cataplasma ex sinapi ac pane madefacto, paribus portionibus imponat usque ad æquinoctij tempus, deinde lauet. Sequenti mense caricæ pro pane admisceantur in decoctum fœnigræci, maluæ, pulegij, rutæ, & artemisiæ. In sinum uerō infundatur sulfinum aut amaracinum, & pessus subdatur *ἐνεαφάρμακος* à nouem quas recipit rebus appellatus, aut libauius uocatus. Est autem pessus lana carpinata, & in rotunditatem ad digiti figuram redacta, in qua continentur medicamenta : atquæ hæc curatio plurimis sufficit ad purgationem. Si uerō fortioribus opus habuerit medicamentis, sunt hæc. Iris Illirica pota cum uino, cyperus, ari radix, castia, iunci rotundi odorati flos, nardus, radices Helenij decoctum, myrrhæ fabæ græcæ magnitudo : hæc cum passio bibuntur, in aquæ mulsæ cyatho dimidio, & dictamni decocti cyathi duo & ammoniacum & sagapenum. Quæ uerō stomachum minus noxæ expositum habent, his & opanacis parum in pillulam coactum & melle cocto tinctum dari potest. Quin & familiaria nobis semina menses mouere solent. Sed minus : uelut est fœniculum, cuminum, apium, daucus creticus, fœseli, amni, sinon, cicer, cedri baccæ, & omnia urinam cientia. Apposita autem & subdita faciunt hæc : Myrrha, absinthij, aut lupinorū decocto trita, aut etiam rutæ succo trita, bdelliū eo dē modo, styrac item & oleæ sylvæstris gummi, cum rutæ succo similiter, aut aristolochia longa ad collyrij formā exsculpta : similiter etiā magni centaurij

δαυρία, πολλὴ πηλοσάνης, ἀληθίον δὲ τῆς ποθεσμίας γενεομένης, δίδοναι τῶν θαλασσιῶν τὰ σελαχία, καὶ τὰ μαλάχια, ὡς εἴρηται, καὶ τὸ σπρακδέρμα καὶ τὰ κεφαλῶτὰ πρᾶσα, σὺ τῷ πηράνω καὶ ππε. ἐψηθέντα. καὶ τὸ ἀφειψήμα τῶν πινέτων σὺ τῷ. Ἐ δεσμοῖς τὰ κάτω διασφίγγειν μέρη ὅτι τρεῖς ἢ δ' ἡμέρας. ἐν αἵσθῃ δὲ τῆς ποθεσμίας πειραιεῖσθαι μὲν ἢ σφίγγει, ποσπιζέσθαι δὲ σμύρνης ὀβολόν, ἢ κυάμης μέγεθος, ἢ κασόριον διαγλυκέος, ἢ μελικράτης, ἢ ἀφειψήμα δρεπεμισίας, ἢ ἐλελισφάκας μετὰ λεπτὸν διαγλυκέος ἢ ἀψινθίαι. ἀψινθίτης ἢ παρ' ἄλλω τινὶ θεραπείᾳ ποσπιζέσθαι παρελθούσης ἢ τῆς ποθεσμίας, καὶ μηδενός, ἢ μὴ ἀξιολογῶσα ἐκκερθέντος, ἀπὸ σφυρῶ φλεβοτομητέον, καὶ ἐπαφαιρείσθαι μετὰ δὲ τινὶ ἐσθόμῳ ἢ ὀγδόμῳ ἢ μέσῳ, τῇ δια τῆς ἰεραῆς χροῖσθαι καθάρσει, ἢ μετὰ δ' ἡμέραν δραπακίζέσθαι κατὰ τὴν ἡμέραν καὶ ὀσφύς, καὶ μηρῶν, ὑδροποτίσασθαι δὲ τρεῖς ἡμέρας καὶ πλάσσεισθαι νότυ ἴσον πρὸς ἴσον ἄρτα βεβλεγμαῖα, ὅσφι ὕρας ἰσημεριῆς, ἔπειτα λουέσθαι. τῷ δὲ ἐξῆς μὲν ἰσάδες ἀντι ἔ ἄρτα μιγνύσθαι εἰς ἀφειψήμα πηλέως, ἢ μαλάχης, καὶ γλήχων, ἢ πηράνης καὶ δρεπεμισίας. εἰς ἣ τὸν κόλπον ἐγχυμαπίζέσθαι, σάσινον, ἢ ἀμαρακινόν. Ἐ πρὸς ποσπιζέσθαι ὀ ἐνεαφάρμακος ἢ ὀ λιβαίου. πρὸς ἣ ἐστὶν ἔριον διεξασπρόν, καὶ ἦθοι σφαιρωθέν, δακτύλα σχήμα εἰληφὸς ἐν ᾧ ἐγκατέχετὰ τὰ φάρμακα. αὐτὴ μὲν ἐν ἡθεραπείᾳ πλάσσει ἢ κέσεν πρὸς καθάρσιν. εἰ δὲ ἰσχυρατέρων δεήσει φαρμάκων, εἰσὶ τὰ δε. ἔρις ἰλλυρικὴ πινυκὴ μετ' οἴνου, ἢ κύπερις, ἢ ἄρτα ρίζα, ἢ κασσία, ἢ χροῖνα ἀψι, καὶ νάρδος, ἐλενίς δὲ ρίζης ἀφειψήμα, ἢ σμύρνη κυάμης ἐλληνικῆς μέγεθος, σὺ γλυκεῖ πινόμενα ἐν ἡμίσει κυάμης μελικράτης. ἢ δικάμινα ἀφειψήματος Κ. ἢ καὶ ἀμμωνιακὸν καὶ σαγαπηνόν. τῆς δὲ δυσαθεστῆρας τὸν στόμαχον, καὶ ὀποπανάκος βραχὺ σφαιρωθέν, καὶ ἐν ἀπέφθω μέλιτι βραχέν, καὶ τὰ σπυγγή ἢ ἡμῖν ἀέριμα τὰ κινεῖν πέφυκεν, ἐλαπίον ἢ οἶον μέλαθρον, κύμινον, σέλινον, δαύκος κρητικὸς, σέσσηλι, ἀμι, σίνων, ἐρέβινθοι, καὶ κερκίδες, καὶ πάντα τὰ διαρηπτικά, ποσπιζέσθαι δὲ, σμύρνα, ἀψινθίαι ἢ θερμῶν ἀφειψήματα πλεονθεῖσαι, ἢ πηράνω λεανθεῖσαι, ἢ δέλλιον πωσούτως εἰσάξει τε καὶ τῆς ἀγρίας ἐλαίας τὸ κόμμι, ἢ πηράνης χυλῆ ὁμοίως, ἢ μακρῆ δρεπελοχία διαγλυφομένη εἰς σχήμα κόλλης. πρὸς ἀληθίως δὲ καὶ ἢ ἢ μεγάλης κενταυρίας

ἡμέρας

Α α ρίζα,



ρίζα, ἢ ἐλεβορίς, ἢ ὅπως σκαμμωνιάς, καὶ κολο-
κυθίδος ἐντελώνη καθ' ἑαυτῶν, Ἐδρυμισία
καὶ ἀσπιδίη μετὰ πηράνε, καὶ χαλβάνη
ὑποθυμιακή τὰ δε αὐτὰ καὶ τὰ ἐμβρυα πέ-
φυκε ἐκβάλλειν.

ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡ-

σεως καὶ αἱμορραγίας ὑ-
σέρας.

Π. Αἰγ. βιβ. γ. κεφ. ξβ. Ἰπερκαθάρσεως
(ἢ γυναιξίν γίνον), ποτὲ μὲν τῶν κατακελευσίων
Ἰπτερινόντων ἔσθροώτερον φερομένων. ποτὲ ἢ
Ἰπτελοῦσι δόποτέστιν, αἱ τίνες ὡς τὸ πολὺ καὶ
αὐτομάτως πικρύνται. συνεχῶς δὲ καὶ Ἰπτε ἀμ-
βλώσειν, ἰσχυρῶς αἱμορραγεῖν. ὡς τε πολλὰ
καὶ Ἰπτερινῶν κίνδυνον. πρῶτον μὲν ἐν δια-
σφίγγῃ τὰ κῶλα δόπο μαχαλῶν ἔσθρω-
ντων διδόναι δε πῆν ὀξύκρατον μὴ ψυχρὸν, καὶ
προσαντλεῖν ὀξύκράτω. Ἰπτείνεσι τε τοῖς τῶ-
ποις πολλὰ ἐρεῖα ἐξ οἴνης καὶ ἐλαίας ἢ ῥοδίνης, ἢ μη-
λίνης, ἢ μυρσίνης δόπο τεθλιμμένα. τροφίω δὲ δα-
τίον, χόνδρον πλυτὸν ἐξ ὀξύκράτους, ἢ ὄρουζαν, ἢ
ἀλικα. οἴνη δὲ ἀπέχοντα. ὑδρομήλον ἀσηρὸν,
ἢ ὄμφακόμελι, ἢ τῶν πικρῶν αὐτῶν δόπο.
προσπίζειν ἢ βαλαύσιον ἐν ὀξύκράτω, ἢ ὑπο-
κύσidos, ἢ ἀκακίας χυλόν, ἢ λύκιον, ἢ σάμιον.
ἀστέρα, ἢ ὄμφακα ξηρὸν, ἢ ῥέον, ἢ φακῆ ἐξ ἰτα-
λικῆ κεραμῆς καυθέντος τῶν ποδῶν, ἢ ὀσμυρον
ἐδίειν ἐν ὀξύκράτω βραχύνει. ἔως ἐν τρυφε-
ρὸν γίνηται. πρόσθετα ἢ διαξ γυναικεία, σέλις
πῆς αἱμορραγίας. ὑποκύσidos χυλός, ἢ ἀκα-
κίας πῶ μάνη λειωθέντες πῶ ὄξει. θυμας ὡς
ἢ ἀρήγῃ ἀπόγγος οἴνη, ἢ ὑγρῆ πίση δευθεῖς καὶ
προσθεῖς. ἢ κενομήν αὐξ, ἢ ποδιὰ μετὰ ὄξους,
ἢ ὀξύκράτος προσθεμένη. ὁμοίως δὲ καὶ ξ φελ-
λῆ ξ δόπο ἰταλικῆ κεραμῆς καυθέντων. πο-
διὰ. ἐξωθεν δὲ Ἰπτεθέρμα ὠφελῆ τὰ σύφον-
τυ Ἰπτεμάτα ἔτα δια φονίκων καὶ κυδωνίων
καὶ πλάσματα. προσεληφότα σίδια ἢ τρινο-
βαλάνης, ἢ βάτς στυ ἀκρέμονας, ἢ ῥίνης φύλ-
λα. βαλαύσιον, ἀκακίαν, ὑποκύσidos, κηκίδια
βραβύ, συπήριαν, μάλισα ἢ ξτο. παρὸς κολα
βρέχε) ὀξύκράτω ἔως ξ διαλυθῆ. ἐπειτα εἰς
ράκος ἰσχυρὸν ἐμπλάσει) ἔκωλλῆ) τῆ ὄσφύι.
ἐνεργῶς ἢ πρὸς ξτο πῆσι, καὶ αἰ κοληπῆ τῶν
ἐμπλάσειων. οἶον ἀρμονία, ἰκέσιος, ἀθηνα, μηλι-
νή ἰνδική, ἔαι ὠρα πηλοῖσι. πρὸς οἷς ἢ χρεῖσθ
πρὸς αἱμορραγίαν κηκίδος, τὸ ἐν τῶν λείων καὶ
λιβανῶν διεῖς ὕδατι προσθεῖ. ἢ κυτίνης, ἢ ῥο-
αῖς γλυκείας ὁμοίως, ἢ πολύγωνον λεῖον. συνθετω

radix, aut ueratru aut scammonia succus, &
colocynthidis medulla per se, & artemisia
imposita cum ruta & galbanum suffitum:
eadem etiam foetus eijcere solent.

DE NIMIA PURGA-

tionis uteri & sanguinis ex
co eruptione.

Paulus Aegineta lib. 3. cap. 62. Nimia
purgationes mulieribus fiunt: quando-
que dum menses augentur, & acuatius fe-
runtur: quandoque in partu perfecto, quae
plerumque etiam sua sponte cessant. Frequen-
ter autem & ex ab ortibus uehementer san-
guis erumpit, ut saepe periculum incurrant.
Primum igitur constringendi sunt artus ab
alis & ab inguinibus. In potu uero danda est
posca, non frigida & posca quoque affunden-
da imponendaque locis multa lana ex uino &
oleo, aut rosaceo, aut melino, aut myrteo ex-
pressae. Cibus detur Chondrus lotus ex po-
sca, aut oryza, aut alica, hydromelum quoque
austerum, aut omphacomeli aut talium quid-
dam ipsis detur. Praebant autem balaufti-
um in posca aut hypocyttidis aut acaciae suc-
cum, aut Lycium aut samium asterem aut
uuam acerbam siccam, aut theon, aut suberis
ex Italico uase usti cinerem, aut sesamum e-
dant in posca maceratum, donec mollescat.
Apposita uero & in pudenda subdita sangui-
nis eruptiones sistunt, hypocyttidis succus aut
acaciae, triti cum manna in aceto. Mirifice
uero auxiliatur spongia uino aut pice liquida
imbura ac apposita: aut usta ipsius cinis
cum aceto aut posca appositus, similiter etiam
suberis ex Italico uase usti cinis. Forinsecus
autem imposita profunt, epithemata adstrin-
gentia & cataplasmata ex palmulis ac malis
cydonijs, in quae addita sunt malicorium,
ilicet glandes, rubi uirgulta, lentisci folia, ba-
laustium, acacia, hypocystis, galla parum,
alumen. Maximè autem hoc. Glutinum
maceratur in posca, donec fuerit dissolutum,
deinde in robustum lintheum inducitur ac
iumbis agglutinatur. Efficaciter quoque
ad hoc faciunt emplastraglutinatoria, uelut
est, Harmonia, Icesium, Athena, Melinum,
Indicum & similia. Pessis autem utendum
est ad sanguinis eruptionem his: Gallae in-
ternam partem tritam, & thus aqua dulci
ac appone aut flores mali Punici dulcis
similiter, aut polygonum tritum: composito
uero



verò hoc : aluminis scissi, gallarum internæ partis, succi acaciæ, mannae singulorum drach. quatuor : ouorum assatorum vitelli quinque : sicca teruntur succo plantaginis & miscentur. Vfus autem tempore in pessum lancum excipiuntur, & in rosaceum tinguntur ac apponuntur. Sed & cucurbitæ leues, magna, sæpe sub mammis appositæ, abunde reuellunt. Infessus autem ijs quibus sanguis erumpit conueniunt hi, Iunci acuti capitulorum, myrti, rosatum, rhamni foliorum, rubi uirgultorum, singulorum æquales partes in aqua coquito, & insidere iubeto. Aliud. Corticis radices, mali punici dulcis, myrti, corticis cupressi singulorum partes tres : gallæ partem unam, coquito in aqua sufficiente. Cæterum per clysterem uterifusorium plantaginis succum infundito, aut seridis, aut polygoni, aut solani, aut perdicij, aut psillij, aut hypocistidis, aut acaciæ. Indantur etiam hæc per lanam, aut digitum, aut specillum, aut pennam in longitudinē formatā, usq; ad uteri osculum, sed & Andronis pastillus per uteri fusorium clysterem, cum aliquo ex prædictis succis, aut cum uino alstringente imissus, efficax est medicamentū.

DE FLVXV M V-
liebri.

Paulus Ægi. lib. 3. cap. 63. Fluxus muliebris, est fluxio uteri per quam totum corpus expurgatur. Tali autem specie præditum est id quod euacuatur, quale est id quod redundat. Aliud enim est rubicundum, uelut serosus sanguinis humor, aliud album, à pituita : aliud pallidum ab amara bile : aliud aquosum. Si uerò aliquando sanguis purus uelut in uenæ sectione feratur, diligenter animaduertere oportet, anñe aliqua erosio facta est in utero. Notæ fluxus sumuntur ex eo, quod assidue loci humectantur, humoribus colore diuersis, & ex eo quod ægrotā decolor est, alimentum non sentit, cibum auerfat, & in deambulando difficulter spirat, & tumidos oculos habet : & ex eo quod aliquando cum dolore, aliquando sine dolore sit, & aut cum ulceratione, aut citra ulcerationem, aut inflammatam, aut sordidam, aut puram. Proinde toti corpori opitulari oportet, cum humida sit affectio, per siccantia citra manifestam calefactionem, & per frictiones totius corporis, & per unctiones ex melle abunde cocto. Danda sunt etiam urinā cientia medicamenta : uelut est aqua in qua asarum, & apium sunt incocta : euacuandum quoq; totum corpus per aluum. Ad hæc portulaca comesta, & succus eius potus prodest, item balaustium, rubi fructus & flos, q uerius membrana illa quæ sub cortice trunci est, & quæ sub cortice ipsius glandis.

διετυπληρίας χρισθς, κηκίδων & εντς ακακίας χ. μαίνης ανά L. δ. ώων όπών λεκυθοι δ. πξ ξερα λεαίνετα χ. δρονογλώσσα, κ. μίγνυτα. εν δε τή χρησθ αναλαμβάνετα εις πιασόν έρεουώ, κ. δαπβάπη) εις ρόδιον & προσήετα. κ. σικύα δε κβΦαι μεγάλαι, πλάκισ υπό στυ πτίκς προσεθείσαι, ικανώς απασώσιν. εγκάθισμα δε τής αιμορραγίας. οχυροίνα κεφαλών μυρσίνης, ρόδων, ράμνα φυλλων, εάτε ακρεμόνων, ίσα έψησας εν ύδατι εγκάθιζε. Αλλο. ροιάς γλυκείας ρίζης Φλοισ, μυρσίνης, κυπαρίσιας Φλοισ ανά με. γ. κηκίδος με. α. ύδατι τδ δεκέν. εγχυμαπίζε ή δια μητραγχύτα, χυλόν δρονογλώσσα, ή σέρεως, ή πολυγώνη, ή σρυχνη, ή περδικίη, ή ψυλλίη, ή υποκυσιδ, ή ακακίας κ. εντηείσω πώτα δια έρις, ή δακτύλη, ή μήλης, ή πέρη, εις μήκος εσχημασμένη, άχρη & σομίς. και ο άνδρωνος δε τρεχίσκ, εγχυμαπιζόμενος δια μητραγχύτα, μί πνος τών είρημύων χυλών, ή οίνα συφεντος, ένεργής έστι φάρμακον.

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
ρόυ.

Π. Αιγ. ειβ. γ. κεφ. ζγ. Ρθματισμός εστι υστερας, ο ρους όλας & σώματος εκκαθαρομένης. πιασόν ή έστι ιδεών έστι τδ κενάμυρον, οίον και τδ πλεονάζον. τδ μδρ έρυθρόν. οίον ίχωρ αίματος. έπρον ή λθκόν, δπό φλέγματος. άχρον ή άλλο, τδ πικρόχολον. Αλλο δε ύδατώδες ει ποτε ή αίμα καθαρόν, ως εν φλεβοτομία φέρειτο, προσέχειν άκρεβώς μη τις άνάβρωσις γέγονεν εν τή μήτρα. συμειωτέον ή τόν ρουώ, εκ & συνεχώς επκαθυραίνεσθαι στυ τώπας, διαφόροις κατά χροιά ύρησις. τιώ δε κάμνεσιν άχροϊν, άπροφον, αύορεκτιν. καν τούς περιπάτις δυσπνοϊν & διωδηκίας εχειν στυ όφθαλμύς. και ποτε ρξ μξ πόνη, ποτε ή χωρίς πόνη γίνεσθ. και ή μεθ' ελκώσεως ή χωρίς ελκώσεως, ή τρι φλεγμονέσης, ή ρυπαράς, ή καθαράς όλω μδρ εν τώ σώματι βοηθάν τούς ξεραίνεσιν, ύρηδ τξ πάθης όντος, χωρίς & θερμογίνην επφανώς. τείψει ή & σώματος όλας & χρισσει δια μέλιτ & ικανώς έψηθέντος, και διερητικα φάρμακα δίδοναι. οίον εστιν ύδωρ ενειψηθέντος αυτώ αίσιρα κ. σελίνη. κενέν ή & δια γαστρός όλον τδ σώμα. πτος ή γε τείπις άνδράχνη έδιομόλη & οχυλός αυτης πινόμμος ώφελεί. βαλαύσιον, εάτε ο καρπος & τδ άνθος, δρυός τα υπό τώ φλοιώ & πέρινη τδ ύμδρωδες, & τδ υπό τώ κελύφθ της βαλάνη.



ἵππων μάλιτα τὸν ἐρυθρὸν εἶν πινόμεν δι' ὕδατος ἢ οἴνου, ἢ ὑποκυστῆς. ἄριος ὁ καρπὸς Φρυγείας μετ' οἴνου πινόμενος. σάμιος ἄσπερ, λημνία σφραγίς, πτύα λαγωῦ, ἢ ἐρίφου, ἢ ἀρνὸν, ἢ μόσχου, ἢ ἐλαφείας. γίγαρτα, λεία, μύρτα, ὄμφαξ, ξηρός, πίπτος Φλοιός, καὶ τὰ ἴππια τῆς αἰμορραγίας ὑστερας εἰρημύρα, τὰ μὴ λίαν δρασήρα. ἄπαν ἢ μὲ πόνου φέρεται, διὰ μητραγωγίαν, ἢ κλυσῆρος, χυλὸν ἀλικῆ, ἢ πρισάνης, ἢ τράγας, ἢ ὀρύζης ἐνεπὶον αὐτῶν, μὲ πινος τῶν ἀνοδιῶν Φαρμάκων, καὶ ἐν ἴσ' τοῖς παροξυσμοῖς, παρηγορητικὸν ἐν ἴσ' τοῖς ἀλείμμασι, περιόδισι γὰρ ἐπίοτε, μετασυνκρίνειν ἐάριαις διαφόροις, πεπαισῶσι, ἀναφωνήσσειν, ἀλείμμασιν, σικύαις δράπαξι καὶ τῶν ὑπερκειμμένων, κλιώσσει, τρέψει. ψιλῶθροις, σμηγμασι, σναπισμοῖς, ἐμέτοις δὲ τὰ ραφανίδων, ἀναληπτικῆ Ἰππιμελεία, λυτρεῖς, οἴνω, ποικίλῃ τροφῇ.

ΠΕΡΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΤΣΤΕ-
ρας καὶ παρεκλύσεως.

Κεφάλ. ξδ.

Ἡ Φλεγμονὴ τῆς ὑστερας ἐκ πλεόνων αἰτίων γίνεται. Ἐστὶ γὰρ ἐκ πληγῆς, Ἐστὶ τῆς τῶν ἐμμηλῶν ἐπιπύσης, δὲ τὴ ψύξεως Ἐστὶ πινόμενων, Ἐστὶ ἠκίσεως δὲ Ἐστὶ ἀμβλώσεως, Ἐστὶ ἐκ τοκετῶν ἀφ' ἀκακῆς κινήσεως. παρέπειται ἢ τῇ Φλεγμονῇ τῆς μήτρας, πυρετός, ὄξυς, ὀδύνη τε, τῆς κεφαλῆς, καὶ πένοντος. Ἐστὶ ἄσπεων ὀφθαλμῶν, καρπῶν τε καὶ δακτύλων, Ἐστὶ τραχήλου καὶ σπασμῶς. παρέγκλισις ἴππια πίναντα, σμάχος συμπαθῆα. μύσας τῆς ὑστερας σμίαις σφυγμοὶ μικροί, πυκνοί. Ἐστὶ ἐν μὲν ἀμυδρᾷ εἴη ἡ Φλεγμονή, ἐκ ἰσχυρῶς αὐτῶν ὀδυνῶν τὴν ὑστεραν. εἴ ἢ ἰσχυρῶς, καὶ αὐτῇ πᾶσαι σφυγμαλιδῶς ὀδυνᾶται. ὅλη μὲν Φλεγμονή, νασα, δι' ὅλης αὐτῆς. εἴ ἢ μέρος Φλεγμονή, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ὀδυνῇ διασημαίνει. τῶν μὲν γὰρ ὅπως ἐν αὐτῇ μόνον Φλεγμονόντων, τὸ ἀλγημα καὶ τὴν ὀφθαλμῶν γίνεται. τὸ σκύβαλον ἐπέχει, θλιβομένης Ἐστὶ ἀπὸ θυσμῶν. τῶν δὲ ἐμπροσθεν, ἢ τε ὀδυνῇ καὶ τὸ ἥτρον, καὶ σπαραγγεῖα ἢ δυσχερῆ γίνεται, τῆς κύστεως θλιβομένης τῶν ἢ πλεονῶν Φλεγμονόντων, οἱ, τε βεβῶνες τείνονται. καὶ τὰ σκέλη βαρύνονται, Ἐστὶ δὲ πύγματος Φλεγμονόντων, καὶ τὸν ὄμφαλον ὁ πίνος μάλιτα γίνεται σὺν ὄγκῳ. περὶ ἢ τὸ σμίον ἕως τῆς Φλεγμονῆς, καὶ τὸ Ἰππιόσπιον ὀδυνῶνται, καὶ τῷ δακτύλῳ καὶ μετὰ σκληρὸν καὶ ἀπηνές ὑπὸ πίπται τὸ σμίον. ἐν οὖν τῇ θεραπείᾳ. πρῶτον

Hippuris rubicundum maxime fluxura sistit pota ex aqua aut uino, item hypocystis, lentisci fructus torrefactus cum uino potus. Samius aster, Lemnium sigillum, coagulura leporis aut hœdi, aut agni, aut uituli, aut cerui, uinacea trita, myrti baccæ, uua acerba sicca, pinus cortex, & quæ in sanguinis ab utero eruptione dicta sunt, quæ non ualde efficacia existunt. Quum uerò cum dolore fertur, per uteri fusorium aut alium clysterem, succum alicæ aut prifanæ, aut tragi, aut oryzae, infundito, cum aliquo dolore sedante medicamento. Et in exacerbationibus quidem mitigatoria adhibeantur: in interuallis autem, (per circuitus enim aliquando affligit) ex alto euocare ac meatus transmutare oportet per diuerfas gestationes, deambulationes, uociferationes, iunctiones, cucurbitas, dropaces partium superincumbentium, insolationes, frictiones, psilothra, smegmata, sinapismus, uomitus à raphanis, uictum refectionum, balnea, uinum, uarium cibum.

DE INFLAMMATIONE
uteri ac declinatione.

Caput LXIV.

INflammatiō uteri fit ex pluribus causis. Nam & ex plaga & mensium suppressione & frigiditate, & inflatione: non minus etiam ex abortu, & partu propter malam partus editionem. Sequitur ad uteri inflammationem febris acuta, dolorque capitis ac tendinis, & basis oculorum, juncturaeque manuum ac digitorum, & colli detractio, & declinatio ad contraria, stomachi per consensum affectio, osculi uteri conclusio, pulsus parui, densi. Et si obtusa fuerit inflammatio, non uehementer uterum dolent: si uerò fortis, etiam ipse totus pulsatorio modo dolet per totum, si totus est inflammatus: si pars inflammata fuerit, circa hanc magis dolor de se significationem præbet. Si enim posteriores ipsius partes solum inflammatae sunt, dolor circa lumbos fit, & stercorea supprimuntur ex recti intestini compressione: si anteriores, dolor circa pectinem fit, & urinæ stillicidium, ac emittendæ difficultas ex uescæ compressione. At lateribus inflatis & inguina tenduntur, & crura grauantur, si uerò fundum ipsius inflammatum fuerit, circa umbilicum dolor maxime consistit cum tumore. At si circa osculum est inflammatio, circa supernum uentrem dolent, & digito immisso durum ac renitens osculum occurrit. In curatione igitur, primum irrigatio-



Itigatione extremis & oleo aut vino & rosaceo
 utendum est, circa pedinem & lumbos
 per hapsos ianæ putæ; circa deligationem
 Cibi abstinentia indicitur usque ad tertium
 diem, post quam uena secanda est in cubito
 si nihil prohibuerit. Nutriantur autem ali-
 ca ex aqua mulsâ aut pane, aut ouo forbili, al-
 ternis diebus: Post quintum diem cata-
 plasma imponatur ex polline, semine lini
 scœni grecico, ex aqua mulsâ, in qua papaueris
 capita cocta reiecta sunt, & oleo. Si uero
 indigetur aduersus caliditates inflammatio-
 ut pote ignis sacri naturam habens, ad me-
 lilotum in passo coctum ut tritum adijce: ui-
 tellos ouorum affatorum cum rosaceo, aut
 melino, aut crocino & impones, aut palmu-
 las nigro diluto feruefastas cum polente pol-
 line terito addito aliquo ex relictis unguentis
 & imponito. Declinatione uero contingen-
 te, ceratum nardinum, aut cyprinum adhi-
 bero, per totam uero curationem, etiam in-
 cessibus utendum est, ex decocto scœni greci,
 aut seminis lini, malua, artemisia & ex oleo
 in ijs autem quæ ferre nequeunt calorem,
 ex aqua calida, affuso rosaceo. Pelli uero &
 infusa assumantur, ex casypo, butyro, medul-
 la ceruina, adipe anserino, unguento susino
 & cera Tyrrhenica. Verum quæ calorem
 sustinere possunt, in ijs etiam aureus appel-
 latus pessus conueniet, & encepharmæus:
 quæ uero non sustinent, cum ouo & rosa-
 ceo, & adipe anserino aut gallinæ. Ad
 feruidiores autem inflammationes, empla-
 strum ex succis in duplici uase cum rosaceo
 liquefacito, & succum plantaginis, aut seridis,
 aut Cichorij, aut intybi misceto: aut hoc uti-
 tor: Adipis anserini, aut suilli recentis
 drach, quatuor, cerati rosacei, aut susini sex-
 tantem, uitellorum ouorum affatorum un-
 ciam unam, croci drach. unam, myrrhæ o-
 bolos tres, opij obolos duos, aut pro opio pa-
 paueris capitum decoctum. Si uero multus
 uexat dolor, succi papaueris magnitudinem
 sabæ cum lacte muliebri ac succo scœnigræci
 apponendam præbe. Catarum ad inflam-
 mationes cum duricia, emplastrum tetra-
 pharmacum rosaceo dilutum apponito, aut
 infundito. Quin & declinationes uterici-
 ca exacerbationes quidem, similiter uelut in-
 flammationes curentur, uerum in remissionibus,
 & in alij declinatione, ijs quæ magis molliunt uten-
 dum est: in inueteratis autem, ijs quæ ex al-
 alto euocant, & meatus transmutant. Si uero
 extrinsecus duricia est, malagmatis uten-
 dum, eo quod ex meliloto paratur, & Mina-
 læ in scripto, & Icosij, & melino

ἢ ἐμβροσθῆ δι δινελαίς ἢ οἶνοροδίνῃ χρῆσθαι,
 κατὰ πέντες ἢ ἑξήσφου διὰ πλημάτων ἐξ-
 εἰς καθαρὰ χωρὶς ὀπιδέσεως καὶ ἀσπία μὲν
 χρεὶ διατρέιτα μὲν ἢ φλεβοποιητικὸν ἀπ' αἰγ-
 κῶν ὅτι εἰ μὴδὲν κωλύει. θρεπτικὸν δὲ χόνδρω ἐκ
 μελικράτους ἢ ἀρτώ, ἢ ὠῶν ῥοφήτῳ ὡραμίαι.
 μετὰ δὲ τὴν πέμπτην καταπλαστικὸν γύρει, λι-
 νοσπέρμῳ, τήλει, διὰ μελικράτους ἐν ὠκῶθαι
 ἀφειψήθεισιν ἐρρίφθον, καὶ ἐλαίς, εἰ δὲ ἀγα-
 νακτοῖα πρὸς πᾶσι θερμασίας ἢ φλεγμονὴν ἐρυ-
 σιπελατώδης ἔσται, μελιλωτὸν ἐψήσας ἐν γλυ-
 κείῃ καὶ τρέψας, ὀπιβάλλει λεκυθῶν ὠπῶν,
 πῶ ροδίνῳ, ἢ μηλίῳ, ἢ κροκίνῳ, καὶ καταπλασ-
 σε, ἢ φοινίκας οἶνῳ κέκραιδῶ ζεσῶς λείψ με-
 πηπῆλης, ἀλφίτων καὶ πινος ἰαν εἰρημῶν μύ-
 ρων ἑ καταπλασσε. ὡρακμῆς δὲ γενομένης
 κηρωτὴν ναρδίνῃ, ἢ κυπρίνῃ ἐπὶ ῥιπίτον. παρ'
 ὅλλῳ δὲ τὴν θερμασίαν καὶ πῆς ἐγκαθί-
 μασιν χρῆσθαι δι' ἀφειψήματος τήλειος ἢ λινο-
 σπέρμῳ, μαλακῆς, ἄρτεμισίας, ἐλαίς ὅτι δὲ
 τῶν μὴ ἀνεχομένων τῆς θερμῆς, δι' ὕδατος θερ-
 μῆ ροδίνῃ ὀπιχσοιδῶ πρὸς δὲ ἑ γχυμα-
 τισμῶς ὡραληπίον, δι' ὕδατος ἢ ἢ ἐσπύ-
 ρῃ, καὶ μυελῷ ἐλαφίῳ, καὶ κηρῶς σέας, καὶ σα-
 σίνῃ μύρῃ, καὶ κηρῷ τυρρηνικῷ. ἐφ' ὧν ἀνεχόν-
 ται θερμασίας, καὶ χρυσῶς δὲ πρὸς τὰ γενε-
 ἰδῶς πρὸς ἀρμόσει τῶ τῆς, καὶ ἢ ἐνεκαφάρ-
 μακος. ἐφ' ὧν δὲ μὴ ἀνεχόνται, δι' ὠῶ, καὶ
 ροδίνῃ καὶ κηρῶς σέας ἢ ἔρηνθος, πρὸς δὲ
 πᾶς σπυροδέστῃς φλεγμονῆς τῆς διὰ χυλῶν
 ἐμπλάσσει ἐν διπλωματι μετὰ ροδίνῃ τήλειος
 μίγνυε χυλὸν δρονογλώσσου, ἢ σέρας, ἢ κηρω-
 τῆς, ἢ ἰντύβῃ ἢ τῆ τῶ χρω. σέας ὅ κηνίου, ἢ
 ὕεις πρὸς φάτις L. δ. κηρωτῆς ροδίνῃς, ἢ σα-
 σίνῃς Γο. ε. ὠῶν ὀπῶν λεκυθῶν Γο. α. κρο-
 κῆ L. α. σμύρνης τριώβολον. ὀπιχ ὀβολῶς ε.
 ἢ ἀπὸ ὀπιχ κωθῶν ἀφειψήμα. πολλῆς
 δὲ τῆς ὀδύνης ἔσται, ὀπιχ μήκων ὅσον φα-
 κῆ μέγιστον μετὰ γάλακτι γυναικείῃ,
 καὶ χυλῷ τήλειος, δίδει πρὸς τῆς. πρὸς δὲ
 πᾶς μετὰ σκληρίας φλεγμονῆς, τὴν περα-
 φάρμακον ροδίνῃ λύσας, πρὸς τῆς ἢ ἑ γχει
 καὶ πᾶς παρεγκλησῆς δὲ, κατὰ μὲν τῶν πα-
 ροξυσμῶς ἐμφερῶς τῆς φλεγμονῆς θερ-
 πῶτον. ἐν δὲ τῆς ἀνέσει καὶ παρακμῆς,
 μαλακτικώτερος, καὶ χροσιάντων δὲ, τῆς
 μετσογχετικῆς, ἔξωθεν δὲ σκληρίας ἔ-
 σης, μαλαγμῶσι χρῆσθαι, τῶ διὰ μελιλω-
 τῶν, τῶ μνασῆς, τῆ ἰκείσῃ, τῆ μελίση



σαραπίωνος, ή τή πυρήνη. Διατα δέ, κατάρ-
χας μὲν λεπτή. ὡρακμῆς δέ θυομένης ὀλί-
γης, ἵππ λαστέον ἀκτίον. πικυλοπέρα π καὶ
ἀδροπέρα χρῆσιον τροφή.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ

ύστερας.

Κεφαλ. ξ ε.


Τῆς φλεγμονῆς εἰς ἀπόστασιν μεταβαλλο-
μένης τὰ μὲν λεχθέντα σημεῖα ἵππ παθήσεται,
πρὸς τὴν δὲ ἀπακτὴν μετὰ φελκῆς αὐτῆς ἵππ
σημασίαι γίνονται. κατὰ μὲν οὖν πρώτας χρο-
νικὰς ἵππ τεταμέναι σὺ τῆς ὀδύνης. τελείως δὲ
ἀλαπηυσίσης, ἵππ πρὸν ἀνιένται. ὡς δὲ τὴν τῆς
ρήξεως καιρὸν οἵτι πῶνοι ὀρμηύτεροι πολλὰκις ἐδο-
ξαν ἐμπεσεῖν νυγματώδως, καὶ τὰ πυρέπια,
σφοδρότερον ἐνοχλεῖ, καὶ πῶτὲ μὲν ἔρον ἐπέχε-
ῖ πῶτὲ δὲ κέπεθ. ὡς δὲ τὸ πῶνθος τῆς ὑστερας
μέρος γινόμενός τ' ὡρακμῆς. πῶτὲ ὄγκος
ὡς δὲ τὸ ἐφέβαιον, καὶ οἷον κλυδατμῆς συναί-
θησις, ὁ πῶτὲ τ' ἀπόστημα μείζον ἢ. τὸ δὲ ἐν τοῖς
προχειροῖς τόποις καὶ ἀφ' ἀποπλησμοῦ, ἢ δακ-
τύλων ἀφῆς κατὰ λαμβάνεται. πρὸς τὸ ἔπις
ὀδύνας ἰσχυροτέρας ἰσχεῖν ἀφ' ὀδύνας δὲ
σμίς ὡσπερ ἐν τῷ ἐν τῷ πυθμένι, καὶ κατὰ τὸν
κόλπον, ἀπονοτότερον ἐστίν, ἔ τῶς μὲν δακτύλοις
ὄγκος ἐκ ὑποπίπται. τὸ δὲ σμίον ἰσχυρότερον
δείκνυται. τῆ μὲν ἐν τῷ χιόνι ἐκπύησει ἀνέργη-
τόν ἀφ' ἑ κατὰ πλάσμάτων τῶν ἀφ' ἡλέως,
καὶ λινοπέριμυ, καὶ κελθίνης ἢ σιτίης ἀλδύρα, πα-
ραταλεκομένων αὐτοῖς σῶκων ἐφθῶν. πῶτὲ δὲ
καὶ ὡριστερὰς κόπερα. καὶ ἐγκαθίσμασι δὲ τοῖς
ἵππ φλεγμονῆ σιωχεστέρον χρῆσιον. καὶ πῶ-
σις διὰ πρεβυθίνης, καὶ σμύρνης, καὶ ὑσώπης, ἔ
ἔσπυρα σῦρραγέντος ἢ ἀπόστηματος. εἰ μὲν ἐπὶ
κύστιν ἐνεχθῆ τὸ πῶν, γαλακτοπόσις χρῆσιον,
καὶ σικύς σπέρματι πῶσιον. εἰ ἢ εἰς ἀπόθυσα-
μένον σῦρραγῆ, φακῆς ἔ σιδίον ἀφειψήματι
κλυτέον. εἰ ἢ κατὰ τὸν κόλπον ἐργείη, καθαρὰ μὲν
ὄντως ἔ πῶς ῥόδιον ἐγχυματίζην ἢ λευκασ-
μένον ἔλαιον, ἢ τῶν πῶρα φάρμακων βασιλικήν,
ἢ ἔσπυρον πρὸς φατῶν ἰσχυρὸς ἢ φερομένης λε-
πίης, δυσώδης, ὡς ἀπὸ οὐμῆς ἐπιπικώτερον ἐσὼ
τὸ ἔνεμα διὰ μύρτων, φοινίκων, φακῆς, καὶ μῆ-
τῶν ἐκκρίσιν τῶν ὑγρῶν, εἰ φλεγμονοῖεν, ἵππ-
μενετέον τοῖς τε κατὰ πλάσμασι, καὶ τοῖς ἐγκαθί-
σμασι ὡς ἢ τὸ σμίον τῆς ὑστερας ἰσχυρόν τ' ἀ-
πόστηματος ἔ μὴ σῦρραγνυμένον μῆ τὸ λεπτοπο-
θῆναι κατὰ ἐπικείμενα τῷ πῶ σῶματι ἐπὶ τῆ δια-
χρηργείας ἐκκρίσει ἔ πῶς τρεσπῶμεν. ὡς ἐν
τοῖς χρεργεργαμένοις εἰρήσει).

Sarapionis, aut pyrino, emplastris. Victus
ab initio quidem sit tenuis, declinatione uero
modica contingente, ad balneum ducantur, &
pleniore cibo utantur.

DE ABSCISSIS V

Caput LXV.

Si In inflammatio in abscessum mutatur,
relata signa intenduntur, insuperque inor-
dinatae exacerbationes cum horrore ipsis fi-
unt, primis quidem temporibus intensae,
cum doloribus: perfecte uero suppuratione
facta, aliquantum remittunt. Verum circa
ruptionis tempus, & dolores acriores saepe
punctorio modo irruere putantur, & febriculae
vehementiores uexant, & aliquando
urina supprimitur, aliquando stercus, circa ab-
scctam uteri partem impedimento contin-
gente: aliquando uero tumor circa pubem,
& uelut fluctuationis sensus, ubi abscessus
maior fuerit. Qui uero in expeditis locis
est, etiam per dioptram instrumentum im-
missum, aut per digitorum contactum de-
prehenditur, supra hoc quod etiam dolores
vehementiores habent propter osculi ner-
uositatem: quemadmodum sanè in fundo
abscessus, & in sinu minorem dolorem in-
duct, & digitis quidem tumor non occur-
rit, osculum autem gracilius comparat. Pro-
inde quò citius suppuretur, auxilium ferend-
um est, cataplasmatibus ex faeno graeco, semine
lini, hordeaceae aut triticeae farinae, admixtis
ficibus coctis, quandoque etiam columbino
fimo, sed & in scissibus inflammationi con-
gruis assidue utendum est, & pellis ex tere-
binthina, myrrha, aegyptio, & butyro. Rupto
autem abscessu, si quidem ad uescicam pus
delatum fuerit, lactis potu utendum est, &
cucumeris semen bibendum. Si uero ad
intestinum rectum eruperit, lentis ac mali-
corij decocto colluatur per clysterem infu-
so. At si ad sinum ruptus fuerit abscessus,
si quidem purum pus fuerit, rosaceum infun-
datur, aut oleum in albatum, aut tetraphar-
macum regium emplastrum, aut butyrum
fecens: si uero sanies tenuis graueolens fe-
tatur, uelut ab ulcere depascendo proserpen-
te, adstringentius sit infusum, ex myrti baccis,
palmulis, lenticula. Et post humorum ex-
cretionem, si inflammatio permaneat, in cata-
plasmatis ac in scissibus perseverandum est. Ca-
terum si circa uteri osculum abscessus fiat, & nõ
rumpatur, postquam tenues factae fuerint, par-
tes puti incumbentes, ad puris excretionem
per Chirurgiam nos conuertemus, uelut in
Chirurgiae tractatione dicetur.



DE VL

DE VLCERATIONE uteri.

ΠΕΡΙ ΕΛΚΟΣΕΩΣ ὕστερας.

Caput LXVI.

Κεφάλ. 5.

Ulceratur sæpe uterus ob partus difficultatem, aut foetus extractionem, aut corruptionem, aut ab acris medicamentis, aut à fluxione, aut ex abscessibus ruptis. Si igitur exposita fuerit ulceratio, per dioptræ usum deprehenditur. Si uerò in profundo, exijs quæ excernuntur. Humor enim diversus excernitur, inflammato quidem ulcere, paucus, cruentus, aut fœculentus, cum dolore: si uerò sordidum est ulcus, copiosior, & tænies cum minore dolore: si uerò depascendo proserpit, graecolens, niger, cum uehementioribus doloribus, & alijs inflammationis signis, & irritatio ad laxatoria medicamenta, ad contraria uerò alleuatio. Putrum uerò si est ulcus, humor paucus, æqualis, sine odore, crassus, albus, cum sensu facilitate. Si igitur inflammatum est ulcus, ijs quæ ad inflammationem relata sunt utendum est. Si uerò sordidum, pitisanæ succus cum melle infundatur, aut tetrapharmacum emplastum cum susino aut aqua mulsa, cocto in ipsa scœnograceo, aut malua, aut sursufibus, aut lente decorticata, aut quod magis expurgerat, marrubio aut eruo, aut admixtam mellis erui farinam, aut iridem, aut alumen rotundum, aut simile quiddam immittito. Hæc ipsa etiam forinfecus cataplasmatibus modo imponuntur aqua mulsa subacta. Peculiaris autem prodest hoc medicamentum: Crocus optimus teritur cum lacte muliebri, deinde rosaceo cerato exceptus cum adipe anferino illinitur lanæ tomento. Præstantius hoc est, quod etiam ad dolores conducit. Capita papaueris in passo diluto macerantur ad triduum, deinde coquantur donec flaccescant, postea teruntur cum foliorum rosarum drachmis 5, croci drach. tribus: admixto capitum papaueris decocto: deinde ceræ drach. duæ cum rosaceo liquatæ affunduntur, & in pefso apponuntur illito ex rosaceo. Facit etiam id quod ex ouis, croco, rosaceo, adipe anferino, & medulla ceruina paratur, & emplastrum Ægyptium absque ærugine mirificè ad ulcerationes facit. Si uerò ulcus depascendo proserpit cum inflammatione, imponatur panis purus maceratus cum aqua mulsa, oleo, althæa,

Ελκῆται πολλάκις ἡ ὕστερα, διὰ δυσκοίαν, ἢ ἐμβρυαλκίαν, ἢ φθοράν, ἢ ὑπὸ Φαρμάκων ὀνημέων, ἢ ὑπὸ ρεύματος. ἢ ἐξ ἀποσημάτων σπύραγόντων. εἰ μὲν ἔν περὶ χέρος εἴη ἡ ἐλκῆσις, διὰ διοπηρισμὸν καταλαμβάνει. εἰ δὲ διὰ βάθους, ἐκ τῶν ἐκκερνομένων, ὑγρὸν γὰρ ἀποκρίνεται διὰ Φυρον. Φλεγμονόντος μὲν ἔλκους, ὀλίγον, αἱμαλωδέες, ἢ τραγωῶδες, σὺν ωβιοδιωία. ῥυπαρὰ δὲ ὄντος, πλεῖον καὶ ἰχώρες σὺν ἐλάσσονι πύρῳ. νεμομένη δὲ δυσώδεις μέλαν, σὺν ἀλγῆμασιν ἰσχυροτέροις, ἔ τοῖς ἄλλοις τῆς Φλεγμονῆς σημείοις. ὁ δὲ ἐρεθισμὸς, πρὸς τὰ χαλαστικά τῶν Φαρμάκων. πρὸς ἢ τὴν ἀντία, κατὰ Φισμὸς. κατὰ δὲ ὄντος, ὑγρὸν ὀλίγον ὀμαλὸν, ἄοσμον, πικρὸν, λεῖπον ὑπὸ διαίτησις. Φλεγμονόντος μὲν ἔλκους. τοῖς πρὸς Φλεγμονὴν εἰρημένοις χρῆστέον. ῥυπαρὰ δὲ ὄντος, πλείονης χυλὸν μετὰ μέλιτος ἐγκλυτέον, ἢ τῶν τετραφάρμακον μετὰ σακίνας, ἢ μελικράτους εἰσημένης ἐν αὐτῷ τήλεως, ἢ μαλάχης, ἢ πτύρων, ἢ φακῶν λεπτομένων. πρὸς δὲ τὸ μάλλον ἀνακαθαίρει, καὶ πρῶσις, ἢ ὀρόβος, ἢ μέλιτι πρὸς ἀπλέξαντα ἔ ὀρόβος τὸ ἀλβύρον, ἢ ἔριον, ἢ σπιθήριον ἐρογυλίω. ἢ τὶ τῶν ἐμφερῶν πρὸς ἀπέμπειν. τὰ τοῖς δὲ αὐτοῖς καὶ ἐξωθεν καταπαλάττειν, μελικράτῳ πεφυραμένοις ἰδιαιτέρον πρὸς Φέλις τὸ δὲ τὸ φάρμακον, κρόκος καὶ λίγιστος λεοίνεσαι μετὰ ζυναυκίαις γάλακτος, εἴη ἀναληφθεῖς κηρωτῆ ροδίην μετὰ χηνείας ἔσεται. ἐγγρέεται κροκίδι. τὰ τε δὲ πρὸς ἀποκαθάρσιν, καὶ πρὸς ωβιοδιωίας ἀρμόζον τὰ το. κωδύβαι μήκων. ἐν γλυκῆ κεκραμένῳ μίγνυται ὅππῃ ἡμέρας γ. εἴτα εἰσένται εἰς πακερωθῶσιν, εἴτα τρίβον. αἶμα ροδοφύλων L. ε. κρόκος L. γ. πρὸς ἀμίνυμῶς ἔ τῶν κωδυῶν, ἀφειφήματος. εἴτα καταχεῖν αὐτῶν, τήξονται σὺν ροδίῳ κηρῶ L. ε. καὶ προσθέσθαι ἐν πρῶτῳ, χροῖσαντα ροδίῳ. ποιεῖ δὲ καὶ τὸ δι' αἰῶν ἔ κρόκος, ἔ ροδίον ἔ χηνὸς ἔσεται, καὶ ἐλαφίον μυελῶ σκευάζομενον. καὶ ἡ αἰγυπία δὲ ἡ διχατῆ ἰδ θαυμασιῶς ἀρμόζει πρὸς τὰς ἐλκῶσεις. νομῆς δὲ οὐσίας, σὺν Φλεγμοσῇ μὲν, καταπαλάσειον ἄρτῳ χλιαρῶ πεφυραμένῳ δι' ὑδρομέλιτος, καὶ ἐλαίας καὶ ἀλθαίας, καὶ τήλεως,



καὶ τήλειος, καὶ Φοινίκων λιπαρῶν ἐνεπίον δι-
 χυλὸν ζηνολγώσας, σφύγγας, πολυγῶνας, σέρε-
 ως, πρῶτον μὲν καθ' αὐτὰ, ὑστερον δὲ μετ' οἶνον
 αἰσθητὴν ἢ ὄξυς. ἀνδρὶ δὲ Φλεγμονῆς τῆς νομῆς
 καταπύργου, ἐνεπίον τὸ ὑπὸ πύργου, καθ' ἅπερ
 ἀφειψήματα σιδῶν, ῥόδων, θαλίαις κυπαρίσσε, μῆ-
 λων κυδωνίων, βάττε, μύρτων, ὀξίνε, ῥάμνε, ῥόυ-
 σκυ πειψικῆ, δι' οἶνον εὐφοντα. ὑστερον δὲ κ, εὐ-
 πηρίας, ἀκακίας, λυκίαις ὑποκυτίδος. ἐκ δὲ
 τῶν αὐτῶν ἀφειψήματων, ἔσω ἢ ἐγκαθιστά,
 μὴ προσκῆπτοντος δὲ, ἐπιέναι τὸ διὰ χάρτε μετ'
 ὄξυκρετῆ τὸ πρῶτον, εἶτα ὄξυς, ἢ τὴν αἰθηρῶν,
 ἢ χαλκίτιν, ἢ χαλκαυθὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὑγρῶν.
 καὶ τὰ τοῖς δυσεντερικῶς ἀρμόζοντα. διδόναι ἢ
 προσφύω εὐχυμον, ὀλίγην. καθαρῶς δὲ γυρομύξ
 ἔλκυσ, λένει τε, πικιλώτερον καὶ τρεφεῖν, καὶ
 εἶνον παρέχειν, ὅπως ἡ σάρκωσις ταχέως γίνω-
 ται. ἐν πρῶτῳ δὲ μέρει προσθεῖτον τὴν διὰ μό-
 ρων, ἀναιμένειον διὰ καδμίας, ἢ λαδάνε, ἢ μο-
 λυθδαίνης. ἔξωθεν δὲ καὶ ἀπὸ κλωπικῶν ἔμ-
 πλαστρον ὀπιπέθρον ὀπιπασρίω ἢ ἰχθυοῖς, ὡσαύ-
 τῶν καὶ πλάσματος, ἔτω καὶ τῶν ἐμπλά-
 στρον ἢ διώαμις διὰ τῶν ἀδήλων διανεχθήσεται
 σπῶν.

ΠΕΡΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

κεφάλ. ξζ.

Τῶν ἐν τῇ μήτρᾳ καρκίνων. οἱ μὲν μεθ' ἔλκω-
 σεως, οἱ δὲ χωρὶς ἔλκυσ συνίστανται. ὅππῃ μὲν ἐν
 τῶν ἀνεγκλήτων, ὄγκος ἐξίσταται πρὸς τὸ σῶ-
 μιον τῆς ὑστερας σκληρὸς, ἀνώμαλος, ὀρθῶδης,
 χεῖρα τευγῶδης, ἐνερωθῆς. ποτὶ δὲ καὶ ὑποπέ-
 λιος. ἢ πονδῶν ἰσχυρῶς κατὰ τε θεθῶνας καὶ
 ὀπιπασρίον, ἢ ἕτερον, καὶ ἐσφύω, ἀγανακτεροῖ τε
 πρὸς τὰς χειραψίας καὶ τὴν πικιλώτερον φαρ-
 μακείαν, ἢ λκωμένε ἢ ὄντ' ἢ καρκίνε, πρὸς
 τῆς ὀδύνας καὶ σκληρίας. καὶ ὄγκω διαβεβρω-
 μένα, καὶ ἀνώμαλά τε ἔλκη θεωρεῖται. καὶ μὲν
 τὸ παλαιόν, ῥυτῶρα ὀρθῶδη, λδκαυθίζοντα,
 εἰδεχθεῖς ὀπιπάγες ἔχοντα. τὰ ἢ δοκῶν τε κα-
 θαρῶ, τευγῶδη, πελία, ἐνερωθῆ καὶ διαίμα
 φαίνε. ἢ κκερμένε) δὲ διηνεκῶς ἀπ' αὐτῶ ἰχθῶρ
 λεπτός, ὑδατῶδης, μέλας, ἢ πυρρός, δυσῶδης.
 ἐπίοπῃ ἢ ἄϊμα φέρε, τὰ τε ἄλλα σημεῖα ἐπι-
 φλεγμονῆς ὑστερας εἰρημένα. τὸ μὲν ἐν πύ-
 ρθῳ ἀνίατην, ὡσαύτῃ καὶ ἰπποκράτης ἀπ-
 φύωατο. παρεγροεῖν ἢ ὅμως αὐτῶ ἐγκα-
 θισμασι μὲν, τοῖς διὰ τήλειος καὶ μα-
 λάχης, καταπλάσμασι τε τοῖς ὁμοίοις. λί-
 αν δὲ παρεγροεῖσιν ἐν τοῖς παροξυσμοῖς,

fæno græco, & palmulis pinguibus. Infun-
 datur autem succus plantaginis, folani, po-
 lygoni, seridis, primum per se, postea cum ui-
 no austero aut aceto. Si autem sine inflam-
 matione nome depascitur, fortiora infundan-
 tur, uelut est decoctum malicorij, rosatum,
 oleæ uirgultorum, cupressi, malorum cydo-
 niorum, rubi, baccarum myrti, lentisci, rham-
 ni, rhois coriatij, ex uino adstringente : po-
 stea uerò etiam decoctum aluminis, acaciæ,
 lyciæ hypocystidis : ex iisdem uerò decoctis fit
 etiam infessus. Si non succedit, medicamen-
 tum aridum ex charta immittito, primum
 cum posca, deinde cum aceto : aut puluillum
 antherum, hoc est floridum, appellatum, aut
 chacitidem, aut atramentum iutorium cum
 iisdem liquoribus, item ea quæ dysentericis
 conueniunt. Dato autem cibum boni succi
 modicum. Puro autem facto ulcere, & la-
 uato & nutrito ueriegatius, & uinum exhi-
 beto, quò caro cito producatur. Pelli uice
 apponatur confectio ex moris dissoluta cum
 cadmia, aut ladano, aut plumbagine. Forin-
 fecus autem emplastrum cicatricem inducens,
 superno uentri ac coxis imponatur. Quema-
 modum enim cataplasmatum, ita etiam em-
 plastrorum facultas, per occultos meatus pe-
 netrans, transferetur.

DE CANCRO VTERI.

Caput LXVII.

CAncri in utero partim eum ulceratione,
 partim sine ulcere consistunt. In his
 igitur quæ sine ulcere sunt, tumor reperitur
 circa uteri osculum durus, inæqualis, præmi-
 nens, colore feculentus, rubicundus, quan-
 doque etiam subliuidus, & dolent uehemen-
 ter circa inguina & supernum uentrem, &
 pectinem ac lumbos, ægreque ferunt conta-
 ctum, & ueriegatiorem medicationem. Si
 uerò ulceratus est cancer, ad dolores, duri-
 tias & tumorem, etofa etiam, & inæqualia ul-
 cera conspiciuntur, plerunque quidem sor-
 dida, oris tumida, albicantia, turpes crustas
 inductas habentia : quæ uerò pura uidentur,
 feculenta, liuida, rubicunda & cruenta appa-
 rent. Excernitur autem assidue ab ipso fa-
 nies tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, graeco-
 lens, aliquando etiam sanguis fertur, & alia
 signa ad inflammatum uterum relata. Affe-
 ctio igitur ipsa incurabilis est, uelut alicubi
 etiam Hippocrates dixit : mitigare ta-
 men oportet per infessus ex fæno græco
 & malua & per cataplasmata similia.
 Valdè autem mitigant in exacerbationibus
 malua



malva aut althæa in aqua mulsa flaccida facta, & cum modico rosaceo contrita ac imposita: itemque cataplasma ex caricis, meliloto, ruta, thure, buniade herba cum oleo diligenter contusa, & cataplasma ex palmulis coctis in passo, additis ouorum vitellis, & polenta, aut cataplasma ex papauere cum coriandro, aut polygono, aut feride. Hæc quidem in doloris uexationibus: postea uerò ceratum adhibeatur ex rosaceo aut myrteo, aut cœnanthino, aut melino cum palmulis in passo coctis. Priuatim autem comodat, id quod ex fæce in æneis uasis in quibus aqua coquitur, subsidente paratur. Hæc enim fæx insuper assata minutissimè teritur, & cerato rosaceo excipitur ad emplastri compagem redacta. Et hæc quidem forinsecus. Intrinsecus autem mitigat locos etiam oleum: Si uerò ulcerati fuerint etiam lac muliebre infusum, & succus plantaginis tepidus: si uerò cruentati fuerint, succus polygoni cum modico thure mitigat, & pelli ex croco, & muliebrilacte, & succo papaueris & Oesypo. Omnibus autem efficacius est etiam ad sedis affectiones hoc. Spumæ argenti Italicae lotia sexuncem, thuris masculi, alypi, adipis porcini recentis, baryri recentis, ceræ Tyrrhenicæ, singulorum textantem, rosacei trientem. Spumam argenti feridis succo tritam liquatis adijce. Cibi dentur boni succi, qui facile concoqui ac distribui possint: uinum sit modicum aquosum. Vitent actium esum, & ciborum copiam. Promtè enim in ipsis cibi contrumpuntur.

μαλάχη ἢ αἰθάλα ἐν μελικράτῳ τὰ κερωθεύ-
σαι ἐ συλλειψμένη μετὰ ὀλίγῃ ροδίνας, καὶ κατα-
πλασοσώδη. Ἐ τὸ διὰ τῶν ἰσχυρῶν καὶ μελιλώ-
των, Ἐ πηγάνης, Ἐ λιβάνου καὶ βενιαδέος βοτάνης
καθημέρης ὀπτιμελῶς σὺν ἐλαίῳ, κατὰ πλάσ-
μα καὶ τὸ διὰ Φοινίκων ἐψημένων ἐν γλυκεῖ.
Προσλαβὸν λεκυθὸς ὠῶν, Ἐ ἀλφίτα ἢ μήκων-
νος μὲν κεραιάνης, ἢ πολυζώνης, ἢ σέρεως, ταῦτα
μὲν ἐν τῆς πεσοδωσίας. μὲν δὲ ταῦτα, κηρωτῆ
ὀπτιρρυθῆσθαι διὰ ροδίνας, ἢ μυρσίνας, ἢ οἶνον θί-
νας, ἢ μελίνας μετὰ φοινίκων ἐν γλυκεῖ ἐφθῶν.
ἰδίως δὲ συμπεφάνη, τὸ διὰ τῆς ὑποστέθης
τῆς ἐν τῆς χαλκίους, ἢ τῆς ἐποπτηθείσαι λήστευθεῖ-
ται καὶ ἀνολαμβάνει κηρωτῆ ροδίνη μέγρι συ-
στάσεως ἐμπλάστωδους, ταῦτα μὲν ἔξωθεν ἐσω-
θεν ἢ παρηγορεῖ ὄστυ τὸ πῦρ, καὶ ἐλαίον. ἐπειδὴ αὐ-
τὸ εἰλικυθῶν τὸ χροῖον, καὶ γάλα γυναικῆιον
ἐγχυματιζόμενον. ὁ, πικρὸς ἔξοχῶς γλάσσε
χλιαρός, εἰ ἢ αἰμάσσοι πικρὸς πολυζώνης σὺν
βράχει λιβάνου ἢ παρηγορεῖ καὶ πῶσι διὰ κρό-
κος, καὶ γυναικῆια γάλακτος, Ἐ ὅπῃ μήκων ὅ.
καὶ ὑσώπης. πάντων ἢ ἄμεινον ἐνεργεῖ, καὶ πρὸς
τὰς ἐδρικός διαθέσεις ἔστω. λιθαργύρος ἰταλι-
κῆς πεπλυμένης ἑ. 5. λιβάνου ἄρρενος, ὑσ-
σώπης, σίατος χοιρῆς νεαρῆς, ἐκτύρα προσφά-
τα, κηρὸ τὸ ῥηλικῆς, ἀνά ἑ. 6. ροδίνας ἑ. 6. δι-
πλῶ λυθῆργυρον λειώσας σέρεως χυλῶ, τῆς
τηκτοῦς ἐμβαλλε. προσφάσι ἢ διδιοικῆτες δοσιον
δύχυμης, οἶνον ὀλίγιστον ὑδαρῆ, φυλαττομένης
δριμυφαγίας, καὶ προσφῆς πλῆθ ὅ. ἐπίμως
γὰρ αὐτοῖς τὰ σία διαφθείρεται.

DE SCIRRHŌ ET
tumore duro.
Caput LXVIII.

IN scirrhum induratur uterus, aliquando
derepentè nulla prægressa causa: plerun-
que uerò inflammatione prægressa & neque
soluta, neque in abscessum transmutata.
Species autem scirrhii est etiam σκλήρωμα,
id est, tumor durus, in collo uteri maximè con-
sistens, qui quidem tumore similis est, mi-
nus autem renitens, cum moderato dolore.
Consequitur etiam in his declinatio ad op-
posita, estque tumor pro ratione affectionis
uehementer renitens cum grauitate, & ægro
motu non solum eturum, sed etiam totius
corporis, adestque ad actiones obeundas pigritia.
Sequitur non probè curatas malus habi-
tus aquosus. In principio itaque uena secetur,
aut purgatio assumatur per hierá Archigenis,

ΠΕΡΙ ΣΚΙΡΡΟΥ ΚΑΙ
σκληρώματῳ.
Κεφάλ. ξη.

Σκίρρηται ἢ μήτρα, ποτὲ μὲν αἰφνιδίως, μηδε-
νὸς προφανέντος, τὰ πολλὰ δὲ φλεγμονῆς
προσηγησμένης, καὶ μήτε λυθείσης, μήτε εἰς δόση-
μα μεταβληθείσης. ἐν εἰδει ἢ σκίρρη καὶ τὸ
λεγόμενον σκλήρωμα ἐστὶ, πρὸ τῶ τεραχῆλῳ τῆς
μήτρας ὡς μάλιστα σιμισάμενον. ὄγκον μὲν ὁ-
μοίως ἔχον, ἥσον ἢ ἀντίτυπον, μετὰ ἀλγήμα-
τος συμμέτρη. παρέπει) δὲ Ἐ τῆς παρῆγκλι-
σις ὅτι τὰ ἀντικείμενα, ὄγκος πρὸς λόγον τῆς
πέισσεως, ἰσχυρῶς ἀντίτυπος, μὲν βάρους καὶ δυσκι-
νησίας ἐσκελῶν μένον, ἀλλὰ καὶ ἔξ ὅλης σώμα-
τος. ὄγκος δὲ πρὸς τὰς πρᾶξεις. ἐπεὶ μὴ καλῶς
ἀχθείσης, καχεξία ὑδραῖδης. ἐν ἀρχῇ πί-
νω φλεβοσπητίον, ἢ καθαροῖν ὠρεῶ-
ληπίον, διὰ τῆς δεξιγένης ἱερέας.
εἶτα



ἔπα καπε πλάσματα διὰ ἰσχάδιον, ὑσώπευ, νί-
τρα, ἀλινθία ἔσικυας μὲ καταχρασμῶν μα-
λάγματα ἢ τὸ πολυάρχων τὸ Διὰ σπερμάτων,
τὸ Διὰ δαφνιδῶν. ἐνκεθισματα δι' ἀφειλή-
ματος ἰσχάδιον, ζεφυκίας, γλύχανος, ἀλθαί-
ας, πεσῆς διὰ πρεβινθίνης, χαλβάνης, σμύρ-
νης, ἱραως, ὑσώπευ, δρώπακος. ὑδάτων αὐτο-
φυῶν χρῆσις νιτρωδῶν, ἀσφαλτωδῶν, ἰαχύ-
ἢ ὑπέσις, ἢ ἔλλεθορισμός.

Π Ε Σ Σ Ο Σ Μ Α Λ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ .

Κηρὸς ποντικῆ, καρδίνης μύρα ἀνά Γο. γ. ἱρίνα,
γλυκίνης, κυπερίνης ἀνά Γο. β. στάσις ζεφτείς
ἢ χηνείας, βετύρις, οἰούπευ, μυελὸς ἐλαφίης, πρε-
βινθίνης ἀνά Γο. α. Ἄλλο. πλίς L. β. σμύρ-
νης L. δ. μὲ οἴνη μύρθησις λειώσις ἱρίνω δα-
σις, ποσὶ θεοῦ διδῶ. Ἄλλο. κηρὸς τυρρηνικῆ, στά-
σις μοχίης, πρεβινθίνης, μυελὸς ἐλαφίης, μέ-
λιτος ἀπικῆ, ἐλαίη παλαιῆ, ἴσα. μετασυγκρι-
πκὸν, ἢ πρὸς ἐπιδωμάτων, σαφίδος λωκίης
χωρεῖς τῶν γιάρτων Γο. γ. πηκίης χλωρῆ
φύλλον Γο. β. ὑδάτος θαλασσίης Γο. α. S. κυ-
μίνου L. δ. μέλιτος τὸ ζεφκῆν. Ἐπιχειρίσις δι-
επασὸν ἐμβαθεῖ κυπερίνω ἐλαίω ἢ προσίθει. καὶ ὁ
χρυσῆς ἢ πρὸς, ὁ, πλιθαίος, ἔδ' ἐννεαφάρ-
μακος ἀρμόζεισι τῇ Διὰ θίσει. ἰδιαίτερος δι-
ὁ πτικῶς.

Π Ε Ρ Ι Μ Τ Λ Η Σ .

κεφάλ. ξ. θ.

Καὶ ἡ μήλη σκίρρωδης ἐστὶν ὄγκος. ποτὲ μὲν καὶ
τὸ σύμιον τῆς μήτρας, ποτὲ ἢ καὶ ὅλην αὐτὴν,
προφανόμοδος ἀφ' ἡ λιθώδης μὲ καὶ πασασμῶ
τῶν ὑπερκειμένων ἐργασίας ἀρθείας τε καὶ
ἀνορεξίας, ἐποχῆς ἐμμείων, ἐμαδῶν ὄγκος.
ὡς ὑπόνοιαν συλλήψεως Ἐπιπίνων καὶ χεῖρας γί-
νεσθ. ὑπερον ἢ χεῖρας Διὰ κείνοντι. πνίς δι-
καὶ ὑδρίης παρεχσιν ὑπόνοιαν. Ἐτάτω Δι-
κελίον, τῇ π' ὄγκος σκληρία. καὶ τῷ μὴ γί-
νεσθ ἢ χον ἐν τῇ τῶν διακτύλων Ἐπιπείσει,
καθὰ περ ἔπι τῶν ὑδέρων. Ἐπιπείνον ἢ καὶ τὸ
ἀληθές εἰς ὑδερὸν μετῆς ἐπίοσι δὲ ἔδ' ἀνίατον
ὡς τὰ πολλὰ τὸ πᾶσι γίνεται. πῶσι δὲ καὶ αἷμα
φέρειται. κοινῶς μὲν ἐν κατάκλισις αὐτῆς ἐν οἰ-
κήματι μικροτέρω, καὶ σκοτηνῶ συμφέρει, καὶ με-
τρίως ἀναψύχοντι, κατὰ κλίνης ἀκίνητα, μετε-
ωρότερα τὰ πρὸς τὰς πόδας ἐχέσταις ἐν ἡρεμία.
προκλητικὴ γὰρ πάσις ρύσεως ἐστὶν ἡ κίνησις, καὶ
ὅστ' μὲν ὄγκος τε καὶ τὰς σκληρίας τῆς ἔπι
σκίρρων τε ἔδ' σκληρωμάτων μήτρας εἰρημύοις
ἰασίμεθα. τὰς δὲ ὑδέρικας παρεγχύσεις Διὰ

deinde cataplasmata ex caricis, hyssopo, nitro-
& absinthio, & cucurbita cum scarificatio-
ne. Malagmata uerò polyarchium, & ex
feminibus constans, & ex lauri baccis pa-
ratum; infusus ex decocto caricarum, artemi-
sia, pulegij, althææ: pessii ex terebinthina, gal-
bano, myrrha, iride, œsypo: dropaces item &
aquaturn naturalium nitrosarum usus, itemque
bituminosarum: uiribus autem tolerantibus,
etiam uerati usus.

P E S S V S M O L L I T O R I V S .

Ceræ Ponticæ, unguenti nardini, singu-
lorum quadrantem, irini, gleucini, cy-
prini singulorum sextantem, adipis ursini,
anserini, butyri, œsypi, medullæ ceruinæ,
terebinthinæ, singulorum unciam unā. ALIUS,
Polij drach. 2. myrrhæ drach. quatuor: cum ui-
no Mendefio trita & irino subacta apponenda
præbeto. ALIUS. Ceræ Tyrthenicæ, ad-
ipis uitulini, terebinthinæ, medullæ ceruinæ,
mellis Artici, olei ueteris, singulorum æqua-
les portiones. Medicamentum ex alto euo-
cans, facit & ad inflationes. Vuæ passæ albæ
exentis uinaceis quadrantem, ruræ uiridis
foliorum sextantem, aquæ marinæ sesqui un-
ciam, cumini drach. 4. mellis quod satis est,
Formatū autē inde pessum cyprino oleo intin-
ge, ac appone: sed & cyreus pessus, & libani-
us, & enncapharmacus affectioni commo-
dant, magis uerò propriè Titianus.

D E M O L A .

Caput LXIX.

Mola quoque, in scirrhum induratus tu-
mor est, aliquando circa osculum uteri.
aliquando circa totum ipsum comparens, ta-
ctu lapidis duritiam referens, cum detractio-
ne partium superincumbentium & gracillita-
te, decoloratione, ciborum inappetentia,
mensium suppressione, mammarum tumore,
adēd ut conceptus suspicio in aliquibus ab
initio fiat, postea uerò tempore discernuntur.
Quædam etiam aquæ intercutem suspicio-
nem de se exhibent, & hoc discernendum
est, tum tumoris duritia tum quod non fiat
sonitus digitis illis, quemadmodum in hy-
dropicis: in quibusdam autem reuera in hy-
dropem transitio fit. Quandoque etiam in-
curtabilis ut plurimum fit affectio, quibus-
dam etiam sanguis fertur. In communi igitur
decubitus in domo parua et umbrosa ac
tenebrosa conducit, quæ etiam moderatè
refrigeret, in lecto immobili, ita ut partes ad
pedes habeant sublimiores & in quiete. Nam
motus omnem fluxionem prouocare potest:
& tumores quidem ac duritias, his quæ ad
scirrhus & scleromata relata sunt curabi-
mus: uerum aquæ intercutem suffusiones,



per ea quæ dicta sunt in tractatione de hydrope. Sanguinis autem eruptiones, uelut sanguinis eruptiones, & fluxum muliebrem. Quidam tradunt molam esse carnem informem ad ipsas uteri tunicas consistentem, & quæ pariatu uelutifæctus. Sed & hæc species laxatorio curatio- nis ductu tradenda est, ut facilius excernatur.

DE INFLATIONE uteri.

Caput LXX.

Inflatur uterus ex frigiditate, aut foetus corruptione, aut partus difficultate, occluso osculo, aut sanguinis grumo in ipso obturato, quandoque in cavitatē spacij ipsius flatus conclusis, quandoque in raritatib. corporis ipsius uteri. In his sequitur tumor pectinis, & inri uentris, cum duricia & dolore punctorio usque ad septum transfertur. & stomachum ac inguina perpingente: & ad digitorum illisionem sonitus instat tympani oboritur. Curare igitur oportet primum uenæ sectione si nihil impediatur: deinde circa exacerbationes inedijs & irrigationibus ex oleo rutaceo, infessibusque ex decocto rutæ, pulegij, artemisiæ, casie & similibus: & cataplasmatibus ex semine apij, cumini, fœniculi, anisi, ammij & fatina loliacea: cucurbitis item leuibus & cum scarificatione. Moram uerò trahente affectione, purgatione utendum est ex picra & hiera & dropacismis ac sinapismis & balneis naturalibus. Obstetrix autem digito prius pingue facto immisso, incumbentem sanguinis grumum, si ita contingat ut adsit, educat leniter, ipsam exoluens, rursusque cataplasma imponatur ex ficu, nitro & absinthio. Epithemata uerò sint mollitoria, polyarchium & quod ex seminibus paratur, & quod ex lauri baccis. Pessii conueniunt ex suta, anelle, nitro, maximè uerò hic: Ficum pinguium contularum drach. una, cumini drachmæ dua, aphronitri drachma una. Verum propter accrimoniam prius in lac tingatur, sed & mollitorij pessii commodi sunt.

DE VTERI STRANGULATIONE.

Caput LXXI.

Strangulatio uteri est recursus uteri ad affectionem, per consensum ducens principalissimas partes uelut sunt arteriæ carotides, cor, membranæ cerebri. Sequitur in affectis accedente exacerbatione, mentis languor, pigricia, crurū debilitas, faciei pallor, aspectus tristis: instante autē suffocatione, sopor grauis, mētis emotio, infrumatorū sensu apprehensio

τῶν ἐν τῷ πρὸ ὑδέρων λεχθέντων. πρὸς τὴν αἱμαρ-
ραγίας, ὡς περὶ τὸν πνεῦσιν τῶν μύλων. σα-
κα φασὶν ἀδιάπλαστον πρὸς αὐτὴν πῆσι χι-
τῶσι τῆς μήτρας σπιγισμῶν. Ἐποπτικῶν
νῆν ὡς περὶ τὰ ἔμβρυα. Ἐστὶ τὸ εἶδος τῆς χαλα-
τικῆς ἀκτινὸν ἀγωγῆς, ὡς τε πύχιον ἐκκρίθηναι.

ΠΕΡΙ ΕΜΠΝΕΤΜΑΤΩΣΕΩΣ.

Κεφάλ. ο.

Εμπνεύματις ἡ μήτρα ἐκ ψύξεως, ἢ φθορᾶς, ἢ δυσφορίας & σμίκ μύσαντος. ἢ θρόμβου ὡς ο-
σφηνωθέντος ἐν αὐτῷ. ποτὲ μὲν ἐν τῇ κοιλότητι
ἐν κύττας, ὁποληφθέντων πινδύματων. ποτὲ ἢ
ἢ τῆς δρασμάσιν & τῆς μήτρας σώματος. αἷς
ἐπιτετα ὄγκος & ἡτρε κῆ & ἰσχυρασίς, μετὰ
σκληρίας, Ἐπὶ νυγματώδους, ἀγνύητος
μέγρι ἀφραγμάτος Ἐσμάχας Ἐβελώνων.
πρὸς τὴν ἐκ τῶν δακτύλων ὀπίκρυσιν ἢ Ἐ-
τομπανώδης γίνε). θροπέυειν ἐν. πρῶτον μὲν
Φλεβοτομία, μηδενὸς κωλύοντος. εἶτα κῆ μὲν
ἄστ' παροξυσμῶς, ἀσπίας, Ἐμβροχῆς δι-
ἐλαίς πηγάνας. ἐγκάθισμασι τε δι' ἀφελή-
ματος πηγάνας, γλήχωνος, δρπημίσιας, κασί-
ας, κῆ τῆς ὁμοίους. κῆ πλάσμασι τε κῆ ἀφ' ἀέρ-
ματος σελίνος, κυμίνος, μαρσθρῶς, ἀνήσος, ἀμειω-
ίρηνος ἀλδύρος, σικύας το κῆ φας Ἐμετὰ κατα-
χασμῶ. χρονιζέσης δε τῆς ἀφραγμάτος. καθάρ-
σει χρῆστέον ἀφ' τῆς πικρῆς, κῆ τῆς ἰερῆς. δρῶ-
παξί δε κῆ σωματισμοῖς. Ἐτῆ τῶν αὐτοφυῶν ὑ-
δάτων χρῆσις. ἢ δι' ἐμαῖα προλελιπισμῶν τῶν
δάκτυλον καθέσθαι, τῶν ἐπικείμενον θρόμβον ἐ-
τυχοι κριμίζεσθαι πρῶτος, αὐτὸν ἐν διαλύσει αὐ-
θις τε κῆ πλάσσειον διὰ σόκος Ἐνίτρε κῆ ἀψινθίς.
ἐπιθέματα ἢ μαλακτικὰ τὸ πολυάρχιον ἐσθαι. Ἐ-
τὸ διὰ σπερμάτων, Ἐτὸ διὰ δαφνίδων. πρὸς τὴ
διὰ πηγάνας, μέλιτος, νίτρε. μάλις τῆς ἔτος ἀρ-
μέσι. σικύων λιπαρῶν κεκομμένων. L. α. κυμίνος
L. β. ἀφονίτρε L. α. διὰ τὴν τῶν δριμύτητα εἰς
γάλα προκαταβαπείσθαι. κῆ οἱ μαλακτικῶς
ἢ τῶν πεσῶν ὀπιτήθειοι.

ΠΕΡΙ ΥΣΤΕΡΙΚΗΣ ΠΝΙΓΟΣ.

Κεφάλ. οα.

Ηύστερική πνιξ, ἀναδρομὴ τῆς ὑτέρας ἐστὶν εἰς
συμπάθειαν ἀγέσης Ἐκυριώτατῶν μορίων ὡς
καρωτίδας, καρδιάν, κηνήγγρας. παρέπε) τῆς
πιχάσας, ἐγζέζοντος μὲν παροξυσμῶ, νο-
θρώτης διανοίας, ὄνος, ἀτονία σκελῶν. ὡ-
χρότης προσώπου, Ἐλέμμα πειλίπαρον.
ἀνείσης δι' τῆς πνιγῆς. καταφορᾶ κῆ
ἰσχυρασία, κατὰ ἀληψίς τῶν αἰσθητηρίων,
μετ'



μετ' ἀφωνίας, σκελῶν σωολκή. εἴτα ἄρχονται ἐρᾶσθαι αἰ γυναῖκοι, ἔ τὸ πρῶτον ὑποπίπτουσατα μελλήσης δὲ ἀνιέσθαι πρῶτος ἐκ τῶν γυναικείων τῶν ὑγρασία πρῶτος ἀφωνίας ἔ βορβορυγμῶν, ἔ πρῶτος πρῶτος τῶν ἐπιπρῶτων. αὐτὴ τε χαλαρᾶται κατ' ὀλίγον ἢ ὑστέρᾳ καὶ ἔ τὸ πρῶτον λαμβάνουσιν τὸ, πρῶτος ἔ τὸ αἰσθάνεσθαι κινεῖται ἢ τὸ νόσημα κατὰ πρῶτος, καθάπερ ἢ Ἰππληψία, πρῶτος δηλονότι τῆς ὑστέρᾳ ἢ τῆς σπέρματικῆς, ἢ ἔ τῆς ὑλῆς. σαπίσης ἐν αὐτῇ. ἔ πολλὰ μὲν αὐτῆς ἐπ' ἀνηνεγκαν. πρῶτος δὲ κατὰ τῶν πρῶτος ἐξ ἀφωνίας ἀπάλονται. τῶν μὲν σφυγμῶν πυκνῶν τε ἔ ὑποπρῶτων ἀπάλονται εἴτα καὶ ἀσφυξίας ἐπιπρῶτος, ἔ τῆς ἀνεπρῶτος δροσιζήσης τῶν Ἰππληψίας. τῆς δὲ ἀνεπρῶτος, τὸ μὲν πρῶτος ἀμαυρωμένης, ἔ τῆς πρῶτος δὲ πρῶτος ἀνεπρῶτος. πρῶτος δὲ τὸ πρῶτος. χερμῶν καὶ φθινοπρῶτος νέας, ἔ τῆς πρῶτος πρῶτος λαγνείαν. τῆς πρῶτος, καὶ μάλιστα εἰς τῆς φαρμακείαν εἰν ἀπάλονται καὶ πρῶτος ἀλλοιᾶς κατὰ σφυγμῶν. ἐν τῆς πρῶτος ἐν τῆς ἀνεπρῶτος χερμῶν ἀπάλονται. καὶ πρῶτος ὀλατὰ σκέλη, καὶ τὸ ὅλον σῶμα, ὡς πρῶτος τῶν λειπθυμῶν ἀνεπρῶτος. δυσώδη τε πρῶτος φέρειν ὡς φέρειν τῆ ρινί, οἶον ἐλύχνιον ἔ τῆς πρῶτος, κατὰ πρῶτος, πρῶτος ὑγραν, κερμῶν ἔ τῆς πρῶτος κερμῶν. πρῶτος δὲ καὶ ἀμῶτος πρῶτος ἐξ ἔ τῆς πρῶτος, ἢ τῆς πρῶτος. ἔ τῆς πρῶτος κατὰ πρῶτος ἔ τῆς πρῶτος. μετὰ πρῶτος, φλογῶν, καὶ πρῶτος καὶ μετὰ πρῶτος. μὴ κερμῶν ἢ τῆς πρῶτος. καὶ τῶν πρῶτος ἀγωγῶν χερμῶν, οἶα τὰ πρῶτος, δακτυλίῳ πρῶτος, οἶον κερμῶν, νίτρον σῶ μῶτος. ἔ τὸ σῶτος ἀνεπρῶτος ὑστέρᾳ, ἔ τῆς πρῶτος τῆ πρῶτος. εἰς αὐτῶν δὲ τῶν πρῶτος ἔ τῆς πρῶτος τῶν μρῶν ἐγχεθῶν, κατὰ πρῶτος αὐτῶν πρῶτος, ὡς ἀμαρμῶν, μαλακῶν. καὶ σῶτος δὲ, τὸ μὲν τῆ ρινί πρῶτος φέρειν, τὸ δὲ τῶν πρῶτος κατὰ πρῶτος. ἐμῶτος δὲ τῶν αὐτῶν τρῶτος πρῶτος καὶ μετὰ πρῶτος. καὶ πρῶτος πρῶτος πρῶτος ἀνεπρῶτος δὲ τῆς πρῶτος. ἐμῶτος ἀνεπρῶτος, ἐπ' αἰσθῶν τε ἢ ὀλιγοσθῶν φυλάπειν. μὲν δὲ τῶν ἔ τῆς πρῶτος κατὰ πρῶτος τῆς πρῶτος. μὲν δὲ τῶν πρῶτος. σικυάσῶν ὡς πρῶτος, λαγνῶν, εἴτα τῆς πρῶτος πρῶτος χερμῶν, πρῶτος μὲν δὲ τῶν πρῶτος ἀνεπρῶτος, πρῶτος τῆς πρῶτος μελικράτης, ἔ τῶν πρῶτος, καὶ μόνον εἰς πρῶτος ἀνεπρῶτος ἔ τῶν.

cum uocis interceptione, crurum contractio: deinde incipiunt rubere mala, & facies aliquantulum plena fit: ubi uerò remissura est, prodit humiditas quædam ex locis muliebribus ad contactum, & murmur quoddam intestinorum procedit, & ipse paulatim laxatur uterus, atque sic & mentem & sensum recipiunt. Mouetur autem morbus secundum circuitum uelut comitialis, repleto uidelicet utero, aut feminatia, aut alia materia in ipso putrefacta: & multa quædam restituta sunt, quædam uerò in exacerbationibus de repente perietunt, pulsibus quidem densis euadentibus, & inordinatè subtemiscenscentibus. Deinde etiam ipsorum interceptione sequente, modica autem humiditate instar toris in cute consistente: uerum respiratione primùm obscura contingente, deinde penitus intercidente. Abundat hæc affectio hyeme & autumnò in iuuenibus salubribus. Sterilibus, & præsertim si per medicamenta steriles factæ fuerint, & alijs per frigeratis. Itaque in exacerbationibus extremas partes deligatæ oportet, & tota crura totumque corpus confricare, & uelut eos qui in animi deliquium inciderunt reuocare, & odora graueolentia naribus admouere, uelut sunt, funiculus lucernarius extindus, castorium, pix liquida, cedria, lanæ & panniculi usti. Quidam etiam matulam utinæ ueteris aut egestionis alui, naribus adhibuerunt. Cucurbitas quoque affigere oportet ad inquina & imum uentrem, cum multa flamma & leues, & cum scarificatione. Si uerò prolongetur exacerbatio, etiam ea quæ flatus ducunt commoda sunt: uelut collyria in anum subdita, quale est cuminum & nitrum cum melle. Sed & in fuso per clysterem stercora subducere oportet, ut ne sua appositione premant: in ipsum uerò uterum odoratissima unguenta infusa, detrahere ipsum solent, uelut est amaracinum, mala bathrinum. Sed & sinapi partim naribus adhibeatur, partim pedibus cataplasmatibus modo imponatur. Voce quoque asperiore quis inclamet, excitet ac uocet ipsam. Sternutatoria etiam adhibeantur ex castorio, herba lanaria, pipere. Vbi uerò remisit exacerbatio, ad uomitum cogantur, & in cibi abstinentia, aut omnino modico cibo conferuentur. Post septimum diem hiera ex colocyntide purgentur: post tertium uerò diem cucurbitas affigere oportet lumbis & laterum mollitudini: deinde castorij potu uti aliquando cum artemisia decocto, aliquando cum aqua multa. In quibusdam enim hoc etiam solum ad perfectam curationem sufficit.

Infer-



infessus autem & pessi mollitorij assumantur. Atque hæc quidem ad exacerbationes : uerum ad totius corporis reparationem à uenesectione initio facto ad purgationem per hieram transire oportet : deinde pictam ex aloë dare, drachmæ pondere, cum cyathis tribus aquæ mulsæ, in assiduo usu aut ex interuallis drachm. 2. cum aquæ mulsæ cyathis sex. Utendum etiam dropacismis & cucurbitis, & sinapismis, & acopis ex euphorbio : deinde exercitijs, frictione & uociferationibus : postea etiam aquarum naturalium balneis.

ἐγκαθίσματα δὲ ἐπιτοιοῦ μαλακτικῶν ὡς λαμβανέσθωσαν. πῦτι μὲν ἐν πρὸς οὖν πύροξυμῶς. πρὸς δὲ τῶν ὄλων ἔσώματα ἀνασκευῶν, ἀπὸ φλαβοτομίας ἀρχέμερον ὅππῃ τῶν ἀλφ. τῆς ἰερέως ἰέναι καθήκον. εἴτε τῶν ἀλφ. τῆς αἰλῆς δίδοναι πικρὸν ὅσον L. α. μῖ. κυάθων γ. μελικράτης κτ' συνεχεῖαν. ἢ ἐκ ἀλαλεμιμάτων L. β. μῖ. μελικράτης κυάθων γ. δρωπακισμῶδης π. καὶ σικύας, ἔσώματα π. κρηστέον. καὶ πῖς δὲ ἀφορβίαι ἀπόπ. εἴτε γυμνασίαι, καὶ κρήφει, καὶ ἀναφωνήσειν. ὑστερον δὲ τῶν ἀπ. φυῶν ὑδάτων χρῆσαι.

DE VTERI PRO lapsu.

Caput LXXII.

Uterus procidit raro quidem, uerum ob plures causas: aut enim muliere ex alto delapsa, & ad coxas delata, ruptis pelliculis quæ ipsam uiscus continent: aut ob extraxionem secundæ uterum simul attrahentis, & ipsi adnatae, uelut in partus difficultate, aut ob inartificiosam fœtus extractionem, aut ob plagam, aut ob animæ affectiones, uelut liberorum amissione nunciata, aut hostium incursum, aut ob periculosam nauigationem, aut aliquam huiusmodi causam, tota corporis miscella exoluta, utero simul prolabente, aut ob resolutionem & debilitatem partium, uelut inclinata maximè ætate contingit. Procidit autem circa os ipsius. Quidam uerò totum ipsum procidere narrant, id quod probabile non est. Quomodo enim reductus firmari posset. Oportet igitur, euacuatoprimum per clysterem stercore, & excreta urina quò undiquaque à compressione liber sit uterus, ægrotam supinam collocare, altiores coxas habentem, & poplites incuruatos, cum cruribus diductis: deinde accipere hapsum lanæ figura, & crassitudine sinui muliebri respondentem, cuiusque tenui linteolo circumdare, & in succum acaciæ intingere, aut in hypocystidis succum uino dilutum, & ad uterum apponere, & citra uolentiam retrudere totum id quod procidit, donec tota moles ad sinum redigatur, & forinsecus contegere pectinem spongia expressa in posca, & decumbere facere hominem extentis ac coaptatis inter se cruribus, itaut alterum alteri incumbat. Postea uerò cucurbitæ affigatur cum plurima flamma, & ad umbilicū, &

ΠΕΡΙ ΠΡΟΠΤΩΣΕΩΣ

ὑστέρας.

κεφάλ. ο β.

Η ὑστέρα προπίπτει σπανίως μὲν, ἀλλ' ἀλείωνας δ' αἰτίας. ἢ γὰρ ἀφ' ἡφους κατεχθείση, ἔκ' ἰσχία ἐδραθεῖση, ῥηγνυμένων τῶν ὑμένων οἱ κατέχουσι τὸ σπλάγχνον. ἢ δὲ ἐξολκῆ δάπτειρα προσελκόμενῳ τῶν ὑστέραν, προσεφευκτόσ' αὐτῇ καθ' ἑαυτὴν ἐν δυσκίαις. ἢ δὲ ἀπεχρον ἐμβρυελίαν. ἢ ἀλλ' ἀπληγῶν ἢ ἀλλ' ψυχικὰ πάθη, οἷον ἀποβολῆς τέχνην ἀπαγγέλλεισης, ἢ πολέμων ἐφόδου ἢ δὲ ἐπικίνδυνον πολέου. ἢ πινὰ τοιαύτην αἰτίαν. τῶν ὄλων συγκρέματι λυθέντι σωολιθησίαις τῆς ὑστέρας. ἢ ἀλλ' ὡς ἀλλοιῶν, ἔσ' ἀπνοίαν τῶν μορίων, ὡς ἐπὶ τῶν ὡσεύμασσι τῶν μάλισται γίνεσθαι. προπίπτει δὲ τὸ σῶμιον αὐτῆς πινὲς δὲ ἐπίσσαν ἰσορροῖσι προπίπτειν, ὅπερ ἀπειθανον. πῶς γὰρ ἀναχθεῖσθαι ἐδραθεῖση. δὲ πίνω τὸ, τε σὺ βάλον ἀλλ' κλυσηρος πρῶτον κενώσαντας, ἔσ' τὸ ἔρον ἀποκρίναντας, διὰ τὸ πανταχόθεν ἀθλίπτον εἶναι τῶν ὑστέραν, χηματίζειν ὑπὲρ τῶν κάμνεσσαν, ὑψηλόπερα ἐχέσσαν τὰ ἰσχία, ἔσ' κεκαυμένας π. τῶν ἰγνύας μῖ. ἔσ' διεσάναι τὸ σκέλη. ἐπὶ τῶν λαθεῖν σφραγμα ἐξ ἐρείς, χημαπὶ κ. πᾶχει ἀναλογουῦ τῶν κόλπῳ τῶν γυναικείῳ, πρὸς τῶν λαθεῖν τε τῶν ἰσχίων ὀθωνίῳ, ἔσ' τῶν λαθεῖν εἰς χυλὸν ἀκακίας, ἢ ὑπικυσίδος οἴνω διεμένης, προσεθῆναι π. τῆ ὑστέρας καὶ διχα βίας ἀναβιβάξαι ἀπαν τὸ προπίπτως ἀχρῆς ἔσ' ὄγκου ἐν τῶν κόλπῳ γένηται. ἔσ' σκεπάζειν ἐξωθεν σπύγγῳ τὸ ἦτρον ἀποβλημμένα ἐν ὄσυχράτης κτ' κλίνειν π. τῶν ἀνθρώπων ἐκτεταμένα ἔσ' σωρημοσμένα ἐχέσσαν ἀλλήλοισ τὰ σκέλη, ὡς π. τὸ ἕτερον ἐν μετέρῳ ὀπικείσθαι. μῖ. δὲ ἔσ' σικύας ὡσεύληπτεον μῖ. φλογὸς πλείονσ, πρὸς ὀμφαλὸν τε καὶ

Bb καθικα



καθηκαίτερον λαγόνα. ὁσφραντά τε προσενεγκτόν ευώδη. τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν, ἐγκαιμένεσθε εἰς τῷ κόλπῳ, ἐγκαθίζετω ἡ γυνὴ εἰς οἶνον μέλανα ἀυσηρὸν, ποσῶσ κεχλιασμένον, ἥτοι εἰς ἀφείψημα μυρσίνης, καὶ ῥίνε, σιδίων. καὶ ἡ πάλιν, τὸ μὲν ἐγκαιμὸν ἐριον αἰρέτω. ἔπειρον δὲ ἐν τῷ αὐτῷ νενοσιμῶτον φαρμάκῳ. καὶ παλάσματα, ἔξωθεν, ἐπὶ τῷ πύθῳ καὶ ἔντομασιν διὰ φοινίκων, ἀλφίτων, ἢ φακῆς καὶ σιδίων μετ' ἐξυμέλιτος. Ἐξωθεν δὲ τρίτης πάλιν ταῦτα γινέτω, μέχρι παντελὸς διαθεραπείας. εἰ δὲ μείναντι τῷ χροῖῳ διασπείη τὸ ποσπεπλωκὸς, ἀφαιρέσειν αὐτὸ μηδὲνα κίνδυνον ὑφορώμενον. καὶ γὰρ ὅλην ἀφαιρεθῆναι μήτραν ἰσχυρῶσ διασπείσειν, καὶ ζῆσαι τὴν γυναικα.

ΠΕΡΙ ΦΙΜΟΤΕΝ

ὑτέρα.

κεφάλ. ο γ.

Γινέτω Φίμος ἐπὶ τὸ σῶμα τῆσ ὑτέρας, ἢ δὲ ἑλκωσιν προσηγεμῶνην, ἢ διὰ φλεγμονὴν σκίρρωθῆσιν. θεραπείην δὲ χρὴ ἐγκαθίστασι πικρὰσ οὐκ ἀποστῶσ, τοῖσ διὰ ὑδρελαίσ, καὶ τήλεισ ἀφείψημασ καὶ παλάσωντασ πῶσούτωσ, καὶ ποσῶσ μαλακτικὸσ προσάροτασ. εἰ δὲ ἐγχεροῖζοι τὰ τῆσ διαθεσεωσ, χρῆστέον ὑπατισμοῖσ καὶ θυμάμασιν τοῖσ διὰ τῶν ἀρωμάτων. λυέσ δὲ τὸν Φίμον, καὶ ὁ διὰ ὑσώπεσ ἔντεσ, καὶ ῥήτινησ, ἔπερτωσίνησ ποσῶσ, ἔδεν ἔπειρον ἢ σέγνωσιν ὄντα ἔσομῖσ τῆσ ὑτέρας.

ΜΗ ΚΤΙΣΚΟΜΕΝΑΙΣ

θεραπεία.

κεφάλ. ο δ.

Κοινῶσ μὲν ἔν ἀμφοτέροισ ἀρμόζει τῷ τε ἀνδρὶ, ἔ τῇ γυναικὶ τὸ ἐν δίκρασίᾳ πολλῇ τὸ πᾶν φυλάττειν τὸ σῶμα, διὰ τὴσ τῶν πόνων καὶ σιπίων ἔλαττων, καὶ τῶν λοιπῶν ἀπάντων συμμετρείασ. τὸ γυναικὶ μέγιστον, μὴ παρορᾶν παινομῶδην πύθιν. ἔπει γὰρ οἱ πόνεσ ἐπιτήδησοσ πρὸσ παιδοποιίαν, διὰ τὴσ μὴ ἐφαρμόζειν τοῖσ αἰδοίοισ, ἔπὶ ὀλίγον ἀφιστῶσιν, ἔπει σπέρμα ἔτε κεν οἱ ἄραον λελεπισμῶσοι. ὠφελοῖ δ' αὖ ἀνδρὶ ἀπαντα πᾶσ θερμαίνοντα, καὶ ἡ συχῇ πύθμασ τῶντα. οἶνον δὲ οὖν θερμῶν συμμέτρωσ λαμβάνειν, ἔλαχάων εὐζωμόν τε ἔρμινον, καὶ ἐρύσιμον, ἔπὶ τῷ πύθμασ. πύθνον δὲ καλαμίνθην πάντοσ μάλλον φυλακτέον. εἰ δὲ κακοχυμῖαν πύθμῃ γένοιτο σύλληψισ πύθμῃ σκαθαίρειν, ἢ κατακρινᾶν χρῆσθῃ διαίτη.

ad utramque laterum mollitudinem. Oportet quoque naribus adhibeantur ossificanda. Tertia uero die incumbente in sinu lanæ hapsio, infideat mulier in uinum nigrum austerum aliquantulum reperfactum aut in myrtis lentiscis, ac malicorij decoctum. Postea incumbens lanæ hapsus tollatur, & alius eodem medicamento imbutus indatur. Cataplasmata extrinfecus imponantur ad imum uentrem, ex palmulis, polenta, aut lenticula & malicorio cum aceto mulso: & per tertium diem rursus eadem fiant usque ad perfectam curationem. Si uero ubi per tempus mansit, putrefactum fuerit id quod procidit, auferatur id citra omnis periculi formidinem. Nam totum ablatum esse uterum putrefactum narrant, & tamen mulierem uixisse.

DE OBTURAMENTO

in utero.

Caput LXXIII.

Fit obturamentum circa uteri osculum aut ob ulcerationem progressam aut ob inflammationem in scirrhum induratam. Curare uero oportet infessibus emolliendo, ex aqua & oleo, & sœnigraci decocto: ita ut etiam similia cataplasmata imponamus, & pessos mollitorios adhibeamus. Si uero diuturna fiat affectio, sub uapotationibus & suffimentis ex aromatis utendum est. Soluit obturamentum etiam pastillus ex æsypo, nitro & resina terebinthina, ut quod nihil aliud sit quam osculi uteri coarctatio.

NON CONCIPIENTIVM

curatio.

Caput LXXIV.

In communi quidem utrisque & uiro & mulieri conuenit, ut totum corpus in bono temperamento conseruetur per laborum, ciborum, balneorum, & reliquorum omnium commodationem, & quod maximum est, ut negligamus habitum pinguescentem. Neque enim idonei sunt pingues ad liberorum generationem, tum quod pudendis non congruunt, tum quod modicum etiam semen emittunt, neque tamen etiam attenuati. Pro fuerint autem ipsis omnia calefacientia, & leniter infantia. Vinum igitur calidum moderate accipere oportet, & ex oletibus erucam, & horminum, & erysimum, & similia, ruram autem & Calamintham præ omnibus uitare. Si uero ob uitiosum aliquem humorem conceptio non fiat, hunc expurgare aut bono uictu contemperare.

Priuatim



Privatim uerò mulieribus couenit partum circa uterum quam maximè prouidentiam habere, & menstruam euacuationem citra impedimentum fieri. Vbi itaque propè adest purgatio, ciborum ac potuum moderationem quam maximè procurare oportet, ita ut etiam aliquid ex irritantibus ad purgationem accipiat, qualia sunt odorata, ac acria olera, uelut est scandix, crythrum, fœniculam, apium, smyrnium: uteri uerò intemperies corrigere. Frigidiores itaque uteros indicat mensium suppressio, & uictus frigidior ac crassi succi, & torpor oboriens circa pectinem, lumbos ac crura: si uerò perfectè perfrigeratæ fuerint, neque uentrem appetunt. Oportet itaque ipsum, tum alijs laboribus se exercere, tum omnibus fomentis, & his quæ per suffitus fiunt uti, & calorem reuocare. Neque absolum est castorium bibere & femina odorata, cuminum, anisum, pulegij comam, & juniperi fructum, pipere singulis admixto. Ipsorum uerò uterorum fomenta partim uapores sint, insidentibus sellis perforatis, partim calida aqua affusa, in qua cocta sit saluia, artemissa, ruta, cyperus, pulegium, acorum & odorata semina. Cataplastmata etiam ex his singulis pectini adhibeantur: bonum est & polyarchium epithema: frictiones item pectinis & coxarum nullo minus conferunt. Utendum etiam pessis subdititijs ex myrrha, ruta, galbano & castorio, ubi prius fomentum aqua mulsæ aut marinæ adhibuit. Bonus est adhæc pessus qui gone, id est, genitura appellatur. At uerò calidiores uteros coniectare oportet ex toto corpore calidiore, & mensibus paucis & cum dolore, & quod exulcerant pudenda mulieris: corrigere autem per moderatè humidantia ac frigefacientia, qualia sunt ex oleribus lactucæ, ac maluar, & bilitum ac cucurbitæ, & cucumis, & pepo, & attriplex, & portulaca, & alij consimiles cibi. Vesica uerò & superno uentri, & lumbis adhibeantur frigefactoria tum cataplastmata tum succorum illitiones. Si uerò ob humiditarem uteri non concipiant, signum est quodd & humidantur circa coitus & tenuiores ac multi deferuntur menses. Vicitus autem his conuenit ficcior, labores, frictiones partium supernarum, uomitus, siccitas, & moderatio cibi. Commodum fuerit etiam acerbis medicamentis uterum corroborare, qualia sunt lentisci decoctum, & myrti baccatum, rosacum, thoris, floris mali panici,

ιδίως δὲ πῆς γυναιξίν ἀρμόσει τῶν κατὰ τὴν ὑτέρα ὡς μάλιστα προνοοῖα καὶ τὴν ἐμμησίον ἀπορροιας γινεσθαι κενώσιν. πολλοὶν εἰς τὸ πίνω τῆς καθήρεως τῆς τῶν σιτίων καὶ πμάτων εἰς μάλιστα συμμετρίας φροντίζειν. καὶ τῶν ἐρεθιστικῶν εἰς καθήρεσιν λαμβάνουσιν, οἷά ἐστι τὰ εὐωδὴ λάχανα, καὶ τὰ δριμεα, οἶον σκάνδικα, κρηθμον, μάραθρον, σέλιον, σμύρνον. πῆς ἢ τῆς ὑτέρας ἐπανερθῆσθαι δυσχερασίας πῆς μὲν οὐ ψυχροτέραι τῶν ὑτερῶν πεκμηροὶ τῶν καταμηνίων ἢ ἄπληρεις. Ἐδίατα ψυχροτέρα καὶ παχυχυμος, ἔπικαρκῶδες γινόμενον πῆς τῆς ἡτρῶν ἔσφω καὶ σκελη αἰδὲ ἀν εἰς τέλος, ἐψυγόμεναι ὡσιν, καὶ ἀφροδισίων ἐφίενται. Δὲ τίνω τὰ τὰ ἄλλα ἐκπενοῦσαν, καὶ πύλαις πέσαις, καὶ τῆς Δὲ τῶν θυμιαμάτων πυλωμένων ἀνακαλιῶσθαι τὸ θερμὸν, καὶ εἶν δόποτροπαιον καστρέον πνεῖν, καὶ τῶν εὐωδῶν σπερμάτω τὸ πεκμινον ἔανησον καὶ γλήχωνος κέμλου, καὶ ὑρεκυθιδῶν καρπὸν ἐκαστῶ πεπέρεως, μίσγασαν. αἰ ἢ αὐτῶν τῶν ὑτερῶν πυρία. Ἐτο μὲν αἰτμὸς ἔσωσαν καθεζομένης ἐπὶ διφρον τῆς ἢ θερμὸν ὕδωρ προσκλυζόμενον, ἐσφῆσθαι ἐλελισφακος ἔδερμισία, καὶ πήσανον, καὶ κυπερον, ἔγλήχων καὶ ἀκρον καὶ τὰ εὐωδὴ ἀερίματα. καταπλάθειν ἢ τὸ ἡτρῶν τῶν ἐκαστῶ ἀραθὸν δε καὶ τὸ πλυαρχα ἄπλημα. αἰγε μὲν τριψαίς ἢ ἡτρῶν, καὶ τῶν ἰσθίων, εἶδενὸς ἦσαν συμφέρεσι. Ἐπροδερτῆς χρεῶσθαι, οἷά τε σμύρνης καὶ πήσανον, ἔχαλδάνης, καὶ καστρέια προσπεραθῆσιν μελικράτῶ ἢ θαλάσση. ἀραθος δε πῆς πῶτα καὶ ἔπασος ὁ λεγόμενος γονὴ πῆς ἢ θερμότηρας τῶν ὑτερῶν πεκμῆρεσθαι μὲν τῶ πὸ οὐ σῶματι θερμότηρῶ ὄντι, ἔπῆς καταμηνίοις ὀλίγοις καὶ οὐ πίνω, καὶ τῶ ἐλκωτῶ τὰ αἰδοῖα τῆς γυναικῆς. ἐπανορθῆσθαι ἢ Δὲ τῶν μετερίως ὑγρανόντων καὶ ψυχόντων, οἷά ἐισι λάχανα μὲν θριδακίνας καὶ μαλάχαι, ἔβλήτων, ἔκρολοκυῶτη, καὶ σίκυα, ἔπέπων, ἀτρέα φαξὺς τε καὶ ἀνδράχνη, καὶ τὰ ἄλλα ἢ σιτία ἀπορροιασά. τῆ δε κῦσει καὶ τῶ ἄπλησθῶ καὶ τῆ ἔσφω προσάγειν, ψυκτηρα καταπλάσασθαι τὴ καὶ πῆς χυλοῖς ἄπλησθῶνται. εἰ ἢ καὶ δι ὑγρότητα τῶν ὑτερῶν μὴ κινεσθῶνται, σημεῖον μὲν τὸ, τε καθυγραίνεσθαι καὶ τῆς στυγασίας, λιπτότερον τε ἔπλυ φέρεσθαι τὸ καὶ μῆμιον. δίατα ἢ πῶτα εἰς ἀρμόσει ζυροτέρα. πῶνοι τε καὶ τριψαίς τῶν ἀνω, καὶ ἐμετοι. ξηρότης τε καὶ μετερίως τῆς σιτίς. εὐ ἢ ἀν ἔχει. ἔπῆς ὑτεραν ἐρυφνοῖς φαρμάκοις συγκρατῶνται, οἷά ἐστιν ὀνικα τε ἀφείψημα, καὶ μύρτων, καὶ ῥόδων, καὶ ῥῆ, ἐπὶ τε ῥοῶς



αἰθες ἔσται τῶν ἀπιλῶν ἑκ κηλίδος. Ἐπιροπῶ-
 ραν ἢ τὴν ὑτέραν εἶον διὰ τῶν ἐναπιῶν ἰατρῶν
 λατρῶν Φημι καὶ ἀλοιφῆς, καὶ τροφῆς ὑγρανέ-
 σης τε καὶ λαχανώδους, οἷα τε συμμέτρως ἔμῃ
 σφόδρα παλαιῆ. Εἰ δὲ ὑπὸ χυμῶν παχυπέ-
 ρων κωλύοντο κύσειν. εἰ μὲν τις εἴη τῶν δαι-
 τόντων, καθάρειν δεῖ τὴν γυναῖκα καλῶς ὡς
 ἐκάστω χυμῶ, οἰκεῖόν ἐστι. μάλιστα ἢ τῆς θάλαττης
 ἀλῆος πικρᾶ καίπειτα τῷ ὄρῳ ἔραλακτος καὶ
 κλύσαι, διατάν τε χρῆσοτέραν ἐξ ὄρεϊν, τὰς δὲ
 φλεγματώδεις χυμῶς, πόνοις τε καὶ ἰδρωτηρίοις,
 καὶ ἐμέταις κενουῖ ἤγειω κάτωθεν. δεῖ ἢ καὶ Φαρ-
 μάκω, Ἰπιθυμον, Ἐφόρβιον, πέπερι, δαύκω,
 ἀσέριμα, πετροσελίνα ἀσέριμα, πάντα τρίψαι
 ὄσον L. ἑ. δεῖναι πέν. ἔπι ἔτα καὶ γαστέρα κα-
 λῶς ἀγει, καὶ τὴν ὑτέραν θερμαίνει, ὡς περ πολλὰ-
 κισ ἤδη καὶ καὶ μῆνια ἐρρήξε τῆς καθαροῦδους.
 ὅταν ἢ τὸ ἐπιπόρρωμα δῆλον γένῃ. τοῖς καὶ μῆνι-
 οῖς χρῆσθαι ἔστι. Ἰηνικαῦτα δὲ μίσγεσθαι ληγύσσης
 τῆς καθάρσεως. ἐπειδὴ ἢ καὶ πνεύματα ἐν τῇ ὑτέ-
 ρῃ ἔνοντα κωλύει κύσειν. τὴν μὲν σημεῖωσιν
 αὐτῶν ἐκ τῶν περὶ ἐκπνεύματώσεως ὑτέρας
 ληπείον. θερμαίνει ἢ, πρῶτον μὲν ἐν δεέστερον
 αὐτῶν, διαλύοντα, προσφέροντα ἢ κύμινόν τε καὶ
 ἀνήθον, ἔσελιν ἀσέριμα, καὶ πηράν, ἔσ ἀνήθον,
 καὶ τῶν δρωμάτων τὰ πολλὰ διδοῦντα, τὰ μὲν
 πίνειν, τὰ ἢ προσθήσεται. τὰς ἢ μεμυκίαις ὑτέ-
 ρας ἀνασμοῦ καὶ προσκλύζοντα τοῖς δώδε-
 σι, καὶ περιώβει τὰς τε θάλαμα λῆχης, καὶ λινο-
 σπερμα, καὶ τήλας, ἔσ ἐλαίαι, ἐστὶ ἢ ὅτε καὶ μέλιτος.
 ἰσχυροτέροις τε, τῆ τε ἀρτεμισία καὶ κόνυζα καὶ κα-
 λαμίνθη, ἔσ γλήχωνι, ἔσ ἀνθεμίδι. περὶ ἢ τὰς τοῖς
 χρῆσθαι, τερεβινθίνην καὶ νίτρον, ἔσ σκύφον ἀργύρου,
 τῷ ἐλατηρίῳ, ἔσ κίονια, καὶ ὀροπίση. Αἷς δὲ
 κέχνηε τὸ εἶμα διατὰ μὲν ἔσ περὶαι, καὶ Φαρ-
 μάκω ἑηρότερα καὶ εὐφοντα κύμινον ῥοῶν, καὶ ἄρ-
 νος, καὶ ῥίζαι βάτα, καὶ μίρτα, καὶ τὰ Ἰπὶ τῆς ὑγε-
 τήρας ἀρμόζοντα. τὰς δὲ διασποφὰς περιαις
 ἐξ ὄρεϊν, ἔσ τοῖς μαλακτικῶς κατέτοις. μίξις
 ἢ ἢ ἐξ ὄρεϊν, δοκεῖ πρὸς κύησιν συμφέρειν.

ΠΕΡΙ ΡΑΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝ-
 δυλωμάτων καὶ αιμορροΐδων.

Κεφάλ. σ.ε.

Περὶ τὸ τῆς ὑτέρας ἐμῖον γίνον ἢ ραγάδες ἐκ
 βλαίων τῶν καὶ τὸ μὲν πρῶτον διαλαθάνουσιν,
 ἐπὶ προσφάτων ὄντων τῶν δὲ τῆς πέξεως πό-
 νων. ὑστερον ἢ κατ' ὀλίγον ἐν ἀσθήσει γίνονται.
 ποτὲ μὲν πρὸς τὰς χειρῶν πίαις ποτὲ δὲ καὶ τῆς

rubi tenerorum uisgultorum & gallæ. Quod
 si ficcior sit uterus, per contraria curetur,
 balnea dico, & unctiões, & cibos hume-
 stantes ac oleraceos, uinumque modera-
 tum, & non ualde uetus. At si præ humo-
 ribus crassioribus conceptus impediatur,
 si quidem is mordax fuerit humor, purgare
 oportet mulierem, quemadmodum quic-
 que humor peculiariter id exigit: maxime
 uerò per picram ex aloë: deinde serum lactis
 per clysterem immittere, & uictum commo-
 diorem excogitare. Pituitosi uerò humores
 laboribus, & sudorificis, & uomitibus, aut
 etiam infernè euacuandi sunt. Oportet &
 medicamentum hoc bibendum dare. Epi-
 thymi, euphorbij, piperis, seminis dauci &
 petroselini, omnia trita drachmarum duarum
 pondere exhibeto. Hoc & per uentrem
 probè ducit, & uterum calefacit, quemad-
 modum sæpe etiam menses his quæ non
 purgantur prodire fecit. Postquam uerò
 correctio se declarauerit, mensibus probè
 proceduntibus, tunc coire oportet desinenta
 purgatione. Quandoquidem uerò etiam
 flatus in utero prohibent conceptionem,
 signa quidem ipsorum ex his quæ de uteri
 inflatione dicta sunt accipere oportet: cura-
 re autem primum uictu parciore, deinde
 cumino & anetho, & apij semine, & ruta, &
 aniso adhibitis. Atomara item pleraque ex-
 hibebantur, partim ut bibantur partim ut ap-
 ponantur. Cæterum conclusos uteros ape-
 rite oportet, odoratis decoctis affusis, & fo-
 mentis adhibitis ex malua, semine lini, feno-
 græco & oleo, quandoque etiam melle. Fortio-
 ribus item, artemisia, conyza, calamintha, pu-
 legio & anthemide. In pessis uerò utantur,
 terebinthina, nitro, cucumere syluestri, elate-
 rio, cassia, & picis sero. Quibus autem osculum
 uteri hiat, his uictus, & fomenta, & medicamē-
 ta ficciora ac adstringentia conueniunt, mali
 Punici flores, lentiscus, rubi radices, myrthi
 baccæ, & quæ in humidiorē comodant. Distor-
 tiones autem uteri fomentis ditigere oportet,
 & mollientibus pessis subditis. Porro coitus
 cum muliere auersa, etiam ad conceptionem
 conferre uidetur.

DE FISSVRIS, CONDY-
 lomatis, ac hæmorrhoidibus uteri.

Caput LXXV.

Circa uteri osculum fissuræ fiunt ex uio-
 lentis partibus: & primum quidem la-
 rent dum recentes adhuc sunt ex partu dolores;
 postea uerò paulatim percipiuntur, aliquando
 ad manuum contactus, aliquando etiam in
 coitu, quando etiam eruentæ fiunt propter
 confri-



constrictionem. Deprehenduntur autem si-
nu diducto. Nam ruptiones in ambitu
osculi conspiciuntur: in quibus chirurgia,
& mordentibus medicamentis reiectis, sim-
plicioribus infessibus, & pessis uti oportet.
Conuenit etiam emplastrum tetrapharma-
cum dilatum: si uerò callosa fuerit fissura,
medicamento ex charta usto utendum est
cum sulfæce. Quod si uim ipsius non ferant,
iridem Illyricam terebinthina exceptam in-
dito. Ulceribus autem ad cicatricem perductis,
argenti paratur. Quandoquidè uerò contingit
conuenierit id quod ex cadmia constat: aut ali-
quod sedi destinatum, uelut est id quod spuma
fissuras diuturnas in condylomata mutari,
per consimilia callus adimatur, & condylo-
matum eminentiæ ad cicatricem perducantur.
Hæmorrhoides autem sunt circa oscu-
lum, aut collum uteri, & per dioptram instru-
mentum deprehenduntur, ex eo quod emi-
nentia apparet circa exacerbationes, dolo-
rosa, cruenta & rubicunda: in interuallis
autem rugosa, doloris exors, subliuida ac stil-
lans. In his igitur, si fieri potest, in interual-
lis excisione utendum est in uolsella pre-
hensis: sin minus per medicamenta saltem
ipsas constringere oportet, ita ut aliquando
malicorio sicco cum galla, aut tali quopiam
attingamus: aliquando his quæ in eruptio-
ne sanguinis ex utero relata sunt utamur,
quæ etiam his quibus ob debilitatem san-
guis erumpit conueniunt, quæ cognoscuntur
ex eo maximè quod uterus assidue cruorem re-
mittit ex interuallis, & non solum mensuræ
purgationis tempore.

συναίσις. ὅτι καὶ αἱμάστον) Διὰ τὴν ἀσθένει-
αν. ἐλέγχον) ἢ ἔκλυτον Διὰ τὴν ἐλάττωσιν. Ἐξ ἰσχυ-
ρῆς κινῆσεως καὶ τῆς ἐπιπέδου. ἐφ' ὧν δὲ
τὴν πρὸ χειρουργίαν καὶ τὰ δηκτικὰ τῶν φαρμά-
κων παρατρέφοντο, τοῖς ἀσθενέτεροις ἐγκαθίσ-
μασι πρὸ ἐπεσοῦς χρῆσθαι. ἀρμόζει ἢ ἡ τετρα-
φάρμακος ἀναμύμη. εἰ δὲ τυλώδης εἴη, τῷ Διὰ
χάρτι χρῆσθαι μὲν ῥοδίνῃ, εἰ δὲ μὴ φέρεται ἀν-
τιπύρρον. ἰσχυρῶς πρὸ τῆς ἀσθενείας. ἰσχυρῶς πρὸ τῆς ἀ-
ναλαβῶν ἐπιπέδου. ἀπυλωθέντων ἢ τῶν ἐλαττω-
μένων ἀρμόσει αὐτὸ Διὰ καθαρῆς ἢ τῆς ἐδρικῶν,
ἀσθενείας τὸ διὰ λιθαργύρας ἐπιπέδου ἢ συμβαίνει πρὸς
ραγάδας χρονίζουσας ἀποκονδυλῶσθαι, τοῖς πα-
ρακλησίαις ἐκτυλωτικῶν πρὸ ἐκείνων ἀκτίων τὰ
κονδυλώματα. Αἱμορροΐδες ἢ γίνονται πρὸ τῆς ἐπι-
πέδου τῆς μήτρας, ἢ τῆς ἀκτίνου. αἰκτὴ ληθῆσθαι)
διόπτησιν τῶν μερῶν ἐκ τῆς ὑπεροχῆς φαί-
νεσθαι, καὶ μὲν τῶν παροξυσμῶν ἐναλλαγῆ, δια-
μόνον πρὸς ἐνεργείαν ἐν τῇ Διαλείμμασι, ῥυσοῦν ἢ
ἀναλαγή, καὶ ὑποπέλιον καὶ τραγῶδη. ἐφ' ὧν ἂν
δαί, εἰ μὲν διωκτὸν, ἐν Διαλείμμασιν ἐκτομῇ
χρῆσθαι μὲν Διὰ τὴν ἀσθενείαν. εἰ δὲ μὴ Διὰ
φάρμακων γούτῃ αὐτῶν ἀποσφύγγει, πῆμιν προ-
σαπρόμενον ξηροῖς σιδαίοις μὲν κηκίδος, ἢ πῆμι τοι-
σῆσθαι, πῆ δὲ τῆς ἐπιπέδου τῆς αἱμορραγίας ὑστέρας ἐκ-
πέσει χρωδῶν, αἰ δὲ τῆς διαρροίας, καὶ αἱμορ-
ροΐσιν ἀρμόσει, διαγνωσκομένης μάλιστα τῆς
συνεχῶς αἱμάστον τὴν ὑστέραν ἐκ Διαλείμμα-
των, ἢ ἐκ τῆς τῆς ἐπιπέδου καθάρσεως μόνον
χρόνου.

DE DIFFICILI PARTV.
Caput LXXVI.

Difficultas pariendi fit aut circa parientem
aut circa foetum, aut circa secundam, aut
propter externa. Circa parientem quidem,
aut crassam, aut obesam, aut quæ totum ute-
rum paruum habet, aut dolorum partus ex-
pers est, aut tumida, aut inflammationem
circa uterum habet, uel in alia parte, aut quo-
modocunque alias ægrotat, aut naturaliter
debilis est, & extrudere non potest, aut ante
tempus parit. Circa foetum uerò, qui aut
nimis magnus est, aut paruus & paruum grauis,
aut magni capit, aut monstrosus, uelut bi-
ceps, aut mortuus, aut uiuus quidè, uerum de-
bilis, & qui extra prodire non possit, aut quod
plures sint foetus (quinque enim uisus prodi-
dit Herophilus) aut quod figuram habeat
præter naturam. Nam figura secundum na-
turam fatibus est, prima quidem in caput,
manibus ad femora extentis, ita ut è directo

ΠΕΡΙ ΔΥΣΤΟΚΙΑΣ.
Κεφάλ. 05.

Η δυστοκία γίνετῃ ἢ ἀπὸ τῆς πίκτησιν, ἢ ἀπὸ
τῆς πίκτημον, ἢ ἀπὸ τῆς χόρλου, ἢ ἀπὸ τῆς ἐ-
ξωθεν. ἀπὸ μὲν τῆς πίκτησιν. ἢ παχέαια καὶ
καὶ πῆμελον, ἢ μικρὰν ὅλην τὴν μήτραν, ἢ ὀδύ-
νων ἀπαρον, ἢ δειλήν, ἢ φλεγμονὴν ἔχουσαν καὶ
τὴν ὑστέραν, ἢ ἐν ἄλλῳ μορίῳ, ἢ ὅπως οὐκ ἄλλως
νοσῶσιν, ἢ φυσικῶς ἀσθενέσιν, ἢ μὴ διωκτέ-
νην ἐξωθεῖν, ἢ πρὸ ὥρας πίκτησαι ἀπὸ τῆς τῆς
κρόνου ἢ ὑπερμέγεθες ὄν, ἢ μικρὸν, ἢ ὀλιγοβαρές,
ἢ ἀδροκέφαλον, ἢ περῆστον, οἷον δικέφαλον, ἢ
πιθηκῆς. ἢ ζῶν μὲν, ἀσθενές ἢ ἢ μὴ διωκτέμενον
προσείναι πρὸς τὴν πρὸς. ἢ διὰ τὸ ἀλεῖονα τυχεῖ-
ναι ἔμβρυα. πέντε γὰρ ἰσόρησεν ἡρόφιλος. ἢ διὰ
τὸ ἀπὸ φύσιν ἔχειν τὸ σχῆμα. καὶ φύσιν μὲν
γὰρ ἐστὶν τοῖς πίκτημοις σχῆμα πρῶτον μὲν, τὸ
ἴσθι κεφαλῶν ἀπὸ τῆς πίκτημον τῶν χειρῶν πρὸς
μυροῖς, καὶ ἀπὸ τῆς κλητῆν ἔχον κατ' ὄρθον τῆς
στομῆς.



φομία τὴν κεφαλὴν. δὴ πρὸν ἢ τρίτη, τὸ δὴ πρὸ
 πᾶδας ἀπὸ ἐγκλητον. τὴν ἢ ὡς τὰ πάντα πάντων
 ὀρήματα ὡς τὰ φύσιν εἰσίν. ὡς τὰ τὸ χόλον,
 ἢ μὴ δότωσιν ὡς τὸν διὰ πεχυσμὸν, ἢ ἔπερ τὰ
 δέοντος δότωσιν ὡς τὸν διὰ λεπιότητα. ὡς τὰ κε-
 νωμένω γὰρ ἔχουσιν, δυσὸλιον τὸ ἔμβρυον ὑπὸ
 τῆς ξηρότητος γίνετ', ὡς τὰ τὸ ἔξωθεν, ἢ τοι ψύ-
 ξειωσ πυκνωσάσης, ἢ θερμῆς ἀμέτερος διαφορη-
 σάσης τὴν δυνάμιν. ἢ καὶ πινος ἐκ τύχης πρὸς-
 πείοντος. εἰ μὲν ἀνδιὰ ἐγγνωσὴν ἢ, οἷον δότωσιν ἢ-
 νωσιν ἔμβρυον δυσοκία γίνοιτο. τὴν χαλασεί
 πρὸτερον πωρεγείν. ἐγκυματίζοντα συχῶς ἐ-
 λαίω γλυκεῖ ἔθερμῶ, ἢ σὺν ἀφειψήματι τή-
 λεως, ἢ μαλάχης, ἢ λινοσπέρμα, ἢ κη ὠοῖς,
 διὰ τὸ παρηγορικόν. εἴτα κη κ' ἀλάσσειν ἐφῆ-
 βαμον μετ' ἄπυρρίον κ' ὄσφύος, τὴν διὰ λινο-
 σπέρμα, ἢ διὰ μελικράτα, ἢ ὑδρελαίω. ἐγκα-
 θίσμασι τε τοῖς ὁμοίοις. κ' ὅσιν δότωσιν ἢ ἑλανεῖων
 ἢ ὡς λαμβάνειν χαλασμάς, εἰ μὴ πυρετὸς,
 ἢ πῖς ἐπερ κωλύει πρὸ φάσις. κη κινεῖν διὰ
 φορία τὴν πύκταν ἐν ἀέρι θερμῶ συμμέ-
 τρωσ. ἐνιοὶ δὲ ἔκατασειμῶς δύνων παρὲλα-
 βον, κ' πηαρμικὰ πρὸς ἴαρον. κη τὴν μὲν δι-
 λιῶσαν, παρηγορῶν. τὴν ἢ ἀπειρον ὄδινων, δι-
 λεκτικὸν δὴ τὸν ὄ. μάλιστα τὸ πνεῦμα κατέχειν,
 κ' πρὸς τὴν λαγῶνα σιωθεῖν. τὴν ἢ λειποθυ-
 μῶσαν, τοῖς ἀπληκτοῖς ὄσφραπτοῖς ἀλάπηθίον.
 κη φιδεῖσιν ἢ μετερίως, θρεπθίον ὀλίγη τὴν τρῶ-
 φῆ. τὴν δεκατὴν μελον ἐν τῇ κλίθῃ πρὶν ἢ ἰα-
 μαπτεῖον, πρὸς πηκλίνασιν τοῖς μηροῖς τε γέ-
 νατα. διὰ τὸ τὴν ὑστεραν πρὸς ἄπυρρίον φε-
 ροῦν, κατ' εὐθὺ ἔφορία γίνεσθαι, διὰ τὸ τῶν
 δακτύλων κηρωτῆς ἢ λιπαρῶσιν παίνειν τὸ
 εἶμιον, κη ἢ ἔμα διὰ σέλλειν. ἔ εἰ π πᾶθος εἴη
 πρὶ τὰ μῶρια, κ' τῆς πρὸ νοεῖσθ'. κη σκύβα-
 λον κατεχόμενον ἐκβάλλειν διὰ μαλακῶ
 κλύσματος. ἔ χόλον ἀνασπέρμαρον διαρῆν,
 ἢ τὰς δακτύλοισ, ἢ πολυκῶπῶσιν ἀθῶ κεκρυμ-
 μῶ ἐν αὐτοῖς, πρὸς ἰαροῦσ τῆς δεξιτέρας χε-
 ρὸς. κη π τῶν λιπαρῶν ὑπερῶν διὰ κλυσηρηδία
 εἰς τὸ κύπτεσ ἐνίεναι τῆς ὑστερας. ὡς τὰ φύσιν δι-
 διασημαπέντος ἔμβρυον, τὸν κ' φύσιν ἀ-
 ποδιδοῦναι ἰαμαπμοῦν, πῆ μὲν ὠθουῶντα, πῆ ἢ
 ὡς γίνονται, πῆ ἢ κάμθοντα, πῆ δε ἀπὸ θύνον-
 τα. κ' εἰ μὲν χεῖρα πρὸς βέλκε, ἢ πῆδα, μὴ ἄπυ-
 ρρῶσ κῶλα λαβόμενον, μάλλον γὰρ ἄπυρ-
 ρῶσ πῆ, ἢ ἔξαρθρον γίνεσθαι, ἢ κ' δότωσιν ἢ γνῶ-
 ἀλλὰ ὅσιν δακτύλοισ ἐρύσονται κατὰ ἔωμον,
 ἢ κατὰ ἔωμον ἔμβρυον, πάλιν τὸ πρὸς βέλκε-
 μῶν εἰσάγειν, εἰς τὸν πρὸς ἴαρον τὸν πῆ. εἰ δὲ
 μὲ σφηνώσσει, ὄλα ἔμβρυον γένεσθαι ὡς τὰ

osculi uteri, caput nullatenus inclinatum
 habeat; Secunda ab hac, in pedes citra in-
 clinationem. Quæ uerò præter has sunt fi-
 guræ, omnes præter naturam sunt: circa se-
 cundam autem, quæ aut non auellitur pro-
 pter crassitudinem, aut etiam antea quàm
 oportet auellitur, propter tenuitatem. Eua-
 cuato enim humore, fœtus præ siccitate agrè
 deuoluitur. Propter externa uerò, si aut fri-
 giditas densauit, aut immoderata caliditas
 uires exoluit, aut etiam fortuite aliqua re al-
 lapsa. Si igitur ob coarctationem, aut uelut
 obturationem fœtus, difficultas pariendi
 fiat, primum coadiuuare oportet per laxa-
 tionem, infundendo assidue oleum calidum,
 cum decocto fœnigræci, aut maluæ, aut fe-
 minis lini aut. etiam cum ouis, mitigationis
 gratia, deinde cataplasma imponere pubi,
 superno uentri ac lumbis ex femine lini cum
 aqua mulsa, aut aqua & oleo: & infessibus
 similibus uti. Sed & ex balneis assumere la-
 xationes, si non febris, aut alia aliqua causa
 impediat, & patientem per lecticam mo-
 uere in aère moderatè calido. Quidam eti-
 am concussiones fortes adhibuerunt, & ster-
 nutatoria admouerunt, & quæ quidem ti-
 mida est impellatur: quæ uerò inexperta est
 dolorum partus, persuadeatur, ut maximè
 fortiter spiritum contineat, & ad laterum
 mollitudines compellat. Quæ uerò in ani-
 mi deliquium incidit, odoramentis non of-
 fendentibus refocilletur: alleuata autem me-
 diocriter, modico cibo nutriatur. At uerò
 quæ obesa est, in lecto prona figuretur, ge-
 nibus ad femora inclinatis, quò uterus ad
 abdomen delatus, è directo osculi sit. Rex
 digitos autem ceratis, aut pinguedine osculam
 illinatur, & leniter diducatur: & si qua affe-
 ctio fuerit circa partes, etiam huic prospicia-
 tur: & steruus contentum, per molle infu-
 sum per clysterem eijciatur, & secunda aper-
 ta dirimatur aut digitis, aut scapello inter
 ipsos occultato, præcedente sinistra manu:
 & aliquis pinguis humor per clysterem in
 uteri capacitatem immittatur. Si uerò præ-
 ter naturam figuratus est fœtus, naturalis figu-
 ra restitatur, partim impellendo, partim de-
 ducendo, partim flectendo, partim dirigendo:
 & siquidem manum aut pedem præmiserit,
 non hac parte apprehensus extrahatur. Ma-
 gis enim obturatur, aut exarticulatur, aut
 etiam abrumpitur: uerùm digitis humero
 iniectis, aut coxæ ipsius fœtus pars præmissa
 ad conuenientem locum retrudatur. At si
 una cum obturatione, totius fœtus figura
 euariet,



tuarior, prius ipse ab uteri osculo in sublime retrudatur : deinde apprehensus, rursus ad osculum dirigatur. Si uerò plures uno factus deferantur, rursus sursum ac deorsum dirigantur, omniaq; fiant sensim ac leniter citra cōpressionem oleo locis affuso. Tempus autē defessus in fellam est, Iquum osculum uteri apertum digito occurrerit, & præruptio prominuerit. Quòd si uerò non prodierit, eò quod mortuus est fœtus, aut ob aliam causam, ad fœus extractionem procedendum est.

ασηματισμός, ἀναβιβάζειν αὐτὸ πρὸς πρὸν ὄπισθ' ἔσμιξι τῆς ὑστερίας μετέωρον. καπειτα λαβόμενον, αὐθις ἀπὸ θύειν ὅππὸ τὸ σμίον. εἰ δὲ πλείονα ἔενός ἐμβρυα καταφέροιτο, πάλιν ἀνωθεν αὐτὰ καὶ κάτωθεν κομίζεσθαι. πάντα δὲ ποιεῖν ἡρέμα, καὶ ἀπειθλασῶς ἐλαιοχυτῆντα ἔσσ' τόπας, καμρός δὲ τῆς εἰς τὸν διφρὸν καθέδρας, ἢ τε τὸ σμίον τῆς μητέρας ἀνεώρος ὑποπέση τῷ δακτύλῳ, καὶ προσκύψῃ τὸ πρὸ ῥήγμα. εἰ δὲ αὖτὸ πθνήκεναι τὸ ἐμβρυον, ἢ δι' ἄλλων αἰτίων μὴ πρὸς ἔρχοιτο, ὅππὸ τῷ ἐμβρυονυκίαν ἵεναι.

DE CVRATIONE MORBORUM in articulis & coxendice.

Caput XII.

*Ciborum & raphanorum plerunquē : deinde ad ueratum ueniendum est. In his uicibus ratio aliarum affectionum communis est, & post uicibus rationem in uicibus, lauatio in frigida, marina præcipuē quidem omnibus articularibus uitijs communia medicamenta sunt. Nam & podagricis ueratum mirificè, sed inprimis morbi inuasionibus succurrit. Quod si multis jam annis in uetera uit, uel à maioribus per successionem descendit; ægrotum ad mortem usque comitatur. Artuum exacerbationibus hoc sanè pacto subueniendum est, Lanæ ex oue sordidæ adhibeantur: irrigationes fiant ex rosaceo & uino: nonnullis & spongia ex posca profuit. Ad hæc cataplasma fiat, panis sumatur cum refrigerantibus, ut puta, cucurbitula & cucumere. Accipiat & cucurbitula tenuis, & plantago herba, & rosarium folia. Nec non & Sideritis dolorem sedat cum pane & musco: & Symphyti radix, & pentaphyllos herba, quinque folium Romani uocant: & marthubium, quod folijs est tenuibus. Huius decoctum quidem infusum dolorem leuat. Ex ipsa uerò herba cum panis micis, aut cum ordei farina cata-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ἈΡΘΡΙ-

πιδου καὶ ἰχιάδος κεφ. ιβ.

*σιτίων καὶ ραφανίδων πολλάκις. ἔπειτα εἰς τὸν ἐλλέβορον ἀγειν. διαίτα δ' ἢ ἐπὶ τῆς δεξιῆς ἢ τοῖσι ἄλλοισι πάθεσι, καὶ ἐπὶ τῇ διαίτῃ, ἀλειψίς, ψυχρολασίη θαλασσινή, μάλιστ' ἀμυγῶν ἀπασι δ' ὄριπκοῖσι ξυναῖ ἄκεα, καὶ γὰρ καὶ τοῖσι ποδαγρικοῖσι ἐλλέβορος τὸ μέγα ἀκθ. ἀλλὰ ἐν τῇσι πρῶτοις προσβολῆσι ἔπαθεος, καὶ ὅτι πολλῶν μὲν ἤδη χρόνον ἐστίν, ἀτὰρ καὶ ἐκ διαδέξιος πατέρων φανῆ, ξυναποθνήσκει ἡ νόσος. εἰς δὲ τὰς παροξυσμὰς τῶν ἄρθρων, ταῦτα δεξιῆς πρήσσειν. εἰς δὲ μὲν ἔσω ἔξ ὀϊοῦ ταῖσι οὐπώδεα. τὲν γὰρ δὲ διὰ ῥοδίνε καὶ οἶνε. μετεξέτεροι δὲ καὶ ἀπογγιῆ ξυνοξήκρητῶ ὤνησεν. ἔπειτα ἐπίπλασμα ἄρθρου, ξυνοῖσι ψυχρολασίη, καὶ κέπονος, καὶ σικυήλη, δροσόγλωσσον ἢ βοτάνη, καὶ ῥόδων ταφύλλα. ἀτὰρ καὶ ἢ σιδηελίς ἀπονός ξυνοῖσι ἀρω, καὶ βριώ, καὶ συμφύτεριζα, καὶ πεντάφυλλου ἢ βοτάνη, καὶ πρᾶσιου, ἢ τοῖσι φύλλοισι λεπτή. τῆς δὲ μέντοι τὸ μὲν ἀφέψημα ἐξάντλημα ἀπονόν. αὐτὴ δὲ ἐπίπλασμα ξυνοῖσι ψίξι, ἢ κει-



θῶν ἀλίτω. μήλων τὲ τῶν κριτίων τῶν
 ἄβρωτων ξὺν ἀλφίτοις ἀρισον. σύκα
 ξηρά κὺ θάσια ξὺν πνί τῶν ἀλίτων. ἢ
 δε μὲν τριψύξιος ἢ ὕλη. καὶ τῶν δε μὲν
 τοῖ ἀλλοῖ ἄλλον ὠνησε, κὺ τωτὸν ἄλ-
 λοτε ἄλλω μελέξετεροισι ὃ, τὰ ἀλε-
 αίνοντα ξυμφέρει, κὺ τωτὸν ἄλλοτε
 ἄλλω ὠφελεί, λόγος ὃ κὺ τῶν δε κάε-
 τα ἄπονον ἐμυδρα, αἶγα κρη βωτά-
 νης τῶν ἰριδος ἐμφαγεῖν, ἐπὴν δε πλησ-
 θῆ, διαλείποντα ὀκόσον ἢ νομῆ ἐν τῇ
 γαστρί μαχθείη, καθύσσει τὴν αἶ-
 γα, ἢ ὃ ἐν τῶν γαστρὸς ἐς τὴν κόπρον
 ἐγκρύψαι ἰὼ πόδε. Φάρμακα ὃ μυ-
 ρία. κὺ γδ τὰς νοσέοντας, ἐω τῶν φαρ-
 μακείας ὑπόρας τίθησι ἢ ξυμφορῆ.
 τῶν δε ἰντρῶν τὰ φάρμακα, ἐν τῆσι
 γραφῆσι λελέξεται.

ΠΕΡΙ ΙΣΧΙΑΔΟΣ.

κεφάλ. ο ζ.

Παύλου Ἀιγινήτου βιβ. γ. κεφάλ. ο ζ. τοῦ
 γένος ἑσὰ τῆς ἀρθρίτιδος ἢ ἰσχίας, μόνω τῶ
 κτῶ τὸ ἰσχίον ἐνετηρίχθαι τῶν αἰτίων αὐτῆς διε-
 νήσοχεν. αἶπιος ὃ τῆς παύτης, παχύς, κὺ φλεγματι-
 κός ἐστὶ χυμὸς, ἐνεσφηνωμένος τῇ κατ' ἰσχίον δι-
 αρθρώσει. ὃ ὃ πόνος αὐτῆς ἀπὸ τῶν κτῶ τὸ σφαι-
 ρωμα, ἢ τὴν βεβῶνα τῶν ἀγρῶν γόνατος, ὃ πῆ
 τῶν πλείων δε ἢ ἢ ἀγρῶν πὸς ἀκρον διακνέται.
 κτῶ ῥχῶς μὲν ἐν ἐντυχόντες τῶν κἀμνοντι, κτῶ τὴν
 τῶν σκυβάτων διὰ κλυσηρος κένωσιν, φλεβο-
 τομίαν ἀπ' ἀγκῶνος τῶν ἀλάβωμων, κτῶ ἐπα-
 φαιρέσεως, εἰ ὃ κτῶ κρῶνον. ἀπὸ ἢ κτῶ τὸ πεπονθὸς
 σκέλος σφυρῶ τῶν ἀφαιρέσιν ποιησώμεθα, καὶ
 κτῶ μὲν τὰς παροξυσμὰς ἐμβροχῆ τῆδε κρητέον.
 κυπρίνης. κ. η. ὄξυς κ. δ. νίτρος κ. β. κάκρυος κ.
 α. δι' οἰσπηρῶν ἐρίων θερμῆ. μεθ' ἢ κτῶ πλάσσειον
 αὐτῆς ἀλδύρω θέρμων πικρῶν, μεθ' ὄξυμέλιτος,
 ἢ αλεύρω αἰρίνω κτῶ ῥηπίνης, κὺ σικύα ἀγρῶν ρίζης
 ἢ νίτρος, ἢ καλαμίνθης, ἢ κάκρυος, καὶ δαφνί-
 δων. ἢ ἢ καλαμίνθη ὃ μόνη κρησίμως κτῶ πλάσ-
 σεται δι' ὄξυμέλιτος, ἢ μελικράτος. ἐμπαλά-
 σσει δε παρηγορητικῆ κρητέον τῆ δε κη-
 ρῶ L. ρ. τερεβυνθίνης L. κ. ε. ἰοῦ L. γ. σμύρ-
 νης, χαλβάνης, ἰριδος ἀνὰ L. γ. κεδρίας L. γ.

plasma fiat. Malorum quoque ci-
 triorum pars non apta cibo cum po-
 lenta magnopere subuenit. Fici ari-
 di & amygdalæ cum aliqua farina.
 Hæc utique est refrigerationis mate-
 ria. Et hoc quidem remediorum ge-
 nus aliud alium juuit : & idem inter-
 dum alium atque alium. Nonnullis
 uerò calefacientia remedio sunt : at-
 que idem remedium aliàs alijs opitu-
 latur. Peruulgatum est autē, & hoc ad
 dolorem tollendū ualde proficere. Ca-
 pram oportet herbam iridem ad fatie-
 tatem depasci : deinde interposito
 tempore, quantum ad pabulum in
 uentriculo conficiendum satis sit, ca-
 pram immolare, atque intra eius uen-
 trem infimo pede ægrotantis occu-
 lere. Demum infinita sunt medica-
 menta. Ægrotos nanque sibi ipsis
 remedia parare urgens impellit cala-
 mitas. Sed medicorum auxilia in
 proprijs libris conscribentur.

DE COXENDICVM morbo.

Caput LXXVII.

Paulus Ægineta lib. 3. c. 77. Quum ar-
 ticularis morbi generis sit coxendicum
 morbus, in eo solo differt ab eo, quod causa
 ipsius circa coxam firmatur : causa uerò hu-
 jus est crassus ac pituitosus humor coarticulati-
 oni circa coxam impactus. Dolor autē ipsis est
 à locis circa nates, & inguina usq; ad genua, in
 plerisq; uerò usq; ad sumum pedem pertingit.
 Ab initio igitur ægro oblato, post stercorū per-
 clysterē euacuationē, uenæ sectionem à cubito
 assumimus cum repetita detractione : si uerò
 post tempus æger nobis obtigerit, à malleolo
 circa crus affectum detractionem faciemus,
 & circa exacerbationes hac irrigatione uten-
 dum est. Cyprini cyathi octo, acetii cyathi
 quatuor, nitri cyathi duo, seminis rosmarini
 cyathus unus, per lanas fuceidas calida hæc
 adhibentur. Post hanc cataplasma impona-
 tur ex lupinorum amarorum farina, cum ace-
 to mulso, aut ex loliacea farina cum resina, &
 cucumeris siluestris radice, & nitro, & cala-
 mintha, & rosmarini semine, & lauri baccis : sed
 & sola calamintha utiliter imponitur cum ace-
 to mulso, aut aqua mulsa. Emplastro uerò miti-
 gatorio utendum est hoc. Cera drachmæ cen-
 tū, terebinthinæ drachmas uiginti quinq;, æru-
 ginis drachmæ sex, myrrhæ, galbani, iridis, sin-
 gulorū drachmæ sex : cedriæ drachmæ quinq; ; præbi-



praebendus detur succus cyrenaeicus erui magnitudinis, aut castorei drachma una, cum opopanaxi obolis tribus. Radicis autem capparitis cortex potus, & cataplasmatibus admixtus prodest: si uero multus est dolor, etiam sphaeram eximentia medicamenta lo-cum habent, uelut est antidotus Philonis, & quae ex diobus piperis generibus constat; infusum uero hoc immittatur. Mellis scilicet cyathus, olei scilicet cyathus, aquae cyathi duo, nitri drachma octo, terebinthinae drachma quatuor. His calidis infusis, insuper fomentum ano adhibeatur, quo longiore tempore retineatur. Euacuat mucosa, quan-doque etiam sanguinem, quando etiam plus prodest: si uero perseverauerit affectio (quod tamen raro contingit) rursus ipsa utendum est frequentius, pro aqua centaury decocto admixto. Sanguinem euacuet etiam thlaspeos semen infusum, & elaterij succus, & quod ex ipso, aut ex radicibus ipsius componitur oleum sicyonium, & salorum pitium muria, & oliuatum colymbadum muria recte intundi potest. Cucurbitis etiam ad colicam, cum multa flamma, & scarificatione utendum est, aliquando etiam hirudinibus. Perseuerante autem affectione, ad purgationem procedendum est, aut per hieram, aut per colocynthidem, ita ut medullae ipsius probe trita drachmae pondus detur, in aqua mullae cyathis plus minus duobus, pro uribus aegri, & prout alio bene affectus est. Sit autem rura in aqua mulla cocta. Probe etiam hos expurgat puls ex colocynthide: in quibusdam etiam uomitus a raphanis ab initio profuerunt. In interuallis autem dropax adhibeatur, & acopa ex euphorbio, praefertim id quod uarium appellatur. Balnea uero naturalia his commoda sunt. Si uero non adsint, in alijs saltem loti relatis acopis utantur, & compositis his, tum Asclepio appellato, tum hoc quod ex euphorbij, adarces, ueratri nigri, castorij, pyrethri, piperis, staphidis sylvictris, singulorum aequalibus partibus paratur. Post balneum picis auidae quadans, sulphuris uiui sextans, calido adhuc corpori inspergatur, ipsumque chatta integatur. Si uero neque haec profuerint, aut reliquijs morbi restantibus, bonum est etiam si napi cum caricis impositum, aut etiam per se. Perfecite uero ipsos restituit Iberidis herbae usus, quam sane etiam lepidium, aliqui uero sylvetice nasturtium appellant. Quae uero apud nos nascitur fruticosa, folijs lauri similibus, & multo maioribus, multam de se experientiam dedit, non solum in coxendicua, sed etiam alijs diuturnis morbis. Aestate autem multo efficacior est: si uero etiam

προσπιεστον ἢ ἀπὸ τῶν ἐπικυρλωαίνων μέγιστος ὄρος. ἢ κασορὶς L. α. σὺν ὀπὸ πᾶν ἀκροῦ τριω-
 βολῶ ὅ ἢ τῆς ρίζης τῆς καππαρέως. Φλοῖος πι-
 νόμοδος τε καὶ τοῖς καὶ πλάσμασιν ὀπμιγνύμε-
 νος. ἢ Φελέϊ. πολλῆς ἢ τῆς ἀλγηθόνος ἔσης ἔ τὸ
 ἀνώδιμα τῶν Φαρμακῶν ἔχει χώσαν οἶον ἢ τε
 Φίλωνος καὶ ἢ διὰ τῶν δύο πεπερεῶν ἐνίματι
 ἢ χρῆστον τῶδε μέλιτος K. α. S. ελαίος K. α.
 S. ὕδατος K. β. νίτρος ἄλκαλ. ἢ τερεβυνθίνης
 ὀλκαὶ δ, ταῦτα θερμά ἐνεσπαντα, δεῖ τὸν δακτύ-
 λιον ὀππιπυριαῦ, ὑπὲρ ἔ πλεῖονι χροῖα καὶ χροῖα
 ναὶ μὲν ὄδη. κενὸ ἐνίστε καὶ αἷμα, ὅτε καὶ παλαιοῶν
 ὠφελεί ἐῖ ἢ ὀπμιγνύει ἢ διαθεσις, ὅπερ ἐστὶ πα-
 μιον ἔ αἰδὶς συχρότερον αὐτῶ χρῆστον. αἰτι. ἔ
 ὕδατος ἀφείψημα κεντρωρὶς μίον γοντα. αἷμα
 δε κενὸ καὶ θλάστωσ. σπέρμα ἐνιερμόνον καὶ ἔχυ-
 λος ἔ ἐλατηρὶς, ἔ τὸ δι αὐτῶ. ἢ τῶ διὰ τῶν ρί-
 ζῶν αὐτῶ σπυρθερμόνον σκυονιον ἐλαμον καὶ τῶν
 ἔριχηρῶν ἔχρῶν ἢ ἄλμη καὶ τῶν ἐλαίων τῶν
 κολυμβάδων, κάλως ἀν ἐνεθείη. σικύοις ἢ καὶ ἔ
 ἰαίος μὲ πολλῆς Φλογὸς χρῆστον. ἐνχαράξω
 χρωμόμους ἐνίστε ἢ καὶ ἐδελλας. ἐπιμόνοντος ἢ ἔ
 πᾶθους ἐπὶ καθαρσιν ἴστον, ἢ τοῖ διὰ τῆς ἱερᾶς, ἢ
 τῆς κολοκυθίδος διδόντα. τῆς ἐντεριάνης. κα-
 λῶς λειωθείσης, δραχμῆς πολλῆθος ἐν μελικρά-
 τῶ K. β. ἢ μικρῶ παλιον ἢ ἐλατίον πρὸς τὴν δύ-
 ναμιν, καὶ τῶν ἀκωλιότῶ ἔ νοσητώτος ἐν δὲ τῶ
 μελικράτῶ πῆρανον ἐνεψῆσῶ καλῶς ἢ τῶ τῶ
 ἐκκαθαίρει, καὶ ὁ διὰ κολοκυθίδος πολλῆς ὀππ-
 τίνων ἢ καὶ σὺν ῥαφανίδων ἐμετοι κατ' ἄρχας
 ὠφέλησαν. ἐν ἢ τῆς διαλείμμασι δροπακίστον
 αὐτῶ. τοῖς τε δὲ εὐφορβίος χρῆστον ἀκόποις, ἔ μά-
 λισα τῶ ποικίλῶ καλεμῶν. λυτῶ ἢ τῶ αὐτο-
 φυῆ τῶ τῶ ἀρμόδια, εἰ δὲ μὴ παρείησαν, ἐν τοῖς
 γουῶ ἄλλοις λυόμῶν. τοῖς ἢ λελεγμόμοις ἀκό-
 ποῖς χρῆστον. καὶ τοῖς σωθεῖς νίτρος, τῶ τε ἀσ-
 κληπῶ, καὶ τῶ δι εὐφορβίος καὶ ἀδάρκης, καὶ μέ-
 λανος ἔλλεβορος κασορὶς τε καὶ πυρέθρος καὶ πε-
 πέρως, καὶ ἀσκαφίδος ἀρχίος ἴσων. μὲ τὸ λυ-
 τρὸν ἐμπροσθεσῶσαν πρὸς τῆς ξηρᾶς Γο. γ θείος
 ἀπύρος Γο. β. θερμόν ἐπὶ τὸν χροῖα καὶ σκεπέ-
 τῶσαν αὐτὸν χροῖα. εἰ ἢ μὴ ἢ ταῦτα θράσοι, ἢ γὰρ
 ἐγκῶ λείμματος τῆς νοσον μείναιτος, καλὸν μὲν
 καὶ τὸ νάπυ καὶ πλάστωμον σὺν ἰαχάσιν ἢ καὶ καθ'
 αὐτῶ. τέλεον ἢ τῶ τῶ δροπακίστοι τῆς ἰσθηίδος
 ἔσῶνης ἢ χρῆσις, ἢν δὴ καὶ λεπίδιον. οἰ ἢ ἀρξιοκάρ-
 δαμον προσεγορεύσιν. ἢ ἢ παρ' ἡμῖν Φυομένη
 θαμνώθης, ὡρᾶ πολλῆσια διαφνης τὰ φύλλα,
 καὶ μείζονα πολλῶ ἔχουσα. πολλῶν δὲ
 ὄωκε πῆσαν, ἔ μόνον ὀππ ἰαχιαδικῶν ἀλ-
 λά καὶ ὀππ ἄλλων χροῖων νοσημάτων θέρως διῆ
 πρᾶκτικῶν πῆρα μᾶλλον ἐστίν. εἰ δὲ ἔ μὴ τύχοι



πῆ Φύλλα Φύσσι, δὲ ἐν τῶν Φλοιδόν τῆς ρίζης
 ἀσπῆς κόψαι μὲν στατος ὕειν, ὡς ἐμπλαστῶν ἢ
 γενέσθαι. εἴτα Ἰππιδάσσαντα βαίνει πυκνῶ καὶ
 τῶν μάλιστ' ὀδωμένων Ἰππιδάσσαντα τῶν, ἢ
 γου καὶ τῆ σφαιρώματος ὄλα, καὶ ἔμηνε, καὶ
 εἰσπινεῖ ἕως ἂν μελανθῇ, ἢ πάλιν γε πελιδνὴ γέ-
 νη) ἢ ἐπιδερμῖς. εἴτα λαβείν αὐτῆ, καὶ λαομαδῶν
 ἐπιθεῖναι πύτυλῳ πύ κηρωτῶν ὀποπανάκος Γοι
 δ. Διάλυσι) ὄλας Κ. β. Ἐ ἀναλαμβάνου) κη-
 ρῶν ἢ κυπρίνη, εἰ ἢ παραιτῶντο τῶν πύτυλων καὶ
 σικῶν πύ γρησιν πῆς ἀνασκόπαστικαῖς χρεστέ-
 ον ἐμπλαστοῖς, ὧν ἐστὶ Ἐ αὐτῆ, κηρῶ πτυίνης αἰ-
 οῦ L. β. περιβουθίνης, περὶ σερῶν ἀργύριον κόπης,
 σφέλλης προσφάτῃ ἀνάσ. χαλβάτης L. α. σ.
 καὶ ἡ λείανη ἢ προσεγορευθῆσθαι τῶν ἀνασκευα-
 στικῶν ἐστὶ γρησμοδῶν καὶ αἰ διασκόπης καὶ νίπης
 σκιδάζομαι, καὶ πῆς ἐπ' ἐνιαυτὸν ἢ πινυμῶσι
 πνῆς ἐχρήσαντο ποτήμασιν. ἐξ ὧν ἐστὶ π, π Διά-
 ποσάρων. χαμαίδρου λ. α. ἡρπιάνης γο θ.
 δρισολοχίας τρογγύλης γο θ. πηγάς σπέρ-
 ματος ἡρῶ ξ. α. πύτυλα κόψαντα δὲ Ἐ σήσαν-
 τα, δίδοναι καθ' ἑκάστην ἡμέραν κοχλιαρίῃ
 παλῆθος νῆσει π Ἐ σπῆτιω, μεθ' ὕδατος ψυχρῆ
 Κ. β. Ἰππιδάσσαντα ἕως αὐτῆ νόσος παύσεται καὶ
 π Διά ζ. δὲ στυπτημῶν. καὶ ἡ πύτυλα ἢ λεγο-
 μῶν, τῆς αὐτῆς εἰσὶν ἐπαγγελίας. γυμνάσια ἢ
 Διά π περὶ πύτυλων ἐπιτελείσθω, Ἐ σπῆτιω δια-
 κάμψων καὶ ἀσφάλοτων, καὶ δρόμων. Ἐ πρὸ φη
 ἢ λεπίνου καὶ μετρίως καὶ εὐπέπτος. εἰδὲ πῆς
 μηδὲν τῶν εἰρημῶν ὑπακείη ἢ ἰαχίας, ὅτι μὲν
 εἰς διαπύην τρεῖσι, ὅτι ἢ, χαλασθέντων τῶν
 σπυρτικῶν νδρῶν, π κῶλον ἐξαρθεῖν δὲ πῆ-
 νου χρονίζου τῆς Διασπῆσεως, καίεν π ἄρ-
 θρον καὶ πρὸς ἢ πῆσας τῆς, ὡς ἐν πῆς χει-
 ρεργασίῳ εἰρήσει) καὶ Ἰππιδάσσαντα ἡμέρας
 πύτυλα φυλάττειν ἀνεπέλωτα.

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Ε Λ Ε -

Φαντ @.

κεφάλ. 17.

Τῶν νέσων μέζονα καὶ τὰ ἄκεια ἐς
 λύσιν αὐτέων ἐμμελῆται. ἐλέφαντος ἢ
 πλίκου κακῆ, πῆς ἀξιόνικος γίγνοιτ'
 αὐτῆς ἐπεί. ἢ γὰρ μέρει ἢ σπλάγχνω
 ἐνί, ἢ ἐνδον ἐσκήπτει μῶνον, ἢ
 ἐξω τὸ κακὸν ἐρπει. ἀλλὰ ἐν-
 δροθί τε ὄλω τῶ ἀνθρώπῳ ἐνοικεῖ,
 καὶ ὄλον ἐξῶθεν ἀμπεχθ. ἀτερπέες

folia tunc quum expeitur, non producerit,
 radicis ipsius corticem contundere oportet
 tum adipe suillo, ad emplastri formam, inde
 in lintecum densum infarcta, dolentibus
 maxime locis imponere aut circa totas nates
 & femur, & finire donec nigrescat, aut omni-
 no liuida fiat summa cuticuta: postea ipsum
 auferre, & loto hoc ceratum imponere.
 Opopanacis trientem in aceti cyathis 2. dis-
 soluito & cerato cyprino excipito. Quod si
 reculent talium urentium usum, emplastris
 malum extirpantibus utendum est, quorum
 de numero & hoc est. Ceræ, resinæ pinus
 singulorum drachmæ duodecim: terebin-
 thina, simi olubarum syluestrium, facis
 uini ustæ recentis, singulorum drachmæ
 sex: galbani sesquidrachmam. Est etiam de
 extirpantibus emplastrum lezna appellatum.
 Commoda sunt ea quoque quæ ex lixiuio
 ac nitro parantur: quin & potionibus quæ
 ad annum bibuntur, quidam usi sunt, ex qui-
 bus est & ea quæ ex quatuor rebus constat,
 chamædryos libra una, gentianæ dodrante,
 aristolochiæ rotundæ dodrante, seminis rutæ
 sicci sextario uno. Hæc contusa & cribrata
 quotidie dare oportet cochlearij mensura
 jejuno & concoctione probè facta, cum aquæ
 frigidæ cyathis duobus, ad annum, do-
 nec morbus sedetur. Medicamentum quo-
 que ex septem rebus compositum, & quod
 Procloascripsum est, idem promittunt. Exer-
 citia faciat per deambulationes & per assidu-
 os flexus, saltus ac cursus. Cibus sit atten-
 uans modèratè & concoctu facilis. Si uerò
 nulli ex relatis cedat coxendicum morbus,
 quandoque ad suppurationem uertitur, quan-
 doque laxatis neruis colligantibus, coxa ex
 articulo luxatur. Oportet igitur diu-
 turna facta affectione, articulum urere tri-
 bus aut quatuor locis, uelut in chirurgiæ tra-
 ctatione referetur, & ulcera ad plures dies con-
 seruare, ut ne cicatrix inducatur.

C V R A T I O E L E - phantis,

Caput XIII.

MOrbis, quo dissoluantur, maiora
 esse remedia opus est. Sed qua-
 nam medela excogitari poterit, quæ
 elephantem tam ingens malum ex-
 pugnare digna sit? neque enim in
 parte una, aut uiscere uno in hærescit:
 neque aut intus duntaxat labes occu-
 litur, aut extra prorumpit: sed & in pe-
 netralibus totum hominem occupat,
 & exterius totum amplectitur. Triste pro-



profecto, & uisu terribile spectaculum. Feræ nanque species est, ac unâ cum his uiuere, unâ cibum capere perinde, atque in pestilentia, formidolosum est. Etenim per inspirationis communionem facilis infectio est. Quod igitur quispiam in arte medica inueniat, quod huiusce mali dignum remedium contineat. Verum enim uerò omnia conferre simul oportet medicamenta? & uictus rationem, & ferramenta, & ignem. Hæcque si nouo & orienti affectui adhibueris: sanationis spes affulget. Sin ad summum suæ creationis ascendat, in uisceribusque stabilis sedeat, insuper & in faciem inuadat: tunc de agri salute spes omninò abscissa est. Itaque uenas in cubito ambas incidito: incidito & uenas in malleolis eodem die: temporis enim interiectio atque separatio fundendo ubertim sanguini, & recreandis uiribus aptior est. Nam sanguinem sæpè & multum mittere operapretium est: quippe uitij huius alimentum sit. Exigua uerò ipsius pars est optima, quæ naturæ cibum præbeat. Incirco qua ratione prauum inquinatumque detrahatur, atque interim corpori familiare ac bonum procreetur, coniectandum est: quoad alimenti penuria morbus prius fatigetur. Noua enim esca applicata corpori spatio temporis antiquam obscurat atque debilitat. Postea medicinam sacram non semel propinato: quin omnia sæpius iteranda sunt, & resumtio, & ad priora reductio. Esto & alia medicamentosa in cibis purgatio: sicut antea de curatione doloris coxendicis diximus. Lac etiam promiscuum atque indiscretum, sed largius ad aluū molliendam potui detur. Verum quintam aquæ partem, quo lac totū dilabatur, atque descendat adijcito. At jejunos primò ad uomitum celerius ducito, deinde à cibis iterum postea assumtis raphanis. Frequenter autem atque assidue omnia fiant,

μὲν καὶ φοβερόν ἰδεῖν. θηεῖς γὰρ ἰδέη. δέος ὃ ξυμβιών τε, καὶ ξυνδιατάσας, ἐμείον ἢ λοιμῶ. ἀναπνοῆς γὰρ ἐς μετέδοσιν, ῥηίδη βαφίη. τὶ αὐτῶν εὐροπὶς ἐν ἰητρικῇ ἔδει ἀξιὸν ἔχον ἀκθ. ἀλλὰ γὰρ πάντα χεὶρ ξυμφέρει φάρμακα, καὶ διαίτην, καὶ σίδηρον, καὶ πῦρ, καὶ τὰ ἄλλα, καὶ μὲν ἐπι νεολοκωτῶ πάθει πρὸς βάλλης, ἐλπίς ἴησιος. ἢν ὃ ἐς ἀκμὴν ἦκη γενέσιος, καὶ ἐν τῶι σπλάγχνοισι ἐδραμον ἴζη, ποτὶ καὶ ἐς τὰ πρὸ σώπα πρὸς βάλλη, ἀνέλπιστος ὁ νοσέων. τὰ μὲν αὐτῶν τὰς ἐπ' ἀγκῶν φλέβας. ἀμφω δὲ τὰ μὲν ὃ καὶ τὰς ἐπὶ σφυροῖσι αὐτῆμαρ. κρέασον γὰρ ἢ διάσασις, ἐστὶ πολλὴν τὴν τῆ αἵματος, ῥοήν, καὶ ἐς ἀνάκλησιν τ' δυνάμιος. χρεῶν γὰρ αἷμα πολλάκις, καὶ πολλ' ἐκχέου, τὸ πάθος τὴν τροφίω. σμικρὸν ὃ ἐν αὐτῶ τὸ χρεῶν τ' φύσιος ἢ τροφίη. ξυλεκμαίρεσθ' ὠν ἀφαρέοντα τὸ πονηρὸν καὶ ἐν τῆκτον, μεσηγὺ τὸ οἰκείον, μέσφι αὐτῶ πρὸς ἀπαυδήση ἀτροφίη ἢ νῆσιος. ἢ γὰρ νεαρὴ ξυμπλακείσα τῶ σώματι, χροῖω μακρῶ ἢ μαύρωσε τῆν παλαιὴν. ἐπὶ τῶ ἱερὴν πῖσισην μὴ ἐσάπαξ, ἀλλὰ γυγνέσθω πάντα πολλάκις, ὃξ ἀναλήσιος καὶ παλινδρομῖσις. ἔσω καὶ ἢ ἄλλη κάθασις φαρμακώδης ἐν σίτω. ἢ ἐπὶ τῶ ἰχθῶ ἢ ἐλεξα ἔσω. ἢ δὲ γάλα ἀδιάκριτον, πολλὸν ὃ ἔσω ἰσθὲς ἐς διαχώρησιν πῖν ἐχέτω ὃ μοίρην ἰὴν πέμπτην ὕδωρ, ὡς παῦ τὸ γάλα διεκθέειν. ἐς ἐμέτας δὲ θάσσον ἀγειν νήσιος τὸ πρῶτον. ἀπὸ σίτων δ' αὐθις ἐπειθε ἀπὸ ραφανίδων. πολλάκις δὲ καὶ ξυνεχῶς πάντα γυγνέσθω.

Ἐπι τῶ



ἐς ἄλλεβορον ἀγόντα καιρῷ παντὶ,
 μᾶλλον ἢ ἔαρος ἢ φθινοπώρῃ διδόναι
 ἡμέραν ἀφ' ἡμέρας. ἢ αὖθις ἐς
 νέωτα. κήν ἢ νῆσος κρατυθη, φαρ-
 μακῶν ποτῶν, ὅκοσα πῆς γινώσκει
 πιπίσκην ἀγαθὸν γὰρ φάρμακόν ἐστιν
 πολλὸν ἐς ὄνησιν. καὶ γὰρ ἢ ὅκοσα γι-
 γνώσκω γράφω, κεδρίης κύαθον ἕνα.
 κριάμης δύο μίσροντα διδόναι. ἄλλο.
 σιδηρίδος ἔχυλῆς κύαθος εἷς,
 τριφυλίας εἷς, οἴνου ἢ μέλιτος κύαθος
 δύο. ἄλλο. ἐλέφαντος ἔδόντος ρινή-
 ματος, ὀλκῆς δραχμῆ, ξυῶ οἴνω κρή-
 σιος κύαθων δύο. ἄλλο. ἢ τῶν ἔχεων ἰῶν
 ἔρπε τῶν θηρίων αἰσάρκεις, ἢ αἰδέ ἐς
 δρεπίσκας πεπλασμαί πίνον. ἄλλο.
 τῶν κροτάλων ἢ χεῖρ τῆς κεφαλῆς, καὶ τῆς
 εἰραίνης ἕκαστον, ὅκοσον δακτύλους τέσ-
 σαρῶν, τὸ λοιπὸν ἐψεῖν ἐς διάκρυσιν
 τῶν ἀκαθῶν, τῶν ἢ σάρκας δρεπίσκας
 διαπλάσαντας, ψύχειν ἐν σκῆνῃ. πι-
 πίσκην ἢ τῆς δέ, ὅκοσος ἢ ἡ σκίλλου
 ἢ αὐτῆς ἢ οἰέχους ὄψον ἐν δείπνῳ, ὡς
 ἰχθύας ἢ χεῖρ τέρας σκευάσαι. ἢ ἢ
 τὸ δι' ἐχιδνῶν τὸ ποικίλον παρέη
 φάρμακον, ἀπὸ πάντων πίνειν τὸ δε.
 ἴχει γὰρ πάντα ὁμοῦ. ῥύπην δὲ καὶ τὸ
 σκῆνος, ἢ τὰς ὀχθῆς ἀλεαίνειν. φάρ-
 μακὰ ἢ ἄλλα μυρία τῶν κελπίων, οἰ-
 νῶ καλέσον γάλλοι, τῶν λιτωδῆς
 τῶν ποιητῶν σφαίρας, ἢ σι ῥύπιασι
 τῶν ὀθόνας σάπων ἑπίκλιν, τῆσι
 ῥύπην τὸ σκῆνος, ἐν λιτωῶ ἀείσον.
 καὶ ἀνδράχην, ἢ αἰζῶν ξυῶ ὄξει,
 ἄλλο ἢ λαπάθης ριζῶν ἀφ' ἑψημα
 ξυῶ ἀπύρω θείῳ ῥύπην καλῶς. ποικί-
 λον ἢ ἀλκυονίς ἔλαιος, ἢ νίτρος, ἢ ἱρυ-
 γὸς ὄξος κεκαυμένης, καὶ συπληρίης

Veratrum quolibet tempore, sed po-
 tius vere atque autumnō diebus
 alternis exhibeto: atque idem in
 proximum annum repetatur. Cæ-
 terum si morbus inualuerit, potabi-
 lia medicamenta quotquot quis cog-
 nouerit, potanda præcipiat. Multa
 enim ac uaria adhibere medicamen-
 ta est operæpretium. Atqui & ego,
 quotquot mihi cognita sunt, literis
 mandabo. Cedriæ cyathum unum;
 brassicæ duos miscens dato. Aliud.
 Sideritidis succi cyathus unus, trifolij,
 cyathus unus, uini & mellis cyathi
 duo. Aliud. Dentis elephantum ramē to-
 rum drachma cum uini diluti Cretici
 cyathis duobus. Quin etiam uiperarū
 reptilium ferarū carnes, & ipsæ in pa-
 stillos conformatæ bibuntur. Opor-
 tet autem & caput & caudam ad qua-
 tuor digitorum spatium præcidere,
 reliquum usque eò elixare, donec
 spinæ separentur: carnes uerò in pa-
 stillos redactas in umbra frigefacere:
 qui potioni, quemadmodum & scilla,
 exhibeantur. Ipsæ quoque uiperæ
 in cæna obsonio dentur: quas co-
 quere, & condire perinde, ac pisces,
 opus est. At si medicaminis ullius
 uarij ex uiperis compositi copia ad-
 sit, id pro omnibus, quandoquid-
 dem omnia simul continet, biben-
 dum est. Præterea corpus detergen-
 dum est, tumoresque *complanandi*.
 Alia item medicamenta sunt innu-
 mera Celtarum, quos hac tempestate
 Gallos uocant. Nitrosis quoque illis
 factitijs globis, quibus uelaminum
 sordes expurgant, saponemque uo-
 cant: illis inquam, globis corpus in
 balneo detergere optimum est. Et
 portulaca, & sedum cum aceto bene
 facit. Rumicis etiam radicum de-
 coctum cum sulphure ignem non
 experto summopere deterget. Illud
 item uarium, & ex alcyonio trito & ni-
 tro & aceti fæce combusta, & alumine
 fisso,



fisso, & sulphure uiuo, & costo, & iride, & pipere. Forsitan autē omnia pro singulorum uiribus miscenda sunt. Aliquibus uerò & hoc æquis portionibus compositum inspergentes perfricabimus. Faciei tumoribus sarmentorū cinerem alicui ferarum adipi admiscens illinito, leonis uidelicet, aut pantheræ, aut ursi. Sin his careas, animalis, quod Græcè *χίναλώπεκα* uocant: latinè uulpanferem dicas (quod genus auis est, si per literas *χ* & *η* prima syllaba scribitur, aut laconicum canem significat ex uulpe & cane natū, si per *κ* & *υ* eandem syllabā scripseris) simile enim indissimili, quemadmodum simia homini, mirificè prodest. Item ammoniacæ gutta cum aceto, & plantaginis aut sanguinalis herbæ succo & hypocisthis & lycium. si carnes liueant: prius quò locus succulentus reddatur, scarificandus est. At si ab acribus fluxionibus exulceratas partes lenire uolueris, fœnigræci decoctum aut hordei cremor molle absterforium est: item ex oleis rosaceum, aut lentiscinum. Assidua uerò lotiones & ad corporis madefactionem & ad noxiarum humiditatum distillationem mire proficiunt. Esca munda esto, boni succi creatrix, concoctu facilis, simplex & uictus ratio prorsus rectè instituta sit in somno & uigilia, in ambulationibus & locis deligendis exercitationes adhibeantur, cursus, conuersiones corporis, peræ aut facculi iactus. Omnia hæc citra lassitudinem aptè & congruenter intendantur. Esto & uocis emissio spiritus oportuna exercitatio. Vestis esto munda, non modo ut aspectu iucunda sit: sed quoniam etiam fordida cuti mordacia sunt. Iejuni absinthite uinum potent. Oppidò quam utilis est panis ex hordeo, & salisamentum tempestiuum, & exiguum quid maluarum, aut brassicæ semicodum cum cumini liquamine. In cana pastinacæ radix apponatur, & alica cum uino & melle antiquo

χρισῆς, καὶ θεία ξάπυρα, καὶ κόρα καὶ ἱρίδος, καὶ πηπέριος. ἰάχα ὅχη πᾶντα μίσγειν ἐκάσω τὸ πρὸς δύναμιν. ἄλλο δὲ ἴσον καὶ τὸδε καταπάσονται ἀνατρέψαν. ἐς ὅτι τὰς ὀχθὰς ξωροσώπη, κλημάτων τὴν σποδὴν, ξὺν πνὶ θηρίων σῆα πμίσγοντα χρίειν, λέοντος, ἢ παρδάλιος, ἢ ἄρκτε. ἢν δὲ μὴ, *χίναλώπεκος*, ὁμοίον γ' ἐν ἀνομοίω ὅπως πύθηκος ἀνθρώπων ἄριστον. καὶ ἀμμονιακὸν τὸ θυμύημα, ξυὸ ὄξει, καὶ δρογλώστα χυλῶ, ἢ πολυγόνε, καὶ ὑποκυσίς, καὶ λύκιον. ἢν ὅτε λιθναὶ ἔωσι αἱ σάρκες, προσερχαράσων ἐγχυλώσος εἶνεκεν. ἢν δ' ἴπτοισι δριμέσι ῥόδιμασι ἀναδραξέντα πρηῦνενταί μερέα ἐθέλης, τίλιος ἀφέψημα, ἢ πλισάνης χυλῶ ῥύμμα μαλθακόν. λίπας ὅροδίνε, ἢ χρινίνε. λυτρεὰ δὲ ξυνεχέα ξύμφορα ἐς ὑγρασμόν, καὶ ἐς διαπνοὴν τῶν κακῶν χυμῶν. τροφή ὅ καθαρή. δύχυμος, δύπεπιθ, ἀπλή, καὶ διατα δυκρινὴς πάντη, καὶ ἐν ὑπνοισι, ἢ καὶ πᾶσι, καὶ χῶρησι. γυμνάσια, δρόμοι, καὶ ἀνειλήσεις, καὶ κορυκοβολία. ἀπάντα ἀκάματα ξὺν ἐμμελεῖ ἴπτοισι. ἐσω ὅτε ἀναφώνησις ξω πνύματος, γυμνάσιον τὸ κληρίον, ἐδῆς ἐσω καθαρή, ἔχως ὀρθῶς μούνον ἢ δε, ἀλλ' ὡς ὅτι καὶ τὰ πινόντα, ὀδραξώδεα τῶ δέσματι. πιπίσκαι ἀψινθίς ἰξοίνε νεΐσιας. ἄριστον ὅ ἀρτε ἐκ κελθῶν, καὶ τὰ εἰχος ὠραῖος, καὶ σμικρόν τι μαλάχης, ἢ κράμβης ἢ μίεφθον, ξυὸ κυμίνε ἐμβάμματι. ἐς δὲ δῆπνον, σαφιλίνος ἠρίζα, καὶ χόνδροι ξυὸ τῶ οἴνω, καὶ τῶ μέλιτι παλαιῶ τὴν

*ἴσους
κυνιδάσμοι, ἢ
κασι γρανά*

Cc μίξιν,



Συμμοί

μίξιν, ἢ τὰ θαλάσσια, ὁκόσα τιλ
 γαστέρα ἰσολύφ, τελλίνων, ξωμοί,
 ὄσπρεα, ἐχίνοι, ἢ τῶν ἰχθύων οἱ πετρῶ
 οἱ χερσαίων δὲ τῶν θηρία, λαγῶς, ἢ
 σὺς. πετεινῶν, πέρδικες πᾶσαι,
 φάσαγ, πελειάδες, ἢ ὁκόσα ἢ χώ
 ρη ἄρεια ἰχθεῖ. ἀκροδρύων, τὰ ὠ
 ρῶα. οἶνοι γλυκεῖς, οἶνωδέων κρείσ
 σονες. λατρὰ φύσει θερμὰ, θειώδη.
 ἢ βίϑ ἐν ὕδασι μακροῦς, εἶθε καὶ
 θάλασσα καὶ πλοῦς. ἐλλέβοριμοί,
 ἐλλέβορϑ λουκὸς μύρ, τᾶν ὠ κοι
 λίνης καθαρσις. μέλας δὲ, τᾶν ὠ καὶ
 ἔστιν ὁ λουκὸς ἐκ ἐμέτηριον μῆνον,
 ἀλλὰ καὶ ξυμπάντων ὁμῶ καθαρι
 πριῶν ὁ δυνατῶτατϑ, ἐπὶ πλήθει
 ἢ τῆ ποικιλίῃ τᾶν ἐκκρίσιϑ. τᾶν δὲ γᾶ καὶ
 χολέρη πρήσσει. οὐ δ' ἐντάσει καὶ
 βίη τῆσι ἔπῃ τῶσι ἐμέτησι. ἐστὸ δὲ
 γᾶ ναυτῆ καὶ θάλασσα κρέασον. ἀλλ
 ἄ δὲ δύναμι καὶ ποιότητι ἐπὶ φάσλι.
 τῆ περιῦ γυίας τῶς κάμνοντες ποι
 ἔει, καὶ ἐπὶ ὀλίγη τῆ καθαρσι, καὶ ἔπῃ
 σμικρῆ τῆ ἐλιάσι. ἀτὰρ καὶ πάντων τῶν
 χρονίων νέσων ἐς ρίζαν ἰδρυμύων, ἢ
 ἀπαυδήση τὰ λοιπὰ ἄκεα, τὸ δὲ
 μῆνον ἰητήριον. πυρὶ ἰκελον γᾶ ἐς δύ
 ναμιν λουκὸς ἐλλέβορος, καὶ ὅτι περ
 πυρὶ ἐργά(ε) ἐκκαῖον, τᾶν δὲ πλέον
 ἐλλέβορϑ εἰσω παρεκθέων πρήσσει,
 ὄπνοιαν μύρ ἐκ δυσπνοίης, ἔξ
 ἀχροίης ὃ ἀχροίω, καὶ
 ἀπὸ σκελεπίης, εὐ
 σαρκίω.

ἰσολύφ
Ναυτιλίν

mixtis : & marina quotquot ventrem
 subducunt, tellinorum juscula, ostrea,
 erinacei, & ex piscibus saxatiles : ex
 terrestribus feræ lepus, aut sus : inter
 aves perdices omnes, palumbes, co
 lumbi, & quæcunq̄ optima in illa
 regione inveniuntur. Inter fructus
 arboreos illi admittantur, quos Graeci
 Horæos uocant : quod ea parte an
 ni maturescant, quam ijdem Graeci
 Horam appellant. Vina dulcia ui
 nosis meliora. Balnea sponde calida
 sulphurosa iuuant. Vita in aquis
 diu ducenda est, & mare, & nauigatio
 conueniunt. Præterea per ueratrum
 purgationes fiat. Album quidem
 superiorem uentrem, atrum uero in
 feriolem purgat. Quin & album
 ueratrum non uomitum tantum mo
 litur : sed etiam omnium simul pur
 gantium medicamentorum effica
 cissimum est, non multitudine &
 uarietate excrementorum : id enim
 & affectus ille, qui cholera dicitur,
 præstare solet : non distentionibus
 & uiolentia in uomendo (ad hoc
 enim & nausea & mare ualidiora
 sunt) sed potentia & qualitate non
 uitiosa, quippe quæ laborantibus
 sanitatem reddit per exiguam purga
 tionem, & modicam intentionem.
 Vetustorum præterea morborum
 omnium firmis radicibus inhaerenti
 um, si cuncta alia medicamina uiribus
 inferiora sint : id unicum remedium
 est. Siquidem igni facultate persimi
 le est album ueratrum : & quod ignis
 exurens facit, eò plus ueratrum inte
 rius discurrens operatur : uidelicet fa
 cilem spirationem ex difficili, ex
 pallido colore floridum,
 & ex macie corporu
 lentiam *

DE



Paulus Aegin. lib. 4. cap. 1. Atetzum Cap-
 padocem bellè dicere arbitror, auxiliorum
 facultatem morbis superiorem esse oportere,
 & propterea elephantem curari non posse:
 non enim reperiti medicinam eo superiorem.
 Si enim cancer, qui uelut elephas
 quidam est in una parte, ex incurabilibus etiam
 ab ipso Hippocrate nominatus est, quomodo
 non magis elephas, qui uelut cancer quidam
 in toto corpore est, omnino incurabilis erit?
 Quum enim atra bilis, ex qua hæc affectio
 conflatur, duplicem generationem habeat
 (aut enim ex atrabiliario ac sæculentiore hu-
 more, & uelut sanguinis limo, aut ex flaua
 bile, utrisque superaffatis generatur) sub
 rubros quidem elephantas, mitiores quo-
 dammodo, aut (ut uerius dicam) minus ma-
 lignos, prima atræ bilis differentia efficit,
 Alios uerò qui etiam maligniores sunt, & to-
 tum corpus exulcerant, & extremarum par-
 tium elapsus faciunt, posterior differentia ex
 flaua bile nimium assata generata producit.
 Quapropter de ijs, qui jam morbo detecti sunt,
 desperandum est: ubi uerò in principio est
 affectio, ut neque aliqua extremarum parti-
 um decidat, neque ulcerata sit cutis superfi-
 cies, neque etiam tumidæ eminentiæ pluri-
 mum insurgant, uerum turpis solum sit facies,
 ita tamen ut non ualdè indecorum aspectum
 præferat, curare tentabimus. Non pauci
 enim per solam capitis uisionem, plerosque
 qui ita inceperunt, prohibuerunt ne ab af-
 fectioe superarentur. Statim igitur incipi-
 ente morbo uenæ sectione utemur, cum
 repetita sanguinis detractione, atque hoc
 magis in uere, quando maximè & gignitur
 affectio & exacerbatur. Paucis autem inter-
 positis diebus, nouem aut decem, purgamus
 ipsos pulte ex colocynthide, non una uice,
 sed sæpe, juxta rationem medicamenti, quan-
 titatem adaugentes. Purgatio quoque ex
 hiera ijs commoda est. Rursus autem die-
 bus circiter decem interjectis, serum lactis
 scissi ipsis dandum est, non infra trium he-
 minarum mensuram, neque supra quinque.
 Sequentibus uerò diebus lacte non scisso,
 aut recens multo alantur. Ex ijs siquid-
 em remittit affectio, eodem alimento
 utantur: si uerò perseverat, à lacte ab-
 stineant, & ab acrium esu uocant,

Παυλ. αἰγ. βιβ. δ. κεφ. α. ὀρθῶς οἶμαι τὸν
 κατωπαδόκην Ἀρετῆον εἰπεῖν. μείζονα τῶν νό-
 σων χεῖρῶν τῶν βοηθημάτων ὑπάρχειν
 δύναμιν, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τυγχάνειν ἰά-
 σεως τὸν ἐλέφαντα. μὴ γὰρ εὐρίσκεσθαι τοῦτε
 φαρμακῆϊαν κρείσσονα. εἰ γὰρ ὁ καρκίνος, οἷον
 ἐλέφας τις ἂν ἐν ἐνὶ μορίῳ, τῶν ἀνιάτων ἐπαρ-
 αὐτῷ τῷ ἰπποκράτῃ ὠνόμασαι, πῶς ἔχει μάλ-
 λον ὁ ἐλέφας, οἷον καρκίνος τις ὑπάρχων ἐν
 ὅλῳ τῷ σώματι, παντῶπιον ἀνιάτῳ ἔσαι.
 Ἦ γὰρ μελαίνης χολῆς, ἐφ' ἣ τὸ πᾶν ἔστι συ-
 νίσταται διτλῶ ἐχέσθαι τὴν γένεσιν. ἢ γὰρ ἐκ τῆς
 μελαγχολικῆς καὶ τρυγωδέςερος καὶ οἷον ἰλύθῃ
 ἔσται αἵματος, ἢ δὸ τῆς ξανθῆς χολῆς, ἀμφοῖν
 ὑπεροπιωμένων, γίνεται. Ἔς μὲν ὑπερύθρους
 ἐλέφαντας ἐπεικείσεται πῶς, ἀληθέστερον δὲ
 εἰπεῖν, ἢ ἴσον ὄντας κακοήθεις, ἢ πρώτη διαφο-
 ρὰ τῆς μελαίνης ἐργάζεται χολῆς. τὰς ἄλλας,
 οἷα κακοήθεστοι τυγχάνουσιν, ἐλκουῶτες τὸ
 πᾶν σῶμα, καὶ τῶν ἀκρῶν ἐκπιῶσεις ἐργάζομε-
 νοι, ἢ ὑστερὰ ἢ δὸ τῆς ξανθῆς χολῆς ὑπερω-
 πιωμένης γινομένη. διὸ τῆς μὲν ἡδὴ τῆ νοση-
 κεκρατημένων ἀπαγορευτέον ἐστίν. ἐν ἀρχῇ δὲ
 ἔπαυσε ὑπάρχοντῶ, ὡς μητέ τῶν ἀκρῶν
 δόποισσιν, μή τι κατὰ κωθλιῶν τὴν ὀπίσθια
 νειαν, μή τι μὲν τοῦ ὄχθους ὀπίσθια ἐπιπλεῖσον ἐπιπλε-
 ῖσασθαι, εἰδεχθέστερον ἢ πῶς μόνον τὸ πρὸσωπον καὶ
 τὸ μὴ λίαν ἀπεπέσθαι φαίνεσθαι, θεραπεύειν
 πειρασώμεθα. πνὲς γὰρ σὺν ὀλίγοι, διὰ μόνης
 τῆς κατὰ τὴν κεφαλὴν καύσεως τῶν οὐτως ἀρ-
 ξαμύων πολλὰς ἐκώλυσαν κρατηθῆναι τῷ
 πάθει. εὐθὺς ἐν ἡμεῖς ἀρχομένης ἔνοσηματῶ
 φλεβοτομία χρησώμεθα μετ' ἐπιφαιρέσεως, καὶ
 μᾶλλον ἢ ἔστι, ὅτι μάλιστα καὶ τίκτεται τὸ πάθος,
 καὶ παροξύνεται, μετὰ ἧ ὀλίγων ἡμερῶν διά-
 σθημα δ'. ἢ ἰ. καθάρωμεν αὐτὸς τῷ διατῆς κο-
 λοκωθίδος πολλῶ, μὴ προσάπαξ ἀλλὰ πλεο-
 νάκις, ἐκ τῆς πρὸς λόγον τὸ ποσὸν ἔφαρμάκις
 παραύξοντες. καὶ ἡ διατῆς ἰερέως δὲ καθάρσις
 τῆς τῆς ὀπίσθια δὲ. πάλιν ἡ διαλείπονται
 ὡς ἔπειτα ἡμέρας, τὸν ὄρρον αὐτοῖς διοτιόν τῆ
 χις ἔχοντες. μή τι ἐλαττον τριῶν κετυλῶν,
 μή τι πλείον ε. πῆς δὲ ἐξῆς ἡμέρας ἀχίς ἢ
 νεαμελγῆς τρεφέωσαν. ἐφ' οἷς ἐνδοιδιῶπις
 μὲν τῆ πάθος, τῆ αὐτῆ τρεφῆς χρησώσαν.
 ὀπίσθια δὲ, τῆ μὲν γάλακτῶ ἀπε-
 χέωσαν, ὀπίσθια φάγησαντις δὲ ἐξεμείωσαν,
 τῆ μὲν γάλακτῶ ἀπε-
 χέωσαν, ὀπίσθια φάγησαντις δὲ ἐξεμείωσαν,



ἄπο τῶν ραφανίδων καὶ σιτίων. ἀγαθὴ δὲ καὶ
 ἡ δαΐ τῶν λουκῶν ἐλεβορέα μετὰ πῦμα κά-
 θαρσις, δις μὲν εἰ οἶον π. τῶν ἑαυθῶν, ἀπᾶς
 δὲ πῦ Φθιωπώρεα. τῶν δὲ κεκρατημέ-
 νων, μήτε φλεβοπημῶν μήτε ἐλλοβορίζων.
 ἔπι γὰρ μεταλήψις ἀπὸ τῶν δερματῶν εἰς τὸ
 βάθος. ἔπι μείωσις τῆς ὕλης ἐκ τῶν ἑπι-
 γίνεταί. ἀλλὰ δὲ εἰ πῦ μὲν ὕλιν ἔπι κοιλί-
 αν ἀπάγειν καὶ ἐντερά τοις δὲ μετασυγκε-
 πτικῶν χρῆσθαι. ξηραίνειν τε καὶ εὐφρῖν πῦ
 ἔπι φαρμακῶν. κοῦφά τε ἐν σκύαι ἐκ τῶν εὐ-
 ματῶν τῆς γαστρός καὶ τῶν ὑποχονδρίων
 κοιλιάδωσαν πᾶσι δὲ αὐτὰ καὶ δρωπακίζεσθαι.
 μικρὸν δὲ ἀλαλιπνῶν, πάλιν ἀνακαμηθῆναι,
 ἀπὸ τῆς δαΐ τῆς ἑσθῆς δροχόμῶν καθύστεως,
 ὑπερπιβεμῶν πῦ φλεβοπημῶν, ἔπι βλα-
 βίστραν μάλινον ἢ ὠφέλιμον ἐσομῆναι. καὶ
 ταύτη τῇ περὶ δαΐ, ἀρξὶ τρεῖς ἢ τετρακίς χρῆ-
 σθῆναι πῦ ἐνιαυτῶν, κατὰ τὸν καιρὸν μαλίστα
 ἔπι ἡρος καὶ ἔπι Φθιωπώρεα. ποτίματι τῶν ἀρ-
 μόσι. οἶον Κ. α. μὲν κεδρίας Κ. α. καὶ χυλοῦ
 κρομμῆος ὠμῆς Κ. β. μίγνεται διδιδότω πρῶτῶ καὶ
 ἐσπερας, ἢ σιδηροπυρῶν βοτάνης φύλλα ξηρὰ
 L. α. ἐν οἶνου Κ. α. ἢ ἐλαφίον κέραι L. α.
 καὶ σκιλλίνου ἄξους Κ. α. ποτίσθαι με-
 τὰ τὸν ἐνωθινὸν περὶ πατρὸς καθ' ἡμέραν. καὶ πᾶσι
 ἀλλὰ δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τῶν διδιδότω ἢ
 σκίλλης πεσλυμῶν L. ε. ἐν μελικράτῳ, ἢ ἐν
 μέλιτι τρεῖς ἢ εὐλίγματῶν. ἢ ὅπῳ κυρλωακῶν
 ὄρορα τὸ μέγεθος, μέλιτι καὶ βετύρω δισ-
 μῶν ἢ ἐλεφατος ῥινημάτος L. δ. μετὰ οἶνον
 κυάθων β. ἢ κυμίνης αἰθιοπικῆς L. γ. μὲν μέλι-
 τῶν, ὡς εὐλίγμα. τῶν δὲ πλεον ὠφέλιμα,
 θηριακῶν δροπικῶν L. α. ἐν οἶνον καλῶ Κ. α.
 λειοτριβηθεῖσα καὶ πνομῶν. ὁμοίως δὲ
 καὶ τῶν σκιλλικῶν δροπικῶν L. α. πινέσθαι. καὶ
 τῆς καλαμίνης δὲ τὸν χυλὸν ὡς περακτικῶ-
 ν ἐπινομοῦσι βοήθημα, πνομῶν. ἀρχεδαμ
 δὲ φασὶν ἀπὸ κυάθων τριῶν ἀρξὶ 5. ἀπᾶν-
 των δὲ μάλινον ἢ δι' ἐχιδῶν θηριακῆ δρα-
 στήρι L. α. ὑπὸ ἀρχεδαμ πνομῶν τε καὶ ἐξωθεν συ-
 χρομένη. ὁμοίως δὲ παρὰ τῆς τῶν θηριῶν,
 ἐσθῆν ἄτας ἐστὶ δραστήριον, ὡς αἰ τῶν ἐχιδῶν
 σάρκες ἐδιόμηναι, καθήψηναι λουκῶ ζωμῶ
 δι' ὕδατῶν πλεονῶν καὶ ἀλῶν, καὶ πρᾶσι, καὶ
 ἀνήθαι, ἀρξὶ τῆς τῶν ἀκαθῶν ἀκαθίσεως.
 περακτικῶν περὶ τῶν π κεφαλῶν
 αὐτῶν καὶ τῶν οὐρῶν, οἶον ἀπὸ δακτύλων δὲ
 ἀφαρθεῖν τῶν δὲ καὶ τῶν ἐν τῶν αὐτῶν καὶ τῶν
 δερματῶν καὶ θηριακῶν δὲ ἀλῆς, τὸ αὐτῆς κατὰ

itemque à raphanis & cibis. Commoda
 est etiam postea ex ueratro albo purgatio,
 bis si fieri potest in uere, semel in autum-
 no. Cæterum ijs qui à malo uicti sunt, ne-
 que uena secetur, neque ueratrum detur.
 Neque enim translatio à cute ad profun-
 dum contingit, neque imminutio materiæ
 ex his amplius fit. Verum materiam ad
 uentrem ac intestina deducere oportet, &
 ex alto euocantibus ac transfrentibus hu-
 mores uti, siccareque ac alstringere cutem.
 Leues igitur cucurbitæ ad os uentriculi &
 ad præcordia affigantur, & ijsdem quoque
 partibus dropaces adhibeantur. Pauco au-
 tem tempore interposito rursus reflecten-
 dum est, initio à purgatione per hieram
 sumto, ommissa uenæ sectione, ex aqua majus
 detrimentum quàm utilitas ulla futura esset:
 & hoc circuitu ter aut quater in anno uten-
 dum est, maximè uere & autumno, Po-
 tiones autem his conueniunt hæ. Aceti
 cyathus unus cum cedriæ cyatho uno & suc-
 ci & brassicæ crudæ cyathis duobus: mixta
 hæc dantur manè & uesperis: aut sideritidis
 herbæ folia arida drachmæ pondere, in
 uini cyatho uno: aut cornu ceruini drach-
 mam unam, & aceti scillini cyathi mensu-
 ram bibendam præbe quotidie post matura-
 tionem deambulationem: sed & alia circa hoc
 tempus dentur, aut scillæ assatæ drachmas
 quinque in aqua mullâ, aut in melle ad
 eclegmatis modum: aut succi Cyrenæici crui
 magnitudinem, melle & butyro dilutam:
 aut ramenti eboris drachmæ dimidium cum
 uini cyathi duobus, aut cumini Æthiopicæ
 drachmas tres cum melle uelut eclegma.
 His autem magis opitulatur pastillorum
 theriacorum drachma una, in uini boni
 cyatho uno trita ac pota: similiter etiam
 pastillorum scilliticorum drachma una biba-
 tur: sed & calaminthæ succum, uelut effi-
 cacissimum auxilium, laudant potum. In-
 cipiendum autem esse ajunt à tribus cyathis
 usque ad sex. Præ omnibus autem efficax
 est theriaca ex uiperis, & pota, & totinsecus
 illita. Si uerò haberi possent ipsa animal-
 cula, nihil aded efficax est uelut uiperarum
 carnes coctæ comestæ ex albo jure, factæ
 coctura per aquam copiosiore, & salem, &
 porrum, & anethum, usque ad spinarum sepa-
 rationem, abscissis prius capitibus ac caudis ip-
 sarum, ad digitorum quatuor mensuram, exem-
 tis etiam ingeraneis ipsarum, pellèq; detracta.
 Quin & theriaci salesidem compromittunt,
 cum



cum obsonijs sumit: sic enim si ipsis utantur, contingit aliquando squamas, aut veluti quendam corticem de cute ipsorum discedere. Cæterum uictus ratio huiuscemodi sit: post somnos, præfixtus & aluo exonerata, gestetur & uociferetur: deinde fricetur, & uariè exerceatur, partim saltu, partim, & quidem amplius, halteribus & follis usu. Deterfo autem sudore, illinatur adipe ursino, aut uulpino, aut hircino, aut uolucrino quopiam, aut butyro recenti. Modico uerò tempore intercedente lauetur, illinens succum sænigræci, aut ptisanæ, aut modicum ammoniacum aceto dilutum. Post balneum deterfus illinatur lentiscino, aut ænanthino, aut myrteo, & uino modico cum alumine, aut ammoniaco, ut strigmenti sit spissitudo. Deterfus autem rursus mollibus linteis ad dimidiam horam quiescat, post quam pota aqua immixtis digitis aut pinnis uomat. Auomitu uerò uinum absinthites aut origanites bibat. Cibi sint: panis hordeaceus, aut maza ex polenta: olera uerò, beta, lactuca, raphanus, porrum, brassica duabus aquis edulcatur, & capparis. Ex mari uerò, ostrea, pelorides, erinacci petines, tellinæ cum betis coctæ, fassamentum uetus medicamenti loco. Auino autem per totum morbum abstineant, itemque à Venere, ita ut paucissimum solum, & tenue, & aquosum uinum, iuxta tempus refectionis, ex purgationibus sumant: in quo etiam æria auferantur, condimentis exceptis. Danda autem sunt ipsis, ptisana, oua, alica lota, lac, & mel cum pane, malua, rumex, silarum, pisces teneræ carnis, & ex uolucris bono succo præditæ: ex fructibus, ficus, uua, & uuz passæ: ex dulcitijs, ea quæ ex nucleis pineis, aut amygdalis tostis & cnico parantur. Bis autem in die alantur. Graue enim his est semel in die cibum capere. Cæterum post curationem intrinsecam, smegmatis in balneo utantur, ex decocto betæ aut sænigræci, cum aphronitro, aut sapone, aut myrobalano, & quandoque etiam psilothris. Deterget etiam portulaca cum aceto trira, & tenue semperuiuum, & tumicis radices aceto coctæ, & alumen cum sale,

είδη ἑὶ πᾶσι ἐπαγγελίας, πῶς τῆς ὀφθαλμοῦ λαμβάνονται. αὐτῶν γὰρ αὐτῶν χρωμάτων, συμβαίνει πρὸς λεπιδίας, ἢ οἷον πᾶσι ἀλώπυ, ἀπὸ τοῦ δερματὸς αὐτῶν ἀφίσταται. ἢ δὲ δίασμα τοιαύτη πρὸς ἑσῶ. Μετὰ τοὺς ὑπὸς προσψηλαφθεῖς τε καὶ τῆς κελίας ἀποπειραθεῖς, ἐωρεῖσθαι τε καὶ ἀναφωρεῖσθαι. εἴτα τρεῖς εἰσθῶ, καὶ γυμναζέσθαι πικίλως, τὸ μὲν ἀφαλλόμενον, τὰ δὲ πλέων ἀλυκτῆροι τε καὶ κερύκω χρωμάτων. ἀπομαζόμενον δὲ τὸν ἰδρῶτα, συγχρεῖσθαι ἑστῆσι δερκείῳ, ἢ ἀλωπεκείῳ, ἢ τραγείῳ, ἢ τῶν πηλῶν πινός, ἢ βουτύρω πρὸς φάτω, μικρὸν δὲ ἀλατιῶν, λουέσθαι συγχρεῖσθαι χυλὸν τήλεως, ἢ πρὸς ἀνήθης. ἢ ἀμμωνιακοῦ βραχὺ ὅξει διεμύει μετὰ δὲ τὸ λυκτρὸν, ἀπομαζόμενον, ἐπαλειφέσθαι ἁγνίνῳ, ἢ οἰνωθίνῳ, ἢ μυρόνῳ, καὶ οἴῳ βραχέει μετὰ συπληρείας ἢ ἀμμωνιακῆς, ὡς γλοισ πάχῳ. ἀπομαζόμενον δὲ αὐθὶς ἀπαλοῖς ῥάκεσιν, ἢ συχαζέτω ἡμιάρον. μετὰ ὅ πῶν ὕδαρ ἀπεμείτω καθέσει διακτύλων, ἢ πτερῶν. ἐμέσας δὲ πνέτω ἀψινθίτῳ οἶνον ἢ ὄρεγανίτῳ. αἱ δὲ τροφαὶ ἑσῶσιν δερκίς τε κερύκῳ, ἢ μάλα ἐξ ἀλφίτων. λαχάνων δὲ, σεῦτλον, θερδακίνη, ῥαφανός τε καὶ πρῶσι, καὶ κερύκῳ, δυσὶν ὕδασι ἀπογλυκαθέντα, καὶ κἀπαραισι, τῶν δὲ ἐκ θαλάσσης, ὄστρεα, πελωρίδες, ἐχίνοι, κτένια, πλίνες ἀμαστίλοις καθηψημένοι. πέρυλλον παλαιὸν ὡς ἐν φαρμάκῳ μίση. οἴῳ δὲ παρ' ὄλλου τῶν νόσων, ἀπεχεῖσθαι, καὶ συκαζίας ὁμοίως. ὀλίγιστον μόνον καὶ λεπτὸν οἶνον ἐὶ δαρῆ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐκ τῶν καθάρσεων ἀναλήψεως λαμβάνοντες. ἐν ᾧ καὶ τὰ ἐριμέα πρὸς αἰρητίον, δίχρα τῶν δερματῶν. δοτεῖν δὲ αὐτοῖς πρὸς ἀνῶ, αἰῶ, καὶ χόνδρους πολυτούς, καὶ γάλα, καὶ μέλι σὺν ἄρτω, μαλάχῳ τε ἐλάπαθον, καὶ σίκερον, καὶ ἰχθὺν ἀπαλόσπερον, καὶ τῶν πηλῶν, ἢ εὐχυμα, καὶ τῶν ὀπωρῶν σπῆα, καὶ σαφυλίῳ, καὶ σαφιδάς, μελίωμάτων ἢ ἀλατιῶν, ἢ ἀμυγδαλῶν πεφυγμένων, καὶ κνίκῳ, δις τῆς ἡμέρας τρεφομένοις. χαλεπὸν δὲ τέρψις ἢ μονοσιτία, μετὰ τῆς ἐνδοθεν ὀπρῆλειαν. σμήγμασιν ἐν τῷ θαλακείῳ χρεῖσθαι, δι' ἀφειψήματῳ στίλκῳ, ἢ τήλεως πῶς ἀφονίτρω, ἢ σίπῳ. ἢ μύροβαλάνῳ, καὶ ποτὲ καὶ ψιλῶθροις. σμήγμα δὲ καὶ ἀδράχνη μετὰ ὄξους λεανθείσαι, καὶ τὸ λεπτὸν αἰζῶν, καὶ λαπάθου ρίζαι ὅξει ἐψηθείσαι, καὶ συπληρία μετὰ ἀλῶν, καὶ σινδῶν.



καὶ σινδάρης ἴσον ἐν οἴνῳ καὶ χινίῳ. καὶ τὸ
 πρὸς ἀλφῆς, δι' ἀλκυονίς. καὶ νίτρου, καὶ μυρ-
 σίνης, καὶ θείου. καὶ συκῆς ἀγρίας Φύλλων ξηρῶν,
 μετ' ὄξους λῆιον καταχρῆσθαι. καὶ τὸ Διὰ ση-
 πτίας ὄσρακας Κ. καὶ κισσῆρας καὶ νίτρου καὶ κι-
 μωλίας πεφωσμένης, κομμειῶς τε καὶ κη-
 κιδῶ. ὀμφακίνης, ἴσον ξηρὸν ἔμπρασθῆναι,
 ἢ δι' ὄξους σημηχρόμνον καὶ τῆσι δὲ θυμα-
 σίν. λαπάθης ῥιζῶν δισμίδιον χειροπληθές,
 νίτρου L. δ' ἡ μὲν λιθάνης L. καὶ θείου καὶ δι' ὄξους
 αἰγυπθίου καταχρῆσθαι. ἔμπρασθαι δὲ πύπ-
 θροσινῶ L. ἰθίης ἀπύρας L. ἢ κόσου L. ἢ ἄσβε-
 στα L. δ. κηρῶ L. δ. δαφνιδῶν ξηρῶν L. ἢ Ἐ-
 πύπθαι φυρεῖται λδύνης ἴων φύλλων χυλίσμα-
 τι, ἢ παχέι ἀφεψηματι, καὶ ὄσρασιν ἔχοντα μέ-
 λιτῶ καταχρῆσθαι. Ἄλλο. ῥιζῶν λαπάθης
 δισμύδια δύο ἐν ὄξει καθεψῆται καὶ ὀλμο-
 κωπῆται καὶ λειοτριβεῖται. εἴτα ἀλκυονίς λιὰ.
 ἀφονίτρου γο. ἢ, θείου ἀπύρας λι. α. καὶ χλι-
 ῶν ὄσρακων Κ. γο. δ. χαμοκλιόντῶ μετὰ τῆς
 ῥιζῆς γο. δ. σικκλεαίνετα πάντα μέχρι γλοιώ-
 δλους πάχους, εἴτα καταχρῆσθαι, θέρους μὲν
 ἐν ἡλίῳ πλάκας, χειμῶν δὲ ἐν θαλα-
 νεῖῳ, μέχρι σικκλεαίνετος. καὶ τὸ πύ ἀσηλη-
 πίου δὲ ξηρὸν σμῆγμα καλῶς αὐτὸ ἀρμόσει
 καὶ τούτοις. καὶ πάντα κοινῶς τὰ ῥηθησθῆναι
 σμηκτικὰ, μέχρι τῶν πρὸς ἀλφῆς. ὡσπερ
 οὖν καὶ τὰ νύκτα εἰρημνῶ πρὸς ἐκείνα. αἱ δὲ
 ἐχθρῶδες ἐπαναστάσεις φλεγμονῶσται ἢ ἡλ-
 κωμῆσαι, καταχρῆσθῶσται λυκίῳ ἰνδικῶ, ἢ
 γλαυκίῳ, ἢ ἀλόῃ, ἢ ἀνδρωνίῳ τροχίσκῳ, ἢ τῆ
 πολυείδους σφραγίδι. καταπλασθῶσται
 χόνδρῳ μετὰ χυλεῦ πολυρόνῃ ἢ δένογλώσ-
 σα. ἢ ἐλξίνῃ λείῳ καὶ τῆς μηλίσιας δὲ Ἰοπί-
 νης χλωρῆς τὰ φύλλα. μετ' ὄξυγγίου κοπι-
 ῶσται καὶ καταπλασθῶσται, θυμασίως
 ὡφέλει. φοινίσεται μὲν γὰρ τὰ μέρη. σελλε-
 πῆ δὲ ῥαδίως ἄρα ὀππιασθέντῶ, ἢ κη-
 ρωτῆς δι' ἀμυγδαλίνης πεπονημένης καὶ ἰσὶ τῶν καὶ
 φύσιν ὄσρασαν ὀππιασθέντα, κατὰ δὲ τῶν
 ἡλκωμῶν ἀρμόσει ἔμπρασθαι. ἢ τῆ Διὰ πύ
 διφρυγῆς, καὶ ἡ Διὰ οἴνης μηλίνης, καὶ τὸ κηρ-
 κιον, καὶ τὸ δι' ὄξυμέλιτος, καὶ ἀνδρωνίῳ τροχί-
 σκῳ, καὶ σμυφύλλῳ, καὶ καδμείῳ. σημεῖον ὅτι τῶ
 ὄλκῳ μετριάσει νόσον, τὸ τὰ πρῶτα τῶν ἡλκῶν
 συνελθῶσται πρὸς ὅτι πᾶς δυστροπίας ἴων ἐλεφαντι-
 ῶντων ὄντας τὰς ὑπὸ πᾶσι ὑδρίας πέντε ἢ 5. διὰ με-
 λικράτῳ Κ. γ. πύπθαι κοινῶς ὅτι τῶν πρὸς δυσ-
 τροπίας ἀναγγραμμένων αὐτοῖς ἀρμόσει πινῶ.

& landaracha, æquis portionibus, in uino
 & oleo lentiscino : & id quod ad utiligi-
 nes descriptum est, ex alcyonio, nitro,
 sulphure, myrti folijs, & fici syluestris folijs
 aridis, cum aceto tritum ac illitum, & quod
 ex sepia testa usta & pumice, nitro, cimolia
 tosta, gummi, & galla omphacina, paribus
 partibus paratur, siccum inspersum, aut cum
 aceto affricatum. Sed & hoc mirificè facit.
 Rumicis radicum fasciculum plenæ manus,
 nitri drachmas quadraginta, thuris drach-
 mas uiginti quinque, sulphuris drachmas
 uiginti quinque cum aceto Ægyptio illini-
 tur. Efficax est & hoc. Auripigmenti
 drachmas decem, sulphuris uini drachmas
 octo, costi drachmas duodecim, calcis uiuæ
 drachmas quatuor, ceræ drachmas quatuor,
 baccarum lauri aridarum drachmas duode-
 cim : hæc populi foliorum succo, aut crasso
 decocto subiguntur, & mellis spissitudinem
 habentia illinuntur. Aliud. Rumicis radi-
 cum fasciculi duo in aceto coquantur, & in
 pila tunduntur ac conteruntur : deinde al-
 cyonij libram unam semis, aphronitri bessem,
 sulphuris uiui libram unam, testarum cochle-
 arum uistarum trientem, chamæleonis nigri
 radices trientem. Conteruntur omnia ad
 strigmentitiam crassitudinem, deinde illinun-
 tur, æstate quidem in sole sæpe, hyeme uerò
 in balneo, usque ad exudationem. Quin &
 Æsculapij aridum smegma benè his congruit,
 & omnia quæ in communi referentur de
 frictoria, usque ad ea quæ ad utiligines descri-
 buntur, quemadmodum etiam nunc rela-
 ta illis quoque competunt. At uerò tumi-
 dæ eminentiæ inflammatæ, aut exulceratæ
 illinantur lycio Indico, aut gleucino, aut aloë,
 aut Andronio pastillo, aut polyide sphragide.
 Cataplasma imponatur ipsis ex alica cum suc-
 co polygoni aut plantaginis, aut helxinæ
 trita : sed & Milesiæ herbæ uiridis folia cum
 axungia tusa ac imposita, mirificè opitulat-
 ur. Rubescunt enim inde partes, uerùm
 facilè sedantur pane imposito, aut cerato ex
 oleo amygdalino facto, & ad naturalem co-
 lorem restituntur. Exulceratis autem par-
 tibus conueniunt emplastra, id quod ex di-
 phryge paratur, & Melinum ex uino, & co-
 racium, & quod fit ex aceto mullso, & pastillus
 Andronius, & pompholyx, & cadmia. Signum
 portò quod moderatior fiat totus morbus, est
 quod prima ulcera ad cicatricem perueniunt.
 Cæterum ad spirandi difficultatem in elephan-
 ticis, asellos sub uasis aquarijs quinque aut sex,
 ex aquæ mulsæ cyathis tribus bibendos præbe.
 In cōmuni uerò etiam aliqua ex ijs quæ ad dif-
 ficulter spirantes scripta sunt, ipsis conueniunt.

Aqua-



Aquarum uerò naturalium usum, uelut maximè necessarium, eligere oportet, aluminosarum præsertim & ferrosarum, & si fieri potest, frigidarum. Conferunt autem ipsis eandem quoque in potu : eandem uim habet etiam arenæ marinæ usus, & omnia exudatoria ac sudorifica. Quandoquidè uerò affectio ex his est quæ facile per contagionem distribuuntur, non minus quam pestis, habitationes ipsorum quam longissimæ remouedæ sunt ab urbibus, & in mediterraneis ac frigidis locis statuendæ, & in quibus pauci homines, si ita fieri possit, uersentur : ita ut hinc in circumfritos locos digredi possint, tum sua ipsorum causa, tum etiam non minus ob eos qui ipsis occurrere possint. Nam & ipsi aëre commodiore utentur, & alijs malum impertiri non poterunt.

πῶς δὲ τῶν ἀνθρώπων ὑδράτων, ἀρεῖαδ' ἔχουσιν, ὡς ἀναγκασιότατων, ἐπιηρωδῶν μάλιστα καὶ σιδηροζόντων, καὶ εἰσὶν τε ψυχρῶν. συμφέροι δὲ αὐτοῖς μάλιστα καὶ πινόμυρα, καὶ ἢ τῆς ᾠραγαλασσίας δὲ ἄμμου χηρῆσι, τῆς αὐτῆς ἐστὶ ἀειδιωάμεως. καὶ πάντα τὰ ἀφιδρωτήρια. ἐπειδὴ δὲ τῶν διμεταδότων ἐστὶ τὸ πάθος, ἐχ' ἤτιον ἢ λοιμός. ἀποικιστέον αὐτὰς ὡς ὅτι πρῶτα τῶν πόλεων, ἐν μεσσηγείῳ καὶ καταψυχροῖς καὶ ὀλιγαθρώποις χωρίοις, εἴπερ οἶον τε. κἀντύθεν δὲ μεταβαίνετωσαν εἰς τὰ ᾠρακείμυρα. ἀξίτε αὐτοῦς καὶ τὰς ὡς εἰσὶ ἐν τῷ ἔξομυρῳ ἐχειρότερον, αὐτοῖσι γὰρ ὀλιπηθειότερῳ τῷ αἰετῷ χηρῆσιν τε, καὶ σὺν αὐτῷ μεταδοῖεν ἀλλοῖς ἐ κακοῦ.



GEORGII HENISCHII B.

MEDICI AVG. IN A-
RETÆVM GOMMEN-
tarius.

DE NOMINIBVS MORBORVM.

Proclare aliquot in locis scripsit Galenus. Nominibus ad curationem nobis opus non est. Neg. enim nomina, sed rerum natura spectanda est. Quo dicto, si quis omnem nominum considerationem nihili fieri existimet, multum errat. Est enim & nominum cognitio necessaria, ut idem Galenus alibi affirmat, idq. imprimis eam ob causam, ut ijs res, quas uolumus, interpretemur: & clarissimis, & apud uetustiores usurpatis, nec non hominibus nostri seculi consuetis, sensum nostrum exprimamus. Quare Hippocratem laudat idem corypheus Medicorum, quem nominibus usitatissimis quoad fieri licuit, semper usum esse: ab inusitatis uero & infrequentibus abstinuisse, multis in locis testatur: Archigenem contra reprehendit, qui nominum patriorum significationes confundere, nouasq. assignere consueuerit. Cuius magna ex parte nomina sint equiuoca, de illis prius in habendo sermone decernere: deinde de rebus oportet. Nos igitur nostre interpretationis à nominibus morborum faciemus initium, cum circa illos tota Medici uersetur actio. Horum quedam sunt Latina, pleraq. uero Græca, eaq. magis usitata: & eiusdem morbi plura numero, scitu non inutilia. Nam & nominum uerborumq. copia plerumq. indecora non est, & in tanta uarietate, quibus utaris, nihil refert, ut habetur 2. meth. med. Tanta uero primorum onomatopœorum fuit prudentia, ut nullum penè morbo nomen imposuerint, quin aliquam rei, quam denotat, naturam explicet. Morborum itaq. alios à parte cui insident, nuncuparunt, ut pleuritidem: alios à causa putata, ut melancholiam; alios à symptomate, ut spasmus; alios ab externarum rerum similitudine, ut

cancrum: alios deniq. alijs de causis: ut ex sequenti nomenclatura apparebit. Morbi igitur, quos ex Aretæo nobis explicandos proposuimus, sunt hi.

MORBI ACUTI Libro primo.

I. ΦΡΕΝΙΤΙΣ, phrenitis, δὲ τὸ τῆς Φρενός, est, mente, quasi difficultas mentis: uel δὲ τὸ τῶν Φρενῶν, id est, septo transuerso, quasi diaphragmatis uitium. Nam in phrenitide mens perpetuò leditur. Idem uero affectus interdum à septo transuerso existit. Iuuenali phrenesis penultima producta, quamuis barbare dictum, uel codex mendosus esse uideatur, sat. 14. Cum furor huius dubius, cum sit manifesta phrenesis Galeno τῷ Ἐφρασίου delirium perpetuum. Celso similiter continua dementia & insania febricitantium: sepius uero insania Auicenna Carabitus, à radice Carab, id est, pugnauit. Feroces enim & temerarij sunt phrenitici. Puerulus peculiari nomine syriasis, siue sriasis, siue seirasis dicitur, à symptomate, eò quod eam syncipitis & oculorum sequatur cauitas. Σιγὸν enim Græci appellant foneam, ad seruanda semina destinatam. Germani Taubsucht/vnsüng Eite/rasende sucht/aberwitz hircoben uocant, generali admodum nomine. Id enim & maniam & melancholiam, & omnem animi alienationem comprehendit.

II. ΛΗΘΑΡΓΟΣ, lethargus & lethargia, à symptomate, δὲ τὸ τῆς λήθης ἢ δὲ γίαις, id est, obliuione & inertia, quam corpori atq. animo ingerit hæc passio. Arabibus congelatio & sirsen frigidum, id est, apostema capitis frigidum, uoce Persica. Sirs enim Persis est caput, & sen est apostema, affine Hebraico Schechim, quo apostema etiam denotatur. Frigidum dicitur ad differentiam phrenitidis, quam idē Arabes etiā sirsen calidum nuncupant. Galeno frigida phrenitis, ut sit phrenitis lethargus calidus. Est enim morbus phrenitidi contrarius. Latini sua uoce ueterum, Germani Schlaßsucht nominant, geneli similiter nomine. Id enim omnes somnulosas affectiones, profundiore quam natura ferat, sopore complectitur, ut sunt lethargus, caros, catoche, cataphora, coma. Et Arabibus subeth, carō & lethargum comprehendit.

D d III. Ma-



III. ΜΑΡΑΣΜΟΣ à symptomate, δὸν ἔμεγαλῶσαι, quod totum hoc morbo detenti corpus planè contabuerit: uel ἄλλοι μαραίνεσθαι, quod nondum prorsus exaruerit, sed ad maiorem consumptionem tendat. Prior etymologia planè consummato: posterior nondum perfectò marasmo conuenit. In specie calidus, πυρετὸς μαρασμῶδης, febris marcida dicitur: item ἄεθρον, amburens, ἔσθρον, qui animi deliquium infert. Hic enim quatenus febris est, caloris particeps est. Frigidus rursus duplex est, naturalis ἔ aduentitijs. Naturalis est μάρσμος Aristoteli, ἔ mera senectus. Aduentitijs est senium ex morbo, sic dictum, quod non ex aetate decursu, sed prematurè à uolenta causa proueniat. Idem ἔ hecetica senectutis, ἔ senium Philippi appellatur, à Philippo Medico, qui primus hoc usus nomine fuisse legitur. Frigidus autem uterq; dicitur, quod in utroq; consumptio humiditatis primigeni à frigido existat. Nec tamen marasmus ἔ febris hecetica unū ἔ idem sunt, sed marasmus est tertia illius species, qua ad solidam usq; simularium partium substantiam progressa est. Quo in loco illud non praetermittendum, quod primum se obseruasse refert H. Mercurialis, uir uaria ἔ recondita eruditionis, neque Hippocratem, neq; ueteres ullos Gracos, imò neq; Cornelium Celsum, nec ferè reliquos illius seculi Medicos, ullam hecetica febris mentionem fecisse: sed tertium tantum illius gradum designasse, ἔ alio quidem, nempe marasmi nomine. Causa uerò silentio praeteriti tam uulgaris, tamq; familiaris morbi haec est, ut idem iudicat, quod febres heceticae in principio, ἔ augmento difficulter cognoscantur: eo quod plerumq; febres alias, uel diarias, uel putridas sequantur: unde fit, ut in principio ἔ augmento pro febribus putridis: tandè uerò ubi longè progressa fuerint, facili negotio agnoscantur. Latini marcorem ἔ tabem, Germani Schwindsucht ἔ derre uocant.

IV. ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ, ἀπὸ πλῆξιν νόσση, apoplexia, quasi uehemens percussio, δὸν ἔ ἀπὸ πλῆξιν, id est, à percutiendo, aut lethaliter cadendo. Vt enim lethaliter percussus, uel uno ictu casus corruit: sic apoplecticus repente cõcidit, iacetq; instar mortui, sine sensu ἔ motu, quin ἔ anhelitu, interdum, quod ad sensum, nullò: interdum duro

ἔ stertorio. Sic percussa antiquiores nominabant, qua ante aras mactata statim corruerant. Sunt tamen quidam, quos apoplexia sensim inuadit, ita ut nonnulla praeludia, ut torpidus quidam sensus ἔ motus, uelut uagantes quaedam formicae in partibus corporis, ut brachijs ἔ alijs sentiatur. Eandem ob causam Germani Den Schlag nominant. Sideratio Scribonio, quod hoc morbo oppressus quasi è caelo, numinis aut sideris alicuius uis, ictus fulmine uideatur. Cornelius Celsus attonitum uocat: quod hoc afflictis ἔ corpus ἔ mens stupeat: uel quod uiuant quidem: sed ita, ut, quasi ecstasin passi, nec sensu nec motione uitae notas praesferant Eidem tamen nomen attoniti commune magis est. Attonitus enim (ait) fit interdum ictu fulminis, interdum morbo, δὸν ἔ ἕξιας hunc Graci appellant. Auenzoar silentium uocat, quod apoplectici sileant, ut pote, omni sensu ἔ motu priuati. Germani etiam Tropff, id est, guttam, quod quidam ex antiquis, ex quorū numero etiam fuit Aristoteles 1. prob. 9. existimarunt, delabi in apoplexia humorem in cor, ἔ ibi instar guttae concretere: uel potius à sanguine concreto (quem uulgò guttam appellant) quo arteriae carotides praepeditae mortem soporiferam inducunt, ἔ animal elidunt. Antiqui deniq; etiam paralytin, id est, resolutionem neruorum nomine generali appellarunt: unde Hippocrates membrum resolutū saepe apoplecton uocat. Vtriusq; enim affectus tanta est affinitas, ut non admodum inter se differat. Vterq; enim priuat sensu ἔ motu, sed apoplexia totum corpus, paralytin omnes partes excepto capite, quod inflecti potest. Quapropter eadem apoplexia ad paralytin est ratio, qua epilepsia ad spasnum. Illa enim similiter uniuersalis, hæc particularis conuulsio est: in apoplexia membra relaxantur, in epilepsia contrahuntur.

V. ΠΑΡΟΕΤΣΜΟΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ, ex candescencia, uel exacerbatio Epilepticorū, quod tunc morbus ab humore exagitatus, uelut excandescit uel exacerbatur, Gracis παροξυσμῶς. Est enim παροξυσμῶς, ut definit Galenus, deterius tempus totius circuitus, uel, ut Aetius, motus particularis morbi à remissione ad deterius. Hippocrati in Coacis pran. Πῆληπις. P. Agineta ἔ Oribasio acutissima epilepsia.

Duplex

Duplex enim comitialis morbus est, alius diuturnus, alius acutus. Diuturnus est mitior & subinde remittens. Acutus est uehemens & nullam intermissionem habens, quæ intra quatuordecim dies uel desinit, uel hominem jugulat, ut in pueris potissimum. Tot enim dies excedens acuti uim deponit. τὰ Πιλιητικὰ autem hic in genere neutro, intelligenda sunt, & non Πιλιητικῶν: quæ uoce & Hippocrates tum alibi, tum aph. 7. lib. 5. uicitur, cum inquit. τὰ Πιλιητικὰ ὁρίζονται πρὸ τῆς ἡβῆς γίνεσθαι, μετέπειτα ἔχει. Comitiales morbi, aut comitialis morbi symptomata, quæ in paroxysmis animaduerti solent, ante pubertatem mutationem recipiunt, Germ. Die ziehende not.

VI. ΤΕΤΑΝΟΣ, tetanus à symptomate, ὅτι ἀσπασθῆς αἰθρωπὸς ἢ ἀκαμπῆς ἐν τῆσιν, quod neutram in partem homo hoc morbo afflictus detortus atq; inflexibilis distendatur. Latinis eandem ob causam distentio, rigor, neruorum rigor, extensio corporum. Rigere namq; Latini dicunt ea, quæ distenduntur, ut apud Horatium lib. Epodon. Ode. 8. parum pudico uersu. Illiterati num minus nerui rigent? Significat autem Aretæo genus & speciem. Cum genus, idem est quod ἑνοβολῆ & πᾶσπος, id est, conuulsio. Cum species, sub conuulsione continetur, cuius tres sunt species, eò quod tres sunt figura, secundum quas corpus nostrum moueri soleat. Aut enim secundum rectam lineam extenditur, & uocatur tetanus: aut secundum curuam, uel antrorsum, & emprosthotonos: uel retrorsum, & opisthotonos nomine peculiari dicitur. τέτανος autem ἑξαιρέτως, eò quod hæc præcipua conuulsionis species habeatur. Nec tamen in eo affectu conuulsa partes manifestè apparent, propterea quod æqualiter ante & retro tendantur. Germanis in genere **verstarung** | in specie **halbstarre** | id est, colli rigor, quod in collo maximè cernatur, uel quod hunc affectum quidam ad illos tantum musculos, qui sunt in ceruice, quibus caput annuit, renuit & circumagitur, pertinere iudicant. Paulus uerò & alij recentiores ad omnes corporis musculos referunt. Emprosthotonum, prouum raptum nominat Aurelianus, cum mentum pectori affigitur, & interdum, ut ait Aretæus, homo non solum in arcum, sed & in orbem trahitur. ut caput genibus

anhexum habeat. Opisthotonon supinum uel postergancum raptum idem uocat, quando in dorsum ac scapulas caput torquetur. Quidam quartam addunt speciem anonymon, Aretæo & Galeno incognitam, cum scilicet corpus in dextrum uel sinistrum latus inflectitur, cui rei experientiam attestari assueuerant, Germ. **Krumbhalß** uocant.

Uterq; uerò affectus & epilepsia & tetanus conuulsio est: sed illa accessionibus distincta, hæc perpetua est. Nec alius fuit morbus, agitatio conuulsiva dictus, qui populariter in Hassia annis Domini 1596. & 1597. grassatus est, quæ tetanus, sed Epidemicus, quem uulgus **Die Kribekrankheit** | **Krampfsucht** & **ziehende sucht** appellauit.

VII. ΣΤΡΑΓΧΗ uel τὸ πρὸ τῆς ἀρχῆς, id est, suffocando, quod hominem non secus quam laqueus præfocans strangulat: uel τὸ πρὸ τῆς σπινθῆς, quod spiritum continendo, respirationem inhibeat, ut Aurelianus inquit. Significat autem Aretæo genus & speciem. Cum genus, omnem affectum, qui faucibus accidit, si spiritum quoquo modo deteriore reddat, designat. Fauces autem appellamus totum oris internum spatium, ubi gula & aspera arteria extrema concurrunt. Cum speciem, tum sub angina tanquam genere continetur: cuius Aretæus duas species facit, unam cynanchen, alteram synanchen: recentiores uerò duabus alijs adiectis quatuor. Inflammantur enim musculi uel gutturis, qui spiritui: uel gula, qui cibo intro ferendo seruiunt. Rursus musculi gutturis, qui laryngem mouent, alij interni sunt, alij externi. Internis inflammatis **κυνάγχην** uocant: externis **συνάγχην**. Similiter musculi faucium, qui **Φάρυγγα** seu œsophagum mouent, alij interni sunt, alij externi. Internis inflammatis **συνάγχην** appellant: externis **κυνάγχην**, quam **ὀδύγχην** Aur. uocat, quod suibus familiare sit malum. In cynanche igitur spiritus non nisi recta ceruice trahi potest, cum multo dolore in guttore, & quadam difficultate deglutitionis: in paracynanche similiter, sed remissius. **κυνάγχην** autem & **λυκάγχην** Aurelianus appellat, uel quod canes ac lupos frequenter afficiat: uel, quod etiam sanitatis tempore ea animalia linguam exerere consueuerunt, ut refert Aretæus. In synanche



deglutitio aboletur manente respiratione, et fauces cum lingua rubescunt: in para synanche facilius est deglutitio, & non solum fauces, sed etiam ceruix & pectus, uelut in inflammatione rubescunt. Sic enim Aegineta distinguit, quem potius sequilibuit, quam uel Galenum uel Cornelium Celsum, qui paulo aliter. οὐράχλω autem dictam ait Aretaeus, οἷον συνέουσαν ἔυδον ἢ ἀρχαῶν, id est, quasi interius urgentem atq; angentem.

Est autem praeter eas etiam quinta anginae species, ubi luxatae ceruicis uertebrae ad anteriora prominent, cauumq; efficiunt, pueris ex casu obueniens, ut scribit Paulus, fereq; incurabilis, de qua Hipp. amplissime lib. 2. Epid. & aph. 26. lib. 3. & 35. lib. 4. Et hanc proprie ueteribus οὐράχλω fuisse appellatam scribit Aetius, quod propter luxatam ceruicis uertebrae lingua sua radice emota, & suis sedibus excedente cogantur aegri aperto ore perpetuo hiare, & canum modo linguam exerere. Ex synanche autem, ait Aretaeus, fit interdum cynanche, cum malum, in melius uertitur. Arabes corrupta uoce squinantiam uocant: latini anginam ab angēdo, quod angat. Germani a parte affecta halßgeschwür, id est, apostema colli uocant. Interdum & breune a fusco lingua colore, qui inflammationem sequitur. Iunius das Zepfle & das wülken im halß nominat.

VIII. ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΟΝΙΑ ΚΑΚΑ, id est, columella affectus. Est autem κίων, quod & κιοῖς a posterioribus & παρρηγεῶν Graecis, Latinis curculio siue gurgulio dicitur, ut desinit Aretaeus τὸ πρὸ τῆς ἄνω ἑξαρτήσεως ἐκκερπίδες σῶμα ἑῖρον μεσηγὺ τῶν μεσοδρῶν, id est, substantia quadam carnea (rara textura membrana inuoluta) pendens ex palato, (id est, in fine palati iuxta fauces uersus caput in opposito radicis linguae, quae hiante ore, si quis linguam deprimat, conspicitur.) Κίων uero appellatur, id est, columna siue columella a figura eius naturali, quae rotunda oblongaq; est, parua columna similitudinem habens. Alia uero ratione Nicander κιοῖδα uocat τὸ ὑπερχηδον, quod instar columna caput sustineat. Curculio autem dicitur, quod rotundam interdum instar curculionis ani-

malis in faba delitescens figuram habeat. Huius igitur partis affectus quatuor species facit Aretaeus, easq; a mutata qualitate nominibus donat. Primam κιοῖα siue κιοῖς da, cum gurgulio ob inflammationem aequaliter intumescit, teresq; instar columna protenditur ac rubet. Secundam καφύλω, id est, uuam, cum laxior ex fluxione redditus superna sui parte tenuis est: inferna autem crassior & liuidus. Sic enim uua uirginea e pedunculo suo dependenti similis euadit, tum figura, tum colore, tum magnitudine. Pars enim superior tenuis gracilisq; apte respondet uuae pedunculo: inferior autem crassa, rotunda, nigra, ipsi grano similima est: sed neq; magnitudo dispar. Appellant & καφύλωμα Graeci: & Latini casum uua seu uuula, sed minus dextrè. Errant enim, ut tradit Galenus, qui curculionem uuam uocant, cum hoc affectus, non partis nomen sit.

Tertiam ἰματίον q. lorulum, ubi membrana utriusq; dilatatur, instar squamarum laterum aut alarum uestertilionum, id est, cum gargareo longior, gracilior, siciorq; euadit. Talis enim ἰματίον, id est, lorio non ineptè comparari potest. Prouenit, inquit Aetius, cum ex suffitu nimium ignescit. Tunc enim gracilescit, & secundum omnem dimensionem comminuitur.

Quartam κερκασίδον, hoc est, simbriam, uel, ut interpretatur Iunius Crassus, radicem montis, quando in tenuem aequè oblongam membranam desinit ceu in mucronem. Porro rarum gargareonis accidens est tum lorulum, tum simbria: frequentius inflammatio & relaxatio. Hinc recentiores duos tantum eosq; primos curculionis affectus recitant: & paulo aliter. Obsessum enim inflammatione gargareonè uuulam nominant: relaxatum destillatione, & ita pendentem, ut quoties aegri uel saliuam transglutiunt, carnis aliquod frustulum se uorare opinentur, a quo ueluti strangulantur, columellam appellant. Germani interdum das Zäpfle: interdum & rectius das nidereschieffen des Zäpfelns uocant.

IX. ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΙΣΘΙΑ ΕΛΚΕΑ, id est, tonsillarum ulcera, uel τὰ κατὰ τὴν φάρυγγα λοιμικὰ πύθη, id est, pestilentes in fau-



in faucibus morbi. Sic enim titulus cap. 9. lib. 1. de causis & signis morborum exponitur cap. 9. lib. 1. de curatione morborum acutorum. Pharynx enim, id est spatium illud laxius ore aperto conspiciendum, quod inter laryngem & gulam medium est, binas habet glandulas, paristhmias dictas, quas & tonsillas & fauces & ἀμυγδαλας, uulgo amygdalas, uocant. πικρὰ δὲ μὲν dicta, quod uelut isthmus quidam inter gulam & asperam arteriam (quam etiam Πάρουσα interdum uocant) extremum collocata sunt.

Tonsilla dicta μετὰ Φορινῶς, quod instar tonsillae, id est, pali sint, ad quam in litore nauis religatur. Fauces quidam uocant per syncdochem, quod sint partes faucium. Amygdalis dicuntur, quod e regione utrinque sibi inuicem appositae. Amygdala à forma. In illo igitur spatio uel potius summa oris parte uarij morbi contingere possunt, ex quibus unam tantum genus, nempe ulcera Aretaeus recenset, eaq. duplicia: mitiora & pestilentia. Mitia sunt exigua, non alie descendunt, & doloris expertia. Pestifera sunt, quae altius descendunt, ut sunt aphtha & exanthemata. Ex his aphtha ut plurimum à gingiuis incipiunt, deinde serpentes palatum, totumq. os occupant, tum ad uiam faucesq. descendunt: quibus obsessis non facile fit, ut homo conualescat. Sunt autem modo subalbida, modo subrubra, modo nigra uelut eschara, unde escharam uocat Aretaeus: pessima & maximè lethalia sunt, quae nigra sunt. Ἀφθὰ exponitur Helychion ἢ ἐν τῷ στόματι ἐλκωσις ἢ φθίση. Galenus nomine aphtha utrumq. genus complectitur: unum facile curabilem oris ulcerum, cuiusmodi est id quod ab acrimonia nutritij lactis pueros uulgo infestat: alterum cacoethes ab humoris mali, id est, uenenati & putris in os affluxu. Arabes Alcolam uocant, ab articulo Al & radice ἄλκω, quod est, ad prunas ustulauit: unde Graecum κηλὼ, comburo, χλιαίνω tepefacio. Latinum caleo & Germanicū Eolen & glüen. Hac enim ulcuscula ignea quadam qualitate pradita sunt. Germani Eurfes & durfehe uocant: à Græco ἐχάεα, quod crustam significat, quae sponte sua ulceribus cauis crassa & nigra accrescit. Nam quae lenior est, non ἐχάεα sed ἐφελις appellatur. Aretaeo crusta est aphtha maligna

seu concreta sordes altius descendens in faucibus. Graeci ἰσθμοί, sic dicti quod sint similes scatebris corporis, quas Graeci ἰσθμοὺς uocant.

Exanthemata, διὰ τὸ ἀνθήματα Aretaeo, dicta δὲ τὸ τῶν ἀνθῶν, id est, floribus, quasi efflorescentia, latinis papulae. Sunt enim eruptiones leues humorum per cutem, siue intra siue extra os: eaq. duplices: aliae subsidentes in cute prorsus, neq. se supra illius superficiem attollentes, ut morbilli puerorum & maculae pestilentes, quas peteculas & petechias, quasi pestigias uocant: item lenticulares & pulicares, quod lentes & pulicum morsuunculas referant: prout maiores uel minores fuerint: & hac ratione nomine ulcerum comprehendi non possunt. Aliae exerunt se, & cutem superant, ut uariolae puerorum & atatum omnium uari, phlyctena, epinyctides & aliae pustula, quas Germani blätterle/psüglin & pfochen in genere uocant. Morbillos uero in specie flecken / flechten / durchschlecht & pütpelein, quod interdum sint purpuræ. Variolas Rindsblattern / Kinderkrankheit / Scheffblattern. Variolae autem nomen à uarus deductum est, quod tumorem exiguum & durum significat, ex frigido crassoq. humore quasi in callum concretum, qui cutem imprimis faciei defædat: alias ecchyma & pituita eruptio Plinio. Auicenna morbillos alices uocat, quae à uariolis non causa, sed tempore differunt. Maculae enim illae sunt quadam uariolarum praeludia & initia: & sub qualitate mutata continentur: quae tandem in uariolas erumpunt. Germanicum psüglin aludit ad Graecum φλυκτῖς & φλυκτιάνη, quod nomen pustulam ab igne excitatam denotat, Blatter vom feur. pfochen autem est Graecum φακῆ, quod lentiginem Latini uocant. Recentiores uero tonsillis non tam aphthas, & exanthemata attribuunt, quam tumorem & inflammationem, quae partis affecta nomen sortitur, & tonsilla appellantur. Aretaeus has, ut & scrophulas sub angina nomine comprehendisse uidetur. Ex his enim collum coarctatur, & difficilis respiratio seu anhelatio redditur. Germani tonsillas Mandel geschwer oder geschwulst der mandel, scrophulas pfinsen oder drüß appellat. χροειδῆς



Græci uocant ἀπὸ τῶν χοίρων, hoc est, porcellis, quod id genus morbi porcis (quos & scrofulas uocant) sit familiare, aut quod numerosa sit sobolis & instar scrofe prolificū. Latini etiam panum & paniculā, ut Græci Πύριλλον uocant. Panem quoque Galli à figura eius pane similitudine. Est enim phlegmone in locis adenosus latior quam altior.

X. ΠΛΕΥΡΙΤΙΣ Græcè dicitur ἀπὸ τῆς πλευρῆς uel τῆς πλευρῆς, uel τῶν πλευρῶν. Ex quibus πλευρῆς tum costā seu latus, tum membranam, qua costas succingit, significat. Barbari pleuresin uocant. Latini morbum lateris, lateralem, lateritiū, costalem, minus feliciter. Hoc enim nomen communem omnium lateris partiū & non priuatum affectum designat. Particularē uerò membrana, qua pleura dicitur, affectū σπυκδοχικῶς ex instituto hominum. Nonnulli tamen pleuritidem uocāt, phlegmonem etiam reliquorum pectoris pāniculorum, ut mediastini & diaphragmatis, ex quibus est Gradus. Fulgur telum uocat, ut refert Serenus, eò quod instar teli membranā pungat. Germ. den stich & seycen weh.

MORBI ACUTI

Libro secundo.

I. ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (que & πνευμονία & πνευμονιὸν dicitur) Latinis pulmonia, à parte affecta, quam πνευμονία Græci uocāt. Hippocrates hoc morbo affectos πνευμονίους uocat aphor. 4. sect. 4. lib. 6. Epid. ἐν τῇ πνευμονίῳ, εὐθὺς ὀξυθυμίας. Pulmonarys, clamore & proclini iracundia abstinendum. Quod enim Fæsius contra omnium interpretum expositionem cōuertit, difficultate spirandi laborantes, id nimis generale est. Latini pulmoniam, & pulmonariam, & inflammationem pulmonis uocant. Germani Lungensucht.

II. ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΩΓΗ, id est, sanguinis ab ore reiectio. Sanguis enim reijcitur uel ex ore & ἀναγωγὴ dicitur: uel ex naribus, hæmorrhoidibus, utero & quacumque alia parte, & αἱμορραγία id est, profusiuū sanguinis uocatur, præsertim tamen copiosum & liberale, ἀπὸ τῆς ῥαγῆναι, quod est, confertim & impetu prodire. In specie uerò hæmorrhoids uocatur sanguinis effluuium per uenas, qua in ano sunt. Rejectionem ex ore Hipp. appellat uomitum sanguinis. Latini sputum sanguinis, ubi pau-

cum est, Aretæi ἐμπίουον: fluorem, ubi copiosum est & Græcis hæmorrhagiam. Reiectus uerò ab ore sanguis effunditur uel ex partibus superioribus, uel ex inferioribus. Si à superioribus, tum prodit aut à palato, aut à faucibus, aut à gingiuis & πύσις dicitur. Si ab inferioribus, tum emanat aut à partibus naturalibus, ut stomacho, liene, jecore: aut à partibus qua respirationi seruiunt, ut thorace, pulmonibus, aspera arteria, septo transuerso, & ἀναγωγὴ nomine speciali appellatur. Sic enim obscurum textum Aretæi interpretamur. Sputum autem improprie uocatur id quod cruentum, biliosum & spumosum reijcitur. Id enim quod lingua & labijs ducitur, proprie sputum dicitur. αἱμοπύουκας, Hæmoptoicos uulgò uocant, αἱμοφορεῖους Galenus, qui sanguinem per guttur reddunt, quasi eum αἷον φέροντες hoc est, sursum ferentes, die Blut außspreyen. αἱμοπύουκας uerò, expuitio sanguinis, außwurff des blüts.

III. ΣΥΓΚΟΠΗ, syncopa, nomen Hippocrati, Aristoteli & Theophrasto ignotum, ἀπὸ τῆς συγκοπῆν, quasi concisura uel concisio spirituum atque uirium. Αἰσυχία, λειποθυμία, λειποψυχία Hipp. Defectus animi Plinio, defectio anima Celso. Nonnullis λειποθυμία, uitalis: λειποψυχία animalis facultatis exolutionem denotat. λειποθυμία uerò Aëtio leue animi deliquium est: λειποψυχία ualidior anime defectio, & initium syncopes, siue imperfecta syncope, in qua agri mente & cogitatione ualent. Syncope perfecta & consummata lipothymia, per quam facultatum omnium exolutio contingit, ut sensu & motu destituantur agri non minus quam mente & animo. Galenus tamen id discrimen non admittit, & duo prima nomina eandem rem denotare tradidit. Aretæus, ut & alij scriptores etiam ἐκλυσιν & cardiacam uocant. Est enim syncope, ut idem definit, ἐκκλυσις τῆς τῆς φύσεως, id est, tenoris nature destructio. Hinc & ἀπνία & ἀδένεια & ἀρρωσία τῆς δυνάμεως dicitur. Cardiacæ autem appellatur, quod sit νῆσος τῆς καρδίας, ut bubo inguinum: neruorum tetanus, epilepsia capitūs. Porro cor uel per se, uel per consensum laborat. Si per se, appellatur syncope cardiaca. Si per consensum uitio stomachi, syncope stomachica & cardialgia & cardiogmos. Perperā igitur Celsus & alij Latini

nomina



nomine Cardiacam syncopen, qua ex languore fit stomachi intelligunt. Contra quos & Aretæus cap. 3. lib. 2. & Galenus in lib. methodi & de locis affectis grauitè disputant. Germani **hergloß / machelof / kraffloß / onmacht / abnemmung** oder **abgang der krefft** dicitur.

IV. ΚΑΥΣΟΣ & καύσω, Causus, ὑπὸ τῆς καύσεως, id est, ab igneo & perurente calore, qui hunc affectum pra alijs morbis maxime infestat. Significat autem uel proprie uel communiter. Proprie febrem, quam intensissimus calor, sitis ingens, ariditas & nigrities lingue sequitur, denotat. Communiter alium quemcumq; affectum, qui non ex his omnibus, sed horum plurimis constat. Graeci καύσωδον etiam hanc febrem, id est, astuosam & usloriā uocant: unde καύσωδεις & καύσωδοί, dicuntur, qui hoc morbo laborāt. Latini communiter febrem ardentem. Caelius Aurel. uerbo quodam Africano flammofam, Barbari cansonidem. Sunt autē cognati morbi, causus, tertiana cōtinua & synochus. Causus & tertiana continua materia conueniunt. Vterq; enim à bile in magnis uasis putrente oritur, sed in causo calor est intensior, & manifesta & periodica exacerbationes non deprehenduntur, quia humor putret in uasis uicinioribus cordi, ut uel uentriculo & maxime ipsius ore: uel pulmonibus, uel parte siua epatis uel jejuno etiam intestino. In tertiana uerò continua putret in partibus à corde distantioribus, minusq; patentes meatus ad cor sortitis, sed & paroxysmi per uices incrementa habent. Ingrauescunt enim ijs diebus, quibus tertiana intermittens accidentia ingrauescunt. Synochus & causus carentia circuituum conueniunt. Neuter enim ad infebrecitationem peruenit, nec remissiones habet: sed in synocho sola caloris copia: in causo ejusdem acrimonia uiget: unde & causus synocho malignior & acutior. Est uerò synochus alius cum putredine, alius sine putredine. Synochus cū putredine est, cum sanguis jam putret: non putris, cum idē tantum incalescit & feruet estq; initium alterius. Barbari synocham inflatam uel inflatoriā uocant, cuius generis fuit synochus epidemica anni 1580. eaq; non simplex sed composita, eò quod & catarrhū & alia symptomata adjuncta habuit: unde

& catarrhus cum febre epidemicus fuit appellatus. Ad synochum putridam uerò illa pertinet, quam quidam πυρογώδον, alij lucē Hungaricam, alij febrem lenticularem uocant. πυρογώδον uocant ὑπὸ τῶν πυρογών, id est, bullis, quod sanguis calore febrili feruens & quasi bullans uenas omnes impleat atq; inflat. Morbus Hungaricus dicitur, quod in Hungaria imprimis grassari solet, uulgò die **Ungerische sucht**. Sed non tā exiguis se terminari limitibus patitur, quin per totam Europam passim uagetur, & eandem in Hispania tum frequentissimam tum ualde periculosam esse testatur Didacus Merinus Hispanus, praesertim ab anno post Christum natum 1557. usq; ad 1573. quo & hoc scripsit, & hic morbus quam plurimos mortales inuasit. Lenticularem appellant Galli & Itali, quod lenticulas & maculas, morsus pulicum referentes producat. Vulgò febrem ardentē die **higige Franckheit** **higige/brennende feber** uocant.

V. ΧΟΛΕΡΗ Galeno dicitur ὑπὸ τῆς χολῆς, à causa putata, quod bilis in eo abundat, & infra supraq; excernitur. Hinc fellistua passio Aureliano. Alexandro Tralliano non eam ob causam, id est, à loco affecto, sic dicta uidetur, sed ὑπὸ τῆς χολαδός, quod materia, qua per uentrem aduehitur, ex intestinis excerni uidetur. χολὰς enim antiquis intestinum est, sic dictum ὡς δὲ τὸ δέχεσθαι τὴν χολαδὴν & ἕμειναι: unde Germanicum **Kaldaunen**. Neq; enim, ait, solum de una fit causa sed de multis. Errat autem, eò quod hac ratione nec melancholia nominis sui rationem tueri posset, cum & ipsa appellationem suam habeat ex eo, quod non ab alia causa, quam ab humore melancholico fieri putetur. Quid, quod in cholera non tam χολαδός quam uentriculus laborat, & hic quidem per se, ille per consensum aliarum partium. Ineptius uerò Partius, qui choleram dictam putat quasi caliacam. Quanta enim inter utrumq; affectum differentia? Latini ex Græco choleram uocant. Medici pleriq; cholericam passionem. Hinc χολερικοί ἢ χολερῶντες ἢ χολερῶδεις qui cholera morbo laborant. Germani uocat **bauchgrimen**. quasi **bauchkrümnen**. Belge Bor, quasi **Βορρυμιον**, ob intestinorum murmur, huic passioni peculiare.



VI. ΕΙΛΕΘΣ dicitur à symptomate. Nam in hoc morbo αἱ τῶν ἐντέρων εἰλικες εἰλοῦνται, id est, intestinorum involucria coarctantur, ut sentit Actuarius: uel πνεῦμα ψυχρὸν δεγρὸν μίμνει εἰλιωσόμενον ἐν ὀλίγῃ τῶν ἀνω εἰλίξει, id est, flatus frigidus & lentus, qui nec infra facile peruadit, nec per superiora recurrit, in tenuibus superiorum intestinorum anfractibus conuolutus diu immoratur, ut scripsit Aretæus. Sic igitur dicitur εἰλεῖν & εἰλεῖν siue cum tenui spiritu, quod coarctare: siue cum aspero, quod uertere & contorquere significat. Nam quod deorsum uergeri deberet, id coarctatur, ne descendat: & circumactum sursum deorsumq; uertitur. Quidam etiam ab εἰλεῖν, quod est, misereor, deriuant, quo naturam potius morbi quam uim nominis exprimunt. Imminens enim hic morbus acerbissimis tormentibus jugulat, ut ait Aretæus: unde & uulgus. Misere mei, appellat. Errant uero qui à parte affecta deducunt, quod tenue intestinum εἰλεῖ, dictum, in hoc morbo precipue infestetur. Neq; enim id intestinum εἰλεῖ, sed λεπτόν, id est, tenue & gracile appellatur. Hoc uero nomen significat & communiter & proprie. Communiter antiquis Medicis omnes intestinorum dolores tum iliacos tum colicos complectitur. Proprie uero tantum acutum tenuis intestini dolorem, quam significationem tempore Tiberij Caesaris, quo uixit Celsus, primum accepisse & nouum nomen innotuisse quidam existimant. Sunt uero duo illius genera: unum ileos in specie sic dictum; alterum chordapsus. Ileos in specie sic dictus, simplicem tenuis intestini cruciatum denotat. Chordapsus compositum ex iliaco & tumore intestinorum, qui compressus manibus, cedit & quodammodo remollitur, id quod Etymologia nominis ostendit. χορδάψος enim siue χορδάψος deducitur ab εἰλεῖν, significante μάλα πᾶσις & χορδῆ, quod est ἔντροπον, ut ait Aretæus: uel quod qui manum loco dolenti admouerit, is ueluti τῆς χορδαῖς ἀπέναντι, id est, intestinum ad chordarum fidiumque morem tensum tangere uidetur, ut scribit Galenus lib. 6. de locis affectis. Hinc χορδῆων, quod est, in chordo & implico. Hipp. lib. 1. ἐπὶ τῶν ἐντέρας παθῶν & ipse εἰλεῖν duplicem facit, arcuatum & hamatiten. Arcuatus in quo oculi interdum

morbo arcuato implentur. Hamatiten, in quo sanguis à naribus fluit, de quo plura in scorbuto magnis lienibus cognato. Latini Græcum εἰλεῖν uerbum uerbo reddentes sua lingua uoluulium & conuoluulium interpretantur: sapius autem ileon uocant. Calius Aurelianus appellat acutum tormentum, cuius nominis tres causas recenset. Vel quod existiment egrotantes conuolui atq; torqueri suorum intestinorum uerticula: uel quod spiritus ob abstinentiam clausus sese inuoluens uinctiones atq; tormenta efficiat: uel quod uehementia dolorum supra eas partes quæ patiuntur egrotantes arcuati conuolutiq; plicentur. Idem scribit ex sententia Callimachi nonnullos Pythagoreos, qui in Sicilia medebantur, consueuisse hunc morbum phragmon, id est, sepimentum nuncupare, quod septis & obtrusis naturalibus uentris officijs cōtingat. Barbari uocant Iliacā passionem. Germanis grīnen / Darmgicht / Gott erbarm dich mein.

VII. Τὰ κατὰ τὴν ἡπαρ ὀξεία πάθη, id est, acuti jecoris affectus. In genere uitium epatis male affecti, morbus epaticus & jecoritis. Græcè ἡπαρίτις eum in modum, ut πᾶσι δὲ ἰστίς, dicitur. Hoc affectos Græci similiter epaticos uocant. Scribonius Largus jecorosos. Marcellus Empiricus jecoritos. In specie hoc uitium aliud diuturnum, aliud acutum est. Diuturnum est intemperies, obstructio, scirrhus, exigua phlegmone.

Acutum est hæmorrhagia epatis & magna phlegmone. De his igitur hoc capite agit Aretæus. Hæmorrhagiam uocant fluxum sanguinis epatis, uel sanguinis epatici, cuius plura sunt genera. A quantitate fluxus, multus & paucus. A qualitate, clarus, saniosus, tenuis, crassus, fætidus, odoris expers. A loco, gibba, sima partis. Phlegmone est inflammatio, id est, tumor præternaturam ex aliqua humore calidiore oriens, unde febris sequitur: est q; tum aliarum partium, tum epatis, qui hepatitis proprie dici solet: est q; alia totius, alia partis, ut caua, gibba: alicujus ex locis, membrana, uenarum. Nomen igitur hepatitis duo illa, nēpe genus & specie complectitur, ut hoc in loco: alibi uero passim apud Hipp. eadē uox duo alia significat, nēpe uenā jecorariam, quæ caua dicitur: (de qua sequenti capite:) & ea generā morbi regij, quæ à jecore originem trahūt, de quibus hoc in loco nihil.

VIII. ΗΨΙΣ



VIII. Η κατὰ τὴν καίλην Φλέβα ὀξείη νοῦσος, id est, uena caua acutus morbus, uel νοσῶσα Φλέβα καὶ δεξιῆς ὀξεία νοῦσος, id est, dorsalis uena atq; arteria morbus acutus, ut habetur cap. 7. lib. 2. de curatione acutorum.

Caua dicitur à magna cauitate, quam obtinet, Galeno μεγίστη, Hipp. ἡ πᾶσις & αἰμορροῖς, id est, sanguis flua, quod sanguinem copiosè effundat, si secetur, rumpatur, conuellatur. Est enim uenarum alia maxima, alia minor. Maxima est caua, per quam sanguis in epate elaboratus in maxima copia per totum corpus deriuatur. Minor est uena porta, cysq; surculi, & uena umbilicalis. Maxima autem illius uena radix è gibba supremaq; epatis parte emata in duos truncos diuiditur, quorum unus superior, alter inferior. Inferior est descendens, qui ab hepate deorsum detortus, in caudicem simplicem & stipites duos diuiditur. Caudex simplex, complectitur partem eam qua ab epate descendit, & ad sacri ossis initium usque protenditur: ex qua communiter quinque uena utrinque, una dextra, altera sinistra prodeunt, adiposa, renalis, spermatica, lumbaris & musculosa. Adiposa ad anteriorem renum tunicam adipe copioso circumfusam fertur. Renalis ad renem excurrit, qua & emulgens dicitur, quod serosum humorem emulgeat secernatq;. Spermatica seminis materiam ad testes defert, unde seminalis dicitur. Lumbaris inter quatuor lumborum uertebras, & spinalem medullam fertur, & spinalem medullam irrigat. Musculosa in lumbares & abdominis musculos propagines profert plurimas, sed qua interdum ab iliacis emergit, ut refert Andreas Laurentius. Hic igitur simplex caudex est. Duo stipites sunt magni rami, in quos caudex finditur: qui quod ab ilibus incipient, iliaci uocantur. Rursus quilibet iliacus stipes in rami duplicem diuiditur, quorum alius interior, alius exterior.

Interior intra abdominis cauitatem continetur, à qua uena quatuor proueniunt, sacra, hypogastrica, epigastrica & pudenda. Sacra per ostium foramina in ossis sacri (quod magnam uertebam uocat Hipp.) medullam fertur. Hypogastrica diuersis surculis tum ad uterum ejusq; ceruicem:

tum ad uesicam, tum ad recti intestini extrema, hamorrhoidalis externa ibi appellata, excurrit. Epigastrica in epigastricis musculos disseminatur, magnaq; sui parte sursum ad umbilicum fertur. Pudenda ad eas partes tam in uiris quam in mulieribus disseminatur.

Exterior extra abdominis cauitatem delabitur, & cruralis dicitur, quod ad inguina & crura descendit: à quo sex uena propagantur, saphena, ischias minor, muscula, poplitea, suralis, & ischias major.

Saphena seu malleoli uena ad inguinis glandulas nata ad malleolum externum descendit, & in pedis superni cutem uariè diuiditur.

Ischias minor è regione saphena extrorsum ad coxendicis cutem, & ejus loci musculos distribuitur. Muscula duplex est: minor & major. Minor tibia musculos & cutem adit, Major per femoris musculos disseminatur.

Poplitea per medium poplitem delapsa nunc in sura cutim absimitur: nunc ad calcem usq; descendit, nunc per externum malleolum fertur.

Suralis in ramos duos diuiditur, externum & internum.

Externus minor est, internus major, sic dicta quod in sura musculos & cutim tibia interna disseminata circa malleolum internum reflexa, latus internum pedis & cutem pollicis, raro alios digitos adit.

Ischias major, majorem portionem per sura musculos deferens in decem ramos absimitur, & singulis digitis binos largiens, minorem inter fibulam & calcem amittit.

Hic est truncus caua uena inferior, qui ut in omnes corporis partes inferiores dirigitur: ita easdem alit & instar fluminis laudabili succo irrigat. Sunt autem partes inferiores, renes, peritoneum, uesica urinaria, uterus, testes, muscoli & ossa, & omnes alia, qua infra jecur sita sunt.

Superior truncus est ascendens, cujus ut & inferioris, duae sunt partes. Caudex & stipites. Caudex partem eam complectitur, qua ab epate ad jugulum usque extollitur. Ab hoc caudice quatuor uena tanquam riuuli manant, phrenica, coronalis, azygus



azygos & intercostalis, eaq̄, qualibet duplex: dextra & sinistra, excepta azygo.

Phrenica siue diaphragmatica per diaphragma disseminata ad cordis usq̄, inuolucrum & membranas Αρσενίαν ramos spargit.

Coronaria, ἡ Φαυκία dicta, uniuersam cordis basin instar coronae cingit: & ex latere suo uelut lacero in dextrum sinum tanquam cisternam ostio patentissimo sanguinem effundit.

Azygos, id est, omnis conjugij expers, sic dicta, quod in dextro tantum latere reperitur. Ramus itaq̄, solitarius est, sed qui tam in sinistram quam dextram partem fertur, octoq̄, inferiores costas, & earum spatia octo uenulis alit, ad secundam ferè lumborum uertebam usq̄, descendens: ubi emulgenti jungitur. Quae causa est, ut commode & uat ἔστω pulmonis uömicalotio exhauriri possit.

Intercostalis tria aut quatuor superiorum costarum spatia nutrit: quam uerò sapius deficere obseruauit Andreas L. quo casu azygos illius munere fungitur, & ramos ad superiores costas mittit. Hic simplex caudex est.

Stipites sunt insignes rami, in quos caudex finditur, qui quod ad clauas & jugulum ascendunt, clauij appellari possunt, uulgo subclauij sed confuse. Rursus quilibet clauius in ramum triplicem diuiditur.

Interior est subclauius, qui intra thoracis cavitatem reconditur, à qua uene quinq̄, proueniunt, mammaria, thymica, capsularis, ceruicalis & muscula, eaq̄, qualibet duplex: dextra & sinistra.

Mammaria descendens, utriusq̄, una, ad mammas fertur, & ad xiphoidis latera emergens cum uena epigastrica ad umbilici regionem anastomosi jungitur.

Thymica per thymum (qui glandulosum corpus est sub jugulo) distribuitur, nec non per intersepientes membranas.

Capsularis per cordis inuolucrum fertur, occurritq̄, phrenicis, quae ascendunt. Hanc à paucis deprehensam esse annotauit Andreas L.

Muscula summi thoracis & colli infimi musculos perreptat.

Exterior clauius est, qui extra thoracis cavitatem egreditur, estq̄, rursus duplex:

superclauius & axillaris. Superclauius est, qui proxime à diuortio supra clauas emergit. Axillaris, qui remotius ab eodem distans ad axillas pertinet.

A superclauio ad colli latera uena oritur, quae à jugulis, cui uicina est, jugularis. Graece ὁ Φαυκίος dicitur, eaq̄, duplex: dextra & sinistra. Dextra iterum alia interna, alia externa. Interna per latera ceruicis interiora ad dextram cerebri, & ejus medulle partem extollitur. Externa sub cute sursum fertur in cutem capitis, ejusq̄, carnosam membranam, & alias caluae partes, subq̄, auris radice, ut plurimum diuisa, tandem in frontis medio dextra cum sinistra juncta, uenam frontis constituit.

Sinistra similiter alia interna, alia externa. Interna in sinistram cerebri, & medulla eius partem spargitur. Externa in omnes partes externi capitis sui lateris surculos spargit quam plurimos.

Ab axillari tres oriuntur uena, thoracica, basilica & cephalica.

Thoracica est quae ad thoracem fertur, quae & ipsa duplex est: superior & inferior. Superior in mammas & musculos pectoris peruadit. Inferior totum thoracis latus perreptat.

Basilica est, quae per interiorum brachij partem fertur. Hipp. interna, estq̄, alia dextra, alia sinistra. Dextra uulgo epatica & jecoraria: sinistra lienaris dicitur.

Cephalica est, quae per brachij exteriora fertur. Hippocrati extrema, uulgo cephalica, quod in affectibus capitis tundatur. Appellatur & humeraria, quod per humerum feratur.

Ex his duabus postremis uenis emergit ea, quam Medici eam ob causam communem, uulgo medianam, Arabes uenam nigram appellant, quae peculiaris & tertia brachij uena non est, sed riuulus quidam ex cephalica & basilica in cubiti articulatione coitu emergens. Vtraq̄, enim uena egressa humeros, dum ad cubiti articulationem uenit, in duos surculos, externum & internum diuiditur, ex quibus duo interni sibi inuicem in medio cubiti occurrentes mediana istius locum constituunt: quae ab origine sua longius progressa partim ad cutem manus externae absimitur, partim in duos ramulos diuiditur, quorum unum inter pollicem & indicem diductus



Diductus cephalicam & oculariam appellatam: alterum inter medium & annularem. Auicenna syclem quidam esse existimant. Externus uero cephalicae surculus, isq; insignior per medium radij & carpum progressus conspicitur, ramo inter paruum digitum & annularem desinit, quem uenam saluatellam Arabes uocant.

Haecenus de caua uena, quam rudi seculo Aretaeus rudi Minerua delineauit: nos prolixius perspicuitatis gratia descripsimus.

Minor uena est uena porta, cuius & ipsius idem breuiter meminit. Haec sanguificationi seruit, ut illa distributioni & perfectioni sanguinis: utq; caua in gibba & conuexa parte: ita porta in sima & concaua parte hepatis inter duas illius eminentias, quas portas Hipp. uocat, radicitur, unde & porta nomen accepit. Alij tamē portam dictam esse uolunt, quod per eam uelut portam chylus ad epar deferatur. Dicitur autem & uena porta & porta & ostiaria, μεγάλη Galeno: interdum & ελεχισία quod sit ελεχλ, id est, trunco cuidam planta similis, Aretaeo Φλεψὶ δὲ τῶν πυλῶν, ut & Galeno interdum ἡ πᾶσις πύλας, id est, uena qua ad portas est, Quidam jecoris manum uocant, quod ea tanquam manu ad chyli attractionem epar utatur. Arabes uenam lacteam, quod cremorem lacti similem allicit. Eadem instar arboris in radices, truncum & stipites diuiditur. Radices sunt capillamenta, quae innumeris surculis per uniuersum epatis corpus sparguntur. Truncus est caudex, in quē radices coeunt. Stipites sunt surculi, in quos caudex dirimitur.

Rursus truncus quatuor ex se ramos emittit, cysticum, gastricum, gastropiploicum & intestinale.

Cysticus ex antica & suprema trunci parte ortus, mox in uescicam felleam bifariam fertur. Est enim gemellus.

Gastricus, isq; dexter, ad posteriorem uentriculi partem & pylorum pratenues spargit uenulas. Sunt autem tenues potius quam crassa, ut chylus in illis existens ueram sanguinis effigiem assequi possit.

Gastropiploicus ad fundum uentriculi dextrum & omentum abit, surculis illum supernè: hoc infernè peruadens.

Intestinalis per duodeni longitudinem

excurrit. Sic Andr. Laurentius. Alij cysticum & gastricum tantum recensent: eò quod ceteri saepe in mesenterico emergere obseruantur.

Stipites insignes duo sunt, splenicus & mesentericus.

Splenicus est elatior, qui ad lienem ferè totus fertur: estq; duplex: unus ante diuisionem, alter post diuisionem. Ante diuisionem quadruplex est: gastricus minor, epiploicus dexter, coronarius, stomachicus & epiploicus posterior.

Gastricus minor, isq; sinister non admodum frequenti ramorum serie in gibbam uentriculi partem distribuitur.

Epiploicus dexter in dextram inferioris omenti regionem surculos aliquos deriuat, & quibusdam ramulis colum intestinum irrigat.

Coronarius stomachicus omnium crassissimus, dum ad uentriculi regionem superiorem abit, mox bifariam dispergitur, priore ramo orificium uentriculi superius corona instar cingit, altero ad pylorum descendit.

Epiploicus posterior dorso alligatus ad posteriorem omenti membranam, & coli partem ramum dextrum & sinistrum mittit.

Post diuisionem qui stipes est, rursus subdividitur in duas uenas, quarum singula iterum in alias atque alias infinita sobole diremta uniuersam lienis substantiam perreptant. Ab eodem uero stipite jam in liene existente uena insignis prodit, uas breue aut uenosum dicta, quae rursus in os fundumq; uentriculi resiliens melancholicum succum eructat, qui suo sapore acerbo & acido torpescens appetentiam excitat, uel potius uentriculum corroborat. Fames enim non tam à perfusione humoris melancholici, quam à penuria alimenti oritur.

Mesentericus stipes est inferior & multo amplior, qui in mesenterium & intestina infinitos diffundit rimulas, inter quos praecipui tres obseruantur: haemorrhoidalis, cacalis & mesentericus in specie sic dictus.

*Haemorrhoidalis per coli extrema & re-
cti intestini longitudinem ad anum usque
prore-*



prorepat: eius finem exilibus ramis orbiculatim amplectens. Et hæc interna & plethoræ uacuatrix: ut illa, quæ uena caua ramulus est, de qua supra dictum est, externa, & cacochymie depletrix appellatur. Hæc occultas: illa externas hæmorrhoides parit. Quod si enim oblienis obstructionem melancholicus sanguis expurgari nequeat, huius ramuli beneficio, certis quibusdam interuallis excerni solet. Cumq; duplex sit hæmorrhoidalis, non mirum ijs siue arte siue sponte apertis non solum morbos abdominis, qui à sanguine in uena porta exuberante ortum habent: sed & affectus sanguineos, qui thoracem & caput affligunt, per sanari.

Cacalis ramus ad cacum intestinum fertur.

Mesentericus in specie sic dictus, in complures & propè infinitos instar radicis arboris diuisus surculos, uenas mesaraicas constituit, quæ inter duas intestinorum, imprimis uero ilei & jejuni, ubi major illorum copia est tunicas sparguntur, ut chyli inde tenuiorem partem exugant, & ad epar transmittant, munita glandulis, ne uel confundantur, uel comprimantur, uel ualidis motibus dissumpantur.

Ex quibus apparet nõ ex caua uena, sed ex porta nutriri uentriculum, pancreas, lienem, mesenterium & intestina, eò quod sola porta, in has partes suos traiciat surculos: uena caua nullum. Estq; hæc dilucida uena tum caua tum portæ descriptio, cuius utriusq; radices per jecoris carnem confusè sparguntur, sibiq; inuicem miranda quadam anastomosi uniuntur. Extrema enim radicem uena portæ in medias uena caua radices infiguntur, & uena caua extrema in medias portæ radices cõcunt, ut à portæ in cauam & à caua in portam facile meet sanguis & remeet. Non tantum igitur uena caua truncus superior cum inferiore ita unitur, ut si quis immissa lamella explorare uelit, unum ascensum utriusque deprehendat, quod scripsit Aretæus: sed & uena caua cum uena portæ tanta communicatio est mutuaq; complexio, ut si quis in uenam umbilicalem recens nati (quæ foras propendet) immittat tubulum, uideat & intestina & caua ramos, & cor & ipsam etiam pulmonum carnem distendi, quod obser-

uauit Andr. Laur. Umbilicalis enim in portam desinit: & portæ in cauam, rursusq; hæc in illam. Illa uero nempe umbilicalis iam edito infanti inarcescit, & in ligamentum abit. Ex eadem uero descriptione, ait Aretæus, etiam illud sequitur, ut totus uena caua truncus tum superior, tum inferior morbis acutis obnoxius sit: non tantum inferior, qui ad dorsum pertinet, id quod Medici quidam opinati fuerunt, sed perperam. Patitur autem uarios morbos, inter quos præcipui sunt cedmata & phlegmone.

Cedmata Hippocrati dicuntur diuturni ex defluxione affectus cū in omnibus articulis, tum præcipuè circa coxendicem, ut ait Galenus. Aretæo uero hoc in loco sunt siue repletiones, siue ruptura uenarum orta uel ex multitudine uel feruore sanguinis. Alludit enim ad Hebraicum Cadah, id est, accensus est siue incanduit, sic dictum quasi incendium, Germ. *enzündung*, quod utrumque eiusdem originis est. Comprehendit igitur nomen suo complexu, id quod aliis in genere ἀνδρῶν εἰς πύλας dici solet, ἀνδρῶν εἰς πύλας, id est, dilatando. Quibusdam etiam speciali nomine ἰσχυρὸς. Latine uarix. Hic enim tumor est tactu blandus à sanguine, & spiritu ab arteria, aut uena profusus excitatus, quo aperto sanguis affatim erumpit, & unà uitalis spiritus, ut ager saepe in Medicorum manibus deficiat. Cuius rei exemplum nuper obseruauit in muliere plethorica, cui uena cruralis cum diu intumisset, tandem sua sponte rupta, circiter quatuor mensuras sanguinis profudit, unde exanguis facta, uix multis diebus obstructo uulnere, & adhibitis analepticis restitui potuit. Sic lethalis est fluxus sanguinis de uena interna qualibet magna, ut pulmonis & epatis, cuius Aretæus meminit, de truncis uena caua utriusq; loquens. Mortifera uero est hæmorrhagia etiam meningum aut retis mirabilis, quarum uena magna quidem non sunt, sed tam frequentes ut sanguinem in cerebri mole ferè copiosorem quam in jecore reperiri quidam existiment: unde & cerebrum tam uehementer calefieri inflammariq; solet. Sic lethalis est repletio tenuium cerebri uenarum in epilepsia puerorum, dum pituitam praerassitudine ac multitudine suscipere non possunt, sed perfrigeratur ac congelatur sanguis, & sic moriuntur.

phleg.



Phlegmone, alter morbus, inflammatio dorsalis uena atq; arteria est, quam prolixè describit Aretæus: recentiores silentio prætereunt. Est autem non tam uena quam sanguinis in uenis contenti inflammatio, & causi species quadam, quæ in dorso maximè sentitur. Hinc factum, ut non aliam causi quam phlegmone dorsii curationem autor proponat: & liber secundus unum caput minus habeat.

IX. Ἡ κατὰ τὸν νεφρὸς ὄξεια νόσος, id est, acutus renum morbus, nempe inflammatio & obstructio ὄξυτον, id est, quæ celeriter jugulat. Sunt enim plures earum partium morbi, qui jam inter diurnos recensentur. Omnes autem illos νεφρίδας nomine Græci interdum complectuntur, siue acutos siue diurnos, Germ. Nierenwehe. Hippocrati τὰ νεφρίδα sc. πῖθῃ, aph. 6. lib. 6. & alibi. Et Nephritici sunt, qui ex renibus laborant, ut stomachici ex stomacho, epatici ex epate, splenici ex liene, colici ex colo, ut refert Gal. lib. 2. de comp. med. sec. loc. cap. 2. Germ. Nierensüchtig.

X. Τὰ κατὰ τὴν κύστιν ὄξεια πῖθῃ, id est, acuti in uesica affectus, nempe phlegmone & ulcera, lapides & grumorum obstructiones: à quibus ischuria & stranguria oritur. Excretio enim urina, sine qua animal uiuere non potest, aut aboletur aut diminuitur, aut deprauatur. Abolita uocatur ἰσχρία, cum urina omninò supprimitur, sic dicta δὸδ τῆ ἰσχρίῃ, id est, tenendo τὸ ἔσπον, id est, urinam. Calio Aureliano ἰσχρία sed perperam. Est ἰσχρία affectus uerus & spurius. Verus est, qui fit uitio uesicae urina plèna, obstructo illius meatu. Spurius, qui fit uitio renum aut ureterum, à quibus uesica nihil recipit. Latinis τὸ νεφρῶδες lotij retentio uel suppressio. Germanicis auffhaltung oder verstopfung des harns. Diminuta urina uocatur stranguria, cum uesica reddit imbecilliter ac deficienter, sic dicta δὸδ τὸ σπῆγγος, id est, gutta seu stilla, & τὸ ἔσπον, id est, urina, quasi κατὰ σπῆγγα ἔσπον ἐκκρίσις, quod in ea stillatim lotium redditur: uesicae morbus Cicer. substillum Catoni, alijs urinae stillicidium. Germ. Kalcseuch / harnstrang / harnwinde / tröpflicht harnen. Differt à diabete. Nam stranguria laborantes frequenter mingunt & guttatim. Diabetici frequenter & in magna copia.

Deprauata urina dysuria est, quæ libidinem mejendi facit, sed excretionem cum dolore, sic dicta à δὸδ, quod in compositione aegrè & malè significat (ut in nomine δουρῆσις) & τὸ ἔσπον, id est, urina. Lotium enim ui quadam & difficulter in ea excernitur. Differt à stranguria. Nam stranguria laborantes guttatim & frequenter mingunt. Dysurici guttatim & non frequenter, ut quidam interpretantur. Pleriq; uerò aliter, quibus dysuria stillicidio caret. Fit uerò siue cum difficultate, siue cum dolore. Galenus namq; duas illius species constituit comment. aph. 48. lib. 7. Ἡ κατὰ τὸν πόρον ὄξεια, hoc est, quæ cum dolore, cuius causa inflammatio, abscessus, exulceratio, inæqualis intemperies & spiritus flatulentus.

Alterum τὸν πόρον δουρῆσις, ὡς μογὶς ἐνεργεῖν τὸν κύστιν, hoc est, quæ cum difficultate, ut uix ipsa uesica opus suum peragat: cuius causa aut facultatis imbecillitas, aut humor præter naturam. Dysurici igitur cum mejere cupiunt, non statim excernunt, sed magno cum conatu atq; etiam aliquando dolore. Arabes stranguria & dysuria nomine indifferenter utuntur: ut & uulgus, quod plerumq; confundit similia. Vtrunq; igitur affectum & dysuriam & stranguriam Germani nocant harnstrang / harnwind / reissen. Differunt enim secundum magis & minus.

XI. Ἡ τῆς μήτρας ὄξεια, id est, uulua strangulatus, præfocatio matricis Aurel. Vas enim fatum conseruans ab Aretæo & ὄξεια & μήτρα uocatur, à Latinis uterus & uulua. ὄξεια id est, postrema dicitur à situ, quod ultimum inter uiscera locum habeat. μήτρα id est, matrix, quod sit mater fetuum, qui ex ipsa aut in ipsa nascuntur: uel quod matres faciat, quæ ipsam habeant. Vterus, Plinio utriculus, quod in eo uelut utre fetus contineatur. Vulua, quasi uolua aut ualua. Lucilio bulga, quod folliculi & loculi similitudinem habeat. Aristoteles locos uocat. Græci etiam Φύσιν, νηδὺν, δελφῶν, ἄγγος & γυνῶν. Hujus igitur uisceris motus triplex est: naturalis, symptomaticus & mixtus. Naturalis est, quum semen proleat à sua ceruice, eiq; quasi obu. ā occu. it. dum itē se contrahit ut concipiat, & dum co. rtu ualido fatum, secundasq; & rics alias si i aduersantes excludit. Symptomaticus similiter

Ec triplex



triplex est: ascensus, reclinatio & descensus. Ascensus, dum ad superiora fertur, hysterica praefocatio, & ἀνωρα ὕστερον, id est, anhelitus ob uteri culpam interceptio nominatur. Reclinatio, dum ad latus dextrum uel sinistrum fertur, distortio, conuersio & peruersio dicitur. Descensus, dum ad inferiora proreptat, uteri prolapsus seu. procidentia uocatur. Mixtus est, dum nimium resiccatus & sitiens ad epar recurrit, aut furens prolabitur. Naturalis fit à sola facultate anima. Symptomaticus à causa morbifica: mixtus à causa morbifica & facultate simul. Motus autem ille symptomaticus conuulsio dici solet κατὰ χεῖρας, ut & singultus. Conuulsio enim proprie dicta motus est earum partiū in iussus, quae sponte nostra mouentur. Uterus autem non sponte nostra sed sua mouetur. Hoc igitur membrum seruire non est, si proprie loqui uelimus, ζῶον ἄνθρωπινόν, id est, animal concupiscentia particeps, ut appellat Plato, sed, ut interpretatur Aretaeus, ἀλάτρυχον ἀγχιζα ζῶον, id est, ὄρνιθι ζῶον ἐν ζῶῳ: uiscus prope animatum, & uelut animal quoddam in animali. Quod enim instar animalis motu locali moueri uidetur, iucundis oblectatur, tristibus afficitur, id sit κατὰ χεῖρας, non sub propria sed sub aliena specie. Ex marore enim praefocationem incurrit ob defectum spirituum, quia maror refrigerat: offenditur fœdis odoribus, dum bene affectus est, ratione prauorum uaporū ex rebus fatidis emissorum. Fatida enim omnia incocta sunt, & prauè permixta, ideoq; inaequaliter sensum afficiunt. Hinc Aristoteles 8. de historia animalium, grauidas mulieres & equas ad odorem extincta lucerna abortum pati scribit, id quod eandē ob causam contingit. Inquinantur enim materni spiritus, quos per arterias umbilicales fetus trahit. Iisdem uerò etiam recreatur, ut castorio & assa fatida, cum malè affectus est, eò quod fœdi illi uapores nature nostrae aduersantur, quos dum ut hostes insensissimos natura irritata expugnare conatur, simul prauos in utero contentos humores extrudit, perinde ut noxia pharmaci qualitate dum uellicatur, uacuationes perficit. Offenditur uerò & suauiter olentibus, ut moscho, ambra & similibus, dum prauè affectus est, ratione bonorum uaporum ex rebus bene olentibus exeuntium. Bene enim

olentia cocta & acuta, admodum cerebri membranas afficiunt, & hinc uterum, qui & ipse membranosus est, & cerebro consentit: quo affecto qui prius latitabant in utero uapores tetri, suscitantur & per arterias, & alios cacos ductus ad diaphragma, cor & cerebrum expirant: unde suffocatio. Inuatur contra suaueolentibus, dum bene affectus est, ratione uaporis & tenuissima aura odorem comitantis, quo celerrimè afficitur, cum exquisitissimum sensum habeat.

XII. Tria sunt nomina cognata, quae eruditi separant: uulgus saepe confundit, οὐρογίαισι, οὐροελασμός & πριαισμός. Σατυρίασις est genitalium dolor & inflammatio, ut hoc loco, qua affecti coitum appetunt, οὐροελασμός est pruritus ad Venerem, familiaris maximè mulieribus salacibus, quae satyrica eam ob causam dici possunt. Tales autem sunt, qui uterum natura ualdè siccum habent, & pabuli sui, quo repleatur, cupidum: id quod ex fissuris labiorum cognosci potest. Galeno hoc nomen etiam aliud genus morbi significat, nempe tumorem adenum, qui aliquantulum post aures prominet. οὐροελασμός est incipiens elephantiasis, quae & οὐροελας dicitur. πριαισμός est penis emphysema, quo laborantes, Venerem non appetunt. Posterius hoc à Priapo, priora nomina à Satyris nomen habent, sed diuersas ob causas. Satyriasis enim dicitur, quod ea uexati penem instar Satyri erectum habeant, ut ait Aretaeus. Satyriasmus autem, quod eo laborantes facie Satyris similes euadant: uel quod elephantici ut & melancholici satyriasis saepe tententur. Priapismus deniq; quod eo affecti Priapi lasciuiam imitentur. Sunt autem Satyri Διὶ Baccho sacri, ut ait Aretaeus, qui arrecto pene figurantur, quod diuina rei signum est. Nunc uerò Satyri uocantur, homines pilosi, faciem cum humana similem habentes, uerius tamen spectra & daemones quàm homines. Germ. waldteuffel & waldgespenst sic dicti à radice schoter 707 id est, praefectus, qui uirgam seu baculum tenet (cognatum enim est nomini chother 707 quod uirgam significat, quam Satyri extentam habent.) Cognatum uerò idem est etiam nomini satan, quod tam de homine quam Diabolo dicitur, aduersarium significans. Hinc satyriōn herba

berba, cuius esus tentiginem genitalium partium inuehit. Priapus uerò idem est qui Bacchus, cuius simulachrum fuit puer ingenti pene, & extento, ut ait Suidas, quod nomen compositum est à uerbo Para πῆρ, fructus protulit, cognatum latino uireo, & à nomine Ab ἄβ, pater, cognatum latino auus, ut Priapus sit quasi ferax pater.

Latinis Satyriasis uirorum, tentigo dicitur. Aureliano tentigo ueretri, Iuuenali ueretri intensio. Appellant & tetanon & τῆσαν & αἰδοῖον. Differt à ceperia, ut uocat Marcellus, qua tumor est penis sine tēnsione, aut incerta tantum parte, ut praputio.

MORBI DIUTVRI NI LIBRO PRIMO.

I. Cognata sunt nomina, κεφαλαίη & κεφαλαλγία & ἐπικρανίη. Dolor enim capitis aut uetus, aut recens est. Si uetus, aut totum caput occupat & cephalaea dicitur: aut alterutram tantum partem, & heterocrania uocatur. Si recens est, cephalalgia appellatur.

Κεφαλαίη à parte affecta, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, id est, capite. Latinis dolor capitis. Caput autem hoc loco dicitur pars illa, qua capillo tegitur, & cuius caluaria adjacet superiori quidem, pericranium: inferiori uerò meninx dura. Alijs cephalaea uocatur, nux, ouum, galea, galeata passio, à similitudine cum nucis, ouo galea, & ipsa galea, quòd totum caput ad modum nucis, oui & galeae comprehendat. Germ. Hauptwehe von langer zeit her.

Κεφαλαλγία propriè omnem dolorem capitis significat: ex instituto uerò hominum recentem tantum. Sodam Arabes uocant à radice Schod ἴω id est, deaustauit, unde Græcum ἑτέλιος & Germanicum Schad. Nullam enim partem corporis humani equè deaustant dolores, ac caput humanum. Cucurbitæ enim more cunctis superpositum passim in se rapit uiscerum subjectorum inquinamenta. Germanicis Hauptwehe.

ΕΤΕΡΟΚΡΑΝΙΗ quasi alterutrius cranij dolor: aliàs ἡμικρανίη, id est, dimidij capitis dolor. Auicenna scribit à Galeno. appellari ambulatorem mediū. Nā modo dextram, modo sinistram partem occupat,

& à temporum pulsatione ferè ortus ad suturam usque protenditur. Ea enim dolorum interstitium est. Arabes plura huius genera faciunt, nempe monopagiam & clauum. Monopagia dicitur, quasi unam partem capitis tenens. Clauus est passio in parua capitis parte & communiter supra oculum in supercilio, sic dictus, quod eo laborantes, clauo seu terebello se perforari, atque uelut acu pungi uel malleo contundi existimant. Ouum etiam quidam dici existimant à similitudine oui, non armorum, ut supra, sed galline, & sic ad hemicraniam pertinet. Serapion quoque non omnem capitis querelam, sed solam pulsatilem, sodam appellat, & sic heterocraniam denotabit. Germ. Hauptwehe in einer seyttē.

Differt autem uetus & recens dolor non tantum duratione sed & tempore, imbecillitate capitis, sexu, uehementia. Vetus enim, qui cephalaea dicitur, jam diu durauit & continuus interdum est: interdum ex interuallis repetit & exacerbatur: suntq; interualla uel ordinata uel inordinata, uelut in comitiali morbo. Sic hemicrania per circuitus plerunque reuertitur, uel quotidianos, uel tertianos. Idem dolor ob caput imbecillum à re quauis facile irritatur: mulieres magis quam uiros uexat, propter copiam & culturam capillorum, ut uult Calius Aurelianus; tamq; uehemens, ut eo affecti neque strepitus neque uocem uehementiorem, neque

Ec 2 splen-



splendorem, neq; uini potu, neq; odores, quibus caput repletur, ferre possint, neq; item motum. Sic hemicrania laborantes interdum ne manum quidem, si tangantur, ferre possunt, affecto scilicet pericranio, & cute non experte morbi. Recens uero qui cephalalgia dicitur, dolor est breuis temporis, uiros magis uexans quam mulieres, & mitior, qualis est ea, quae à Sole, aut labore, aut à febribus contingere solet. Ex quo apparet utrumq; genus minoris ac maioris ratione inter se distare, ut cephalaa sit inueterata & agrè cedens κεφαλαγία & κεφαλαγία recens & facilè cedens cephalaa. Potest uero cephalalgia & hemicrania in cephalaa successu temporis, ut & in uertiginem uel conuulsionem abire. Itaq; inquit Aretaeus. Exiguos dolores capitis ne spernito.

II. ΣΚΟΤΩΜΙΑ & σκοποδίνη Aretaeo unū & idem sunt. Interpres uertiginem uocat, sed minus rectè. Duplex enim uertigo est: simplex & tenebrosa. Simplex est imaginationis passio, cum circumagi in gyrum uidentur omnia, Graecis δῖος, ἰλιγγί, ἰλιγγί &. Tenebrosa, oculorum passio est, cum praeter capitis & grauedinem & rotationem tenebra oculis aut splendores ac scintilla quadam (μαρμαρυγαί Aretaeo, λαμπρόδες alijs dicuntur) caligini permixta oculis obuersantur. Aretaeo σκοτώμα & σκοποδίνη, Hipp. σκοποδίνος, Aegineta σκοτωματικὸν πάθος. Barbari Scotomiam quasi Scotodinam uocant. Hoc igitur nomen affectum compositum, id est, uertiginem & simpliciter appellatam & tenebrosam comprehendit, δῖος & σκοτός, id est, caligine & diuis, id est, gyro. Quapropter qui σκοποδίνω dicit, ut Aretaeus, uertiginem etiam dicit: qui uero uertiginem, ut interpres, σκοποδίνω non dicit. Vertigo enim sine scotomate: scotoma non sine uertigine esse potest. Quidam differre ajunt, ut inchoatū & imperfectum à perfecto: ut uertigo sit quid imperfectum: σκοτώμα quid perfectū. Nec tamen scotoma est hypochyma, quod & ipsum caliginem oculis obtrudit. Huius enim causa conjuncta, nempe aqua & fumus, non in cerebro sed in oculo delitescit. Germani uocat Schwindel/ HauptSchwindel/ vmberrümlung.

III. ἘΠΙΛΗΨΙΑ, Epilepsia, δῖος & ἐπιλαμβάνειν, apprehendendo, quasi quadam apprehensio, captio, detentio, interceptio mentis

atq; sensu. Hoc enim affectu correptis subito cognitio & sensus aboletur, adeo ut paroxysmo soluti, eorum quae acciderunt, amplius recordari non possint. Quidam etiam sic dictam uolunt, quod Ἐπιληΐας à demone occupari ueteres crediderunt.

Appellatur uero hic morbus & caducus & comeßalis & comitialis & conuulsio & Hercules & Lunaticus & magnus & puerilis, et sacer et fonticus. Tantam nimirum nominum copia hic morbus meruit, quanta praeter hunc nullus habet, ut maxime notabile atq; admiranda illius uim malitiamq; exprimant.

Caducus dicitur à cadendo, quod cuncti ferè hoc morbo affecti imprimis dum munia sua obeunt, cadant, humiq; prostrati jaceant, facultate qua corpus rectum tenebat, subito uel impedita uel abolita. Germani eandem ob causam uocat fallend siechtag & fallende seüch, à frequenti horum casu: quo tamen nomine abstinent & Vergicht uocant, dum puerorum epilepsiam designare uolunt, ne metuendo morbi caduci nomine horrorem, & metum adferant.

Comessalis à comeßando, quod ab inordinato cibo & potu oriri solet. Pueris igitur ob ingluuiem familiaris est: unde corpus prauis humoribus repletur, qui caput petentes epilepsiam pariunt. Germani similiter den freiß uocant à uerbo freessen.

Comitialis à Romanis comitijs Plinio dicitur, siue quod in comitijs & hominum frequentia, ut hodie in concionibus, maxime inuadat & potissimum deprehendi solet, siue quod comitia, quo die aliquis cecidisset, inter rumpi solebant. Hinc factum ut epilepsia obnoxij, conciones & congregationes hominum interdici soleant.

Conuulsio dicitur ab alio, eoq; contrario, quam epilepsia nomē denotat, symptomate, nēpe à conuellendo, id est, uehementer agitādo. Sicut enim epilepsia nomē stuporē omnium sensus energiarum denotat: ita hoc spasmosum totius corporis motum: quo partes nervosa contorquentur, & breuibus saltuosiq; motibus concutiuntur. Proprie uero conuulsio genus est: epilepsia species. Est enim conuulsio omnis praeter uoluntatē motio, seu inuoluntaria musculi uersus suum principium contractio: Graecè πρᾶσις: estq; duplex; alia omnium totius corporis partium: eaq; uel perpetua & tetanus dicitur: uel non perpetua & epi-



Et epilepsia dicitur: alia unius partis, et uel oculorum, ut $\epsilon\pi\alpha\lambda\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$: uel oris, ut $\kappa\omega\upsilon\upsilon\acute{o}\varsigma$ $\alpha\pi\acute{\alpha}\sigma\mu\acute{o}\varsigma$: uel mandibularum, ut $\tau\epsilon\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$: uel penis, ut $\alpha\omega\tau\upsilon\rho\acute{\iota}\alpha\sigma\iota\varsigma$: uel aliarum partium, quæ cum proprijs nominibus careat, cum additione hujus uel illius partis effertur, Germ. **Krampf** appellant. Nulla igitur epilepsia sine conuulsione est: quædam uero conuulsio epileptica non est.

Hinc Algonij epilepsiam **dic arbeits**, id est, laborem seu agitationem à præcipuo illius symptomate appellant.

Herculeus morbus, $\eta\epsilon\rho\kappa\lambda\epsilon\acute{\iota}\alpha$ $\nu\omicron\upsilon\sigma$. Hipp. à contumacia et uehementia, quod $\delta\upsilon\sigma\kappa\alpha\tau\alpha\mu\acute{\alpha}\chi\eta\tau\iota\varsigma$ sit, id est, quod nulli remedio cedat, aut expugnari se patiat. Est enim morbus partis nostri corporis principis et causam habet obscuritatis plenam et magna cum seuitia conjunctam. Sed et Hercules dicitur, ut uult Aristoteles in problematis, quod eo morbo Hercules obnoxius fuerit, alijq; uiri magno ingenij acumine præditi, ut Cambyses Persarum Rex, ut refert Herod. lib. 3. C. Iulius Cæsar, ut ait Plut. in Cæsare. Plotinus Platonicus, ut scribit Suidas et Eunapius. Neq; enim tantum à pituita, sed et melancholia, epilepsia oritur, cum uterq; ut frigidus humor, sinus cerebri obstruere possit. A melancholico autem humore ingenij produci excellentiam demonstrat ibidem Aristoteles.

Lunaticus, à causa efficiente, nempe Luna, uel quod humori frigido humidoq; præest, à quo epilepsia oritur: uel quod certis Luna mutationibus agrotos hic morbus inuadat: uel quod interlunio natos ferè infestet. Ita uulgò, sed rudi Minerua. Interlunio enim nati in genere aut breuis aui sunt, aut in senectute morbofi sunt. In specie uero epileptici fiunt, nati Luna Soli siue conjuncta, siue opposita, Marte item et Saturno ipsæ copulatis aut oppositis: aut quadrato aspectu affligentibus. Hoc itaq; tam uulgato hujus morbi nomine, communi omnium temporum consensu Astrologorum decreta contemnenda non esse conuinci potest, cum ab illis causas morborum procreatrices remotas deduci omnis antiquitas sibi persuasum habuerit, et quotidiana id ipsum testetur experientia. Habeo plurimas genituras Epilepticorum, ait P. Forestus, medicus nostri temporis celebris, in quibus ea respondent

præcipuè, quæ Ptolomeus de ipsæ obseruauit. Sed nemo est Astrologia deditus tam inops exemplorum, quin similes quàm plurimas ipse collegerit. Est autem alia periodica, alia non periodica. Periodica interdum crescete, interdum decrescente Luna inuadit: imprimis uero cum aut Luna inchoatur, aut impletur: uel si per locum malefici in genitura transeat. Hinc quidam mox ante nouilunium, et ante quadrantes et ante plenilunium medicamenta contra epilepsiam exhibent. Ajunt uero eos, qui plenilunio cadunt, periculosius corripit: et ex repletionem malum oriri: ut ex inanitione, si interlunio cadant. Id quod experientia non semper comprobatur. Obseruauimus enim correptos interlunio, qui ex repletionem agrotabant, meliusq; ualuisse statu ferè cali nubilo atq; austrino, quàm sereno. Epilepsia enim conuulsio legitima non est, cum, ut Capouaccius tradit, nec inanitionem, nec repletionem ut causam agnoscat. Non inanitionem, eò quod cito sit et cito desinit. Non repletionem, quia cerebrum neruofum non est. Simili ratione in sacris literis, ut Math. c. 17. lunaticus dicitur, cujus morbus Luna ascensu increfcit, ut ejus qui à demone obstruetur. Est enim melancholia, quæ crescit decrescitue pro ratione Lune, balneum Diaboli.

Magnus et major dicitur $\kappa\alpha\lambda\acute{\iota}$ $\epsilon\pi\omicron\chi\eta\upsilon$, quod sit majormagno alio. Quod autem sit magnus infra dicitur in diuisione morborum. Tanta autem inest grauitas, et deformitas huic morbo, ut Plinius sua ætate (quod nec jam insolens) sola mentione epilepsia, desui suctum scripserit. Et quanta sit ejus feditas Aretæus his uerbis expressit cap. 4. lib. 1. diutur. Varium et portentofum morbi genus est epilepsia. Et paulò post. Triste medijs fidius est ipsius inuasionis spectaculum: turpis et ejus desinentia, cum stercore et lotio.

Puerilis et infantilis à subjecto, quod in puerulis, ipsiq; madidioribus regionum præsertim calidiorum frequenter eueniat. Ij enim sua natura frigidiorum humorum copia referti sunt, à quibus epilepsia oritur. Quosdam uero ex ijs mox ante septimum diem jugulat: quosdam inuente pubertate deserit, alios à pueritia incipiens ad senectutem usq; comitatur. Hinc Aristot. 2. de historia anim. ultimo scribit, consueuiffe ueteres nomina pueris septima

E e 3 die,



die, ut Iudæi octavo die, quod eo tempore salui esse credantur, qui ante hunc diem plerumque morbo epileptico intereunt. Hippocrati μάδων νόσος & νόσος πνεύμων, Arabibus mater puerorum. Germanis **Kindlin weche** & **vergicht** & **gegicht**, inter qua nomen posterius non tantum epilepsiam puerilem, sed & eam, qua colicos dolores, febres, uulnera, aliosque morbos graues comitatur, euphemie gratia, ut blandiore uocabulo atrox malum leniatur, designare solet. Nomen autem **Vergicht** à paralyti quam **gegicht** uocant, deductum esse uidetur. Epilepsia enim cum paralyti tanta est cognatio, ut instar apoplexie in paralyti finiri interdum soleat. Quod etsi neget Galenus id tamen se aliquando uidisse scribit G. Frascatus in epilepsia cuiusdam puerperæ, qua cum in paralyti desisset, ab ipso curata fuerit.

Sacer morbus, iuxta veteres, uarias ob causas. A parte affecta qua sacra est, nempe cerebro, quod laborat. Caput enim in quo cerebrum positum est, sacrum animæ templum uocant philosophi. Tam cerebrum igitur quam animum sacrum contaminat. A causa, quod ut ait Aretæus, nonnulli flagitiosos hominibus à Luna immitti existimant. Hinc deifica lues ab Aureliano dicitur: idque similiter, ut antea, morbus magnus, κατ' ἐξοχλῶν. Et si enim hoc epilepsia proprium non sit: sed commune cum alijs morbis, ut causam habeat peccata hominum & iram Dei, tam graui tamen morbo potissimum conuenit. Mirum igitur, cur autor libri de morbo sacro, quem nonnulli rectius Philotino quam Hippocrati ascribunt, tam aptam huius nominis rationem cauilletur, & primos illius autores, Magos, expiatores, circulatores, arrogantes nominet. Laudem enim potius illi merentur, qui oculos mentis ad calum attollunt, & tum huius tum aliorum morborum causam inde petunt. Quod eleganti hoc uersu expressit Virgilius Aeneidos 12. Si quando lethum horrificum, morbosque Deorum rex Molitur. Et Theophylactus cap. 8. in Math. ubi ait, morbos esse milites & uindices DEI. Quo alludens Cornelius Celsus subdit, inter nonnulla auxilia aduersa ualitudinis plerumque sanitatem contigisse ob bonos mores. Lunam uero Aretæus ut Deam nominat. Hanc enim Phryges, ut tradit Lucianus in Ioue Tragædo pro Deo suo coluerunt, qui hominibus & multum prodest & incommodet.

A magnitudine symptomatum. ἱερὸν καὶ μέγα, ait Aretæus. Omne magnum sacrum dici consuevit. Sic & sacer ignis dicitur, morbus multorum generum, qui à Plinio recensentur: & os sacrum, id est, magnum atque latum, tribus ossibus simul coagmentatis constans. Et antiqui scriptores, quicquid ingens & præclarum habere uolebant, ἱεράν uocant, ut in nomine medicamenti, quod hiera uocant, apparet. Sacer uero morbus, ait Aretæus, etiam appellatur, eam ob causam, quod non humana ope tolli possit, sed diuina. Id uero rursus κατ' ἐξοχλῶν intelligi oportet. Nullus enim alioquin morbus est, qui sola ope humana tolli possit: diuinam opem non requirit. Nam ut Iob. 5. dicitur. Dominus ipse uulnerat & medetur. Et Hipp. libro de elegantia Medico. Omnes morbos, quos Medicina uincit, ope Deorum uincit.

Aut sacer, subdit Aretæus dicitur, quod Epilepticus demone correptus esse uideatur. Tanta enim symptomatum uehementia est, ut ex homine feram quandam, aut demonem terribilem faciant. Quam ob causam factum, ut in sacris literis lunaticus, & obsessus pro eodem sumi putentur: ut supra diximus.

Soticus morbus dicitur Plinio κατ' ἐξοχλῶν. Latini enim non tantum comitalem, sed & perpetuum quemcumque, nec certo tempore finiri solitum morbum, ob quem reus apud iudicem comparere non cogatur, soticum nominant, à sontibus, id est, nocentibus, quod perpetuo noceat, ac propterea hominem absentia excusans. Sic Germani simili ratione die schwere Franckheit & die schwere not appellant.

Vocant autem & S. Valens plag & S. Veits plag id est, plagam S. Valentini & S. Viti. As nomen quidem Valentini ad Germanicum fallen, id est, nomen caduci alludit: ut euphemie habeatur ratio. Nomen uero S. Viti ad solstitium æstiuum, in quod dies illi sacra olim incidit. Circa illud tempus enim maxime se hic morbus prodit, adeo ut tempore solstitiorum & æquinoctiorum Luna decrescente medicamenta Epilepsia aduersantia Medici prescribere soleant. Sunt uero & cause alie. Scribunt enim utrumque & D. Valentinum & D. Vitum hoc morbo affectos sanasse miraculo quodam: & creditum etiamnum sanari eo correptos, qui ad templa ipsius sanctis dicata peregrinationem instituerint.

Vocant



Vocat & S. Viti choreā S. Vitis tans, ejusmodi morbum, quo afflicti saltant, nec desinunt, donec ad S. Vitum ueniant: ex quibus multi antequam eò peruenire possint, concidunt & moriuntur.

Quod si nociferando clamorem edant, eam speciem Schreyend Vergicht, id est, clamorifam epilepsiam uocant.

IV. MELANCHOLIAE nomē à causa putata deductū est, ut ait Galenus. μέλαινα enim χολή, id est, atra bilis hunc affectū parit. Arcæus sic dictum existimat à χολή, id est, ira et μελαίνη, id est, permulta & efferata. Quidā enim, ait, non ex atra bile, sed aliunde ut ex ira efferata melancholici euadunt. Quod uerò τὸ μέλαινα efferatum denotet, Homeri auctoritate probare conatur. Caterum μέλαινας Φρένας ut & μέλαινας ὀδύνας alij de profundis accipiunt, eò quod talia atra esse soleant. Virung, tamen tolerari potest. Vt enim profundi dolores sunt acerbis: ita efferata ira in profundis præcordijs. Cælius Aurelianus paulò remouius melancholiam dictam putat, quod in ea humor niger uomatur. Galeno ἐξέσπας μελαγχολική, non qualibet melancholia est, sed furiosa & uehemens. Hinc μελαγχολικὴ & μελαγχολώδεις Aræto & μελαγχολικῶς ἐξέσπαστοι Hippocrati, qui hoc affectu laborant. Eisdem & Φυσώδεις, id est, flatuosos à ueteribus appellatos scribit Aræto, eò quod hic morbus flatum & ructus piscium odorem exhalantes pariat. Nūc isto nomine alius, isq̄, diuersus affectus denotari solet, à melancholia propriè sic dicta multum differens, qui melancholia hypochondriaca & flatuosa appellatur. Nam melancholia propriè sic dicta in cerebro sedem suā habet, & à succo frigido oritur. Hypochondriaca in hypochondrijs, qua Myrach Arabes uocant, residet, & à fumis malignis & acrioribus ad cerebrum elatis oritur. Hypochondriaca igitur & myrachialis dicitur. Arabes enim myrach uocant, id quod Græci hypochondria, totam nimirum uentris imi carnosam partem, qua membra nutritiōni destinata continet: sic dictum à Meri מֵרַח id est, altili, seu pecore, quod pinguescit: uel à Murah מֵרַח id est, ingluuie seu sinu gutturis, in quem aues cibum demittunt. Germ. **Eropff.** Græci hypochondria uocāt, quod τῷ χόνδρῳ ὑποκείσθαι, hoc est, cartilagini subjacet. Celsus præcordia uertit, quod circa uentriculū

sint, quem ueteres Græci καρδίαν appellarūt. Sed & flatuosi esse possunt, qui nō sunt hypochondriaci: quāuis hypochondriaci sine flatibus esse non possunt. Flatuosi igitur hoc loco σωεῦδοχικῶς intelligi debent. Nomen uerò melancholice significat propriè et impropriè. Propriè morbi nomen est. Impropriè μέλαινα uel μελαγχολικὸν χυμὸν, Latinis atrum uel melancholicum succum denotat. Est autem hic uel alimentarius, uel supernuacaneus. Alimentarius, quarta pars sanguinis est, aptus ad nutriendū. Supernuacaneus rursus aut naturalis, aut præternaturalis. Naturalis est, qui nō alit quidē, sed alios usus habet, estq̄, is qui ex massa sanguinis iam facta ad splenem deriuatur, et pars hujus ad uentriculum: aut qui in uenis cōtinetur, et cū lotio aut per cutē expellitur. Præternaturalis est, qui corrūpitur uel ex adustione, uel ex permixtione uinuis quatuor humorū. Est itaq̄, melancholia præternaturalis, adustus aut sanguis, aut pituita, aut melancholicus succus, & propriè atra bilis dicitur: permixta autē alienæ substantiæ, aut sanguinea est, aut pituitosa, aut biliosa, suntq̄, gradus quidā melacholice nō naturalis. Mitissima enim est à sanguine, ex bile omnium pessima: ex alijs medio modo se habet.

Rursus cum morbi nomen est, duplex illius genus est. Vnum, ubi per totū corpus sparsus est sanguis melancholicus, crassus, niger & feculentus. Alterū, ubi idē imbibitus est uentriculis et substantiæ cerebri reliquo corpore illaso. De hoc genere hic intelligitur. Id Latino uocabulo appellari non potest. Celsus tamen phrenitin & insaniam. Cicero furorē sed minus scite uertunt. Germ. **Melācholey / Schwarz geblüt / aberwitz** uocant.

Eodem modo melancholicorum nomen æquinocū est. Aut enim morbo ex atra bile orto laborantes denotat: aut sanos, in quibus melancholicus humor, isq̄, naturalis redundat, de quibus Hipp. l. 4. aph. 9.

Melancholicos uehementius per inferiora purgabis. Horum similiter uaria sunt genera, pro melancholici humoris uarietate. Sunt enim melancholicorū alij ueri, alij sanguinei, alij pituitosi, alij biliosi. Veri sunt à uera melancholia, quorū corpus siccum & musculosum, pilus niger, densus, asper, color similiter totius corporis niger. Sanguinei sunt à sanguine uel temperatè mixto, uel isto. Qui sunt à sanguine temperatè mixto, ualent



ualent ingenia & tales sunt eruditi omnes. Qui ab eodem usto, sunt flauo pilo sed albicante, rubras in facie multas habent pustulas & obnoxij delirio cum risu.

Pituitosi sunt à melancholia nimio phlegmate diluta, uel à pituita crassa, quæ etiã melancholia aliquando, eaq; asinina dicitur, quorũ ingenium hebes est, color corporis totius albicans, pilus item albus, tenuis et gracilis. Biliosi sunt ab adustione flaua bilis, uel à melancholia nimia bile diluta, qui furiosi sunt, pilo rufo & facie admodũ rufa, quales fuerũt Hercules Thebanus, Ajax Telamonius, quorũ ille prosiliit in rogũ ardentẽ in mōte Oeta: hic seipsum manu propria confodit.

V. MANIA, mania, à μανία, cuius futurũ μανῶ, deductum est, ut hoc à μάω, id est, λῆαν ἐπιθυμῶμαι, uehemẽter cupio, ut uult Eustathius: uel potius à radice Ham ἄν id est, tumultuari, per inuersionem literarum, unde etiam Gracum εἶμα, impetus. In bonã igitur & malam partem accipitur, tum pro assiduo labore uel assiduitate cum strepitu, ut cū μέλιος α μανιοῦ ἰδὴν dicitur in epigram. tum pro furibundo iracundoq; impetu, uel etiã quacunq; desipientia. Quo alludẽs Plato in Phadro duas μανίας agnoscit. Vnam ὑπὸ νοσημάτων αὐθροπῶν, id est, ab humanis morbis, de qua jam hic. Alteram ὑπὸ θείας ἐξαιτίας, hoc est, ex alienatione diuina, qua extra consuetum uitæ morẽ quis rapitur, cuius quatuor facit genera. ἐπιπνοίαν μανικὴν, τελεσικὴν, ποιητικὴν & ἐρωτικὴν. Est enim furor diuinus aut ab Apolline, cui tribuit ἐπιπνοίαν μανικὴν, inspirationem uaticinij: unde μαντικὴ dicitur, quasi μανικὴ interposito πῶ. Aut à Dionysio, quem τελεσικὴς mystica (τὰ πλὴν enim mysteria significat) autorem facit. Aut à Musis, quæ ποιητικὴ, id est, poetica dicitur, qualis fuit Orphei, Musæi, Lini, Tyrtæi, Aut à Venere & cupidine, quibus ἐρωτικὴν, id est, amatoriam maniam, omnium optimam dicauit. Hæc ille philosophicè, nec minus tamẽ Medicè, sic cum his, quæ ab Aretæo traduntur, conferantur. Omnis enim cognitio aut perficitur, aut ladirur. Si perficitur, ea diuino instinctui tribui debet, et prudentia Θεοδιδάκτος uel ἀποδιδάκτος, Platoni ἐνθουσιαστικὴ σοφία uocatur, qua sua sponte, non tamen sine impetu diuino, ad artem aliquam quis fertur, est ἤ, uel μαντικὴ, uel τελεσικὴ, uel ποιητικὴ, uel ἐρωτικὴ. Quidam enim euadunt

excellentes uates, ut Cocles præstans Chironomantes, nõ tam ex arte, quam ex instinctu diuino: quidam sacrorum mysteriorum periti, ut D. Bernhardus, qui literas suas in syluis & agris didicit, meditando sacra eloquia & orando, nec ullos unq; alios (ut idem de se testatur) habuit præceptores, quàm quercus & fagos. Quidam poeticam ueluti à Musis infusam norunt, ut Euages pastor diuino afflatus numine poeta euasit comicus. Quidam Astronomiam sine Doctore discunt: philosophiam possident à nemine traditam, ut ait Aretæus. Hanc enim Eroticam maniam & non illam obscenam uocat Plato: & hunc ardorem ex studijs natum Aurelianus protrepticum uocat.

Laditio cognitionis delirium dicitur. Laditur autem uel phantasia, uel cogitatio. Si phantasia, est uertigo uel melancholia. In uertigine homines putant omnia in circum uerti. In melancholia tam uaria imaginatio est, ut omnes illius species enumerari nequeant: sunt tamen quedam, quibus certa sunt indita nomina, ut hydrophobia, lycantropia, cucubut, iliscus. Hydrophobia est, cū demorsus à cane rabido falsam de aqua opinionem concipiunt, sibiq; ab illa adeo metuunt, ut refugiant potum, quanquam sit aqua eorum siccitati singulare remedium. Lycantropia, id est, lupina insania, in qua homines putant se esse lupos. Cucubut, cū quis à uiuis abhorret, et ad defunctos eorumq; sepulchra, uel, ut ait Aretæus, in solitudinem fugit, secumq; tantum modo uersatur. Compositũ à Choggab חגגב, timor: uel חגגב chagab, circumuinit in fissuris petrarum, & bod בוד intricatus est, ut nesciat quid sit faciendum. Iliscus est insania erotica, nata ex amore, de quo historiã Aretæus recitat. Nomen uerò compositum est ab Alah אלה plangere & אש ignis, quasi planctus ignis, id est, amoris. Sunt uerò plura genera, quorũ exempla aliqua autor recēset.

Si cogitatio ladirur, tum est uel cum febre, ut phrenitis: uel sine febre, ut mania. Quod si delirium sit paruum, aut breuiori tempore duret, αἰσθησις dicitur, qualis est ebriorum, terrore panico affectorum, ictorum, ex hæmorrhagia exanguium, mandragoram & altercum edentium. Si magnum, aut longiori tempore duret, αἰσθησις uocatur. In pueris & adolescentibus μωρωσις: in senibus λήρησις.

Rursus



Rursus mania varia diuisio est. Genus uerò
 πῦν, aut ait Aretæus. Ad tot uerò species re-
 duci potest, quot habet mania salutaris, ut sit
 alia μαρτυρική, alia πλεσικῆ, alia μολυσμική, alia
 ἰσχυρική. Furor enim affecti interdum futu-
 ra predicunt, propria membra dilacerat pia
 cogitatione Dijs suis tanquam id postulanti-
 bus, ut ait Aret. uersus poetarum recitant,
 linguis, quas nō didicerunt, loquuntur, libi-
 dine exardescunt, quæ omnia furore desinē-
 te desinunt. Magna itaq; inter melancholiā
 & maniam cognatio est: sed differunt. Nam,
 ut ait Aretæus, melancholia mania initium
 est & pars quædam: ut sit melancholia, re-
 missior & inchoata mania: mania, senior &
 consummata melancholia. Deinde in melā-
 cholia deprauatur imaginatio: in mania ju-
 dicialium. Sic enim Aret. ἡ μελαγχολία ἐστὶν
 ἀθυμία ἐπὶ μὴ φαντασία αὐτῶ πυρετῆ. μανία
 uerò ἐκ τῆς ἐξ ἰσχυρῆς ἐστὶν ἀθυμίας. Quapro-
 pter eadem ferè mania, quæ melancholia
 exempla esse uidentur, eò quod iudicium fal-
 sum sine imaginatione falsa raro contingit:
 contra iudicium illasum manere potest, quā-
 uis corrupta sit imaginatio, nisi affectus per-
 seueret diutius. Ex quo apparet melancholiā
 non esse mentis alienationem, ut quidam de-
 finiunt: nisi improprie, & ex consequenti.
 Mens enim ἡ ἰσχυρική imaginationem de-
 notat: & anterior cerebri pars ubi offensa
 diu durat, in qua φαντασίαν residere ajunt,
 simul partem mediam, ubi discursus est, affi-
 cit. Sed & illud sequitur, errare eos, qui me-
 lancholiam non esse iter in maniam contra
 rectius sentientes disputant.

Latinis mania sua lingua furor & rabies
 est, insania Cic. quasi insanitas & ægritudo
 animi. Valetudo & impotentia mentis Suet.
 mentis alienatio Plin. alijs delirium mania-
 cum. Germanis **Aberwitz** quod ex Græco
 ἀφροσύνη deductum uidetur. **Alberheit**
wansinnigkeit / **rasen vnd toben**: quæ
 nomina communia sunt phrenitidi & deli-
 rio. ἡ ἐπιφρεσικὴ appellari potest **ein wüs-
 tende vnd hefftige Melancholey**.

VI. Παράλυσις, paralysis, ἀπὸ τῆς ἀλύειν,
 quod resolvere, relaxare, remittere, effami-
 nare, eneruare significat. Est igitur paralysis
 in genere resolutio: κατ' ἔξοχὴν affectus, in
 quo nervi & musculi resoluuntur, id est, emol-
 liuntur, ne sua munia, quæ sunt sensus & mo-
 tus, exerceant. Sensus autem hic pro tactu
 ἐξαιρέτως accipitur, charactere nimirū ani-

malis proprio. Magna igitur inter apoplexiā
 & paralyin cognatio est, ad eò, ut Hippocra-
 tes sæpè crux apoplecticum dicat, quod pro-
 prie paralyticum uocari solet. Differunt au-
 tem hoc modo. Tactus & motus aboletur aut
 cum cogitatione aut sine cogitatione. Tactus
 & motus laesus cum cogitatione, apoplexia
 dicitur: in qua omnium principū animæ fa-
 cultatum, & omnium musculorum & ner-
 uorum ueluti resolutio est. Tactus & motus
 laesus sine cogitatione proprie paralysis uoca-
 tur, eaq; triplex. Læditur enim tactus et mo-
 tus uel seorsim uel conjunctim. Solus tactus
 abolitus constante motu, ἀνασθησία, id est,
 priuatio sensus dicitur. Solus motus abolitus
 seruato tamen sensu, simplex paralysis est.
 Vterq; & tactus & motus abolitus paralysis
 composita est. Exquisita est composita: im-
 perfecta ea, quam simplicem diximus: imper-
 fectissima, quam Aretæus & Galenus ut pa-
 ralyseos nomine indignā, potius ἀνασθησίαν
 id est, priuationem sensus appellandam judi-
 cant. Nam paralysis de motus potissimum
 amissione dicitur. Rursus paralysis tum ex-
 quisita, tum perfecta alia est totius corporis;
 alia partium. Resolutio totius corporis est;
 qua totum corpus immotum est excepto ca-
 pite, quod inflectitur & paralysis in genere
 dicitur. Resolutio partium, paraplegia Aretæo,
 alia certum nomen habet, alia caret no-
 mine, & paralysis uocatur, addito genitiuo,
 qui partem significat: estq; uel neruorū uel
 musculorum. Nam non soli nerui, sed etiam
 musculi sunt instrumenta motus: ita ut inta-
 ctis neruis passio aliquando musculos feriat:
 est etiam ubi utraq; affliguntur. Neruorum
 igitur respirationis resolutio uocatur apnæa:
 uocalium, aphonia: lingua, sermonis uitium.
 Musculorum colli uesicæ resolutio appellatur
 paresis Aretæo, estq; inuita urina, ut sedis
 musculorum resolutio, stercoris inuita deje-
 ctio. Aliarū uerò partium resolutio anonomos
 est: & periphrasi adjunctione partis ad ge-
 nus definitur. Potest autem resolui quacunq;
 pars tum externa, tum interna, particeps sen-
 sus & motus: uel seorsim, uel conjunctim,
 ut gena, supercilium, digitus, manus, crux,
 tonsilla, isthmus, stomachus, intestina.
 Sic Herophilum dicere solitum ajunt, eos,
 qui subito moriuntur perire paralyi cordis.
 Dicitur itaq; paralysis partis, ut cruris, digi-
 ti, supercilij: sed & genuum, quam peculiari
 nomine



nomine Aret. $\lambda\upsilon\pi\omicron\theta\upsilon\mu\acute{\iota}\lambda\omega$, id est, deliquium animi uocat ex consequenti. Resolutio uero cruris, $\sigma\kappa\alpha\lambda\epsilon\tau\acute{\upsilon}\rho\epsilon\eta$ uel $\sigma\kappa\alpha\lambda\omicron\tau\acute{\upsilon}\rho\epsilon\eta$ primum Germanici tēpore, dici capit, cum ille trans Rhenum exercitum duxisset. Vitio enim aqua milites, ut ait Plinius, duobus malis tentari caperunt, qua stomachacem & scelotyrbem uocarunt. De quo plura sub scorbuto.

Resolutio uero dimidij corporis peculiari nomine $\eta\mu\upsilon\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\alpha$, hemiplegia dicitur; est $\acute{\alpha}$ uel dextri uel sinistri lateris, totius uel partis. Totius est, cum pars dextra uel sinistra à uertice usq; ad pedes resoluitur. Partis est, cum pars dextra uel sinistra à capite usq; ad pedes sensu motuue priuatur.

Caterum partes, qua paraplegia occupantur, non omnes eodem modo affici obseruantur. Quaedam enim relaxata in longum porriguntur: quedam cum sint propter paralyzin breuiores, contrahuntur, nec extendi possunt, & quedam sana, quedam agrotæ sunt. Hinc fit, ut canina conuulsio, platycoria, mydriasis & uestica contractio inter paralyseos species tanquam effectus illius ab Aretæo ponantur. Sic in distentione oris est & conuulsio & resolutio. Relaxatur enim latus musculus faciei, qui paralyzi occupatur: contrahitur contra alter, qui non laborat, unde tortura oris. Vbiq; enim natura duos musculos sibi inuicem opposuit, ut in facie adductorem abductori, ut cum unus in se contrahitur, sitq; breuior, & partem cui inseritur uersus suam originem attrahit, alter tensus membrum relaxet: dumq; uicissim hic contrahitur & membrum retrahit, & ad priorem figuram reducit, prior iterum extensus membrum remittat. Quod si igitur unus laborat relaxatusq; est, trahere non potest: sed trahitur à sano, partemq; affectam ut contracta uideatur, efficit. Antagonistarum muscularum affectum in ore noscimus. Nam sana membra loquuntur, conuiuent, sentiunt, rident. Quare, scribit Aretæus, deprehenduntur loquendo, ridendo, conuiuendo. Nam in affecta parte labrum risu caret, & inter loquendum non mouetur, palpebra nõ uolubilis, oculus riget, nil sentiunt partes læsæ. Hac ideo. Nam decipiunt in canina conuulsione partes: eò quod integra spectantibus laborare uidentur. Eadem est ratio platycoriae & mydriaseos, uestica itē contractionis & relaxationis. Est autē pla-

tycoria, pupilla dilatatio, sic dicta $\delta\alpha\delta\omicron$ τῆς $\omega\lambda\alpha\tau\acute{\upsilon}\eta\tau\omicron\varsigma$, id est, dilatatione & $\chi\acute{\omicron}\sigma\eta\varsigma$, id est, pupilla $\mu\omega\delta\pi\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ Aretæo ejusdem $\Phi\theta\iota\omicron\varsigma$ seu contractio seu constrictio est, alijs idē quod $\omega\lambda\alpha\tau\upsilon\sigma\sigma\eta$: sic dicta uel $\delta\alpha\delta\omicron$ & $\acute{\alpha}\mu\omega\delta\pi\acute{\omega}\varsigma$ \omicron $\rho\acute{\alpha}\nu$, à uisu obscuriore, quasi $\acute{\alpha}\mu\omega\delta\pi\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$, uel $\delta\alpha\delta\omicron$ & $\mu\omega\delta\acute{\alpha}\nu$, quod pupilla superfluo redudet humore. Paresis uero uestica ab Aretæo huc quoq; refertur, qua hac & dilatatur & contrahitur, similiter ut oculus, sed & dissimiliter. Motus enim oculorum simpliciter uoluntarius est, & hic solus ad paralyzin propriè pertinet: motus uero ani & uestica, qui dejectio & mictio est, motus mixtus est, quem necessitas urgens requirit, qualis & respiratio est.

Caterum paresis interdum genus, interdum species est. Genus cum est, prætermisionē significat, ut cum ait Aretæus, $\omega\delta\gamma\lambda\omega\sigma\iota\varsigma$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\kappa\upsilon\eta\sigma\iota\omicron\varsigma$ $\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\nu$, $\epsilon\upsilon\epsilon\gamma\epsilon\iota\varsigma$ $\tau\epsilon$ $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\sigma\iota\varsigma$, paralyzis est motus tantum, actionisq; prætermissio: interpreti defectio: sic dicta à $\pi\epsilon\pi\acute{\iota}\mu\eta$, quod & admittere & dimittere & permittere & prætermittere, & relaxare & remittere & remissum reddere significat.

Species cum est, rursus aut relaxatio neruorum in genere est, nihilq; aliud quam paralyzis: aut relaxatio uestica, id est, fibrarum & musculi ceruicis uestica, quibus affectis fit resolutio. Sic enim Aretæus, $\kappa\upsilon\sigma\iota\omicron\varsigma$ η $\acute{\epsilon}\rho\omega\nu$ $\chi\acute{\epsilon}\sigma\iota\omicron\varsigma$ η $\acute{\alpha}\nu\epsilon\gamma\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$, $\pi\acute{\alpha}\rho\epsilon\sigma\iota\varsigma$ $\tau\epsilon$ $\chi\acute{\upsilon}\rho\iota\omicron\nu$. Nunc eo nomine quidam paralyzin ex colica ortam designare solent.

Similiter $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\zeta\acute{\iota}\alpha$ & $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\alpha$ interdum idē, interdum diuersa significant. Idem sunt, cum utrumq; usurpat Hippocrates pro paralyzi, qua apoplexia, uel epilepsia succedit, humore in aliquā ex non præcipuis partē depulso: sic dicta $\delta\alpha\delta\omicron$ & $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\sigma\epsilon\upsilon$ uel $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\eta\eta\upsilon$, quod est perperam pulsare citharam, aut aliud instrumentum Musicum, siue $\delta\alpha\delta\omicron$ & $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\eta\epsilon\omicron\zeta$, quod est, mente percelli. Hinc $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\zeta\eta\gamma\omicron\varsigma$, \omicron , mente captus & $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\kappa\upsilon\mu\acute{\alpha}$ $\acute{\epsilon}\iota\delta\epsilon\alpha$ uocat Aret. species paralyseos. Diuersa sunt, cum $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\gamma\acute{\iota}\alpha$ Galeno comment. 3. in lib. 1. prorrh. paralyzis est unius partis corporis qua, & $\eta\mu\upsilon\omega\lambda\eta\zeta\acute{\iota}\alpha$ peculiari nomine dicitur: $\omega\delta\gamma\omega\lambda\eta\zeta\acute{\iota}\alpha$ uero paralyzis est totius corporis, qua & uniuersalis, ut prior particularis appellari potest. Caterum utraque apoplexia & interdum epilepsia succedit.

Para-



Paraplexiam deniq, quidam pro apoplexia accipiunt. Barbari paralysisiam uocant. Scribonius siderationem neruorum. Germani das gegicht / parliß / lähme / constractur / Innio Schlag / tropff, qua nomina & apoplexia tribui solent.

VII. ΦΘΙΣΕΟΣ nomen interdum proprie: sepe promiscue & confuse sumitur. Proprie omnis corporis diminutio est: sic dicitur ἀσθενία & Φθίειν sine Φθίειν, quod utrunq, Φθίωθειν, id est, corrumpere & extenuare significat. Est autem alia totius corporis, alia partium. Phthisis totius corporis est lesa nutritio totius corporis, uitio uel epatis, uel splenis, uel cordis, uel pulmonis. Qua fit uitio epatis, ea triplex est, ἀσπερσία, δυσσπερσία & κακασπερσία (licet enim nouis uocabulis, perspicuitatis gratia uti.) Ἀσπερσία est, cum corpus uniuersum prorsus non alitur: δυσσπερσία, cum imbecilliter ac languide: κακασπερσία, cum male, unde κακασπεία, id est, uitiosus corporis habitus oritur. Vnaqueq, autem species maciem parit. Nam in atrophia & dystrophia alimentum non apponitur, quod natura requirit, cum semper aliquid decedat corpori, in cuius locum aliud succedat necesse est. In cacotrophia uero quod apponitur, id corruptum est, nec ueram, sed cadauerosam carnem parit. Quod igitur male nutrit, id nihil nutrire uidetur. Eadem est ratio splenis, de quo Hipp. lib. de locis in homine. πῶσι γὰρ αὐτῶν ὅτι πᾶσι θάλας κὶ τὸ σῶμα Φθίει. Ex iisdem nang, splen augetur, & corpus contabescit. Quae uitio cordis fit macies, & ex diuturnis febribus oritur, ea non improprie, ait Aretaeus, phthisis uocatur, quauis sicca tußis adsit, & pulmo ulcere careat. Quae uitio pulmonis fit tabes, duplex est. Pulmo enim afficitur aut ab ulcere tußiue diuturna, uel etiam reiectione sanguinis, purisue, & hac πύη & Φθίσις ab Aretaeo dicitur: aut à corrosione ex pure praterlapso, dum è thorace educitur, quae febrem conjunctam habet, & Φθὴν ab eodem nominatur. Ac πύη quidem, siue à πῶσι siue à πύον in genere masculino & neutro, quod pus siue sanguis putrefactus denotatur, unde πύωσις, suppuratio, & πύωδις, purulentus: cui oppositus ἀπύωσις, pure carens.

Φθὴν uero à Φθίω quod & Φθίω dicitur, labefacto & interimo. Vnde νεοΦθίωτος, nuper corruptus. πύη itaq, causam conjunctam,

Φθίσις & Φθὴν effectum, id est, morbum magnitudinis diminuta indicat. Plerumq, enim ἐκ τῆς ἀσθενείας sequitur τὸ Φθίειν, id est, ut scribit Hipp. 7. aph. 15. & 16. Sanguinis sputo puris sputum, & phthisis succedit. Sic Aretaeus. Alij phthoen à phthisi tanquam genus à specie separant: & phthoen omnem tabem uocant. Phthisin eam tantum, quae pulmonis ulcera remedijs non cedentia sequitur, & febrem lentam conjunctam habet: & sic in libris practicoꝝ usurpari solet.

Phthisis partium est lesa nutritio particularis, à certa parte quae tabescit, nomen accipiens, ut tabes pupilla, spina, dorsi, renum, coxae, & sic deinceps. Tabes pupilla est, cum pupilla arētē coit, ut stimulo similis fiat. Sic Φθωώδες ἰΦθαλμίας, id est, lippitudines, quae oculorum tabem aut extenuationem asferunt, consumto eorum humore, quod per immoderatas siccitates contingit, aph. 16. l. 3. Tabes spinae, Φθίσις ἀλάια, quā τὸ Φθῶδ' & ἀόρατον, tabem cecam & inconspicuam exponit Gal. in Exeg. ex lib. de locis in homine, cum in spinam aut medullam spinalem fluxio decumbit. Tabes dorsi, Φθίσις νοτιάς Hipp. l. 2. de morbis, quam τὸ ὄπισθεν Φθίον uocat lib. de locis in homine. Tabes renū, Φθίσις νεφρίτις, quae ex renum ulcere ortum ducit, lib. περὶ τῶν ἐν τῷ πνεύματι. Tabes coxae, Φθίσις ἰχθυαδική, coxaria, cum ex abscessu aut fluxione in coxendicem coxa emaciatur & gracilescit: crassa materia plurima repletis uenis, quae alimentum ad crus transferre nequeunt, in Coacis pranos. & lib. 1. de locis & lib. περὶ ἀδένων.

Ceterum à Φθίσει Φθίσις dicitur, quod nomē & phthisi correptos & ad phthisin natura pronos denotat. Eisdem & Φθινώδες & Φθινώτης & Περυσώδες & σενώδες uocant. Latini consumptos, alatos, & tabula ritu angustum thoracem habentes. Αἰετοὺς enim alam & σένωσις asserem siue tabulam significat. Alati autem dicuntur, quod scapulas nudas sine carne habent, & alarū instar prominentes retrorsumq, productas. Latini phthisin sua lingua tabem uocant. Germani schwind sucht / lügesucht / etrig sucht.

VIII. ΕΜΠΥΗΣ eadem cum πύη, de qua in phthisi diximus, origo est, diuersa tantū cōpositio, unde ἐμπύωσις et ἐμπύωσις de ducitur. Est igitur ἐμπύη, morbus, cū pus ex thorace aut latere proueniēs per pulmonē excreatur, ut capi-



ut capite precedenti definit Aret. ἐμπύημα uerò, cognatum illi nomen, collectio puris est, facta in quacungue corporis parte. οὐρανδοχικῶς autem effusio puris inter thoracem & pulmonem. Hoc igitur causam, illud morbum denotat. Pus uerò alij per os, alij per aluum deijciunt. Qui per os, empyi, id est, suppurati seu purulenti uocantur. Qui per aluum, ἀποσπματια, apostematia, id est, abscessu laborantes. Ἀποσπμα enim est abscessus siue humor in suppurationem conuersus, sic dictus ab ἀποσπμα, id est, separo, dirimo, absistere facio. In abscessu enim ea quae prius se contingebant, se inuicem separant. Latini suppurationem & excreationem purulentam uocant. Germ. Geschwâr der Brust.

IX. αἰματὴ τῶν πνεύμων ἀποσπμα, pulmonis abscessus. Latini uomicam uocant. Est enim ἀποσπμα & ἀποσπμα ut ejusdem originis, ita & significationis. Vomica autem Celso, Plinio, Iuuenali abscessus est malignus, latens, puris plenus. Differt ab empyemate, quod empyematis locus affectus, uacuum inter thoracem & pulmonem spatium est. Vomica pulmonis affecta pars pulmo est. Germanis Lungengeschwâr.

X. ΑΣΘΜΑ interdum genus, interdum species est. Cum genus est, omnem anhelitus difficultatem significat: sic dictum à uerbo ἀσ, id est, flo, spiro, uel ab ἀσθμ significante τὸ ἀποσπμα τῶν πνεύμων τῶν σπματι βαρῶν, id est, calidam expirationem confertim factam, seu frequentem & difficilem, qualis in cursu & uehementi exercitatione fieri solet. Cum species est, unam ex asthmatis in genere dicti speciebus differentiam denotat, ut Celso, qui tria deprauata respirationis genera recenset: dyspnaam, asthma & orthopnaam. Dyspnaa est, ait, difficultas spirandi modica, quae non strangulat. Asthma est uehementior, ut spirare aeger sine sono & anhelatione non possit. Orthopnaa est, cum nisi reecta ceruice spiritus trahitur. Aretao, ut & Galeno, orthopnaa peculiaris species non est, sed paroxysmus tantum asthmatis, cum in accessione huic affectui obnoxiy propter timorem suffocationis thoracem penitus erectum habere coguntur. Est uerò & dyspnaa nomen equiuocum. Interdum enim genus est, & omnem respirationem deprauatam comprehendit. Aliquando species est, & dif-

ficilem respirationem significat ex crassis & uiscidis humoribus ortam, qui bronchia pulmonum obstruunt, ut uult Gal. 7. de medic. secundum locos. Respirationis enim uel abolita, uel diminuta, uel deprauata est uarias ob causas, ut dicitur suo loco. Latini suspirium & difficultatem trahendi spiritum uocant. Orthopnaam Auerrhoes erectum anhelitum. Graci etiam mortis meditationem, ut scribit Seneca epist. 51. Qui enim difficile trahunt spiritum, subinde se morituros opinantur. Germani das Reichen.

XI. Τὸ πνεύμα δὲ πνεύματος, pneumodes τῶν πνεύμων. Pars enim affecta pulmo est. Estq; nihil aliud quàm asthma ortum ex humore crassiore & copiosiore, in naturam grandinis uel lapidis conuerso. Veterinary hunc morbum in brutis pulmoniam uocant. Frequenter enim in brutis: raro in homine contingit: unde factum ut pauci ex practicis hujus affectus mentionem faciant. Rarū itaq; est, quod de Ferdinando I M P. referunt, post mortem totum ejus pulmonem gypseum repertū esse. Causam reddit Arist. 10. problem. quod homo frequentissime tussiat, sicq; humores pectoris euacuat. Bruta autem, cum ferè non tussiant, humores retinent in pulmonibus, qui indurati hunc affectum pariunt.

XII. Ἡπαρ, epar, τῶν ἐπαιρεν, quod ἐπαιρεν, id est, extuberat. Figuram enim habet supernè gibberam: infernè cauam. Latinis jecur, quod ex Graco deductum uideatur: uel potius utrunq; ex Hebraico Peder ἵψ quod in genere exta, quae Graci ἀπλῶν uocant, denotat, id est, cor, jecur, pulmonem & lienem. Σωρανδοχικῶς autem epar tantum, cujus parenchyma omnium primū est, ad quod uena umbilicalis primum refundit sanguinem. Alterum enim cordis est: & hinc reliquorum uiscerum. Vnde & saepe apud Hipp. κατ' ἐξοχῶν hypochondrium dicitur: ut primum uiscerum sub diaphragmate & costis nothis sitorum. Germani ex eadem origine Leber uocant. Hoc igitur uiscus omni morborum generi obnoxium est, ex quibus unum tantum Aretaus hoc in loco explicat, nempe phlegmonem, id est, inflammationem, quae ἡπατις, id est, affectio epatica proprie dicitur. Est autem morbus & acutus & diuturnus. Acutus est, ubi intra dies 14. jugulat: & sic inter acutos

causis



causas & signa illius supra tradidit. Diuturnus est, ubi diutius durat, & uel suppurat uel in scirrhum mutatur: & sic hoc in loco explanationem illius instituit. Germani **Lebersucht** uocant.

XIII. Σ Π Α Η Ν cum Græco αὐλάγχρον cognationem habet, unum nimirum ex uisceribus, ὠδὸν ἤπαρ & ὠσπερ αἰτὶ ὄρον epati, ut ait autor libelli de respiratione: uel ut Aretæus, ἤπατι ἰσορροπον, epati æquilibre, non exquisitè tamen. Quibusdam enim paulò elatiorem, alijs decliuorem situm occupat. Quorum Hipp. sect. 2. lib. 6. Epid. meminit. Quibus lien deorsum uergit, his pedes & genua calent, nasus & aures frigent. Latinis lien ex Græco αὐλῶ deductū uidetur, nisi quis utrunq, ex Hebræo רֶלֶן, Heliz deriuare uelit, quod inter cetera deridere significat: unde Græcum γελᾶν & κατὰ γελᾶν, & Germ. **lachen**. Splen enim risus organum nominatur. Germ. **Wiltz**, quod ad Hebraicam originem quàm proximè accedit. Hoc autem uiscus, ut & epas, etsi omni morborum generi obnoxium sit: ex his tamen imprimis duos Aretæo describere uisum est, scirrhum & empyen. Scirrhus est tumor contumax & indomitus, durus instar lapidis. Empe est cum splen inflammatur & suppurat. Hippocrates ut & Aretæus, uidetur utrunq, genus morbi lienem: aut lienes appellasse, quia lien insigni tumore se prodit: ideoq, hoc affecti lienosi dici possunt. Quanquam Galenus lib. 9. κατὰ τόπος ita proprie dici uelit eos tantum, quibus lien induruit. Vtrog, autem morbo ex obstructione orto tum epas tum lien maximè infestatur, non ratione uel substantia, qua utriq, rarior est, uel uasorum, qua utrunq, ampla habet, sed ratione contenti humoris. Nam, ut inquit Gal. 13. Methodi, jecur naturaliter lutosum quippiam continet: & lien lutulento & crasso sanguine abundat. An uerò magni lienes Hippocratis idem sit morbus, qui nunc Scorbutus uel Schorbutus peregrino nomine uocatur, id controuersum est. Quidam negant. Pleriq, uerò nouum morbum esse affirmant, Hippocrati & Aretæo incognitum. Hoc igitur in loco ejus meminisse operæ precium uidetur, cum à liene ortum habeat, & ab Eleganti Medico non tantum communium & uulgò notorum contra naturam affectuum, qui uel à Græcis, uel ab

Arabibus describuntur, notitia requiratur: sed & deceat eundem eorum, qui rariius occurrunt, & miserè aliarum imprimis regionum incolas affligunt, dignotio. Nomen igitur scorbuti ex uernaculis uocibus **Schorbüch** & **Schorbeck** deriuatum esse constat, quorum utrunq, ex **Schus** oritur, quod lingua Danica & Belgica lancinationem & disruptionem, siue ulcerationem: & à **buck** in priore dictione, quod uentrem aluinum: in posteriore uerò à **beck**, quod buccam denotat. Germania superioris incolæ non dissimili origine **Schurmund**, quasi oris uitium: alij etiam **Schurbein** quasi cruris uitium uocant, ut & **Schurbauch** pro **Schurbuck**. Quæ nomina morbi hujus symptomata suis Etymologijs designant. In hoc enim affectu totus aluinus uenter, in quo uentriculus & hypochondria, torquentur, bucca ex pallescunt: gingiua à colore naturali mutata, tumida & laxa putrescunt, dentes nonnunquam uacillant, tandemq, excidunt cum fetore: pedes tument, cum nonnulla contractione: crura affliguntur maculis primum sanguinolentis, plerunq, liuidis aut purpureis. Quam ob causam Bataui etiam **blawschwitt** appellant. Quidam Latinis malunt uti uocabulis, deductis tamen ex Græca origine: & **scelotyrben** & **stomacacen** uocant, quorum illud à σκᾶλ & τὴν ἐσθῆν est, quasi cruris turba uel perturbatio: ut sit Germanicum **Schurbein**: hoc à σῆμα & κατὸν, quasi oris uitium, oscedo Marcello, ut sit Germanicū **Schurmund**. Scelotyrba uerò & stomacaca appellatio antiquior est, sed in alia significatione. Est enim species paralyseos, qua erectus homo ambulare non potest, sed sese modo in sinistrum, modo in dextrum latus inclinat, nonnunquam etiam pedem non attollit, sed instar locos acclines ascendenti attrahit. Cognati igitur morbi sunt **icterus niger**, **uoluulus hamatites**, **magni lienes Hippocratis** & **niger alphas**: cum partim consentiant, partim dissentiant. Scorbutus enim & **icterus niger** ex humore melancholico oritur: sed ille ex putrescente & contagioso: hic ex non putrescente, & qui per contagiū non manat latius. Scorbutus itaq, febris interdum lenta & erratica particeps est. Scorbutus & εἰλεῖ αἱματῆς Hipp. αἰτὶ τῶν ἐν τῷ πλῆθῶν uentrem aluinum lancinat. Sed

Ff ille



ille sine *αεθουμία*: hic cum *αεθουμία*. Sic enim Hipp. *αεθουμία* δὲ ἢ καὶ παλαιωρέειν *αεθουμία*, Ileo hamatite laborans ad deambulandum ac laborandum promptus est. Scorbutus & magni lienes Hippocratis malus gingiuas, os fatorem spirans, sanguinem ex aliqua parte prorumpentem, extenuationem & pedum ulcera ostentant: sed ille cum maculis, quae semper ferè efflorescunt: hi sine maculis crurum. Scorbutus & niger alphas, communes habent maculas: sed ille certam sedem seruantes, cum exulceratione cutis & febricula: hic mobiles ex uno loco & serpentes sine exulceratione cutis et febricula, sed cum stupore partium.

XIV. *ικτερίων*, sic dictus, ut ait Aretaeus, δὲ τῶν ικτερίων, id est, uinerris, quas aliqui Martes uocant, & syluestris mussele species est. His enim bestijs oculi colore luteo tincti sunt. Alij ab aue ictero dicta, galbula concolore deriuant, quae si spectetur sanari id malum traditur, & ipsa mori, ut tradit Oppianus & Plinius lib. 30. cap. 11. Hoc uerò nomen interdum genus, interdum species est. Genus est, cum biliosi humoris in superficiem uniuersi corporis effusionem denotat. Species est, cum effusionem tantum flaua bilis. Bilis enim duplex est: flaua & atra. Icterus igitur duplex est: niger & flauus. Nigrum ab atra bile ortum Arabes ictericiam nigrā seu uiridem appellant. Nigra enim bilis, ut ait Aretaeus, cum uiridi misceri solet: nec melancholicus humor simpliciter niger est, sed oleagineus. Hanc speciem icteri, ait Mercurialis, aut non nouit Celsus, aut saltem neglexit: meminit autem Aretaeus. Secunda species quae à flaua bile oritur multa habet nomina. Graeci enim uocant icterum, Latini arcuatum morbum, auriginem & regium morbum. Icterus enim proprie colore flauo est, instar oculorum ictidis. Aurigo Scribonio propter auri colorem, quem bilis toto diffusa corpore mentitur. Sed non hominem decet, ait Aretaeus, quod in lapide pulchrum fuerit. Arcuatus morbus Celso, à colore arcus caelestis amulo. Germani *geelsucht* uocant.

XV. *καχεξία*, *cachexia*, δὲ τῆς κακῆς ἕξως, id est, malo habitu, qui uel mentis est, uel corporis. Hic malum habitum corporis, id est, solidarum partium corporis deprauationem denotat, τῆς *κεξία* contrarium. Habitus enim corporis ipsa solida partes appellantur, quas continentia Hipp. uocauit.

Hic igitur deprauatur uel per se, uel per consensum. Per se, cum à naturali temperamento recedit, tertiamq; alimenti concoctionem, quae in ipso, hoc est, solidis partibus peragi debet, corrumpit. Per consensum est, cum uitio jecoris contingit: estq; uel indefinita totius corporis, uel definita certarum partium. Et rursus alia flatuosa, alia aquea, alia biliosa, alia melancholica. Flatuosa, *καχεξία* *φυσώδης* & *τομπανίτης* appellari potest. Aquea Galeno lib. 1. de alimentorum facultatibus de lente agēti, *hydrops* est, cum in aquam alimentum conuertitur. Biliosa & melancholica, ubi in bilem utramq; alimentum conuertitur, ex quo interdum icteri, psora, lepra, elephantiasis, uutiligo. Sunt uero cognati morbi atrophia & cachexia, & inter se ut effectus & causa differunt. Corrupto enim alimento corpus probe nutrirī non potest, ut cachexia atrophia succedat: eamq; ob causam Celsus libro tertio, *cachexiam* *tabis* speciem constituit, ut supra in phtisi diximus. Hinc *cachectus* Plinio et *cachecticus*, cui corpus macie conficitur. Galeno *καχεκτίας* & *καχεκτος*. Polybio uerò *μεταληπιώης* homo male mentis seu turbulentus & seditiosus. Quale enim corpus, talis mens ut plurimum. Germ. *Ein böse gestalt des leibs*. Cachexia partium est, ut cerebri & oculi & aliorum membrorum. In columi nang, reliquo corpore partium aliqua siue externa siue interna malo habitu laborare potest. Sic cerebrum quibusdam melancholicis *cachecticon* est: & ex longa lippitudine, ut ait Galenus, oculus *cachexia* inducitur. Praecipua uerò epatis *cachexia* est, quae uniuersalem totius corporis malum habitum efficit: ut particularem *cachexia* partium aliarum.

MORBI



MORBI DIVTVR. NI LIBRO SECUNDO.

I. ΤΑΡΩΨ cum accentu acuto, uel ὑδρωΨ cum graui tria significat, serosum humorem, morbum ex eodem ortum & hominem ex eo affectu laborantem. Exempla passim sunt obuia. Sic autem dicitur ab ὑδωρ, id est, aqua & ὤψ quod & oculum & aspectum significat, ut sit ὑδρωΨ quasi aspectus aquosus uel habens aquosum aspectum: ut αἰγίλωΨ, habens oculos caprinos: αἰμάλωΨ sanguineos, ut in suggillatione: δεινωΨ truces, ἐλωΨ uolubiles: ἐνωΨ pulchros: μύλωΨ coniuuantes, νεκρίλωΨ lusciosos. νώΨ imbecilles, χαράλωΨ letitiam præferentes designat. Sapius autem, ut hoc in loco, affectum præter naturam, in quo corpus aquoso humore abundat, illudq; in tumorem extollit, significat. Huius Aretæus quatuor: Stephanus Atheniensis quinque, species constituit. Intumescit enim, ait Aretæus, corpus uel totum, uel pars ejus. Si totum, id sit uel à pituita crassa & frigida, tumq; Φλεγματίας uocatur: uel à carne liquata in humorem sanguineum, aquosum & tenuem, tumq; anasarca dicitur. Si pars, ut abdomen, intumescit, id sit uel ab aquoso humore solo, tumq; ascites dicitur: uel à flatu multa aquæ permixto, tumq; tympanites nominatur. Stephanus uerò Atheniensis hac diuisione utitur. Intumescit aut uenter, aut caro. Si uenter, id est, spatium inter peritoneum & intestina, extollitur, uel sola aqua colligitur, & hydrops dicitur: uel flatu & aqua, ac si aqua superet, ascites uocatur. Si flatu, tympanites. Si caro intumescit: rursus uel sola aqua colligitur & fit anasarca: uel aqua cum flatu, & fit hydropisis. Pleriq; uerò Medici tres tantum species faciunt: Phlegmatiam, tympaniten & asciten. Hydrops enim proprie sit uitio epatis, estq; symptoma sanguificatricis facultatis, ex quo corpus repletur uel flatu, uel seroso humore, uel sanguine pituita crassa multum permixto. Si ex flatu sit tympanites: si ex seroso humore sit ascites: si ex sanguine pituitoso sit phlegmatias. Vel hoc modo. Tumor hydropicus aut est totius corporis, aut uentris tantum. Totius corporis hydrops, anasarca est. Ventris hydrops, aut

ascites aut tympanites est. Ascites est ab aquoso humore inter peritoneum & intestina. Tympanites est à flatu copiosiore, aqua pauciore. Hydropisis uerò Stephani & Anasarca tum Aretæi tum Stephani ad cachexiam referri potest, ortam ex continuis & longis febribus, nec tam uitio epatis sit quàm solidarum partium. Hydrops uerò Stephani, phlegmatias est. Caterum Φλεγματίας dicitur à redundate inq; totum corpus sparso phlegmate. Alij δὲ τοῦ Φλεγματίου appellare malunt, à colore pituitæ, qui albus est, uel saltem liuidus, humorum aliquorum admixtione, ut Gal. 7. aph. 29. asseruit. Appellant & quidam anasarcam nomine æquiuoco. Nã & cachexie speciem, de qua paulò ante dictum est; & phlegmatiam, propriam hydropis speciem, comprehendit. Hinc quidam anasarcam & leucophlegmatiam unum & eundem affectum esse uolunt. Anasarca autem dicitur quod humor pituitosus ἀνὰ σάρκα, id est, per carnem: ut hyposarca, sub carne: catasarca, juxta carnem in hoc affectu contineatur. Alijs simpliciter σαρκίτης, sarcites, & si paruus sit, Ἐπισαρκίδιον, episarcidion: item ὑποσαρκίδιον, hyposarcidion. Latinis proprie aqua intercus uel subtercus, quod humor aquosus per carnem & sub carnem uniuersi corporis passim diffundatur.

Ascίτης, Ascites uocatur, quod in toto abdomine, uelut ἀσκή, id est, utre, magna aquarum copia colligitur: uel quod cum eger in lecto se reuoluit, auditur fluctuatio: uel digito percussus in morem utris resonat.

Τυμπανίτης, tympanites appellatur, quod in eo abdomen percussum instar tympani sonat: uel flatu intus reclusus ex crebro motu ut tympanum sonum reddat. Alijs est τυμπανίτης. Aqua intercus sicca Hipp.

Rursus hydrops, cum morbum denotat: aut proprie significat, aut improprie. Proprie significat tumorem uel totius corporis, uel uentris, de quo hæctenus. Improprie est tumor aquosus alterius partis: ut pulmonis, uteri & testium, de quibus passim Hippocrates.

Ff 2 Græcè



Græci etiam hydropem ὑδρῶν, ὑδρῶσιον & ὑδρῶσιον uocant. παρῆχουον Aurelianus, quod sit manifesta quedam humorum inter peritonæum & intestina effusio. Latini hydropicum tumorem. Barbari hydropisiam. Hinc ὑδρῶσιον Hippocrati est aqua intercute laborare, aut corripit. Et ὑδρῶσιον, aqua intercute suffusi, qui & hydropici. Germanis die Wasser sucht.

XI. ΔΙΑΒΗΤΗΣ, diabetes, διὰ τῆς διαβάσεως, quod est, transire & diuarnicare. Interdum igitur circinum significat, à diuarnicatis cruribus: interdum siphonem, ut Columella. μεταφορικῶς hoc in loco morbum in quo potus liquor per urinam quasi per siphonem ac fistulam transiens sine dilatione egeritur, teste Aureliano. Aretæo διαβήτης est ὑπερβολὴ διαβήσεως, id est, trajector seu pertransiens, quod humor corporis nullo in loco consistat, sed subinde de loco in locum διαβήτης h. e. pertransit. Alij διαβάσιον etiam appellant: uel quod dipsadis fera reptilis morsum sequitur, ut ait Aretæus: uel διὰ τῆς διαβάσεως, ab immensa siti, quam inuehit. Quidam διαβήσεως, ὑδρῶν εἰς ἀκίδα, quasi hydropem matula: alij etiam διὰ τῆς διαβάσεως εἰς ἕρον, quasi urinae profusum, uentriculi intestinorumq; leuitati simile. Latini nullum illi peculiare nomen dederunt, quod simplex sit. Serenus urinae fluentum uocat poetice. Nec Hippocrates usquam nominat, non quod ignotus fuerit, sed quia raro contingere solet. Sed & Germanis est anonymos, quibus **der vngede wete harn** appellari potest.

III. Τὰ νεφρὰ νεφρῶν νεφρῶν, id est, renum affectus. Νεφρῶν renes dicti sunt à radice Nahar נַחַר quod est, fluxit, affluxit, profudit. Vnde Græcum νεφρῶν per transpositionem literarum oritur: nec latinum renes & riuus ab alia origine, quam uel ab Hebraico Nahar, uel Græco νεφρῶν descendit. Renes enim sunt quasi riuus, per quos serosi humoris sit profusio. Germanicum **Nieren** Hebraico quam Græco propius est, cū literarum nullam conuersionem faciat.

Duo sunt renes, ne uel uno obturato, expurgatio seri cessaret: uel quod cum paruus sint, & copiosissimo sero sanguis abundet, unus non sufficiat. Substantiā illorum Aretæus cum Hippocrate, inter glandulas collocat, quod multa humiditate, ut glandula,

oblectetur. Galenus inter parenchymata numerat, eam ob causam, quam Aretæus recitat, quod nimirum ut epæ rubeant. Figuram habent semilunæ. Aretæo similem testibus, sed latam magis & retortam. Incubant musculis lumborum (quos ὑποσῶν Græci uocant) unde si renes calculis infestentur, dolores lumborum circa ὑποσῶν excitantur, ut ait Aretæus: sed & crus è directo stupore torpet. Musculi enim illi cruri flexendo destituti sunt.


Partes illorum alia externa, alia interna sunt. Externa sunt, uasa & sinus. Vasa rursus alia ingredientia, alia egredientia. Ingredientia sunt, qua intra renum cauum se insinuant, suntq; uena emulgens & adiposa, arteria amplissima & nerui. De emulgente & adiposa, supra diximus, cum sint uena caua propagines. In adiposam uero sapè ramulus ab azygo diaphragma permeans inseritur, unde thoracis purulentia per renes expurgari potest, ut quidam iudicant. Arteria, arteriosum expurgat sanguinem, serumq; in arterijs copiosissimū in renes refundit. Nerui à stomachico orti ad renes feruntur, unde in nephritide fastidiū et uentriculi subuersio.

Egredientia sunt duo uasa insignia, alba, caua, arteriarum instar neruea, per qua renes in uesicam urinam expellunt: dicti ὑπερβολὴς ἢ νεφρῶν ὑπερβολὴς, id est, urinary meatus ab ἕρον, & νεφρῶν quod urinam feruent. Celsus uena alba, eaq; renibus singula. In uesica autem terga utring; se inserunt & quidem obliquè, ne quid inde sursum ad renes remeet. Aretæus ὑπερβολὴς, id est, canaliculos uocat instar fistularum formatos.

Sinus, Aretæo νεφρῶν, sunt caua, in quibus uasa in plures ramos diuiduntur, suntq; duo, maior & minor. Major est quam membrana quedam circumdat, qua cum instar cribrorum foraminibus sit peruia, serum à sanguine separat & transcolat in alterum sinum minorem tanquam cisternam, qua serum à sanguine separat excipit, exceptumq; uretere in uesicam refundit.

Sic Aretæus & Anatomici ferè omnes. Andreas Laurentius negat in homine sinus illos reperiri, seq; obseruasse ait, nullos emulgentium uasorum ramos in renum cauum manifeste permeare, aut cum illis, qui ab uretere oriuntur coire, sed per carunculas in renibus sparsas transcolari.

Aequa.



Aequalis uerò lotij à renibus in uescicā uia est, ut ait Aretæus. Existimauit enim renem unum alteri ex diametro ad angulos rectos opponi, ideoq̄ serum esse ἰσῖππομ. Obseruatum uerò est ab Anatomicis recentioribus, renem unum, siue dextrum, ut sensit Galenus: siue sinistrum, ut obseruauit A. Laurentius, altero esse semper dimidia sui parte, id est, duarum uertebRARUM spatio elatiore, ut si feri quædam portio quasi effrenata præterfluere, ea in alterius canalem incideret, utq̄, alter alterius tractui moram non afferret. Sinistrum autem elatiorem esse conuenit: & dextrum depressoem: quod ille sub liene, qui paruus est: hic sub epate, quod majus est, collocatur.

Renum igitur tum substantia, tum uasorum morbi duplices sunt, acuti & diurni. Acuti sunt: hæmorrhagia, febris & inflammatio, quorum autor supra causas & signa inter acutos tradidit. Longinqui sunt, apostemata, ulcera, calculi & hæmorrhoids.

Differunt autem hæmorrhagia & hæmorrhoids, quod illa sanguinis profluum copiosum & liberale est: hac profluum lentum et periodicum, hæmorrhoidum profluum simile.

Græcis νεφίτις quiuis affectus renum, siue similis, siue organicus, siue communis uocatur: propriè uerò calculus, ut aph. 31. l. 3. & aph. 11. lib. 6. quibus in locis pleriq̄, solum calculum renum, quidam promiscuè omnia renum uitia, ut ulcera, inflammationes, obstructions & dolores subaudiunt. Germanus ille *Niern wehes* hic *der stein* & *das griess*. Ex purulentis uerò renibus nata tabes, νεφίτις φθίσις appellatur ab Hippocrate libro πει τῶν ἐν τῷ νεφρῷ. Et nephritici dicuntur, qui ex renum siue uitio quocunq̄, siue peculiariter calculo laborant. IV. Τὰ ἐν κύστει πάθη, id est, uescica morbi.

ΚΥΣΤΙΣ aliàs in genere locus est & pellicula cui aliquid includitur, unde cista Latinis. Medicis uas urina expurganda destinatum est, idq̄ duplex, χοληδόχον & ὑποδόχον. Illud fellis, hoc urina conceptaculum. Illud sub fibris epatis delirescens: hoc in hypogastrio recto intestino connexum, idq̄, in uirus: faminis inter uterum & os pubis: illud cum adjectione, & usitatius uescicula fellis nomine diminutiuo, hoc κύστις absolutè dici solet. Partes uescicae duæ sunt: fundum & ceruix. In fundo urina continetur. Ceruix, quæ &

collum dicitur, canalis est à parte uescicæ anteriori aliquantum oblongata prodiens, maribus angustior & oblongior: faminis breuior & latior: munitus extrema sui parte sphinctere, id est, constrictore musculo: estq̄, aliquantum contortus.

ΚΥΣΤΙΣ autem dicitur à radice Koschesch *κυστις*, id est, collegit ex uarijs locis. Vesica enim urinam uelut laguncula quadam colligit, eamq̄, retinet ad tēpus, ne continenter & intempestiue eam reddere oporteat. Latini uescicam & matulam corporis uocant. Germani die *Blasen* & *Wasserblatzer*. Morbi illius similiter ut renū alij acuti, alij diurni. Acuti sunt inflammatio, ulcus, conuulsio, febris acuta. Diurni sunt uarij, inter quos Aretæo tantū quatuor: ulcus, abscessum, resolutionem & lapidem recensere libuit. Quorum neq̄, Latinis neq̄, Germanis peculiaria sunt nomina.

V. ΤΟΝΟΡΡΟΙΑ, gonorrhœa, quæ & γονόρροια dicitur, δὲ τῆς γονῆς καὶ πόρος, genitura profluum: ut αἰμόρροια, sanguinis profluum, πύρροια puris fluxus: cui contraria ἀρροία, priuatio profluum, imprimis menstruum. γονῆ autem propriè genituram, ut ἀρῆ quæ semen significat, quæ duo ratione quadam inter se differunt Arist. l. 1. de generatione animalium. Genitura enim ens naturale imperfectum est, proueniens à perfectis animalibus, quæ natura cœunt: semen uerò ens aliquod perfectum, tantum plantarum & animalium imperfectorum. Et gonorrhœatum propriè tum impropiè significat. Propriè perpetua seminis excretio est, sine pudendi tensione. Impropiè, ea quæ intento pudendo fit: ut in conuulsionibus. Rursus profluum genitura triplex: gonorrhœa simplex, gonorrhœa uirulenta & pollutio nocturna.

Gonorrhœa simplex est, inuoluntaria et indefinēs profusio genitura absq̄, uoluptate.

Gonorrhœa uirulenta est, ueluti genitura corrupta ac uirulenta profluum, natum ex fado concubitu.

Pollutio nocturna est, nocturnum & inuoluntarium genitura effluuium. Latini πύρροια profluum genitale. Barbari gonorrhœam uocant. Hoc uerò morbo affectus Græcis γονόρροια & γονόρροια dicitur.

VI. ΣΤΟΜΑΧΙΚΑ uel γαστρίκων παθήματα, stomachi affectus, δὲ τῆς γαστρίδος, sic dicti



quasi σῆμα χέτων, id est, orificium fundēs ali-
quid: aut σῆμα simpliciter, ut μόνυχος ex
μόνος per pleonasmum. σῆμα autem ipsum ex
Hebraeo Satam שַׁטָּם id est, obstruxit, dedu-
ctum esse uidetur. Quod enim occludi obtu-
rariq; solet, orificium est. Rursus stomachi
uox equiuoca duplicem significationem ha-
bet, unam propriam, alteram impropiam.
Proprie, angusta ceruix est instar isthmi ue-
tri cuiuslibet cauog, praeposita, estq; alia κώσ-
ως, collum aut ceruix uesicae: alia τῆς μήτρας,
collum aut ceruix uteri: alia κολίτης, ceruix
uentriculi. Exempla passim sunt apud Hip-
pocratem, qua collegit Fastus. Impropric &
κατ' ἐξοχὴν stomachus, ceruix seu collum
uentriculi totum est: & rursus σπυροδοχικῶς,
uel ipse uentriculus cum suo orificio, uel ori-
ficium illius superius, & sic hoc capite intel-
ligit Aretaeus. Collum uentriculi totum, pars
est inter fauces & orificium uentriculi me-
dia, quam ueteres œsophagum: qui post
Aristotelem scripserunt, stomachum:
Galenus atas gulam appellauit: ut testatur
ipse Galenus cap. 4. lib. 5. de locis affectis.
Lactantius cibalem fistulam. οἶον Φαγος au-
tem dicitur, quod tanquam infundibulum
ea qua eduntur, ferat.

Ventriculus ipse, Aretaeo κολίτη, de quo
sequenti capite, capacitas est illa, in qua tum
chyloses tum cruditates fiunt, & pituita co-
aceruatur. Ventriculos superius ob ampli-
tudinem κατ' ἐξοχὴν σῆμαχ & dicitur. Ve-
teres Medici καρδιαν, id est, cor dixerunt.
Hippocrates σῆθος, id est, pectus. Tam uicinū
enim cordi est, ut extremum cordis mucro-
nem tangere uideatur: aut saltem ab eo non
longè distet: idemq; sub medio pectore &
cartilagine xiphoidae continetur. Ex quo in-
telligi potest quod scripsit Aretaeus. μίσην ἐπι-
ζει τῷ πνεύμονι ἢ καρδίῃ: ἢ δὲ τῶν μεσῶν
τῶν σῆμαχων συνάμει.

Appellatur uerò orificium superius ad
differentiam alterius, quod inferius dicitur.
Superius est id de quo iam egimus. Inferius,
Graecis πύλωσ, Latinis janitor dicitur.
Cibum enim è uentriculo labentem, tan-
quam ostiarius quidam tandiu cohibet, do-
nec illum uentriculus elaborarit. Illud latius
& in sinistra parte spinam uersus situm est:
hoc angustius dextram sedem occupat. Et
uerò illud superius est respectu stomachi: ita

idem respectu gulae inferius, id est, pars gulae
inferior. Sic enim Plinio lib. 11. c. 37. sum-
mum gulae fauces uocantur, postremum sto-
machus.

Morbi igitur stomachi in hac ultima si-
gnificatione accepti, quos Aretaeus recenset,
sunt quatuor: ναυτίη, ἀπορίη, ἀλάδος, καρδι-
αλγία. Galeno similiter s. de loc. aff. 6. qua-
tuor sunt hi. Cardialgia, nausea, singultus
& omne genus uitiorum, qua circa appeti-
tum oriuntur.

Ναυτία & Ionicè ναυσία, continua & fre-
quens ad uomitum propensio est, quam ta-
men uomitus non sequitur: sic dicta ἀπὸ τῶν
ναυτῶν, id est, nautis. Proprie enim nauseam
significat, qua nauigantes in mari corrip-
untur. Impropric omnem nauseam. Graeci
etiam ἀναρρομήν uocant. Latini subuersio-
nem. Quidam tamen nauseam à subuersio-
ne separant, ut nausea sit qua ante cibum:
subuersio qua post cibum contingit. Latini
ἀεὶ Φερετικῶς appellant irritum uomendi
desiderium. Germani *Uckel*.

Ἀπορίη anxietas seu animi consternatio,
cognata lipothymia, cum ob nimiam inedi-
am deficiunt uires, aut ob intempestiuam ui-
ctus rationem eadem opprimuntur. Germa-
nis *die öde*. Ab ἀόση igitur Hippocratis
differt, qua & ipsa anxietas ab interpreti-
bus dicitur. Ea enim aestus seu incendium
quoddam oris uentriculi est, ob quod ager
non potest quiescere, sed modo hunc, modo
illum locum mutat. Aretaeus uerò cum ἀπο-
ρίη eandem facit, dum supra inter cholerae
symptomata ἐπιπέλω ponit. Ἄοση dicta est
ἀπὸ τῆς ἀόσειος significante, ἔπι πυρῶσ h. e.
ardere, καὶ τῆς ἀεσοκόρας ἢ ἐπαχθῶς ἀετι-
θεῶσ h. e. fastidio & molestia affectum esse,
ut ait Galenus ἐν τῆς γλώσσας. Rectius ue-
rò ab Hebraico *Esch* שֵׁשׁ deducitur, quod
ignem denotat, unde latinum *asso*, id est, si-
lum ad ignem teneo. Germani *dui Sod*
non dissimili forma uocant.

ΠΛΑΔΟΣ non tam morbi quam cause
nomen est. Significat enim in genere super-
fluum ac redundantem humiditatem, que
tum stomachum, tum partem quamcumq; re-
plet, & fluxam humoreq; flaccescentem red-
dit, & hinc languidam. Nomen deductum
ἀπὸ τῆς πλατύνειν, id est, dilatando. Aretaeo
etiam ἐκλυσις, id est, resolutio. Hinc itaq; re-
solutio *ferris*



ferri potest omne naturalis appetentia uitium. Attractrix enim facultas, per quam appetimus, aut abolita est, aut diminuta, aut deprauata. Abolita, ἀνορεξία. Deprauata, δυσορεξία. Deprauata κακορεξία uocatur.

Ανορεξία inappetentia est, cum nulla sit factio nec appetitus ullo modo percipitur. Hipp. Δυσορεξία.

Δυσορεξία est, cum aliqua sit, sed obscura factio, Latine appetitus dejectio. Hip. eos qui nihil appetunt uocat ἀσπίτας. ἀσπίτας uero, qui appetitū dejectū habent. In ἀνορεξία homines nec appetunt nec admittunt cibum. In δυσορεξία non appetunt quidem, non tamen respuunt. Trinusq; uitij species est μαλακία, id est, mollities seu laxitas, propter quam uentriculus nec cibos appetit nec continet.

ΚΑΚΟΡΕΞΙΑ est triplex: pica, fames & sitis immoderata.

Pica, Aristoteli κίονα, est appetitus praeter naturam in pregnantibus potissimum, ob quem res absurdas ut carbones, & calcem uiuam cupiunt. Sic dicta ab aue ejusdem nominis, qua terram comedit, & uarijs plumis ornatur. Hoc enim morbo affecti & terram & alias res uarias appetunt.

Fames immoderata est uel κυνώδης όρεξίς uel βελίμος.

Κυνώδης όρεξίς, caninus appetitus, est insatiabilis edendi cupiditas, in qua agri edunt multum, sed aut uomitu reuiciunt, aut per aluum excernunt, ut canes. Alij phagedaenam uocant.

Βελίμος est magna fames, quam animi deliquium sequitur: sic dicta à βε quod magnum & λιμός, quod famem denotat. Plutarchus πολυλίμων uocat.

Sitis immoderata est appetitus immoderatus materia potulenta ex tristi sensatione, ut definit Mercurialis.

ΚΑΡΔΙΑΛΓΙΑ sic dicta quasi αλγ & καρδιάς, quod sit dolor oris uentriculi, quod καρδιάς antiqui dixerunt, ut γλωσσάλγία, κηφαλάλγία, ὀδοντάλγία, ὠταλγία, id est, dolor linguae, capitis, dentium, aurium.

Cognata autem sunt nomina καρδιακή, καρδιαλγία & καρδιόγρη, qua interdum unam rem, id est, dolorem oris uentriculi, interdum diuersas res significat.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ enim καρδιακήσ in specie non quiniis dolor est, sed syncope, quam stomachicam uocant, quae uitio non cordis sed oris uentriculi contingit. Nam quae uitio cordis per se affecti sit, syncope cardiaca dicitur, ut supra annotauimus in syncope, morbo tertio acuto libri secundi. Germ. Was geschwäche & Herzwoche.

ΚΑΡΔΙΑΛΓΙΑ in specie est molestus uentriculi dolor cum nausea, ut Erotiano placet. Plinio rosio stomachi, alijs morsus oris uentriculi. Celso bilis uentriculi, ab anxietate differens. Nam anxietas sine dolore est, cardialgia cum dolore.

ΚΑΡΔΙΩΤΜΟΣ in specie cordis ipsius palpitatio est: sic dictus από τῆς καρδιώσεως, quod cordis dolorem sentire significat. & in hoc sensu Aretaeus quoq; hoc nomine utitur, ideoq; à uitijs oris uentriculi excludit. Germ. Herzjittern.

Singultus, quem Galenus nominat, Aretaeus omittit, motus conuulsiuus est, quo natura conatur expellere uitium quod siue toti uentriculo, siue ori uentriculi duntaxat, siue oesophago soli, qua proxime stomachum attingit, penitus impactum est, altiusq; in eorum tunicis insedit. Singultum enim Latini: ut & Graeci λύγχα & λύγμων à sono quem edit, uocant, ut & λύγχα singultirei Hebraei nomine generali Resach. נשף significante & respirationem & gemitum & singultum, à Resach deducto, id est, respirare & resocillari. Germani das schluckens den nosch / hixen hatsch.

Ad stomachum autem Galenus etiam refert omne genus uitiorum, quae circa appetitum oriuntur, eò quod orificium superius uentriculi propria appetentia sedes est, unde & solum exquisitissimo sensu praeditum esse solers natura uoluit, ut partium reliquarum omnium factum, alimento destitutarum persensatiret. Ea enim si & ipsa factio nis sensum similiter haberent, hanc uentris perpetuo tempore famis & sitis, essetq; animal in aeternam.

Ex stomacho laborantes σωμαχικοί in genere appellantur, siue prostratum appetitum habeant, siue post acceptum cibum grauitatem in ore uentriculi sentiant, siue nau-seent, alioque stomachi uitio affecti sint.



In specie ἀσώδεις ἀσὴ laborantes: ναυτιώδης, ναυ. εὐστ: καρδιακὸν, cardiaci, qui propter languorem oris uētriculi animo deficiunt et sudoribus resoluntur. καρδιαλγίαι, morsu oris uentriculi correpti, καρδιώδους quibus cor palpitat.

VII. ΚΟΙΛΙΑΣ Διάθεσις, affectus uentriculi Κοιλίης genus & species est. Primum enim in genere hac uoce omnis cavitās dicitur in profundo posita, ut cerebri, cordis, epatis & reliquarum partium.

Deinde in specie ἡ κοιλία cum articulo, alui uenter: ἰσθμὸς duplex, inferior & superior. Inferior ἡ κάτω κοιλία, totum spatium ab umbilico ad ossa pubis excurrēns est. Aristoteli & Aretaeο νεώτερη, alijs ἐπιτοκοιλία. Persio aqualiculus, alijs sumen aut rumen. Superior, ἡ ἄνω κοιλία, spatium à xyphoide cartilagine ferè ad umbilicū usq; extensum est, continetq; intra se epar, lienem & uentriculum, qui cum maximam prae reliquis cavitatē habeat ἡ ἄνω κοιλία, & simpliciter κοιλία ab Aretaeο appellatur. Alij similiter γαστήρ, id est, uentrem: latini sapius uentriculū nomine diminutiuo, ut sit γασπίδιον. Hoc igitur πεπτησίων ἀσπλάγχνον, ut autor definit, id est, uiscus coctioni prima, quae chylosis dicitur, destinatum, tum alijs morbis, tum diarrhaea & cæliaca laborare solet, de quibus hoc capite agit Aretaeus.

Διάρροια in genere profluuium est, in specie ὑγρῆς ἰσοφῆς ἀπὸ πλάτῃς ἡ Διάρροια, id est, liquidi alimenti incocti defluxio, ut ait autor Alimentū autē ἀπεπτηνόν est, quod formā chyli adeptum non est. Huius igitur effluxio aut est diarrhaea simpliciter aut cæliaca. Effectus autem utriusq; fluor duplex est. Syntecticus & sanguinolentus.

Diarrhaea simpliciter sic dicta est recens profluuium, quod non diu durauit. Profluuium alui & defluxio Aureliano, profluuium alui Colum. Germ. Durchlauff & Bauchflus.

Cæliaca est longior diarrhaea, sic dicta διὰ τὴν κοιλίαν, id est, uētriculo, quasi uētricularis. Aureliano uentriculosa passio & uentriculatio & longa alui resolutio. Hinc καρδιακὸν, qui uentriculi imbecillitate laborant. Aureliano uentriculosi.

Fluor syntecticus. dejectio biliosa, acris, fulua, graueolens, strigmentorum crassitudine olei, & pinguedinis aspectu: sic dictus

διὰ τῆς σαρτιζῆως, quod colliquationem significat, ex qua hic fluor oritur.

Fluor sanguinolentus, hamorrhagia Aretaeο, est cruenta dejectio, in qua sanguis flauus, purus, non permixtus excernitur.

Sic Aretaeus. Alij uero aliter his nominibus uti solent, quorum distinctionem hac ratione breuiter perspicuam reddemus. Aut alimenta exeunt, aut humores. Rursus alimenta exeunt, aut cruda aut cocta. Si cruda, id est, talia, ut assumpta sunt, fit fluxus lientericus & cæliacus, inter quae secundum magis & minus tantum differentia est. Lientericis enim prorsus cruda, protinus ussumpta sunt, infernè prodeunt: cæliacis semicocta, quaeq; in uentriculo diutius morantur. Si cocta, tum id uel nutritioni destinatum, uel excrementum est.

Si nutritioni destinatum est, id uel chylus erit, uel sanguis, uel secunda humiditates. Si excrementum est, id uel prima coctionis erit, ut faeces: uel secunda coctionis siue renue ut bilis, siue crassum, ut melancholia: uel tertia coctionis, ut ichor: unde sudor & mador.

Chylus si exeat, est fluxus chylosus, in quo alba quidem, sed crassa excernuntur.

Sanguis si exeat, est fluor sanguinus, qui uel hamorrhagia, ut Aretaeus appellat, uel dysenteria uoce largiore dicitur.

Secunda humiditates si exeant, erit fluor syntecticus, id est, colliquatiuus, de quo etiam Aretaeus.

Feces si exeant, erit stercoraria dejectio, quae & fluxus stercoralis dicitur.

Bilis uel melancholia si exeat, erit diarrhaea, eaq; duplex: biliosa & melancholica. Communi uoce profluuium: alijs fluor humoralis.

Tertia coctionis, si exeat, cū ichor sit sanguis serosus, erit fluor ichorosus, qui sub hamorrhagia comprehendī potest.

Eodem modo humores exeunt aut crudi, aut cocti: & hi rursus aut putres, aut semiputres. Crudus humor est pituita. Semiputris est pus. Putris est causa conjuncta febrili, eaq; uel in uenis, ut in febre continua, uel extra uenas, ut in febre intermittente.

Si igitur pituita exeat, erit pituitosa dejectio, quae sub diarrhaea continetur: estq; uel stomachica, uel cephalica. Manat enim aut à uentriculo & intestinis, uitio prima coctio-

nis: aut



nis: aut à cerebro, catarrho per gulã in alui descēdēte. Est uerò stomachica, diurna: ut cephalica nocturna diarrhœa, eò quod catarrhus uesp̄ri cōmouetur, à quo fluor cephalicus. Pituita uerò motus in uētriculo interdū.

Si pus exeat, erit fluxus purulentus, ut in tumoribus.

Si materia putrida, erit fluxus criticus, ut in febribus.

Diarrhœa igitur & caliacæ nomen equiuocum est, & aliter utrumq; Aretæus, alij aliter accipiunt. Eadem est ratio dysenteria & lienteria, quæ & ipsa autor aliter quàm alij intelligunt. Hac autem ut facilius & altius animis insigi possint, rem totam breuiter sic expediemus.

Omnis alui fluxus aut sine ulceratione, aut cum ulceratione est. Quæ sine ulceratione est, diarrhœa & caliacæ dicitur. Sic enim autor definit. Medic. Διάρροια ἐστὶν ρευματισμὸς πολλῶν κολίως ἀνὸ φλεγμονῆς καὶ ἐκώσεως πολλῶνι, id est, copiosa & diuturna alui fluxus sine inflammatione & ulceratione. Quæ cum ulceratione est, dysenteria & lienteria uocatur: quorum eadem inter se ratio est, quæ inter diarrhœam & caliacam. Vt enim caliacæ succedit diarrhœæ: ita lienteria dysenteriam sequitur, ut uult Aretæus. Idem uerò ab autore definitionum in eo discrepat, quod diarrhœam Aretæus ὀλιγορροίον: hic πολλορροίον uocat.

VIII. ΚΩΛΙΚΟΙ, id est, plenioris intestini morbo laborantes, ut uertit interpret: Colica enim nomen quod nunc usitatum est, nec Hippocrates, nec Aretæus habet: concretum tantum & non abstractum nominans. Nouū enim id est, & tempore Tiberij Cesaris primum innotuit, ut supra in ileo diximus. Quod uerò nunc colicam uocamus, id ueteres in genere ileon nominarunt. Colica dicta est ἀπὸ τῆς κώλης, nomine ualdè equiuoco. Nā & genus & speciem significat in arte Medica (Habent enim & Rhetores & Poëta & piscatores sua κώλη) Genus cū est omne mēbrum denotat. Species cum est, rursus uaria significat. Eustathius pro pede accipit: ut & Pollux pro membro, quod ex femore tantum & crure cōstat. Alij generalius pro artubus, ut sunt crura & lacerti. Hoc in loco crassum intestinum est, sic dictum quasi κώλον, id est, cauum quod sinus habeat quam plurimos. Hinc Aristoteles laxū uocat. Celsus intestinū laxius et plenius. Arabes Cellulatum. Pluri-

mis enim quasi cellulis discretum—exturmescit, & concamerata habet innolucra, in quibus feces figurantur.

Ab hoc igitur intestino κωλικὸς adiectiuū deducitur, quod & ipsum duas res diuersas significat: nempe & id quod ad coli dolorem pertinet: & hominem coli dolore affectum. Ex prima significatione κωλικὴ ὀδύνη, & κωλικὸν ἄλγος, coli dolor, & κωλικὸν Φάρμακον & κωλικὴ ἀντιδοσις, medicamentum ad sedandū coli dolorem comparatū, derivatur. In altera significatione κωλικὸς hoc in loco autor intelligit, id est, intestini plenioris morbo laborātes. Et hæc est propria utriusq; acceptio. Est uerò & alia impropria. Κωλικὸν enim ὀδύνην Græci uocat, non tantum dolorē crassi intestini κώλον appellati: sed & uehementissimos quosq; dolores, in quibuscunq; uentris partibus. Sic κωλικὸν Φάρμακον medicamentum non tantū ad colicos, sed alios etiā morbos, sedandi doloris causa adhibitū, aliās ἀνωδύνον dici solitum. Affectus enim colicus maximos dolores habet, quos qui sedat, is quoscunq; alios simili modo sedare potest. Est uerò colon præ cæteris intestinis obnoxium magnis doloribus, duas ob causas. Nam primum ualdè ampliū est: unde pituita, quæ in eo generatur, frigescit, & uitrea euadit: deinde ab infernis partibus aërem recipit, unde flatus, qui & ipsi in eo generantur, augetur. Cætera uerò intestina cum tenuia sint, pituitam, quæ in ijs remanet, ob loci angustiā & uenarum multitudinem non difficulter percoquunt.

Vulgus colicam simpliciter, & colicum dolorem uocat. Quidam uernacula lingua die Quetter, id est, matricis affectum, quamuis perperam, non tamen sine exemplo ueterum. Neg, enim inusitatum est, ut affectus aliquis diuersas partes occupans, eadem uerò symptomata producat & eandē curandi methodū postulās, idē nomen habeat. Sic ueteres ilei & colon appellati intestini cōmunē affectū fecerūt. Et Aretæus hoc capite eīδὸν morbum & strophum in colicis excitari posse affirmat. Eadē licentia ueteres phthisin appellant tum utram tabem, quæ pulmonis ulcus sequitur: tum quamcunq; corporis extenuationem. Exempla alia sunt in alijs morbis. Similiter colicus dolor uterinus dicitur, quod laborante utero, intestina quoque laborent: & contra intestinū male



malè affectis, uterus quoq; malè affici solet. Quod uerò nomen habet in mulieribus, idē in uiris colico dolore affectis retinet.

Caterum cum εἰλεὼν & σπασμὸν in colicis excitari posse ait Aretæus, intelligit quadam & εἰλεὼς & σπασμὸς symptomata, ut retractionem intestinorum & stercoris per os rejectionem, quæ tamen non contingunt semper, sed ijs tantum, quibus mors jam imminet, ut idem testatur.

IX. ΔΥΣΣΕΝΤΕΡΙΑ, id est, difficultas intestinorum. δὺς enim difficultatem, & ἐν-περ, intestina Græcis significant: sic dicta ὠδὴ καὶ ἐν τῷ σπλάχνῳ, quod intra corpus stent atq; insint. Comicis eandem ob causam interanea. Sunt autem intestina membranacei canales à uentriculo exorti, & hinc flexuosis gyris & anfractibus per totum imum uentrem ad anum usq; continua textura procedentes: ut cibos aliquantulum coquant, distribuunt in jecur chylum, & reliquias per sedem deiciant. Vnum igitur illorum corpus est & continuum, sed in diuersas partes distinctum, ratione situs & habitus.

Ratione situs, alia τὰ ἄνω sunt, alia τὰ κάτω. τὰ ἄνω sunt superiora à uentriculo ad cecum usq; intestinum, quæ & ἀραιὰ & λεπλά & στενὰ, id est, tenuia, gracilia uel appellant. Aretæus χολώδεα, id est, biliosa & hinc præcis χολώδες dictas asserit. Germani hinc **Kaldaumen** uocant. Plautus lactes: præcis pantes: suntq; hæc iterum tria, δωδεκάδακτυλον, νήσις & εἰλεὼς, duodenum, jejunum, ileon.

Τὰ κάτω sunt inferiora à cæco, usq; ad intestini recti initium, quæ & παχέα & σπικώδεα, id est, crassa & carnosæ uocant, Aristoteles pinguia: suntq; & ipsa tria, τοφλόν, κώλον. Lib. Cecum, colon, rectum.

Superiora uerò & inferiora illa sunt in brutis & hominibus diuersa ratione. Nam in canibus & plerisq; quadrupedibus (quorum anatomia præcis, ex quibus Aretæus, & non humanorum corporum periti fuerunt) superiora superiorem: inferiora inferiorem locum obtinent, tum exortu tum processu: in hominibus uerò res aliter se habet. Nam ileon, unum ex superioribus intestinibus subter umbilicum ortum suis gyris & anfractibus ad caua osium ilium utriusq; & hinc ad caua osium pubis supra uesticam se diffundit, adeo ut hoc solum in en-

terocæle in scrotum delabi soleat: cæcum & colon, quæ sunt inferiora, nõ item. Colon uerò, unum ex inferioribus suo processu omnium supremum est. Nam à rene dextro incipiens sursum reflexum ad cauum jecoris ascendit, indeq; subter fundum uentriculi & supra gracilia intestina progrediens, ad cauum lienis peruenit, à quo ad renem sinistrum delapsum, & ab hoc iterum reflexum ad summum os sacri finitur.

Quod si igitur situm intestinorum in hominibus spectemus exactius: non male alia extrema, alia media dicemus. Extrema sunt crassa: media sunt tenuia. Mira enim natura prouidentia tenuia, quæ chylo coquendo & distribuendo destinata sunt, nobiliorem, id est, medium locum obtinent: crassa fecibus continendis dicata, ne comprimantur, utq; tenuia seimenti instar obuallent, in ambitu collocata sunt.

Ratione habitus, intestinorum aliud substantia est, aliud adjunctum. Substantia constat ex duabus tunicis, quarum una interior, altera exterior,

Interior rugosa est, & conspersa fibris uarijs, plerisq; obliquis.

Exterior est carnosior, & fibris constat magna ex parte transfuersis.

Adjunctum duplex est: aliud tunica interioris, aliud exterioris. Adjunctum tunica interioris in concava superficie intestinorum aliud crusta est, aliud adeps. Crusta est quadam epidermis, quæ moderatè delabentem chylum moratur. Adeps est siue mucus in gracilibus intestinis, siue pinguedo in crassis quæ intestina oboluit, ne asperitas excrementorum offendat.

Adjunctum tunica exterioris in conuexa superficie intestinorum, aliud tunica araneosa est, aliud tunica cõmunis. Araneosa est fibris rectis prædita tam tenuis, ut oculis lynceis uix animaduerti possit. Communis est, quæ à peritoneo accepta tunicam exteriorē intestinibus propriam undiquaq; obducit. Inseruntur uerò intestinibus præterea uena, arteria & nerui. Vena chylum ab intestinis in epar uehunt: & à jecore in intestina sanguinem refundunt. Arteria sanguine uitali intestina perfundunt, & motu assiduo concutiunt, ne putrescant. Nerui intestinibus sensum impertiunt, ut res graues & molestas excitata uel expultrice protrudendo deiciant.

Horum.

Horum igitur intestinorum tam superiorum, quam inferiorum, ut uocat Aretæus, morbus dysenteria est, cuius uaria significatio est: alia communis, alia propria.

Communis est, cum quoduis alui profluuium denotat, & sic Hipp. intelligit libro secundo Epid. Id enim solum Etymologia nominis innuere uidetur.

Propria est, cum pro sanguinis per aluum excretionem accipitur, qua duplex est: una sine ulcere, altera cum ulcere. Dysenteria sine ulcere rursus triplex est: αἱμάτη. ἡπατίτης & ἀνώρου.

Αἱμάτη est, que fit propter boni sanguinis copiam in toto corpore aucti, qui ex uenarum orificijs in intestina apertis effunditur.

ἡπατίτης uel αἱματώδης est, cum propter jecoris imbecillitatem aquosus sanguis deijcitur, lotura carniū persimilis.

Ανώρου est, cum sanguis propter bilis flaua uel atra permissionem acrior, uenarum orificia aperit, & per intestina fertur.

Dysenteria cum ulcere est ἔλκωσις ἐντέγων, id est, intestinorum siue abrasio siue exulceratio, quam hoc in loco Aretæus intelligit: est ἄλῃα intestinorum consideratorū secundum situm, alia secundum habitum.

Exulceratio intestinorum consideratorum secundum situm alia est superiorum, ut duodeni, jejuni, ilei. Alia inferiorum, ut caci, coli, recti. Alia omnium simul.

Abrasio intestinorum consideratorum secundum habitum, alia est adipis, alia crusta, alia tunica interioris, alia tunica exterioris. Quatuor itaq; sunt gradus dysenteria, quos ulcerum nomine uocat Aretæus.

Primus est abrasio adipis, quam Arabes fluxum mucosum: Aretæus eam, qua in recto intestino fit, τερεσμῶν uocat.

Secundus est, ubi ulcus paruum profundum est, id est, crusta tantum ex aluo excidit.

Tertius est, ubi ulcus magis profundum est, id est, tunicam utramq; attingit, unde & sanguis & sanies emanat.

Quartus est, ubi ulcus non tantum profundum & depascens est, sed & inaequale & instar gemmae arboris callosum.

Celsus dysenteriam tormina uocat, quod homines torqueat. Germani similiter generali appellatione bauchgrimmen.

Specialius uerò rotschad & rote ruhr / quasi rubrū malum & rubrum profluuium. Δυσεντερικός & Δυσέντερος. Dysentericus, qui dysenteria laborat.

Τερεσμῶσις δὲ τὸ τὸ μῶσιον, ὁ πένανθι, ἐκτείνεσθαι τε ἢ πρὸς ἐκκρίσεις ἐκτείνεσθαι, quod locus affectus extenditur, & ad excretionem uī cogitur, ut tradit Actuarius. Latinis ex Græco tenesmus & tenasmus, Plinio τένεσμόςος crebra & inanis desidendi uoluntas. Græcis etiam eandem ob causam Νέστιος & Νεσπός. Germanis der zwang / das trucken / das cringen. τερεσμῶδης, tenesmo similis, uel homo tenesmo laborans. Hinc τερεσμῶδεια, excrementa qualia in tenesmo egeruntur, hoc est, pauca, mucosa & acrida.

X. ΔΕΙΗΝΤΕΡΙΑ, id est, leuitas intestinorum, sic dicta ἀπὸ τῆς λεϊότητος τῶν ἐντέγων, id est, equabili superficie intestinorū.

Affectus enim hic est continendi chyli impotentia, cum is cito rejicitur, nullam in intestinis moram trahens. Est ἄλῃα duplex: alia cum cicatrice, alia sine cicatrice. Quae cum cicatrice est, dysenteriam sequitur, id est, exulcerationem. Quae sine cicatrice est, ex assidua egerendi consuetudine oritur, ut ait Aretæus: uel etiam ex humore quodam glutinoso interna toti tunica intestinorum obducto, quod saepius contingit. Est igitur hienteria uocabulum ambiguum. Supra enim inter uitia uentriculi, id est, symptomata concoctricis facultatis recensuimus, communem loquendi usum imitantes: nunc auctoritatem Aretæi secuti pro uitio intestinorum, id est, symptomate retentricis facultatis illorum accipimus: que significatio Etymologia nominis magis congruit. Nostri in genere uocant den bauchflus & die rhr.

XI. ΤΣΤΕΡΙΚΑ, id est, uitia uteri. Est enim uterus, ut ait Aretæus, ἔμφορὴν νόσων πυρίων τε ἢ κραιῶν, id est, acerrum morborum infinitorum malorumq; congerit. Quod quidem κατ' ἐξοχὴν intelligi debet. Neg, enim ulla pars corporis humani est, que nō omni morborū generi, simile, organico, cōmuni, obnoxia sit: uterus uerò omnium maximè. Quae enī uitia habet, nō soli nocēt, sed toti corpori: nec partū tantū inquinant, sed & omnes facultates exolluunt, naturalem, uitalē,



uitalem, animale. Quod exploratum habes Hippocrates. præclare scripsit libro de locis in homine. Αἱ ὑστέραι πάντων τῶν νοσημάτων αἰτίαι εἰσὶν. Uteri muliebrium omnium morborum causa sunt. Sunt autem morbi illius duplices: alij acuti, alij diurni. De acutis supra. Diurni, quorum hic locus est, isti sunt. ῥόος, ἔλκμα, σκληρίη, πρῶτος. ῥόος ἢ ῥόος nomen equiuocum est, quod & genus & speciem passim significat.

Genus est, cum pro fluxu quocumq; ponitur, & sic aliquando pro alui profluuiio.

Species est, cum interdum pro menstrua purgatione: sapius autem pro muliebri fluore accipitur: qua duo multum inter se differunt. Menstrua enim purgatio est, cum fluit sanguis mensuris periodis. Hanc Graeci distinctius uocant ἐμμηνον καὶ ἄρρον. Muliebris fluor est cum ferè assidue & inordinatè sanguis per uterum fluit. Hunc antiqui ῥόον simpliciter uocant: alij ῥόον γυναικῆον & ῥῶν τῆς ὑστέραις, fluxum muliebrem et fluxum uterinum: & sic hoc in loco Aret. intelligit. Rursus menstrua purgatio duplex est: moderata & immoderata. Moderata est, cum sanguis in debita quantitate et qualitate fluit. Immoderata, cum maiore, quam solet, copia fluit. Vtrig; opposita est ἀρρῶν, id est, suppressio menstruorum. Fluor uerò muliebris alias species habet. Alius enim ἰσθηρῶς, alius λεκῶς appellatur.

ἰσθηρῶς est ruber, cum sanguis emanat, isq; ratione substantiae uel tenuis, uel crassus & concretus, ut grumi. Ratione coloris, uel flauus, uel liuidus, uel niger.

λεκῶς est albus, isq; iterum duplex: unus propriè, alter impropriè sic dictus. Propriè sic dictus est, cum album serum aut pus effluit, idq; utrunq; uel sincerum uel mixtū. Impropriè sic dictus est gonorrhœa muliebris, id est, inuoluntaria in feminis genitura excretio. Neq; enim tantum mas, sed & mulier hoc morbo laborat, cum & ipsa semen suum habeat, quamuis Aretæus, id affirmare nolit, feminis non γυνῶν sed γυναικῶν attribuens. Nec raro accidit, ut Medici fallantur, opinantes profusionem esse seminis, cum sit aliorum excrementorum fluxio, quibus mulieres naturâ frigidiores abundant, præsertim si sit diurnior & maciem non inferat. Neq; enim fieri potest, ut durante diutius

uero seminis profluuiio, corpus non consumatur & tabescat.

Vulgus alba menstrua appellat omnem fluorem muliebrem, nec omninò malè. Nullus enim tam ruber est, qui alba excrementa sibi commixta non habeat. Germani das weis̄ gesicht.

ἔλκμα sunt ulcera, qua tum corpus uteri, tum ceruicem imprimis & collum sapius inuadunt, suntq; uaria, alia mitia, alia immittia. Mitium rursus aliud superficialium, aliud profundius. Superficialium est excoriatio cum pure pauco & inodoro. Profundius est exulceratio cum pure copiosiore & graueolente, dolare uerò paruo. Immitte est Φαγδαίνη, sic dictum ἔκτο & Φάγεω, id est edèdo. Profundum enim ulcus est, quod ab agris particulis ad integras pascendo pergit, ab herpete differens. Φάγαμα enim (quod nomen illi equipollet) cum cute etiam subiectam carnem attingit: herpes solam cutem exulcerat, phagedæna initium. Germ. Ein böß vmb sich freßend Geschwâr / cancri genus Celso.

σκληρίη est durities, ut scirrhus & cancer. Neq; enim cancer, ut ait Aretæus, ulcus est, sed tumor durus & indomitus, cum uenis turgentibus & proximas simul partes distenditibus: sic dictus quod cancro sit similis. Tumor enim ipse tactui renitens cancri corpus durum & asperum: uena turgentibus non tantum formam pedum referunt, sed & cæcri malitiam. Ut enim cancer animal, quod forpibus suis semel cepit, non facile dimittit: ita tumor cancriosus, ubi semel radices egit, difficulter euelli, tolliq; potest. Duplex autem cancer est, unus ἀνέλκωτος, alter ἔλκωτος. Ἀνέλκωτος est sine ulcere, quem antiqui occultum appellarunt: quod nomen tamen aliter usurpauit Philoxenus, qui occultum uocauit delitescentem in utero aut intestinis. ἔλκωτος est cum ulcere, quem ulceratum uocant.

πρῶτος in genere prolapsus & proci-dentia est, cum pars quacumq; à sede sua excidit. Prolabitur autem uel oculus, uel uuea, uel podex, uel uterus. Prolapsus oculus est, cum totus oculus extra oris sui cavitatem prominet. Paulo ἐκπιεσμός. Prolapsus uuea est, cum tunica oculi, uuea dicta, ob erosam diuisamq; corneâ excidit, estq; uel simplex,

uel



uel composita. Simplex est $\mu\upsilon\kappa\acute{\alpha}\Phi\alpha\lambda\Theta$, $\sigma\alpha\Phi\acute{\upsilon}\lambda\omega\mu\alpha$, $\mu\eta\lambda\omicron\nu$. Composita est $\eta\lambda\Theta$: $\mu\upsilon\kappa\acute{\alpha}\Phi\alpha\lambda\Theta$ est parius prolapsus, $\sigma\alpha\Phi\acute{\upsilon}\lambda\omega\mu\alpha$ est amplior, acinum uive representans. $\mu\eta\lambda\omicron\nu$ adhuc major, palpebras excedens. $\eta\lambda\Theta$, id est, clauus, cum praterquam quod procidit, etiam duritiem contraxit.

Prolapsus ani est recti intestini egressio.

Prolapsus deniq. uteri (de quo solo hic agitur) est, $\eta\eta\epsilon\zeta\omega$ $\eta\upsilon\sigma\epsilon\tau\eta\alpha\iota\omicron\sigma\eta$, ut ait Aretæus. Estq. triplex. Procidit enim aut $\omicron\lambda\eta$ $\eta\upsilon\sigma\epsilon\tau\eta\alpha\iota\omicron\sigma\eta$ siue $\eta\delta\omega\lambda\omicron\nu$, aut $\tau\epsilon$ $\sigma\omicron\mu\omicron\nu$. $\eta\omicron\lambda\eta$ siue $\delta\omega\lambda\omicron\nu$ cum tota uulua foras exit. Tota autem est, non tam quæ omnes illius partes, quam quæ fundum proprium uteri corpus continet. Duplices enim illius partes sunt, similes & dissimiles.

Ex similibus prater uenas & arterias sunt tunica & uinacula.

Tunicae sunt duæ, propria & communis. Propria est interior, ualdè carnosæ, & reliquas totius uentris membranas crassitie superans. Hanc alij simplicem. Picolominus duplicem facit, id est, ex gemina membrana conflatam, adeoq. sibi inuicem iunctam, ut uix una ab altera discerni possit. Communis est exterior, quæ à peritoneo oritur, omnium ab eo ortarum crassissima. Vincula sunt ligamenta, eaq. duplicia, communia & propria.

Communia sunt, per quæ toti corpori alligatur, epati quidem & uenoso generi per uenas tum spermaticas tum hypogastricas: cordi & arterijs per easdem numero arterias: cerebro & spinali medulla per neruos: recto intestino & uesica per uillos cõplures.

Propria sunt, per quæ uicinis ossibus connectitur: suntq. duo paria: superius & inferius, utring. unum. Illud par in uteri fundum inseritur, estq. latum & membranofum. Hoc ab uteri lateribus ad inguina ascendit, estq. rotundum & subrubrum musculorum instar. Illud uterum ossibus pubis: hoc ossibus ilij alligat: suntq. omnia tñ laxa, ut loco moueri: tum mollia ut cum uiscere toto extendi, & ipsum citra lacerationem sequi possint.

Dissimiles partes sunt fundum, os interius, collum & orificium colli.

Fundum est superior & latior uteri pars, uesica fundo incumbens, in quo embryo alitur & augetur: ut chylus coquitur in fundo

uentriculi, & urina in uesica cavitare continetur.

Os internum, $\sigma\omicron\mu\alpha$ $\tau\omicron\nu\upsilon\sigma\tau\epsilon\tau\epsilon\omega\nu$, est meatus angustus, qui uteri cavitatem coarctat, perpetuoq. coniuget non pregnantibus: post conceptionem uerò tam exquisitè clauditur, ut ne aciem quidè acus aut specilli admittat.

Collum est canalis oblongus uagina instar, ab orificio interno prodiens. Alijs ceruix, Galeno $\kappa\omicron\lambda\pi\Theta$ $\gamma\upsilon\nu\alpha\iota\kappa\epsilon\omicron\varsigma$. Fallopio sinus pudoris. Ex ore enim angustiore in amplissimum sinum desinit.

Orificium colli externum Græcis est $\alpha\iota\delta\omicron\iota\omicron\nu$ $\gamma\upsilon\nu\alpha\iota\kappa\epsilon\omicron\iota\omicron\nu$, latini uuluum & laruam uocant. Constat id pluribus ex partibus, de quibus Anatomici.

Ceterum $\delta\omega\lambda\omicron\nu$ $\tau\eta\varsigma$ $\upsilon\sigma\epsilon\tau\epsilon\gamma\epsilon\varsigma$ apud Aretæum nouum nomē est hoc in loco. $\delta\omega\lambda\omicron\nu$ enim Anatomicis est media cranij substantia, eaq. rara & cauernosa. Latinis mediotullii, sic dicta, quod duas superficies illius ossis, superiorem & inferiorem disiungat. Erit igitur $\delta\omega\lambda\omicron\nu$ $\tau\eta\varsigma$ $\upsilon\sigma\epsilon\tau\epsilon\gamma\epsilon\varsigma$ uel duplex membrana ex qua constat uterus, uel media illius substantia, quæ pregnantibus jam non membrana uideatur, sed tota ferè carnosæ, fungosæ, spongiæ similis, in multos cortices facillè diuidua, ut fatum conseruet magna sanguinis & spirituum copia.

Rursus $\alpha\iota\gamma\alpha\iota\varsigma$ uocat Aretæus membranas uteri, easq. ut communiter ferè omnes Medici, duas facit: $\chi\omicron\tau\omega\nu\alpha$ uerò tunicam quæ fatum inuoluit, quæ triplex est: chorion, amnios, & una in brutis allantoides. $\chi\omega\pi\omicron\nu$, quod Aretæus tantum nominat, proprie est exterius inuolucrum crassius, utero proximum: sic dictum, quod sit fetus $\chi\omega\sigma\eta\mu\alpha$, id est, conceptaculum. Improprie autem $\delta\delta\omega\tau\iota\pi\omicron\nu$, id est, secunde, ut uertit interpres. Hoc enim nomine plerung. totum fetus inuolucrum duabus membranis compactum significatur. Quod uerò chorion maximum est & insigne admodum, uulgus id solum secundas uocat.

$\Delta\mu\upsilon\Theta$, id est, agnina, sic dicta ab $\alpha\mu\upsilon\Theta$, id est, agno, quod sit instar pellis agninae mollis. Est enim membrana interior fatui proxima: alijs indusium. Arabibus, Abigas. Germanis *das lammerein heuclin*.

$\Delta\lambda\lambda\alpha\tau\omega\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$, sic dicta ab $\alpha\lambda\lambda\alpha\varsigma$, id est, farcimine, quod sit farcimini similis. Est enim tunica fatui interchorion et amnion media,

Gg duabus



duabus constat tunicis, quarum una chorio, altera amnio adhaeret, inter quas urina factus continetur, allantoiden tanquam farcimem coctis carnibus implens, unde et nomen accepit.

Cum tota igitur uulua procidit id fit, ait Aret. aut laxatis uinculis in non pragnantibus: aut uiolento partu, secundis uterum secum trahentibus.

Tò σπύριον uteri procidit, cum non totus uterus, sed os tantum interius ad cervicem usque egreditur. Sic enim Aret.

XII. ΑΡΘΡΙΤΙΣ, id est, articularum: ut νεφρίτις renū: πλευρίτις pleurae dolor. Αρθρὸν autē, unde ἀρθρίτις deriuatur, significat improprie & proprie. Improprie omnem unionem membri cuiuscumque, ut cum Hipp. lib. de natura pueri ait. Carnem nigrescentem a spiritu articulari. Proprie rursus duo significat. Primum conuexum ossis extremum, quod inseritur, cui opponitur ἰσχίον, id est, acetabulum, aut γλῆνη, id est, pupilla, ossium alterius extremum, quod excipit.

Deinde διάρθρωσις, id est, iuncturam, articulationem & compagem ossium, seu totum id, quod connexis inter se ossium finibus in extensionibus aut inflexionibus mouetur. Vtrunq; sic dictum ab ἀρθρῶ, & ἀκμόζω, quod unum alteri congruat: uel potius ab Αραὴ ἄρῃς conuulsit, quod unum ab altero diuellat. Vnde Ariel, potentes domini, penes quos uita necesse est, potestas est. Similiter ἀρθρίτις tum genus, tum species est.

Genus est, cum pro omni articularum dolore ponitur. Species, cum non pro omni dolore indifferenter, sed eo duntaxat, quem interna causa pepercrit, siue ea sit flatus, siue sanies, siue aliquis succus alius, praesertim frigidus ac pituitosus, ut uoluit cum Aretaeo Galenus & Fernelius. Sic enim ille. ἰμὸς δὲ ἀρθρῶν μὴν μὲν αἰτίην τὴν ἐμφορὰν ἰσχυρὰν ἐμφορᾶν, μὴν δὲ πᾶσιν. Hodie tamen magna ex parte calidas arthritides experimur.

Rursus haec arthritis, quae dolor est ex interuallis ferè inuadens, ideoque periodicus, duplex est, generalis & specialis. Generalis est, quae omnes articulos uel simul, uel uicissim affligit.

Specialis est, quae certum aliquem articulum occupat: estque multiplex: chiragra, podagra, ischias, gonagra, anonymos.

Chiragra est, quae manum infestat, eiusque uel carpi, uel externae partis uel digitorum articulos.

Podagra est, quae uel malleolos, uel pedi-

um, uel pollicis articulum (quod plurimum contingit) affligit.

Sic dicta ἰσθμὸς & ἀρθρῶν ἰσθμὸς uel quasi ἰσθμὸν ἀρθρῶν, captura seu uenatio pedum. Podagra enim proprie pedicula seu tendicula est, qua animalia capiuntur pedibus, Improprie uero morbus articularis, qui a pedibus incipit, & sensim progressu temporis omnes articulos inuadit, & in quidem arthritis podagrica, aut podagra arthritica appellari potest. Interdum autem genus, interdum speciem significat. Genus est, cum omnem arthritidem denotat: ut Tralliano lib. 11. in capite ἰσθμὸς ἀρθρῶν inscripto. Species est, ut hoc in loco.

Ischias, quae ischion occupat, id est, siue coxendicis et femoris articulum, siue ligamentum, quod femur cum coxendicis acetabulo connectit, siue ut uult Fernelius, summam natem, qua nerui a lumbis & ab osse sacro emergentes in crura feruntur.

Gonagra seu γοναλγία, quae genu infestat.

Anonymos est, quae caret nomine, estque aliarum partium, ut ceruicis, humeri, cubitorum & aliorum articularum. Nomen igitur accipiet periphrasticum a genere et parte cui insidet, diciturque arthritis ceruicis, humeri, cubitorum. Similes autem species sunt, ait Aretaeus, chiragra & podagra, gonagra & anconagra (si nouo uti uocabulo liceat.)

Latinis arthritis dicitur articularis uel articularius morbus. Quidam guttam uocant, quod a destillatione, uel per uiam fluxus guttatim stillantis oriri soleat. Ger. gleichwehe & zippetele, deducto nomine ex Schafar, ἰσθμὸς id est, fregit, unde & aliud Germanicum uerbum, schiffen. Dolor enim arthriticus acerbissimus est, uires totius corporis frangens. Hinc Arthritici & Arthritici dicuntur, hoc affectu laborantes.

Ischiadem Graeci etiam ischiadicum morbum, latini coxendicum, Barbari sciaticam, Nostri huffwehe uocant. Ea uero affectos ἰσθμὸς ἀρθρῶν, coxarios, sciaticos.

Est uero arthritis cognata lues Venerea, quae & ipsa ingentes ossium dolores excitat, sed in diuersis locis. Arthritis enim infestat membranas, quae articulos inuestiunt. Lues Venerea affligit membranas, quae medias partes ossium siue artuum constitunt. Venerea dicitur, quod coitu contrahit ut plurimum solet. Quidam pudendagram uocant, quod potissimum partes genitales infestat.

Fraca-



Fracaſtorio ſyphiliſ; quali contagium amato-
rium: uel, ut alij ſcribunt, ſyphylis, ὡς ὁ
ὄναι τὰ Φύλα, quod ledat gentes, uel quod
ſit noxa utriuſq; ſexus. τὸ Φύλον enim ἔ
gentem ἔ ſexum denotat. Alijs alio nomi-
ne appellare placuit. Nono enim, eiq; incognito
morbo licuit, ἔ licet etiam nū uaria nomina
effingere. Sic quidam a natione, in qua pri-
mum cepit Gallicum, Hispanicum, Indicum,
Italicum, Neapolitanū uocant. Galli Neapoli-
tanum, quod Neapoli primum in Gallorum
exercitum ſanire cepit. Neapolitani contra
Gallicum appellant. Indicum uerò, ab Indi-
cis mulieribus hoc morbo laborare ſolitis,
quarum congreſſus, cum in Europam ueniſ-
ſent, multos primum infeſcit.

XIII. ΕΛΕΦΑΝΤΙΑΣΙΣ, Elephantiaſis
ſic dicta ὡς ἔ λέφαντος, id eſt, elephante
animali, cum quo hic morbus multa habet ſi-
milia, ac tot quidem, quot modis elephas ab
alio quocunq; differt animalis genere. Vincit
enim ceteras animantes magnitudine ἔ
craftitē, colore ſolum nigrum duntaxat eſt,
corum habet aſperū, longeuitate nulli ani-
malium cedit. Eadem ratione morbus ani-
malis uniuocus tam magnus eſt, ut major da-
ri non poſſit, tumore toti corpori ἔ craftitē
inducit ab alijs morbis diſſimilem, facit liui-
dos ἔ cadaueroſos: cutim ſquamis ueluti
magnorum piſcium exaſperat, multos annos
durat, nec prius perimit, quàm egrotum
membratim dilaceret.

Elephas igitur non immeritò appellatur
ab Alluſh, ἄλλυς quod inter cetera ἔ χιλί-
αρχος ſignificat, et bouem, qui tanquam dux
præcedit gregē, unde ἔ Aleph prima litera,
quæ reliquas omnes præcedit. Eſt enim hic
morbus ἔ χιλίαρχος ἔ bos ἔ alpha omni-
um morborum. Habet uerò ἔ plura alia no-
mina. Nominant enim et Herculeum morbum
ἔ Leonem ἔ lepram ἔ Satyriaſin.

Herculeus morbus, ἡράκλειον πάθος, ὅτι ἔ
δε μὲς (ὡς ἔδεν, ἔ) δακτυλώπων, ut ait Aret. An
uerò Epilepſia, quæ ἔ ipſa morbus Hercule-
us dici ſolet, ſit maior, de eo quæri poteſt. Idē
enim nomē unum par morborum æqualium
deſignare uidetur. Exactius autem expen-
dētī elephas maior, epilepſia minor eſt. Nam
ut ait Aret. ἡ ἐλεφαντίασις κατὸν ἰδέσθαι αἰ-
σχρόν ἔ δὲ μαλῶδες τὰ πάντα, uifu ſædum ἔ in
omnibus terribile. Epilepſia uerò ἀπρόπῆς
ἔ ἔ παροξυμῶς ἔτη, αἰσχρὴ ἔ ἔ δὲ δὲ ἔ
αἰσῆς, triſte inuafionis ſpectaculū, turpis ἔ

eius deſinentia. Maius autē malum eſt, quod
durat ſemper, minus quod per uices inuadit.

Λέοντα, id eſt, leonem uocant ἔ Πρωκονία
ἔ ὁμοίότητος εἶνεκεν, ut ait Aretæus, quod frōs
Elephantiaſorum ita intumeſcit, ut cuti fle-
xili ſuperciliorū leonis ſimilis fiat. Eſt enim
ἔπρωκονίον extrema frōtis ruga, quæ oculis ſu-
perinducimus, quoties attentius aliquid co-
gitamus, aut erubeſcimus, ut ſcripſit Rufus.

Lepra dicitur ὡς τὸ τῶν λαπίδων, hoc eſt, à
ſquamis ſiue laminis, ut uult Actuarius: uel à
λεπέυεσθαι quod eſt ſcabrum fieri ἔ albeſce-
re, ut uult Nicandri ſcholiaſtes in Theriacis.
Etymologiam Hebræicā paulò poſt dicemus.

Satyriaſis dicitur τῶν τε μῆλων ἔ ἐρυθμία-
τος καὶ ἔ ἐν οὐνεσιῶν ὄρμησιν ἀχέεσθαι καὶ ἀναι-
σχόντα εἶνεκεν, ut ait Aretæus. Leproſi enim
malas habent ex rubro liuentes ac nigrican-
tes, ἔ inſtar Satyrorum inexplebilem atq;
impudentem coeundi libidinem. Commune
itaq; hoc nomen eſt ἔ priapiſmo, de quo ſu-
pra: ἔ elephantiaſi, quod ſymptoma utri-
uſq; idem eſt: morbus uerò differens.

Ceterum lepra ἔ elephantiaſis plerunq;
differunt. Leporam enim duplicem faciunt:
unam Græcorum, aliam Arabum.

Lepra Græcorum, ψωρὰ, id eſt, ſcabies
eſt, ut origo nominis indicat, quæ utriq; ea-
dem. Vtrunq; enim deriuatur à uerbo Za-
raath, leproſus fuit, cognato cum Raza ἔ
perforauit. Lepra enim ſiue ſcabies cutem
profundius penetrat, ἔ uicinas partes ſuo
contagio infeſcit. Sic Hipp. lib. 5. Epid. Θεο-
φῶρος πῆς ἐλέπεα τὴν κόσιν. Theophorbi ſi-
lio ueſica ſæda ſcabie, (lepram dicunt) labo-
rauit. Nec latini nominis origo aliam ſigni-
ficationem innuit. Scabies enim à ſcabendo,
uel à ſcabritie dicitur, quæ ἔ lepra ex ſua
Etymologia Græca tribuitur. Alij lepram à
ſcabie ſeparant, ratione duplici. Scabies enim,
ajunt, ſummam cutem uaria figura infeſtat,
furfuracea, tantum ex ſe remittit.

Lepra profundiore cutem orbiculatim
depalcitur, ex qua pro furfuroſis ſquamula
pallida ἔ ſub nigra decidunt. Celfus impet-
iginem appellat, cuius quatuor genera de-
ſcribit ſola qualitatis intenſione ἔ remiſſio-
nis differentia: ultimum uerò ſolum proprie
lepram plerunq; uocant, ut Gorræus annota-
uit. Auicenna alboram nigram ἔ impetigi-
nem excoriatiuam appellat, quod cutis per
cortices ſquamasq; reſoluitur.

Gg 2 Lepra



Lepra Arabum, qua & recentiorum dicitur est. Elephantiasis Græcorum, quam Aretæus describit, estq̄, ut, Paulus describit, cancer siue tumor uniuersi corporis. Recentiorū uerò appellatur, quod hodie quoq̄ hunc affectum sis appellant. Vi uerò lepram Græcorū Celsus: ita lepram suam Arabes in quatuor differentias diuidunt, nempe leoninā, tyriā, alopeciam seu uulpinam, & Elephantiam, sic denominantes à feris, quibus morbus similis sit, sed minus dextrè. Vnus enim idemq̄ morbus est, qui cognationem cum quatuor illis feris habet. Ex quo apparet rationem istorum nominum Arabes non intellexisse. Est uerò alia diuisio eruditior, ut sit elephantiasis alia alba, alia rufescēs, seu colore fusco, hacq̄ iterum triplex: aut mitior, aut senior, aut pessima. Mitior est, sanguinea & rubicunda, qua à sanguine feculento feruidiore oritur. Senior, est magis nigricans, qua à succo melancholico præassato fit. Pessima est subflauo colore uirescens, qua à bile flaua adusta proficiscitur. Alba est, qua à pituita nitrosa, adusta uel putrefacta aut atra bili mixta oritur, cuius Plinius lib. 25. cap. 5. meminit: estq̄, propriè lepra Hebræorum, quam in Gallorum Britannia uulgarem esse scribunt.

Est deniq̄, & lepra recentiorum, qua tuberculosa dicitur, quaq̄ ad Oceanum Germanicum & in Germania crebrius uisitur, estq̄, ueluti cancer occultus.

Cognata itaq̄, sunt nomina psora, lepra, Elephantiasis. Psora ad lepram prauia est: lepra ad elephantiasin, si magis humor uratur & malignior euadat, & morbus diutius perseueret.

Sunt uerò & alia cutis infecta nomina, ut uiriligo & lichen, qua interdum confunduntur, interdum discernuntur. Vitiligo enim in genere uitiosum cutis, interdum subiecta etiam carnis colorem denotat. Et sic omnes lepra species comprehendit. Quā ob causam Arnobius lepram, quam Dominus in Euangelio curauit, uiriliginem uocat. Sis lichen significat eam scabiem qua cutem

erosione exasperat, & cū pruritu rubrificat.

Elephantiasin alij & elephantem & elephantiam uocant. Arabes morphaam albā, morphaam nigram & leucen, pro uarietate colorum. Albam, ubi color in album inclinat, superficiem tantum occupans, uocant & alphon. Nigram, cum color niger est, umbra similis. Leucen ubi color magis albidus est, canos producens pilos languini similes. Vocant & Alboram. Nostrates den Auffatz Malazey / Veldsiech. Auffatz à separando, quod infecti hoc morbo è catu hominum separari soleant. Malazey / quasi Mahl & zeichen id est, significatio, quod uultu terribili morbum denotet, uel fortassis à radice מלח Malath, fuga sibi cōsuluit, quod leprosi in locum deserti fugiāt. Veldsiech quasi morbus cāpestris propter nosocomium, quod extra urbem habent.

Lepram uerò tuberculosam, uocant den Enopfferen Auffatz.

Psoram id est, scabiem den grind oder raud, à radice Radah רדד id est, cruciauit. Scabies enim & malus uicinus duo sunt mala, qua aequè cruciant, aded ut Iudæus utrunq̄, aduersario suo imprecari soleat. Appellant & die Etage, à uerbo. Kerez denotante דורא ארמה, auulsionem, quod auellat cutē à carne, uel quod auelli soleat. Vnde uerbum Kragen. Lichenem Plinius impetiginem. Celsus papulam: recentiores serpiginem. nostrates geflecht & zittermahl & schörzen) à nomine שרש Sered, quod rubricam uel filum rubrica infectum denotat. Serpigo enim rubro colore est. Vel à Seretb שרש quod incisuram significat, unde Germanicum Rizen. Impetiginem autem feram Plinius mentagram uocat. Arabes Saphati ex Hebræo שפחת Saphahat significante scabiem serpentem, que cuti adhæret. Nostrates den wilden Nehres uocant, id est, ferinum exanthema, à uerbo Nezer significante florem & surculum, quod efflorescat in facie & trahas succum è capite uelut stipite.

Hactenus de nominibus morborum.



DE PARTE AFFECTA.

Pars affecta est subjectum morbi, id est, membrum morbum patiens. Græci τὸ νοσῶν, uocant. Galenus τὸ νοσῶν τὸ νοσῶν sedem malè affectam uel locum patientem.

Est autem pars affecta non tantum ea, quæ morbum patitur permanentem, qui iam factus sit, actionemq; ledit, sed & transeuntem, qui partim sit, partimq; permanentem nondum accepit. Sic colici doloris pars affecta colon est, non tantum cum causâ uehementer affligit, sed & si aliquando transitum tantum fecerit. Opponuntur itaq; pars affecta, quæ agrotat, & pars sana, quæ morbi experta est. Partes sanæ spiritu: agrotæ ichore seu sanie replentur, ait Hipp.

Num uerò quælibet pars corporis humani agrotare possit, de eo queri solet. Tres enim sunt res præter naturam, morbus, causa morbi & symptoma: & rursus duplices partes corporis humani, aliæ animatæ, ut pote solide, aliæ inanimatæ, ut humores, & spiritus, ut pleriq; sentiunt. Morbum igitur Medici ipsis continentibus, id est, partibus solidis ascribunt, ut uenis, arterijs, ligamentis, neruis, carni, uisceribus, ossibus & reliquis. Causam uerò morbi ipsis contentis, id est, humoribus, qui uel quantitate uel qualitate sua præter naturam morbos efficiunt. Spiritibus deniq; symptomata attribuunt, quæ nihil aliud sunt, quam læsiones functionum, quæ spirituum ope perficiuntur. Ad has enim & mutata qualitas & excrementum mutatum referri potest & debet, cum utrunq; non existat in corpore, nisi partis alicujus præcedat læsio. Ex quo sequi uidetur ut sola partes solide morbo laborare possint, humores & spiritus morbi expertes dici debeant. Sanitas enim et morbus affectiones sunt corporis uiuentis tantum, ut asserit Aristoteles lib. de sensu & sensibili.

Quod si uerò rem exactius perpendamus, nullam partem siue continentem siue contentam à morbo excludemus. Nam & humores & spiritus, eruditi plerunq; partes animatas faciunt. Vtrasq; enim nutriri, augeri & imminui uidemus. Spiritus uerò

cum sit calor natiuus, uel anima ipsa est, uel primum animæ instrumentum, ut asserit Galenus, quamuis improprie. Calor enim ut qualitas à spiritu qui est substantia, categorijs differunt. Præterea non rectè dictum Aristotelis huc accommodatur. Is enim citato loco lapides tantum, aliq; corpora uitæ expertia, nec morbo affligi, nec sanitate frui affirmat, partes uerò uiuentis corporis siue ea animatæ, siue inanimatæ sint, sanas uel agrotas dici debere minimè negat. Idem itaq; alibi αἷμα ὀπίσθινον & ὑποκίον, id est, sanum & morbidum sanguinem uocat: ἀσπύον quidem menses in mulieribus: ὀπίσθινον sanguinem sapore dulcem & colore rubrum.

Agrotat autem pars uel una uel plures uel omnes: & rursus alia per se, alia per consensum.

Cum una agrotat, ea uel continens est, uel contentum. Cum plures agrotant, ea sunt uel plura continentia, uel plura contenta, uel utraq; simul. Nihil enim prohibet, quominus interdum duos morbos constituaemus, unum ascribentes contentis, alterum continentibus, ut si cum hætica febris putrida copuletur, quod accidere posse Gal. in libris de differentijs februm testatur: aut si uentriculus propria dyscrasia laboret, ut frigida: & simul in eo deprauata esculenta contineantur, quæ nec concoqui nec in chylum à sano aliis uentriculo conuerti possunt.

Pars affecta per se est, cui morbus ipse uel morbi causa insidet. Appellatur & pars affecta proprie & primario. Græcis κατ' ἴδιον ἀφάρου.

Pars affecta per consensum est, cui nec morbus ipse nec morbi causa insidet, sed quæcumq; alia patitur, adeo ut actio ejus ledatur. Potest autem ledi tripliciter, id est, aboleri, imminui, deprauari.

Neg. enim necesse est partem eam, cujus actio læsa sit, statim etiam morbo teneri, ut potest digitus sentiendi uel mouendi facultate destitui, quamuis omni uitio per idiopathiam careat. Appellatur & pars affecta improprie & secundario. Græcis κατὰ σύμπτωσην.



Nec tamen pars omnis per sympathiam afficitur, quaecumq; ab alia afficitur. Destillatio à capite saepe pleuritidem excitauit, nec tamen eo casu pleura abscessu tentata per sympathiam laborat, sed per idiopathiam. Alio igitur nomine perspicuitatis gratia, caput æquum dicitur & pleura à morbo dicitur, cum & causa morbi & ipse morbus in utriusq; partibus hereat. Neq; enim raro accidit, ut pars affecta per consensum, afficiatur tandem per se, si morbus perseveret diutius.

Partes autem uel consentiunt uel dissentiunt. Rursus consentiunt uel essentialiter, uel accidentaliter. Essentialem consensum facit substantia affinitas, & sic omnia ossa inter se consentiunt. Accidentalem consensum habent quæ sunt uel contigua, uel continua, uel medijs conjuncta, uel situ inter se communicant.

Contigua sunt, quæ uicina sunt aded, ut se contingant, ut in primo uentre cerebellum & spina principium: in medio uentre pulmones, cor, diaphragma, œsophagus & latera: in infimo uentre uentriculus, epar, lien, intestina, diaphragma, uterus, uesica, rectum intestinum. In artibus femur cum tibia, brachium cum cubito.

Continua sunt uel quadam tantum, ut duodenum, uentriculus, gula & palatum. Vel omnes totius corporis partes, unum quippe corpus conformantes.

Media, quibus conjuncta partes inter se consentiunt, sunt caui ductus, nerui, ligamenta & partes intermedia.

Caui ductus sunt œsophagus, uentriculus, aspera arteria, uasa uretica, uena, nerui, arteria. Oesophagus igitur uentriculo, cui jungitur, consentit: aspera arteria pulmonibus, quibus inseritur: uesica renibus, quæ uasis ureticis sociantur: epar & cor toti corpori, per uenas & arterias, ab utroq; uiscere prodeuntes, & in omnes corporis partes disseminatas.

Nerui distributi hinc inde faciunt ut cerebro partes quæ sentiunt: & spina, partes quæ mouentur, consentiant.

Ligamenta uterum jungunt coxarum ossibus, unde mutua illorum sympathia.

Partes interjecta similem consensum fa-

ciunt. Sic spina uentriculo ob succingentem membranam mediantem: manus pectori: intestina cerebro, epati stomachus & clauicula consentiunt.

Situ inter se communicant, quæ eandem uiam habent, id est, rectitudinem quandam meatuum, eamq; ratione processionis triplicis. Hinc partes superiores cum inferioribus secundum longam: dextra cum sinistris secundum latam: interna cum externis secundum profundam directionem consentiunt.

Dissentiunt partes, quæ ab alijs integritatem suam uel lesionem non accipiunt, nec communicant: ut calida à frigidis: humida à siccis. Calida sunt carnosæ & sanguinea, ut cutis, caro, adeps. Frigida sunt exanguis, ut uena & arteria. Humida sunt ad tactum molles, ut adeps. Sicca ad tactum dura, ut pilus, dens, os, cartilago.

Rursus ratione modi pars compatitur, aut positiuè, aut priuatiuè.

Positiuè cum pars consentiens aliquid aliunde illapsum excipit, ut spiritum, uaporem, qualitatem, humorem, facultatem, ut in epilepsia & dolore capitis, cum cerebrum à fumanti uentriculo suscipit.

Priuatiuè cum non affluit, quod affluere debuit, quia uel impeditur uel deficit. In paralyti crurum, uerbi gratia, impeditur facultas sensus à cerebro, quia luxata spina superior. In apoplexia impeditur facultas motrix & respiratio, quia cerebrum insigniter obstruitur. Vox autem uitatur, quia flatus deficit, obstructis pulmonibus aut resolutis costarum musculis, aut perforato thorace. Sic corpus contabescit obstructis uenis jecoris, impedita distributione sanguinis. Hanc sympathiam incompletam Auicenna uocat. Nam, uerbi gratia, in uocis amissione ex materia uocem facientis, quæ per efflationem fit defectu, uocis instrumenta nihil affecta sunt, materia tantum deficit.

Deniq; pars compatitur, ratione communis functionis, eusq; triplicis animalis, uitalis, naturalis. Consentiant itaq; caput, nerui, musculi, spinalis medulla & exteriorum sensuum organa, eò quod partes anima-



animales sunt: & harum una aliqua affecta sine per se, sine per consensum actio animalis leditur. Cor uero & arteria, eaque, quae continent, consentiunt eo quod partes uitales sunt, quae ad pulsationem, & generationem transmissionemque uocalium spirituum pertinent. Pulmones, thorax, aspera arteria fauces, diaphragma & thoracis musculi consentiunt, eo quod partes uitales sunt, quae ad respirationem per se faciunt, isdem uero & cor & cerebrum consentiunt, eo quod & ipsa ad respirationem faciunt, sed per consensum. Palatum, fauces, larynx & eius musculi: item epiglottis & columella & nerui, quibus gutturis musculi mouentur, consentiunt, eo quod uocem edunt proprie. isdem uero & cerebrum & spiritus & instrumenta respirationis consentiunt, eo quod & ipsa uoci edenda seruiunt, sed communiter.

Palatum, dentes, labra, lingua & nares

consentiunt, eo quod ad sermonem articulandum faciunt proprie. isdem uero & instrumenta tum uocis tum respirationis consentiunt, eo quod & ipsa eundem usum obtinent communiter.

Oesophagus, uentriculus, jecur & uenae consentiunt, eo quod communis est illarum naturalis functio, concoctio nimirum & alimenti delatio. Vesica fellis, renes, lien, uesica & uasa urinaria consentiunt, quia communis illorum functio, nempe superfluum excretio. Testes, uasa spermatica & uterus consentiunt, eo quod generationi communiter seruiunt. Eadem est ratio panniculi carnosissimi, musculorum ascendentium & descendentium, peritonaei & abdominis, quae inter se consentiunt, eo quod eorum officio, quod est continere membra naturalia, funguntur.

SIGNA PARTIS AFFECTAE SIMPLICITER.

Scire locum laborantem tanti refert, ait Galenus, ut tota ars Medica non sex mensibus tantum, sed sex diebus comprehendi possit, si eam, quae ad particulas attinet, tractationem adimas. Qui enim affectam partem exacte cognouerit, is & curabit facilius, & praesagiet certius, & ipsam affectus speciem eadem opera saepe agnoscat. Sic adunci unguis pariter & tabis affectum & pulmones affectos esse demonstrat. Ut uero magnum haec cognitio usum habet, ita plena difficultatum est. Plerumque enim locus male affectus obscurus est, qui nec uisu obseruari, nec auditu ex aliorum narrationibus cognosci potest: unde ad signorum syndromen confugere oportet, quae Medicum in re tam graui & abditata certiore faciant.

Signorum alia manifesta sunt, alia occulta. Manifesta sunt, cum partes externae sunt, sub quo sensum cadunt.

Occulta sunt internarum partium, quae uaria sunt, petita uel a causis, uel ab affectis, uel ab utriusque simul. Rursus causa, cur una potius quam altera pars affecta sit, aut externa, aut interna est.

Externa calum est, anni partes, regio, ui-

ctus forma, uita condicio.

Interna est, ipsius partis natura, aegrotetas, sexus, parentes.

Effectus sunt partis cuiusque proprius affectus & dolor.

Utraque simul sunt, morbus hic uel ille communiter grassans, consuetudo laborandi ex hoc uel illo membro, iuuans & nocens. Sunt igitur in uniuersum numero tredecim.

I. Remota causa calum est, a quo et si incerta coniectura, non tamen inutilis peti potest. Nam quae non prosunt singula, multa iuuant. Singulis autem signis & planetis certa membra dicata sunt, ut Arieti caput, tauro collum, Geminis, brachia & humeri, Cancro, pectus: leoni cor & dorsum. Virgini, uenter imus, libra, lumbi, renes, uesica. Scorpio, pudenda. Sagittario, coxa. Capricorno, genua. Aquario, crura. Piscibus, paruus pes. Sic Saturno aures, Ioni cerebrum, Martineri, Soli, cor & oculi. Veneri, gula & membra genitalia: Mercurio, lingua & pulmo. Morbo igitur incipiente, cum Luna uersatur in Ariete, pars affecta caput est: cum in Tauro, collum: cum in Geminis pectus, & sic deinceps.

Quod



Quod si Saturnus affligatur, aures laborabunt. Si Iupiter, cerebrum; Si Mars, nervi, & sic de alijs similiter. Nihil enim, ut ait Hermes Trismegistus, sine stellarum congressu siue influxu in rebus humanis, aut ualesudinarium, aut sanum est.

II. Anni partes membrum patiens indicant, ut Ver cutem, cerebrum, articulos. Aestas, aluum, aures, sanguinem. Autumnus, lienem, collum, intestina, coxendicem. Hyems caput, pleuram, pulmonem. Causas recensent interpretes, ad librum tertium aphorismorum Hippocratis.

III. Regio interdum etiam, cum certis partibus peculiari quodam fato noxam inferre soleat: ut solum Pinzgauense anteriori gulae parti tumorem, quem Graeci Ερροχονδην, moderni bocium uocant. Aquitania dorso gibbum: Lusitania pulmonibus phthisin, Apulia, uesicula icterum. Mauritania Libyis dracunculum. Cetera terra alijs partibus morbum uernaculum, quem Hipp. επιχολιον: alij ερδηνιον & τωμιον uocant.

IV. Victus forma uentriculi aut jecoris laborantis signum esse potest: ut lepus marinus, pulmonis, Cantharides, uesica: alimenta crassa ac lenta renum & uesicae affectionum.

V. Vita condicio partes pati ostendit, eas quibus insunt potentiae, quae in quouis officio magis laborant: ut infectori pulmones phthisi: deauratori & mineralium fossori nervos tremore affectos esse uerisimile est.

VI. Ipsius partis natura, ut fungus in capitis ulceribus, dura membrana lesionem ostendit.

VII. Aegroti aetas, ut puero gingiuarum dolorem dentiendo, adulto dentium dolore & cariem: rursus puero uesicam: adulto renes ex lapide facilius affici coniectamus.

VIII. Sexus, ut feminis uterum suffocatione: & ubera lactis defectu: uiris autem penem gonorrhoea, & mentum suis morbis laboris significat.

IX. Parentes. Nam quas partes, ut cerebrum, articulos aut oculos parentes imbecillos habent, filij ferè seruant.

X. Affectus cuiusq; partis proprius, isq; uel morbus, uel causa, uel symptoma.

Morbus uel essentia uel situ suo.

Essentia, ut suffusio, oculos: granula quaedam in lingua, quae curationem non admittunt, elephantiasin denotant.

Situ, ut affectus intus sub hypochondrio dextro, epas: sinistro, lienem affici significat: si ad latera lumborum profundius, renes: si in pectine intus, uesicam laesam: si adhuc profundius super intestinum relictum, in femina uterum. Et dextri hypochondrij tumor per costarum extrema productus in jecore est: exporrectus in uentris longum, rectos musculos abdominis occupat.

Symptoma est actio laesa, mutata qualitas, excreta & retenta.

Actio laesa eam partem à qua edi solet, affici ostendit, ut imaginatio cerebrum: caecitas uisum: laesa tactio nervos: laesus motus nervos & musculos in ea parte qua mouetur, affectos esse demonstrat, & sic de alijs. Omnis enim pars actionis instrumentum est: & laesa actione partem, per quam exerceri solet, laedi & ipsam necesse est.

Causa, ut attritatio lue Gallica laborantium partes genitales morbo Gallico infectas significat.

Mutata qualitas, ut color, sonus, sapor, odor, tactilis qualitas, uitiosa & à naturali mutata, eaq; uel partis, uel totius corporis.

Partis, ut rubedo maxillarum, pulmonis inflammationem: uitiosus color oculis, hypophagmate oculos, uesiculam ictero, hamorrhoides & uterum fluxu laborare ostendit.

Sonus in auribus aurem male affectam: sternutatio cerebrum excalescendum, aut perhumectatum spatium inane in capite: ructus affectum uentriculum: crepitus uentris affectus frigidus intestinorum: sonus specillo in ulcere immisso & osse contacto corruptionem ossis.

Sapor uitiosus humores in uentriculo, amarus bilem: falsus pituitam falsam: acidus acidum humorem: dulcis, dulcem: inspidus, inspidam & aqueam pituitam: fatidus putrem.

Odor fatens illius partis, unde uenit, humorum corruptionem aut excrementum aliquod. Sic sudor fatens à pedibus proueniens, in eis humores putrere indicat. Fatida tussis pulmonis ulcus.

Qs fatens aut oris ulcus, aut dentem putridum, aut gingiuas corrumpi. Fatens spiritus licnem affectum.

Calor in quacunq; humani corporis parte tactu perceptus, ibi calidam intemperiem inesse significat: frigus frigidā intemperiem, nisi ab euidenti causa excitatum sit. Frigus paulo supra umbilicum tactus occurrens, frigidam uentriculi intemperiem testatur. Siccitas in parte occurrens intemperiem siccam, id est, tabem uel atrophiam adesse significat. Humiditas contra humidam intemperiem.

Totius corporis, ut in ictero flauus, in ictero nigro, niger, in hydropse plumbeus aut pallidus, color hunc aut illum humorem prater naturam abundare in corpore & partes naturales contaminare significat. Calor totius corporis febris est & cor affectum denotat. Frigus frigidam epatis intemperiem, siccitas, si calida sit, febrem hecticam.

Excreta precipuam affectorum locorum notitiam praestant. Duplex autem meatus est, per quem fit excretio, alius naturalis, alius non naturalis. Naturalis est auris, oculus, naris, os, gula, guttur, sedes, collum uteri & uesica & porus corporis. Non naturalis est ulcus & uulnus. Rursus excretorum per meatus naturales, aliud est substantia, aliud magnitudo. Excretorum per meatus non naturales, aliud substantia, aliud modus.

Substantia, ut sordes aurium copiosior aurem lesam.

Lippitudo multa insolens: mucus nasi multus, tenuis, crudus, cerebrum affectum. Furfures caput plenum prauis ichoribus.

Sputum partium uitalium uitium, ut thoracis, pulmonum, aspera arteria, gusturis, aut alicuius instrumenti respirationis. Vitiosum autem sputum esse oportet, id est, non concoctum, ut sanguine aut altera bile respersum, mistum uel, aut spumofum, aut aliter corruptum.

Sanguis tussi rejectus pulmonem: per nares aut palatum rejectus percussio ualenter capite, meningem aut ejus uasa lesa.

Pus simili modo excretum, item grando & grumus sanguinis, pulmgnem, thoracem, laryngem lesam.

Stercus uarium, uarios intestinorum, uentriculi, mesarci affectus, & interdum corporis totius: fatens concoctionem, non fatens cruditatem.

Urina substantia tenuis cruditas: crassa mediocriter coctione. crassior & perturbata dum mingitur uel interitum, si cum uirtute debili sic maneat: uel coctionem futurā, si tenuiores urina praecesserint. Quod si initio clara sit & post mictionem perturbetur, humorum coctionem in uenis breui tempore a natura peragenda demonstrat.

Urina color genus humoris peccantis demonstrat, albus sanguinem serosum, si adsit cruditas: aut flaua bilis ad superiores uel inferiores partes a uasis urinalibus auersione: uiridis similis fistico frigiditatem: aruginosus adustionem: oleaceus, colliquationem. Ruber uel admixtionem bilis, ut in febris: uel admixtionem sanguinis serosi, ut in hydropse, cachexia & colica: uel maximam excalesfactionem sanguinis.

Flauus impense, nimium bilis descensum in renes, uel nimium illius in epate & uenis prouentum, uel obstructionem debilitatem ue uesica fellis.

Niger in sine quartana, in puerperio, in suppressione menstruorum, crisi. Alias excessum caloris, si ager sitit: aut frigus mortificans, si ager non sitit, aut sedimentum paucum sed unitum sit.

Quod si nigra post ictum aut comestione rei nigrae contingat, externam causam demonstrat.

Ex contentis in fundo hypostasis farinacea calorem igneum: foliosa eundem sed uehementiorem: uel uesica erosionem: fursuracea, eundem calorem sed intensiorem, uel uitium uesicae: tenuis & alba, spiritum flatuosum tenacem remissum humori excrementitio & semicocto.

Spuma flatum cum humore uiscido mixtum. Pinguedo siue in toto corpore urina ueluti jus, siue in superficie suprema tantum, calorem igneum, qui adipem, carnem, partes carnosas et humidū substantificū colliquat.

Capilli cum urina excreti non tam renes quam ureteres affici demonstrant. Pilorum enim longitudo ureteres amulatur.

Caruncula cum lotio reddita, uel renum maximam exulcerationem, uel calidam tantū renū intemperiem, si caruncula sit aliquid carni simile uel acrem & salsam urinam.

Arenule in matula residentes, uel adustione sanguinis in uenis significat, si in umbra siccata



si caca sunt molles & tractabiles: uel renum affectum; si aspera & dura fuerint. Rubra autem sunt à renibus: non rubra à uesica, ut si fuerint alba uel terrea, uel ut lutum.

Lapis concretionem succorum, uel arenularum in uesica aut renibus.

Grumus sanguinis, recens ulcus.

Pus, ulcus inueteratum ac sordidum, aut in renes, si sine dolore: aut in uesica ceruice, si magno cum dolore effluat.

Pituita uesica calculum, uel sordidum ceruicis ulcus, si cum dolore redditur. Quod si citra dolorem, crudum renum aut internarum ejus partium abscessum indicat.

Sudor nota est succorum in uniuerso corpore abundantium, ut urina eorum qui sunt in uenis. Sudor autem uel erumpit, uel non erumpit. Si non erumpit, etiam adhibitis sudorificis, cutem densam & duram esse ostendit. Si erumpit aut ab uniuerso corpore dimanat, uel à certis partibus, qui qua parte corporis sit, ibi morbum esse ostendit, teste Hipp. l. 4. aph. 39.

Lac. è mammis grauida multum fluens imbecillitatem fetus, semen uiri aut mulieris sponte profluens, liquidius esse, aut uasa spermatica affici: menses largiores, pauciores, decolores affectum uterum.

Aborsus uteri uitium, id est, humiditatem acetabulorum interdum demonstrat.

Bronchium tussi excretum tracheam arteriam, aut pulmones male affici indistincte ostendit: magnum autem tracheam arteriam: paruum pulmonem distinctius. Sic ramentum crassum aliquod crassorum: tenue aliquod tenuium intestinorum ladi significat.

Excretorum per meatus non naturales substantia, ut urina per uulnus aut ulcus reddita uesicam, ureteres, renes. discissos esse, ac dextrum quidem, si in parte dextra, sinistrum, si in sinistra appareat.

Stercus per uulnus excretum, uel in uulnere stercoreus odor pertusum intestinum.

Cibus & potus per uulnus excreta, uentriculum aut intestinum aliquod perforatum: & sic de alijs.

Modus, ut sanguis exiens saliendo, arteriam discissam designat, praesertim si sit flauior & tenuior. Sic chylus ex aperto uen-

triculo decidit, si plurimum erant laborantes: ex intestinis autem, si cum flatu & crepitu per infernam aluum descendit.

Retenta, ut in nephritide urina cum difficultate redditur, aluus fluit: in coli dolore aluus sistitur, urina fluit. Suppressa urina uitium aut in renibus, aut in uesica, aut urethra, h. e. urinaria fistula significat.

Cibus & potus diu in uentriculo contenta, ubi magnum ponderis sensum afferunt, scirrhum aut alium tumorem in ephysi declarant.

Dolor, qui ad symptomata quoque refertur, non minus probabiles affecte partis notas praebet. Hujus autem consideratur uel situs, uel mutatio, uel species.

Situs, ut si dolor sentiatur in dextro hypochondrio, ostendet affici partes dextras: ut uel jecur, uel renem dextrum, uel partem coli intestini, uel musculos abdominis, & sic de alijs. Nam ibi morbus, ubi dolor.

Mutatio, qua decubitu obseruatur. Nam si exterior sit affectus, grauius in partem affectam & facilius in sanam decumbit: si interior, facilius in partem affectam & grauius in sanam, quia pendulum uiscus uoluerem ingeminat.

Species uaria est. Res enim obiecta, qua facultati sentienti et percipienti aduersatur, aut alterat, aut distendit, aut grauat, aut laterat, aut mordicat, aut perforat, aut pulsat, aut stupefacit.

I. Quae alterat, refrigerat aut calefacit. Hinc dolores, quos Hipp. ἐδοναίς θεγυαίς & πυρεταίς, id est, calidos & frigidus uocat. Calidi, caloris sensum faciunt, & à frigidis leniuntur. Frigidi, frigoris sensum inferunt, & calefacientibus mitigantur.

II. Quae distendit, partes in longum trahit & decurtat. Hinc dolor τινάδης, id est, tensiuis, communis omni parti sentienti, ita neruis, membranis, musculus, cuti, item & adenis. Neruorum distensio est uel totius corporis, uel partium. Totius corporis neruorum distensio, conuulsio est, cum nerui uersus principium & finem usque ad cerebrum, ut fides cithara tenduntur. Partium distensio est spasmus, cerebrum non attingens, sicut uel ab inanitione, uel à repletione.

Membra



Membrana distendatur in dolore capitis, pulmonis, epatis, lienis et renium, cum hæ partes uel replentur à spiritu tenui & flatuoso, sitq; citra grauitatem & pulsum: uel tenduntur ab humorum copia, sitq; cum grauitate: uel à tumore calidiore, sitq; cum pulsu.

Musculorum distentio, lassitudo tensiua dicitur, quæ ab immodicis exercitationibus humores fundentibus oritur.

Cutis denig, & glandula ualdè inflammata tensione dolent à multo humore intra se contento, ut uterus fetu grauiore, uentriculus cibo largiore distentus.

III. Quæ grauat, partem instar ponderis loco incumbentis, premit. Hinc dolor *Capòs*, id est, grauis, communis membro ægre sentienti, ut cerebro, pulmoni, epati, renibus. Ac cerebro quidem & toti capiti ab humorum copia, ut sanguine, melancholia, pituita; pulmoni & epati ab inflammatione. Renibus tum ab inflammatione, tum à calculo maiore. Hic & obtusus dicitur, estq; acuto oppositus.

IV. Quæ lacerat, membranam à carne quasi diuellit. Hinc tensiuo cognatus est, cum & ipse diuellat, sed non neruos & uasa, sed carnem tensam ob membranas per carnem mediam plurimas inæqualiter insertas, & eam quoq; circumdantes. Membrantarum itaq; proprius est.

V. Quæ mordicat, omnem partem sensibilem humore mordaci stimulat & erodit. Hinc *òdúvη μετὰ δίζεως* uocatur, & stimulant. Accidit præsertim capiti ab humorum & uaporum acrimonia: nec non intestinis ab exulcerante dysenteria.

Huius similis dolor ulcerosus est & pruriginosus.

Ulcerosus est, qui cutem & partes imas ad ossa usq; affligit.

Pruriginosus est, qui cutem tantum infestat primum & per se, secundo & ex accidenti carnem etiam: unde ulcerosi doloris prauius.

VI. Quæ perforat, partem sensilem magis quam mordicans afficit. Hinc *òdúvη òζòs* dolor acutus & *ωρυπατòδης* punctorius seu fodicus dolor uocatur, quo ceu acu aut terebro perforante aut palo impacto membrum affici uidetur, familiaris colo intestino & calculo inæquali, item membranæ cerebri ex pituita uitreâ, nec non membranæ alijs, quæ

ossibus alligantur, ut in pleuritide, propter inflammatam membranam, quæ coheret ossibus. Cætera enim membrana, quales sunt pulmonis, cordis, epatis & uesicæ graui dolore affici solent. Huic igitur similis profundus est, & is qui *òσòρòs πòs*, ossium dolor dicitur. Profundus ab accidente dicitur, quod partium sit in profundo sitarum: *òσòρòs πòs*, quod in membranæ, quæ ossibus adjacent consistat, ideoq; ossium ipsorum ueluti dolentium præbet. Acuto dolor grauis opponitur, de quo supra. Profundo autem superficialiarius, qui & sublimis dicitur, qui cutem carnemq; proximam morbo corripit denunciat.

In genere igitur acutus & uehemens dolor partem exquisiti sensus affici denotat: ut sunt oculi, membranæ cerebri & aliarum partium, stomachus, uterus & partes neruose, sed & uesicæ ceruicæ propter meatuum angustiam & transitus difficultatem. Grauis & obtusus dolor partem non exquisiti sensus affligi significat, ut sunt cor, epar, pulmo. Renes ambigunt. Nam in uenis, arterijs, tunica succingente, & in exortu ureterum, acutus, in carne obtusus dolor percipitur. Sic magnitudo doloris in mittione collum, non uesicam affici declarat.

VII. Quæ pulsat, arterias, easq; partes, in quibus cæ continentur, cum dolore premit. Hinc *òdúvη σφυγµατòδης η̄ σφυγµατòδης*, dolor pulsatorius, proprius uehementi inflammationi in arterijs (quæ sola pulsant in homine, uel citra dolorem ut in bene ualente, uel cum dolore, ut in male affecto) idq; proprio & primario affectu: in reliquis uero partibus per consensum, eò quod à tactu uicinarum comprimantur.

VIII. Quæ stupefacit, partes quascunq; torpore afficit, unde & dolor, qui inde excitatur, stupidus & torpidus uocatur: estq; nullius partis proprius: nec tam dolor, quam quiddam ex dolore & stupore compositum, ut ulcus inflammatum duas res diuersas ulcus & inflammationem comprehendit.

Hactenus de signis partis affectæ ab affectu partis proprio & dolore sumtis.

XI. Morbus, hic uel ille hoc tẽpore grassans in populum, eandem in detegenda parte affecta præstat gratiam. Nam par est conjectari eandem partem affici in singulis, quæ in uniuersis patitur.

XII. Com-



XII. *Consuetudo laborandi. Nam qui ex hac aut illa parte laborare consuevit, eandem facilius posse pati, & jam affici uerisimile est.*

XIII. *iuuans & nocens, idq; aut medicamentum, aut cibus, aut potus. Singula enim particula quibusdam adhibitis delectantur: alijs offenduntur. Si igitur v. g.*

frigida respiratio profit, thoracem excoactum esse ostendet: si potus similis, uentriculum: si clyster intestinum.

Sic in sanguinis uomitu, si acria maxime iuuent, eum ex uentriculo prorumpere: si ea qua reprimunt, prosunt, eum ex pectore aut pulmone profluere. Si uinum datum noceat, eum ex capite manare declarabit.

SIGNA PARTIS AFFECTÆ VNIVS VEL PLVRIVM.

Pars affecta uel una est, uel plures, uel omnes. Vna affecta est, si actio lesa sit propria unius partis, ut dejectio & mictio inuoluntaria potest fieri à solo musculo ani aut uesica resoluta aut discisso. Quod si actio lesa sit communis plurium partium tum uel una uel plures simul affecta esse possunt, ut respiratio uel uox leditur uel una, uel pluribus, uel omnibus partibus respirationi & uoci seruientibus lesis, ut diaphragmate, thorace cum suis musculis, pulmonibus, aspera arteria, musculus octo epigastrij, uel ijs qua cum dictis mouentur. Sic atrophia oritur lesa uel una uel pluribus partibus tum singularibus

tum alijs partibus nutritioni destinatis, ut uenis, uentriculo, intestinis, epate. Et dejectio leditur, quibusdam uel omnibus eam iuuantibus lesis, ut intestinis, musculus octo epigastrij, diaphragmate. Vtra autem illarum sit lesa simpliciter, ex signis, de quibus paulò ante diximus & jam dicetur cognosci oportet. Vbi illud pratermittendum non est, multos esse hos locos ex quibus signa petuntur: nec tamen omnium ubiq; usum esse querendum. Quaedam enim ex sola actione lesa, quadam sine hac signis alijs deprehenduntur.

SIGNA PARTIS AFFECTÆ PER SE ET PER CONSENSVM.

Leditur actio lesa non modo partibus, qua eam efficiunt, sed etiam ijs, qua connexa & adherentes sunt: ut respiratio uitatur affecto utero aut uentriculo, qua partes quamuis respirationi non seruiunt, ijs tamen consentiunt. Multum autem interest scire, num pars affecta laboret primario affectu, an per consensum. Qui enim hoc ignorat, is nec remedia loco conuenienti applicare potest, nec recta methodo mederi. Nam v. g. ignarus huius discriminis manui resoluta adhibebit, qua ceruici apponenda sunt, cum ex illa principium affectionis pendeat: aut cerebro tantum applicat & non potius

uentriculo, in uertigine uariè occupatus: quod in Medicis imperitis irridet Galenus lib. primo de locis affectis.

Rectam uerò methodum incurando non obseruabit, eò quod parti primo laboranti, primum non succurret, qua percurata, ea qua condolet, conualescit, non contra.

Pars igitur affecta per se ab affecta per consensum accurato studio distingui debes: idq; ex certis notis, de quibus jam dicemus.

Sunt autem partis per se affecta signa alia manifesta, alia occulta. Ex manifestis est morbus partis proprius, seu proprium accidens partis. Nam v. g. cerebrum per se affectum



affectum dicitur in delirio : eò quod mentē percilli cerebri proprium symptoma est. Id tamen signum commune est parti affecta simpliciter : ceteris igitur, ysq; occultis ad- jungi debet.

Occulta signa sunt, magnitudo, numerus, tempus, iuuans.

Magnitudo. Nam si morbus est magnus, pars per se & primò afficitur. Sic si uehemens sit capitis dolor, caput per se : reliquas partes, ut oculos, aures, stomachum, per consensum affici colligemus.

Numerus. Nam si solitarius existit, neq; praecessit affectus, cuius comes putetur, similiter pars per se affecta dicitur.

Tempus. Affectus partis per se affecta perpetuus est, nihilq; intermittens.

Iuuans. Illi praesidia accommodata conferunt.

Eodem modo signa partis affecta per consensum alia manifesta sunt, alia occulta.

Ex manifestis est, quod morbus non est partis proprius. Nam v. g. cerebrum per consensum affectum dicitur in cephalalgia, eò quod non tantum illa pars corporis, sed & alia eodem genere symptomatis corrip-

soleant. Hoc uerò signum, ut supra diximus, probabile tantum est, non necessarium.

Occulta sunt, paruitas, numerus, tempus, iuuantia.

Paruitas. Quod enim cum alijs, id ab alio affici uehementius affecto necesse est : alioquin partes, nisi uehementiori passione laborent, reliquas in consensionem secum trahere non possunt. Si igitur morbus est paruus aut mediocris, ex alia parte magis laborante consequi solet.

Numerus. Si pluribus jungatur, alteriq; superuenerit. Sic si caligo quadam ante oculos obuersetur, & stomachi dolor ante- cesserit, ex eo stomachum primò affectum, oculos per consensum laborare dicemus. Quod si uerò uomitus insequatur & oculi non male habeant, eundem stomachum pri- mariò affectum colligemus.

Tempus. Facile mutatur, & alterius in- cremento inualefcit, illiusq; remissione mi- tescit. Sic caput si dolet, per consensum dole- bit, si dolor non sit continuus, sed augeatur & minuatur cum dolore uentriculi.

Iuuans. Subsidijs idoneis parti adhibitis non leuatur.

Haecenus de parte affecta, quæ cum sint prolixiora, ut melius memo- ria comprehendi, & facilius ad usum accommodari possint, in breuem *σύνολον* redigere, & duabus tabulis uno in- tuitu contemplanda subijcere placuit.



[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Hb PRIMA



PRIMA TABVLA DE PARTE AFFECTA.



SECUNDA TABVLA DE SIGNIS PARTIS AFFECTÆ.

Manifesta, cum partes externæ sunt, subq; sensum cadunt: ut cutis vitia.

Affectæ simpliciter, tū	Causis quarum alia	Externa	Cælum. Luna in ♃ caput. 2. afflicta cerebrum. Anni partes. Ver cutem, cerebrum, articulos. Regio. Apulia vesicæ icterum. Victus forma. Alimenta crassa & lenta renum & vesicæ affectum. Vitæ conditio. Infectores pulmonum phthisi obnoxij.
		Interna	Ipsi partem natura. Fungus in capite duram membranam. Ætas. Puer gingivarum dolore, senex tussi. Sexus. Mulieres uteri præfocatione: viri gonorrhæa. Parentes. Cerebro vitiosi cerebro vitiosos liberos.
Oculta de sumpta	Effectis quorum alius	Morbis uel	Essentia sua. Hæmodia dentes, apoplexia cerebrum. Situ suo. Affectus sub hypochondrio dextro, epar: sub sinistro lienem.
		Causa	Attrectatio lue Gallica laborantium, læsa membra genitalia. Actio læsa. Imaginatio læsa cerebrum: conestio uentriculum. Doloris situs, situm partem. Mutatio in decubitu, exteriorem uel interiorem partem affectam. Species, pungens, membranam: pulsatorius, arteriam: grauis, affectam partem sensus hebetioris. Mutata qualitas solidarum partium. Color, sonus, sapor, odor, tactilis qualitas, ut calor, frigus, humiditas, siccitas, vitiosa, partem, uel totius corporis. Rubedo maxillarum, pulmonem: calor totius corporis febrem.
Signa partis affectæ alia	Excreta, quorum alius	Naturalis in quibus	Substantia. Sordes aurium, lippitudo, mucus, furfures, sputum, sanguis rejectus, pus, dejectio, urinæ substantia, color, contentum, idq; hypostasis, spuma, capilli, caruncula arenula lapis, pus, pituita. Sudor, lac, menses, abortus.
		meat alius	Nō naturalis in quibus alius Magnitudo. Bronchium magnum tussi rejectum tracheam arteriam. Substantia. Urina per uulnus aut ulcus reddita, uescam, ureteres, renes discissos. Modus. Sanguis exiens saliendo arteriam discissam.
		Retenta.	Suppressa urina, vitium aut in renibus, aut in uesica, aut in urethra.

Vtrisq; simul, morbus hic uel ille in populum grassans, consuetudo laborandi ex hac uel illa parte, iuuans & nocens, siue medicamentum, siue cibus, siue potus.

Speciei. Affecti sunt spiritus, si morbus uniuersum corpus citissime corrumpit. Sin minus, partes solidæ aut humores laborabunt, quorum signa alibi.

Numeri. Agrotat una pars si actio læsa sit propria unius partis. Sin communis, unius uel plurium esse potest.

Temporis. Pars affecta laborat per *ἀπονομίαν*, si morbum ex alia parte per *συννομίαν* acceperit, diutiusq; perseveret.

Affectæ ratione uel	Qualitatis alia	partem per se affectæ	Manifesta. Morbus partis proprius. Magnitudo. Morbus est magnus & uehemens. Numerus. Solitarius est, nec præcessit alius. Tempus. Non intermittit. Iuuans. Illi præsidia adhibita profunt.
		partem per consensum affectæ	Manifesta. Morbus non est partis proprius. Paruitas. Morbus est paruus aut mediocris. Numerus. Pluribus coniungitur alteriq; superuenit. Tempus. Facile mutatur & intermittit. Iuuans. Subsidia idonea parti adhibita, uel nocent uel nihil iuuant.



DE PARTE AFFE- CTA MORBORVM ACV- TORVM LIBRO PRIMO.

I PHRENITIDIS pars affecta est una principaliter, cujus ratione delirium sequitur, nēpe cerebrū, idē, uel totum uel pars ejus, siue anterior, siue media, siue posterior.

Partes uerò affecta minus principaliter plures esse possunt, eaq̄, uel propinqua cerebro, uel remota.

Propinqua cerebro sunt dua meninges pia primum, deinde durior: quibus additur pericranium.

Remota sunt Aretao, primum thorax cū pulmone & corde, qui in omnibus morbis acutis laborat: praterea cum eo connexa, ut nerui, os uentriculi, succiugens membrana, septum transuersum.

Et phrenitici neruis, repetit ibidem Aretaus, laborant. Et paulo post. Interdum precordia interius sunt sursumq̄, trahuntur & circumtenta cutis est.

Deinde interdum, ait autor, uitium in jecore est dolorq̄, interdum in liene. Et paulo post. Venter intumescit. Deniq̄, interdum, quod exempla confirmant, artus, ut brachia & pedes.

Atqui non tantum ex ijs partibus, quas Aretaus expresse in curatione nominat, sed & ex alijs affectis phrenitis nonnūq̄ oritur: ut ex renibus, uesica, intestinis, matrice & omnibus ferē membris inferioribus.

Imprimis uerò eas affici partes Medici quidam ueteres existimarūt, in quibus anima originem esse suspicati sunt, ut prater cerebrum, cor, diaphragma, propria quadam ratione fundum siue basis cerebri quam sessionem uocat Calius, cordis summitas, membrana qua cor tegit, arteria aorta, uena crassa. Sed quamuis hac affecta esse possint & soleant omnia, non tamen phrenitis cum delirium facient, nisi laeso capite, in quo anima regiam suam sedem habet.

Est igitur phrenitis cognata omnibus cerebri morbis, ut apoplexia, epilepsia, lethargo, caro, melancholia & alijs: cum quibus ut loco affecto conuenit: ita ab iisdem dissentit symptomate & causis. Symptoma est commune uel proprium.

Comune est febris, qua non est in apoplexia uel in alijs morbis cerebrū occupantibus.

Proprium est motus, qui in apoplexia soluitur, in phrenitide tantum deprauatur.

In epilepsia motus est conuulsiuus: in phrenitide uoluntarius.

Lethargum, caron, melancholiam parit fluxio frigidorum humorum, ut pituita & humoris melancholici: phrenitidem causat fluxio calidi humoris ut sanguinis & bilis utriusq̄.

Signa partium affectarum simpliciter.

Signa partium affectarum simpliciter alia sunt cerebri, alia meningum, alia aliarum partium. Rursus cerebri aut totius, aut partium ejus.

Affecti cerebri simpliciter signa alia manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, quae sub sensum cadunt, & sunt in externis partibus. Nam, ut refert Auicenna, cerebrum inflammatum interdū ita intumescit, ut suturae capitis separentur. Quod tamen, ait P. Salius ne dum uerificatur in phrenitide, sed nec apud me est possibile, cum suturae ex graui ictu non ita facile dissolui & dissipari possint, ne dum quod imaginari queat, ex tumore interno hoc accidere posset, nisi forsā hoc in puerulis admitteratur, in quibus suturarum tegamenta mollissima existunt, cartilaginosaq̄ corpora nondum ossa facta sunt.

Occulta sumuntur uel ab affectu proprio, uel dolore, uel decubitu, uel excretis, uel retentis.

Ab affectu proprio. Phrenitis est morbus proprius cerebri, ut cruditas stomachi. In cerebro enim principes animae facultates, ad quas delirium pertinet, sedem suam habent.

A dolore. Cerebrum aut non dolet, aut obscure & exiliter. Neq̄ enim per cerebri substantiam membrana sparguntur, quae ubi sunt, ibi sensus tactus locū habet. Dolet autē obscure, quod in cerebri mole et substantia medullari spiritus animalis, uehiculū nimirum, cui facultas tangendi insidet, existit.

Dolor



Dolor testitur obtusus cerebri affecti signū est. Si cerebrum pendulum non esset in quouis decubitu, & uni alicui parti caluae tantum & non toti subduceretur, cum melior esset et facilius in eam partem que affecta est, decubitus. Cum igitur spiritibus inflatum in medio capitis, perinde ut terra in mundo sustineatur, a decubitu signum eius affecti peti non potest. Solent tamen phrenitici plerumque primum in ventrem decumbere.

Ab Excretis. Ex oculis acris lacryma effundi solet: & sanguis e naribus stillat, nerui laborant, spinae dolent. Sunt enim hi extraordinarij ductus, per quos cerebrum humoris copia oppressum, ideoque agrotans sese exonerare conatur.

A retentis. Biliofa eaq; crassa per aures non excernuntur. Vt enim pituitosa saninitatis tempore per palatum & nares, magis tamen palatum: ita biliosa per aures expurgantur continuo. Similiter nec tenuia & fuliginosa in cerebro coaceruata per meninges, cranium & cutim expirant: unde retenta phrenitidem faciunt, aut factam augent.

Affecta pars alicujus cerebri signa similiter alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta nulla sunt propria, quod partes interna sunt, nisi communia cum toto cerebro, de quibus antea dictum.

Occulta sunt totidem, ut cerebri, sumpta uel ab affectu proprio, uel dolore, uel situ partis, uel decubitu, uel excretis, uel retentis.

Ab affectu proprio, id est, lesis actionibus signa sunt dubia. Pleriq; autem quibus uentriculus anterior cerebri est locus apprehensionis interioris, postremus memoriae, medius cogitationis, sic recensent. Anterior pars cerebri cum afficitur, imaginatio leditur: lesa ratione media pars patitur. Lesa a imaginatione & ratione anterior & media pars affecta est. Lesa deniq; memoria posterior pars afficitur, quamuis ea nondum affecta primarij, nihilominus tamen leditur memoria, eod quod in phrenitide phantasmata & numerosiora plus iusto & omnino deprauata offeruntur. Quibus uero eadem pars cerebri cogitat & meminit, usq; ab hoc loco signū nullū differentiae partis affectae, sed causa tantum uel uehementia petitur. Quod si enim cerebri substantia paulo sicciore fuerit, aptius memorandi facultati inserviet: sin humidior, aptius imaginandi facultati.

Itaq; si alterutra qualitas alterata fuerit, alterutrius facultatis laesa causa erit.

A dolore & situ partis. Dolor anterioris partis partem anteriorem: media, partem mediam: postrema, postremam partem affectam esse denotat. Omnium uero partium dolor usq; obtusus, totum cerebrū affici demonstrat.

A Decubitu. Haec nulla, ut in toto cerebro; uerisimile tamen est, ut si pars anterior cerebri laesa est, melius in eam egrotans decumbat: eod quod minus pendulum. Si pars posterior, melius in eam: si pars media melius in latera.

Ab Excretis. Ex oculo dextro acris lacryma effusa & sanguis e nare dextra stillans, partem dextram e directo sitam affectam monstrat: contra ex oculo & aure sinistra eadem manantia, partem sinistram.

A retentis. Similiter biliosa eaq; crassa per aurem dextram, non excreta, parte dextram laesam ostendet: contra sinistram.

Signa periclitantij affecti manifesta sunt et sensui obuia.

Meningum autem affectarum signa alia a: affectu proprio, alia a dolore, alia a situ partis, alia a decubitu, alia ab excretis, alia a retentis: quae pleraq; communia sunt cum cerebro nec ualde necessaria, quae peculiari-ter recensentur, eod quod siue membranae sola, quod raro fieri putat Iacchimus, siue etiam cerebrum, quod saepius, unicus sit curati-onis modus, & suturae coronali praesidia utrobique adhibentur. Differunt tamen actionibus lesis specie doloris & mutata qualitate. Nam in apostemate cerebri pulsus est undosus: dolor obtusus & grauis, adest rubedo aut fluities in oculis, ita ut appareant ophthalmici. In apostemate membranarum dolor praeter modum affligit, propter meningum extensionem: estq; punctorius ratione neruorum: pulsatorius quoq; ratione arteriarum, quibus praeditae sunt. Pulsus durus est ferrinus propter affectam duram matrem: paruus interdū propter induratam arteriam. Quod si igitur membrana primum afficiantur, dolor praecedit, usq; ingens, qui per occiput collo & uniuersa spinae communicatur, quod in affecto cerebro non continget necessario. Praeterea phrenitim ipsam ex tenui meninge potius quam ex cerebro gigni scripsit Galenus. Tametsi alibi fatetur tenuem meningem, ut qua cerebro tenaciter adhaerescit,



nisi cum eo nullum affectū subire posse, neque etiam cerebrum citra meningem affectam: sed statim unus affectum alteri oportet impartiri. Quamuis & dura meninx sola affecta esse possit, cum longius à cerebro distat, ne dilatio eius impediatur.

Signa affectarum, aliarum partium, ut thoracis & imi ventris & artuum similiter, alia sunt manifesta, alia occulta, qua ex relatione agrosantis & lesis actionibus, mutata qualitate, excretis & retentis facile cognosci possunt, & alibi explicantur.

DIVISIO PARTIVM AF- FECTARVM NON SIMPLICITER ET PRIMVM

quidem cerebri.

Pars affecta principalis nempe cerebrum, est affectum vel per se, vel per consensum. Per se affectum est cerebrum cum laborat ex inflammatione vel erysipelate. Per consensum afficitur, cum per se non laborat, sed à consentiente patitur, idq. fit aut positivè aut privativè. Positivè cum aliquid aliunde il-lapsum excipit, ut uaporem humoremque, vel

à membranis suis, uel à thorace ejusq. partibus, ut corde, pulmone, diaphragmate: uel ab imo uentre ejusq. partibus, ut stomacho, epate, liene, uesica, renibus, matrice: uel ab artibus, ut brachijs & pedibus. Privativè, cum non affluit, quod affluere debebat, eò quod uel impeditur, uel de-

SIGNA CEREBRI AF- FECTI PER CONSENSVM.

Signa cerebri per consensum affecti manifesta sunt ex definitione, quia cerebrum à se nullam morbi causam habet, nec inflammatum est, aut in temperie aliqua affectum.

Occulta sunt, quia delirium non est solitariū, subito fit, nec perpetuum est, demit eo quod fit solo diaphragmate inflammato, crescente alterius partis affectu augetur, sublato alio quouis aut remisso quiescit, capiti applicata remedia nihil conferunt. Deniq. delirium paruum est aut mediocre nec caput adeo calidum sentitur, aut ita rubent aut stillant oculi, tumentue eorum uenule.

Primum igitur compatitur positivè à membranis suis tum intrinsecis, tum extrinsecis, nempe pericranio. Verè enim locus inflammationis est membrana, per quam uasa primò disseminantur & substantia cerebricòpatitur, dū humorem calidum à membranis per uenas extrinsecus secundo loco excipit.

Deinde à pulmonibus, ut in peripneumonia, à corde, ut in febris: à succingente membrana, ut in pleuritide: à septo transuerso ut in inflammatione illius elatis ad cerebrum uaporibus.

Tertio à stomacho, à jecore, à liene & ceteris uentris partibus, nec non artibus inflammatis, aut uirus aliquod exhalantibus. Testatur id historia ab Hollerio relata de adolescente, cui tumor uelut inflammatio ad

malleolum dextrum obortus, & subsequentibus balbutie, febris latente, siti, & lingua fuliginosa phrenitico facto quartus dies mortem attulit, cum impediretur causerij admotio & scarificatio. Ab illa enim inflammatione qualitas uenenosa in caput efferebatur. Idem refert ex leui catarrho cuidam in facie ruborem natum fuisse: unde phrenitis, conuulsio, mors. Compatitur uerò & privativè à siccitate aut frigiditate, quemadmodum innuere uidetur Hipp. aph. 9. lib. 7. cum inquit.

A sanguinis profluuio desipientia, aut etiam conuulsio malum.

Id enim quod affluere debebat non affluit, eò quod deficit, nempe calor & spiritus animalis, propria instrumenta anima intelligentis & ratiocinantis, que ab immodico sanguinis per nares aut alio quocumq. profluuio exhauriuntur. Esse uerò hoc, quod inde oritur delirium non phreniticum, sed alterius generis ex eo colligitur, quod Hipp. ὄρεσις ὄρεσις uocat, quò mediocre deliramentum & mediocris animi alienatio denotatur. Phreniticum enim ab immodico tantum calore cum materia oritur. Impediri uerò potest calor & spiritus uitalis ex quo animalis nascitur, uel à spinali medulla obstructa, uel à neruis resolutis, uel spondylis colli intrinsecè uel extrinsecè luxatis.

Et si



Et si enim hec potius asthma morbum uel alium faciāt q̄ delirium, phrenitidis tamen quoq̄ causam esse posse uerisimile est.

Num uerò diaphragma affectum sit primariò, an uerò cerebrum, id est, an phrenitis sit idiopathica ex cerebro, an uerò sympathica ex diaphragmate, id ex tribus cognosci potest, contractione hypochondriorum, uoce & respiratione. Diaphragmate enim per se affecto præcordia mox ab initio intrò sursum reuelluntur: uox acuta, respiratio parua & frequens est.

Cerebro autem per se affecto retrahuntur hypochondria posterius: uox grauis est, respiratio magna & rara, id est, ex longis interuallis.

Reliqua uerò signa utriq̄ communia sunt, ut dolor circa eam partē, pulsus inæqualitas, delirium perpetuum & febris acutissima.

Deinde an cor primariò, an uerò cerebrū sit lesū, id quoq̄ præter cōmunia signa peculiari quodam signo distingui oportet: eo quod febris, ratione cuius à mania distinguitur, phrenitidem perpetuò comitatur. Delirium enim phreniticum sicut paulatim fieri solet & angendo procedere; ita quiescere nec subito nec affatim consueuit, autore Galeno. Febrile autem & quodcumq̄ aliud ex sympathia ortum subito. Præterea in febribus deliria ferocitatem non habent: in phrenitide uerò ualidiora sunt. Et simplex delirium ortum propter consensum aliarū partium frequens, ortum uerò ex idiopathia cerebri rarum. Deniq̄ deliria febrium ipsas febres semper sequuntur: phrenitis plerumq̄ febrē antecedit uel saltem comitatur.

Neḡ uerò delirium in phrenitide ubi cerebrum per se afficitur ita perpetuum intelligendum est, ut interdū agrotus ad mentē non redeat, dum nondum fanaticus omninò euasit. Perpetua uerò nihilominus hæc dicitur in sania: nam nullas habet certis uicibus remissiones.

II. LETHARGI pars affecta est cerebrum, idq̄ uel totum uel secundum partes tantum posteriores, ut quidam uolunt: & hoc principaliter, cuius ratione facultas rationalis patitur. Partes uerò affecta minus principaliter plures esse possunt: eaq̄ uel propinqua cerebro, uel remota. Propinqua cerebro sunt nerui, meninges, medulla spinalis. Remota sunt totum corpus, diaphragma, uiscera, imprimis uesica & intestinum imum.

Signa partis affectæ. Ac cerebri quidē affe-

cti signū est affectus proprius, excreta & retenta. Lethargus enī ut et phrenitis morbus est cerebri proprius. In cerebro enī principē anime facultates, ad quas obliuio & somnus profundus pertinet, resident. Os excrementis scatet, & tussunt à pituita labente, liquidumq̄ spuunt multū: nerui laborant, occiput dolet, biliosa excernuntur.

Signa meningū affectarū eadē qua cerebri.

Signa affectarum aliarum partium ex relatione agrotantis, & lesus actionibus, mutata qualitate, excretis et retentis cognoscuntur. Nerui enim dolent: spinali medulla applicata remedia profunt, totum corpus plumbeū uel liuidum, diaphragma inflammatum, aut intrò tractum: cor febre afflictum: uesica humorum acredine uexata: intestinum imum ad excretionem emortuum.

Est autem cerebrum affectum aut per se, aut per consensum.

Per se affectum est, cum laborat ex phlegmone uel dematosa. Per consensum, cum à consentiente patitur.

Signa partis affectæ per se, & per consensum. Cerebrum per se pati ostendunt signa phlegmones uel dematosa, de quibus alibi.

Per consensum autem affecti signa manifesta sunt ex definitione, quia cerebrum à se nullam morbi causam habet, nec inflammatum est, & symptomata in eodem statu permanent. Occulta sunt tum alia, tum præcedens aliquis morbus, & intermissio symptomatum. Præcessit enim morbus uel totius, uel alicuius partis. Totius, ut febris pituitosa. Partis, ut septi transversi, pulmonis, intestini & alius partis inferioris morbus pituitosus. Et symptomata remittuntur uel augentur, remisso uel aucto morbo principali. Compatitur uerò priuatiuè, cum uel deficit calor & spiritus animalis uel impeditur calor & spiritus uitalis, ex quo animalis nascitur, eodem modo, ut in phrenitide. Positiuè autem cum aliquid aliunde illapsū excipit, ut uaporem humorem uel à membranis suis, uel à toto corpore, uel à diaphragmate, uel ab alijs partibus.

III. MARASMI subiectam alijs unum est, nempe solida partes, cum sit tertia febris hæctica species. Sic enim febris uulgò diuidi solet, ut alia sit in spiritibus, ut ephemera, alia in humoribus, ut putrida, alia in solidis partibus, ut hæctica. Aegineta triplex facit.

πρῶτα.



μῦα, ὕδα & σπῆα, spiritum, humores & solidas partes: ut febris hectica triplex genus febrium contineat, ephemeram, putridā & hecticam, id quod uel de uno eodē, uel diuerso tēpore intelligi potest. Ex ephemerā enim febris putrida oritur: & ex putrida fit hectica. Sed & inflammari potest simul spiritus, humor & pars solida, & sic Aegineta intelligere uidetur: Alij humorem secundarium in marasmo affici asserunt, qui quadruplex est, humor inscius, ros, gluten et cambium. Alij aliter. Meo iudicio unum tabis & febris subjectum est, nēpe cor, ut phrenitidis & lethargi cerebrum. In omnienim febre cor potissimum affligitur, sed dissimili ratione. In ephemerā & putrida intēperies calida & sicca inest solida cordis substantia mediātē per spiritus & humores, & ἄξιον, secundum dispositionem, qua facili negotio auferri potest: in hectica uerō immediate & per se & ἄξιον, secundum habitum qui difficulter aut nullo modo euelli potest. Solida autem substantia uocatur, qua tribus cōstat partibus, solida, carnosā & spirituosā. Solida est stamen ex semine genitāli confectum, quod tanquam tela exorsa pars prima est, qua & membranosa & fibrosa dicitur. Carnosā est humor concretus ex sanguine materno affluēte, uacua interfilamenta substantia solida quasi rimas explens. Spirituosā utriusq; & solida & carnosā essentiā absoluit: inq; solida substantia maximē consistens omnes partes actionibus suis obeundis aptas facit. Ex quo apparet inutilem esse illorum distinctionem, qui tres febris hectica species faciunt ex hac triplici solida partis substantia. Omnes enim hae partes cū secreta nō sint, sed mixta inter se & cōfusa, equaliter exardescūt, neq; unius incendiū citra alterius partis inflammationē subsistere potest.

Sed nec illud pratermittendum, alium esse spiritum & aliud humidū, quod in diuersis febribus laborat. Duplex enī spiritus est, alius uagus, alius fixus. Vagus est fluens, qui ex alimento oritur. Fixus est, qui in humore primigenio consistit. Corrupto uago febris diaria oritur: consumto fixo febris hectica. Similiter humidum aliud primigenium, aliud aduentitium.

Primigenium est radicale, quod ex semine ortum essentiā mēbri constituit. Aduentitiū est, quod ex cibo & potu in sanguinem mutato prouenit, inq; substantiā nutriti abibit. Corrupto aduentitio febris putrida oritur: con-

sumto primigenio, marasmus. Vnde Auerrhoēs prudenter admodum febrem hecticā nō simpliciter per fixationē caloris, sed et exiccationem humiditatis definiuit. Sic enim ille 3. colliget. 11. Febris hectica est calor extraneus fixus in substantia membrorum impediens operationes & consumens humiditātē substantialem.

Ceterum cor in marasmo laborat uel per se, uel per cōsensum. Per se laborat, cum immediate & primum afficitur nullo prgresso alio morbo. Per cōsensum cū à parte quadā corporis lesa noxam accipit. Hac autem pars etsi multiplex esse possit, ut pulmo & diaphragma contiguū: continuus lien, renes, intestina, uterus & reliquae partes totius corporis, quibus cor per arterias cōsentit: dua tamen sunt praecipua, uentriculus & epar, quibus morbo infestat is cor uicinū prōtē & ipsum afficitur. In septo tamen transuerso Galenus marasmū nō uidit: hectica uerō febrem uidit, & hanc quidē absolutam, saepē uerō citius interimentem, q̄ plānē completa esset. Tabidi enim plerunq; moriuntur, anteq̄ hectica ad marcorē ueniat.

Cōafficitur autem cor uel positiuē uel priuatiuē. Positiuē, cū ab inflāmata parte quacūq; patitur, à qua calor incipiens, successiue per arterias cor petit, ibiq; penitus figitur. Priuatiuē, cum quod affluere debuit, nō accipit, eò quod aut impeditur, aut deficit. Affluere autē debuit uel spiritus animalis, uel nutrimentū uel spiritus uitalis. Spiritus animalis impeditur obstructo cerebro in apoplexia: nutrimentum salubre affecto epate uel splene. Spiritus uitalis affecto uētriculo, epate, splene deficit. Ex sanguine enim spiritus uitalis generatur.

Signa cordis affecti alia sunt manifesta, alia occulta. Ex manifestis nullū est, cum cor intus latens nō appareat, nisi dissecto post mortē corpore. Tū enī cor instar pyri rossi attenuatū uidebitur: quod in aulico quodā more animi confecto ob denegatā uirginem, cuius amore flagrabat, Phil. VVirsungus Medicus AVG. post frustratam curationem aperto cadauere obseruauit. Ex occultis sunt causa, effectus & utraq; simul: qua breuiter percurremus.

Causa sunt eadē, qua intēperiei calida, de quibus alibi. Nā v. g. μαρσμοῦ δὲν calido et sicco temperamento, eodē, siue naturali, siue acquisito pradisus est: & longo tempore uini generosi

generosi potu omnes partes corporis solidas excalefacit. Effectus est symptoma propriū, ut caloris à cibo sumto incrementum, quod caliditatem in alto corde celatam & occultam, perinde ut ignem in calce occultum infusa aqua arguit.

Utraq; simul sunt iuuantia, ut quod cordialium usus ualde prodest.

Signa cordis per se affecti sunt morbus partis proprius, magnitudo, numerus, tempus. Tabes enim uniuersalis totius corporis est proprium symptomacordis, quæ si magna est, nec præcessit alius morbus, nec intermit, cor per se affectum esse ostendit.

Signum cordis per consensum affecti sunt magna inflammatio uel alteratio partium consentientium, quæ præcessit. Quænam autem illa sit, id tum ex relatione egrotorum, tum ex proprijs cuiusq; partis indicijs cognosci potest. Verbi gratia, laborātis diaphragmatis signa sunt Galeno lib. 10. methodi, Pulsus durities, difficultas spirandi inæqualis & uaria. **III. APOPLEXIAE** pars affecta principaliter Paulo est $\kappa\omicron\mu\eta\ \delta\epsilon\ \chi\eta\ \tau\omicron\nu\ \nu\delta\ \rho\omega\nu$, communis neruorum origo. Minus principaliter affecta sunt omnes partes corporis, quæ sensu & motu præditæ sunt.

Est autem principium neruorum Aristoteli cor. Medicis, medulla cerebri. Itaq; ille x. probl. 9. apoplexiam fieri uoluit, cum humor in corde concreuit frigore. Rectius uerò Hipp. & Galenus alijs, omnes Medici principium illud cerebro tribuunt: licet non simpliciter. Neq; enim est principium γενέσεως sed διακρίσεως & πικρώσεως. Ac γενέσεως quidem, id est, originis non est, eò quod nerui ex cerebro non oriuntur, ut pars ab alia parte: cū prima omnium spermaticarum partium stamina simul & semel inchoentur, adumbrenturq;, non statim perficiuntur. Est autem principium διακρίσεως, id est, distributionis & officij, eò quod nerui à cerebro tanq; principio animale spiritum in totum corpus deducant. πικρώσεως uerò, id est, radicationis quoq; principium est, eò quod in cerebro nerui radices habeant uariè implicatas, sensimq; plantarum modo incrementum accipiant.

Rursus cerebri medulla duplex est, una medulla spina sic appellata, quod extra caluam elapsa in tota spina exporrigatur: altera, quæ intra caluam clausa continetur, ab eaq; nõ excidit. Hinc duplex neruorum principium statuunt: aliud mollium, aliud durorum: illud primum, hoc secundarium appellant. Medulla enim spinalis ut ex cerebro oritur, ita uim

omnem ab eodem accipit. Erit igitur Aegineta pars affecta in apoplexia medulla utraq;: una cerebri, spina altera.

Iam uerò cerebri duplex est diuisio: una ratione longitudinis: altera ratione profunditatis.

Ratione longitudinis, partium cerebri alia anterior, alia posterior.

Anterior est cerebrum in specie sic appellatum, quod rursus in dextram & sinistram partem proprio diaphragmate intrinsecus discretum est.

Posterior est cerebellum, sic dictum quasi paruum cerebrum, eò quod decuplo minus cerebro est: idq; rursus in partes diuiditur, quæ laterales dicuntur, & duos quasi globos inuicem oppositos constituunt.

Ratione profunditatis, cerebri pars alia extima, alia media est. Extima pars est externa superficies quam $\kappa\omicron\sigma\omicron\epsilon\iota\delta\eta$, id est, uariicosam dicunt.

Infinitos enim habet anfractus & circūuolutiones plurimas (quæ & meandri & spiræ & sulci & fossulae circulares dici possunt) easq; usus maximi. Venis enim & arterijs quæ & plures & majores quasi in illis alueis perreptant, tutum præbent domicilium, ne uel assiduus cerebri motionibus disrumpantur: uel si uacua spatia deessent, caliditate cerebri, præsertim in plenilunio, arctius comprimeret, quo restricto, spiritus facile suffocari, & calor extingui posset.

Media cerebri pars est recondita, quæ uentriculos & plexum choroidæ & $\sigma\omega\mu\alpha\ \psi\alpha\lambda\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$ complectitur. Ventriculi sunt quatuor: duo anteriores, medius & extremus. Duo anteriores, septum lucidum inter se distinguunt, semicirculi, uel potius auricula humana formam referentes: Galenus anteriores uocat: alij priores & superiores. Medius est, duorum priorum uentriculorum concursus & communis lacuna, in quam illorum uterq; humiliori sui sede dehiscens conuentum spirituum deponit. Biforis autem est, geminos de se profertens ductus, unum secerniculum dictum: alterum anonymon. Secerniculum est, qui antrosum declinui itinere ad basin cerebri descendit, expuens eo illius superuacua. Anonymos retrorsum in quartum uentriculum dirigitur atq; absorbitur. In extremo secerniculi peluis & infundibulum est, sic dictum, quod instar infundibili primū latior, deinde angustior est, per quod tanq; manicam Hippocratis aut saccum, cerebri pituita transcolatur. Huic glans pituitaria substermitur, carne porosa & bibula spongia instar illuic excipi-



excipiens, quam cum diu retinere nō possit, in quatuor canales deriuat, quorum duo retrorsum uiam capeunt ad palatum, totidē sub oculorum orbita ad nares, ut inde postea exhauriatur: pars uerō in lachrimas absumitur, fusa prius calore cerebri.

Extremus uentriculus est quartus, cerebello & dorsali medulla communis, omnium minimus & solidissimus, qui cum liberalem spiritum affluxum admittere debeat, primū amplior est, hinc iuxta medullam dorsisensum arctatur, donec tandē ad cerebelli precipitium in acumen rostri desinat, instar calami scriptorij: unde & calamus uocant.

Plexus choroides est contextus uenarum & arteriarum labyrinthicus, utriusque unus, gemino uentriculo priori obliquē insistentis, spiritum animale omnibus suis numeris absolutum perficiens, ex spiritu uitali, quem ex uenis jugularibus & arterijs carotidibus, ex quibus constat, accipit, & ut quadam mirifica illum perficiendi, quā à cerebro eiusque medulla acquirit, tandemque perfectum intra uentriculos tanquam thesaurum cerebri recondit. σωμα ψαλλοειδής est corpus camera modo extructum, tribus quasi columnis suffultum, sub quo medius uentriculus apparet. Cerebri igitur amplissimā molē Atlantis instar sustinet, ne tertium uentriculum comprimatur; indeque obstruatur.

Ex quibus apparet uentriculorum cerebri eum esse usum, ut tū excrementis à cerebro segregatis deseruiant, tum spiritus animales à plexu choroide acceptos conseruet, ut inde semper presentes ad omne corpus per neruos, ad animae sentiētis transuersionem, illiusque facultatum omnium actiones edendas transfundant.

Apoplexia igitur δευτερον erit tū substantia cerebri, tū uentriculi, tum processus uentriculorum, tum uasa ex quibus construitur. Grauius tamen cerebri corpus afficitur, minus uentriculi eius: qua in re ab epilepsia differt: in qua grauius affligitur cerebrum circa uentriculos, minus penes corpus.

Afficitur autem cerebrum, uel per se, uel per consensum.

Per se affectū est, cum immediatē & primū afficitur, nullo praegresso morbo, id quod fit cum aut intēperie laborat, ob quam spiritus animales non conficiuntur amplius, sed extinguuntur uel suffocantur: uel cum apoplexia materialis est, orta ex humore in uentriculos cerebri nimis copioso, & crasso, & subito irruente; unde cerebri meatus obstruuntur,

fitque spiritus animalis interceptio. Humor enim et status secundū naturā in uentriculos penetrans, eosdem minimē laedit.

Per consensum laborat, cum à parte quadā corporis lesa coafficitur: idque bifariam: positiuē & priuatiuē.

Positiuē cū status uel uapor crassus uasa occludit, ut accidit ebrijs: unde cohibito spiritu sanguis infrigescit & concreuit. Vel tumor praeter naturā alicujus partis uicina cerebro contiguam, proximamque illius substantiam astringit, meatusque spiritus animalis egredientis interceptio.

Priuatiuē cum spiritus non exitu sed aditu ad cerebrū prohibetur, ut cum pituita uenas jugulares et arterias soporarias obstruit, & quasi laqueus collū premens hominē strangulat. Spiritus enim uitalis cerebro nō transmittitur, ex cuius perfectiore concoctione, animalē qui planē momentaneus est, inque nihilū facillimē abit, subinde generari necesse est, quod tamē raro contingit. Illud uerō scipius, cum in habitu athletico plethora totū corpus distendit, & natium calorē, adeoque spiritum uitalē suffocat, unde apoplexia oritur, quam Hipp. δροληψιν φλεβων, Galenus ἀσφυξίαν uocat: aut cum uulnere in capite accepto, eoque ad cerebri usque sinus penetrante spiritus plurimi confertim euanescent.

Laborat uerō in apoplexia non tantum principium neruorum, sed etiā ipsi nerui affecto cerebro siue per se, siue per consensum. Ut enim chorda in instrumento muta sunt sine plethora: ita nerui in corpore humano suum officium non faciunt, nisi impulsī à spiritu animali, qui in apoplexia deficit.

Ex ceteris partibus, quae etiam per consensum laborant imprimis est cor, cui cerebrum potissimum consentit ratione respirationis.


Signa cerebri affecti alia sunt manifesta, alia occulta. Manifestum nullū est, cum cerebrum in calua delitescens non appareat. Occulta sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt eadem, quae plethora & cacochymia, de quibus alibi. Nam u. g. apoplecticus angustam ceruicem habēs crebriore crapula cerebrum naturā debile eneruauit.

Effectus est symptoma cerebri proprium, nepe functionis animalis à cerebro proficiscentis, id est, mētis, sensus & motus abolitio.

Utraque simul sunt iuuantia, ut quod cerebro applicata remedia profunt.

Signa cerebri per se uel per consensum affecti sunt: magnitudo & numerus. Nam apoplexia si uehemens sit & nullo praegresso alio



alio morbo contigerit, per se cerebrum afficitur: si debilis, & antegressum morbum sequatur, per consensum laborare designat.

Quod autem corpus cerebri grauius afficitur in apoplexia, quam sinus ipsius, cui contrarium in epilepsia accidit, id ex effectu cognoscitur. Nam si apoplexia ex sola uentriculorum cerebri obstructione oriretur, epilepsia perpetuo praecurreret: & apoplexia solutionem sequeretur semper epilepsia. Neque enim tota potest tolli obstructio, priusquam media auferatur: nec totus sinus implebitur priusquam medius. Ex quo sequitur in epilepsia maxime laborare uentriculos ab adhasu materia: at in apoplexia obstrui corpus cerebri, uel, ut Paulus belle admodum loquitur, neruorum initium, id est, eam partem cerebri, unde nerui exorsi spiritum animale à cerebro accipiunt.

Rursus utraq; cerebri pars tam dextra quam sinistra afficitur, cum hominem rapit subito: altera tantum, cum in paralyin desinit. Affici denique non tam anteriores uentriculos quam mediam & postremum, qui sunt principes, plerique existimant, quod apoplexia principes cerebri actiones, qua sunt cognitio, sensus & motus, aboleat. Quod tamen alijs non placet, qui interiores facultates sedibus in cerebro designatis non distinguunt, ut alibi retulimus.

V EPILEPSIAE subiectum principale Paulo est cerebrum, & interdum omnes sinus illius. Minus principale aliud est morbi, aliud symptomatis. Morbi subiectum uarium est, ut os uentriculi, epar, lien, intestina, renes, uesica, uterus, testes, uasa spermatica, artus, habitus totius corporis. Symptomatis est uariuissimum corpus, per quod nerui distribuuntur, quodque in paroxysmo concutitur. Grauius autem (ait Galenus) affligitur cerebrum circa uentriculos, minus penes medullam: qua in re à morbo attonito differt: ut supra in apoplexia diximus. Alij aliter. In apoplexia enim cauitatem uentriculorum: in epilepsia membranam eosdem succingentem πλωτον δεικνύον statuunt. Alij denique, medium uentriculum cerebri: alij posteriorem, alij utrumque, uel modo unum, modo alterum, uel etiam primum affici statuunt.

Laborat autem cerebrum uel per se, uel per consensum. Per se afficitur cum aut male temperatum est imbecillumue, unde malus humor semiobstruens oritur: aut uias per quas

superflua recipit nimis laxas, aut meatus, per quos expurgari solet, nimis astrictos habet.

Per consensum laborat, cum à parte quadam corporis lesa, qua illi consentit, noxam accipit, et si ipsum uitio careat: idque fit bifariam, positiuè & priuatiuè. Positiuè, cum flatus uel uapor uitiosus ab aliqua parte consentiente ascendens uentriculos cerebri, uel nimia quantitate semiobstruit, uel mala qualitate offendit & ad expulsionem irritat.

Priuatiuè cum non affluit, quod affluere debuit, ut cum ex inedia succus in cerebro biliosus biliosior redditur. Vnde Galenus eos, qui epilepsij corripuntur ob solam stomachi lesam actionem, ex inedia uehementer ledi asserit lib. de uera sectione aduersus Erasistratum. Neque enim priuationem hic aliter interpretari possumus, & aliter quidem, quam in conuulsione qua ab utraq; causa, inanitate & plenitudine neruorum & tendinum musculorum oriri solet, his siccioribus relictis, uel etiam immodicè madefactis. Ea enim conuulsio fit neruis per se affectis, qui in epilepsia conuelluntur, non quod per se affecti sunt, sed quod per consensum cerebro affecto.

Signa cerebri affecti alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, ut pituitosi humoris ex ambabus naribus & ex ore profluxio, qua interdum in paroxysmis epilepticorum contingit: prolapsus item alicuius de substantia processuum cerebri, ob morbi uolentiam, quod & ipsum aliquando euenit. Mortuorum uero cerebrum, uentriculi, & sacra fistula plerumque limpida aqua esse imbuta & repleta, annotauit Coiterus praestans Anatomicus.

Ex occultis sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt eadem qua morbi, de quibus alibi. Nam & epilepsia obnoxius est, cui caput pituita nutrit, eamque incurrit, si nimium motum à cibo ineat.

Effectus est symptoma cerebri proprium, ut mentis, sensuumque omnium ablatio.

Utraque simul, ut quod cerebro applicata remedia profunt.

Signa cerebri affecti per se & per consensum, sunt affectus proprius, magnitudo & numerus. Nam si caput ferè semper graue sit, epilepsia sit uehemens & repentina, & nul-



Et nulla in reliquo corpore labes procedens, per se cerebrum affectum esse ostendit: si contra nulla sit capitis grauitas & epilepsia debilis, per consensum id affici designabit.

Aqua autem parte consentiente oriatur, id peculiaribus signis cognosci oportet.

A uentriculo enim si fuerit, excitatur uel post crapulam, in pituitosis: uel post inediam in biliosis, praecedit cardiogmos, anxietas, nausea.

Ab hypochondrijs, ut epate, liene, intestinis si fuerit, tum ructus & flatus copiosi prodeunt, praecordia tument, intestina murmurant, uomitio fatigat.

In specie, si ab hepate sit, adest tussicula quadam sicca, sine sputo.

Si a splene, totum corpus ad nigrum & melancholicum uergit.

Si ab intestinis, uenter sentit corrosione, os fluit a multis humiditatibus, ascarides exeunt.

A renibus & uesica si fuerit, earundem partium peculiaria symptomata praecedunt, ut dolor, grauitas, tumor. Eadem est ratio uteri, testium & uasorum spermaticorum, artuum & habitus totius corporis. Praecedit enim retentio menstruum & seminis, ex artibus aut crure & digitis frigida quadam aura sursum ascendere putatur, febris uniuersum corporis habitum infestat.

Rursus ea pars cerebri laborat, in quam epilepticus cadere solet. Quod autem materia magis in uentriculo medio & posteriore haereat, id ostendit, quod difficiliter excutitur.

VI. TETANI, quatenus spasmm in genere significat, subiectum principale sunt instrumenta motui dicata, eaq, principalia, ut tendo & musculus. Minus principale sunt instrumenta motus minus principalia, ut: nerui & ligamenta, quaq, cum illis consentiunt, ut sunt cerebrum, spina medulla, membrana, uentriculus, diaphragma & alia neruosa corpora. Sunt enim nerui canales, per quos cerebrum singulis partibus, qua moueri debent, uim motricem distribuit, non aliter quam epa per uenas nutrimentum: & cor per arterias uitalem spiritum iisdem communicat.

Tetani autem in specie sic dicti pars affecta sunt tum musculi, tum nerui spinales, qui caput mouent, suntq, duplices: anteriores

& posteriores. In tetano eni proprie sic dicto musculi a priori & posteriori parte ex aequo distenduntur: inemprosthotono et opisthotono inaequaliter. In illo enim nerui anteriores: in hoc posteriores palma in trahendo obtinent. Quarta uero speciei, de qua in tetani nomine diximus, subiectum sunt nerui & musculi, qui corpus in latera, id est, tum dextrorsum, tum sinistrorsum flectunt, qui cum pauciores sint, rara haec species est, ideoq, uel incognita ueteribus, uel omissa obraritate. Frequentiores itaq, species priores & certis nominibus insignita, ed quod musculi, qui uel antrorsum uel retrorsum mouent, laterales uincunt maiore numero.

Ceterum in spasmo pars anterior uel posterior potius laborat: in paralyssi pars dextra uel sinistra. Spasmm enim a musculis incipit, & tendit in cerebrum: unde fit motus antrorsum uel retrorsum. Paralyssi a cerebro incipit & in neruos desinit: unde promte facultas cerebri materiam ad partem dextram uel sinistram detrudat.

Rursus neruorum pars affecta, alia cavitata est, alia substantia.

Cavitas si affecta sit, spasmm parit. Si substantia, paralyssin. In spasmo enim nerui sunt breuiores repletis cavitatibus. In paralyssi idem sunt molliores humectatis & distentis substantijs. Nec tamen & ipsi non contrahuntur in paralyssi, ed quod malum a principio neruorum originem habeat. Alijs contrarium uidetur, quibus neruorum pars alia externa, alia interna est. Externa pars, ajunt, si affecta sit, spasmm efficit. Si interna, id est, medulla paralyssin. Humor enim crassus & siccus, qui conuellit neruum, illius interiora seu medullam subire non potest. Qui uero committit paralyssin, cum sit tenuis & fluidus, facile per medullam sese insinuat. Palemonem in hac controuersia aget plurium signorum & affecte partis principalis in utroq, affectu consideratio. In paralyssi enim principaliter neruus medullaris ladicatur: in spasmo musculus contumacior: & conuulsionis uis consideratur in motu in iusto: paralyseos uero in impotentia mouendi. Praeterea, ut ait Capouaccius, musculi contrahuntur a neruis in spasmo: a ligamentis in paralyssi, unde & membra contracta manent, nec conuelluntur.

Præterea, ut ait Capouaccius, musculi contrahuntur a neruis in spasmo: a ligamentis in paralyssi, unde & membra contracta manent, nec conuelluntur.



Ut uerò conuulsio uniuersalis in musculis totius corporis conspiciatur: sic particularis (quam quidam in specie spasmodum uocant) in certa dumtaxat parte affecta contingit, à qua proprium interdum nomen sortitur. Contractio enim musculo oris, uocatur spasmus cynicus: musculo mandibularum $\rho\epsilon\sigma\mu\delta\varsigma$, musculo oculorum $\sigma\pi\alpha\sigma\mu\delta\varsigma$, musculo pectoris $\pi\epsilon\chi\theta\epsilon\sigma\mu\delta\varsigma$, id est, spiritus subsistens: musculo obsecanarum partium $\pi\epsilon\tau\alpha\sigma\mu\delta\varsigma$: musculo deniq; alio ad motum alterius partis destinato, spasmus simpliciter: nostris **deu Krampf** appellatur, cumq; proprio nomine careat cum additione huius uel illius partis effertur, id quod & supra in nomine epilepsia monuimus.

Afficitur autem neruus & musculus, uel per se, uel per consensum.

Per se affectus est, cum primum & immediate morbo uel causa morbi afficitur, id quod fit laesa facultate uel ex inanitione, uel ex repletione. Vtrobique enim magnitudo immixtaur secundum longitudinem, latitudine uerò augeta uel immixta. Augetur latitudo à repletione, imminuitur ab inanitione.

Per consensum laborat, cum à parte quadam corporis laesa coafficitur, idq; bifariam: positine & priuatiue. Positine, cum siue humorem aut uaporem à cerebro aut alio membro, ut uentriculo, colo intestino, diaphragmate, liene, mesaræo per se affecto: imprimis uerò inflammato delabentem excipit: ex quibus uapor musculos, non neruos replet, teste Galeno: siue etiam prauam aliquam aut uenenatam qualitatem: ut ex morsu siue punctione scorpionis uel alterius uenenati animalis. Quem spasmus à maligna qualitate ortum Arabes non proportionatum ad materiam: ut priorem ab humore profectum proportionatum ad materiam uocant. Materia enim in qua, est mobile neruosum, quod stimulaturn à malitia qualitatis sese contrahit ut expellat sibi non proportionatum, id est, incongruens: non aliter quam animalia quedam faciunt, que ut grauius percutiant, sese primò contrahunt, ut majorem impetum faciant: non refugit autem humorem ex repletione ortum tanquam proportionatum, sed sibi aliquo adjecto tantum sese contrahit. Alij tamen spasmus non proportionatum ad materiam

esse spasmus per consensum negant, eò quod à neruis incipiens, in cerebrum desinit: id quod spasmu uero & primario conuenit: praesertim cum is ad spasmus à repletionem reduci possit. Nerui enim cum uellcantur, ad locum dolentem expultrix humores mittit, qui subito affluxu replent & inflammationem faciunt: unde fit conuulsio. Auerroës conuulsionem à re pungente ortam prorsus negat spasmus esse, sed expansionem uerbo barbaro uocat. Eadem est ratio uulneris, à quo, ut morsu scorpj, interdum conuulsio similem ob causam oritur. Priuatiue afficitur cum non affluit, quod affluere debuit, eò quod uel impeditur, ut spiritus repleto cerebro ex crapula: uel deficit, ut idem spiritus eodem cerebro affectione grauiore oppresso: unde neruus refrigeratur & adstringitur.

Sic conuulsio interdum oritur, cum pondus graue neruosis partibus superponitur, ibiq; diutius permanet, ut refert Calius Aur.

Huc uerò pertinet & secundaria illa conuulsio, qua fit ex euentu, cum resolutio unius musculi facit conuulsionem alterius, de qua in nomine paralysis diximus.

SIGNA musculi & nerui affecti, alia sunt manifesta, alia occulta. Manifesta sunt qua interdum occurrunt, ut cum caput musculi aut tendo insignis ob externam aliquam causam grauius offenditur, u. g. puncturam, contusionem, luxationem, inuisionem. Hæc enim sensu percipi possunt. Occulta sunt, qua usu eueniunt ut plurimum, cum nerui in internis, $\eta\gamma\sigma\sigma$, sensum latentibus partibus uersantur: suntq; triplicia, causa, effectus & utraq; simul.

Causa, ut phrenitis, punctura, uulnus & alia, de quibus suo loco.

Effectus est symptoma proprium, ut deprauata motus uoluntarij actio, siue contractio & distentio membrorum cum dolore, qua solis musculis conuenit. Vbi enim homines sani sunt, nerui contrahuntur ad sua principia citra dolorem: ubi agroti, cum dolore, & contra uoluntatem liberam. Cognoscitur uerò etiam ex pulsû, qui in neruis affectis est extensus, instar sagittæ ascendens & descendens.

Utraq; simul, ut quod affectus musculorū grassatur in populum, agrotans illo laborare consuevit, & musculos roborantia prosunt.



SIGNA musculorum per se affectorum sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuans. Quod si enim musculorum dolor sit uehemens, nullus praecesserit morbus, nec intermittat, & remedia musculo affecto adhibita iuuent, eum per se affici, id est, causam conuulsionis intra se continere ostendet.

SIGNVM musculi per consensum affecti similiter est quadruplex. Paruitas, numerus, tempus et iuuans. Dolor enim conuulsionis non est uehemens, nec solitarius, nec perpetuus. Praecessit enim lesio quadam uentriculi, uteri, uel aliarum partium, ex quarum sympathia spasmus oritur. Nec iuuant remedia applicata musculo affecto per consensum, sed applicata parti affecta per se, ut uentriculo, utero, uasis spermaticis. Quanam autem ex his partibus per se afficiantur, ex proprijs illorū signis cognosci oportet. Nam u. g. uenterculus per se laborabit, musculi per consensum, si dolor sit circa ipsum, cruditas, cibi corruptio, nauſea. Vterus affligetur si retenti menses. Spermatica uasa, si semen alienam qualitatem habeat. Cerebrum per se affectum erit nec transmittet spiritus, si laboret ex intemperie calida uel frigida, adsit destillatio, iuuent quae sunt utilia: ledant, qua noxia cerebro admoventur.

SIGNA uerò partis conuulsa à paralyſi in spasmo cynico sunt peculiariora, qua cognoscere multum refert, ne remedia parti sana applicentur, qua laboranti conueniunt. Nota igitur utriusq, quatuor sunt, tractus, saliuatio, facilitas os claudendi & dolor.

Primum enim pars sana in paralyſi, cum sit sicciior, trahit ad se agram, utpote laxam & sequacem. Contra pars sana in conuulsione trahitur ab agra nimirum tensa, rigida, contracta.

Secundo, si pars affecta sit à paralyſi, multa est & frequens saliuatio, cū fiat ab humore tenui. Sin à conuulsione cōtingat, saliuatione caret, cū fiat ab humore crasso & sicco.

Tertio, si musculus laboret à conuulsione, melius os clauditur, quam à paralyſi.

Quarto, si musculus maxilla sit resolutus, nullum aut perexiguum sensum, sed & nullum dolorem percipit: conuulsus autem suo sensu ualet & dolore premitur.

VII. *ANGINAE* subjectum Aretae duplex est: πνεύμα, spiritus & τὸ ἔργον αἰσ

ἀναπνοῆς, instrumenta respirationis. Anginam enim uocat omnem strangulationem in faucibus, uitio siue spiritus, siue faucium factam. Interdum igitur solus spiritus afficitur, ad calidissimum siccissimumq, conuersus, nulla corporis parte inflammatione laborante. Ne uerò incredibile alicui uideatur, Aretaeus duobus exemplis & duplici analogia probare conatur. Primum est à locis Charonae, in quibus aura, quam quis adducit, noxam adfert, ut ait Gal. 2. de nat. hum. uel, ut ait Aretaeus: strangulatisimè, citra ullum corporis affectum. Sic autem dicta sunt illa loca à Charone nauta inferorum, quasi infernalialia. Similia loca sunt auerna sic dicta q. ἀόρα, id est, sine aibus, quod illa aues adire nequeant: qualem fuisse adem sacramin Achilli insula ante Borysthenem sita scripsit Iulius Solinus cap. 29. Secundum est à rabido cane, quo uel in faciem tantum spiritum exhalante, homo, qui animam duxerit, mox in rabiem agitur, etiamsi canis non momorderit.

Analogia prima est haec. Eadem est ratio spiritus qua humoris.

Humor nocet & intra & extra corpus. Ergo & spiritus. Analogia altera est haec. Eadem est ratio morborum & medicamentorum perniciosorum. Nam u. g. morbus est febris: medicamentum perniciosum est ueratrum album: à quorum utroq, homines aequaliter uomunt. Atqui morbus est instar spiritus: medicamentum instar humoris. Vt igitur humor intus nocet, ita & spiritus. Tanta uerò, ait, cognatio est, inter uenenum assumptum & aërem spirando haustum, ut uulgius pestem Atticam, qua ab aëre infecto pendeat, ex puteis Pyreai ueneno Peloponnesium corruptis profectum esse existimaret. Haec ille satis prolixè, sed digressorio argumento. Potest & addi illa ratio, sumta ab historia, quam Ioh. Heurnius, Medicus olim Leydensis, his uerbis recitat libro de morbis pectoris. Ego, ait, phreniticum jam phanaticum redditum, qui septem diebus uivόντων, ἔργων intuens quosuis inuadebat, à fati secui, nec ullum usquam phlegmones uestigium deprehendere potui. Corpus hoc athletico erat robore & habitu, constantisq, atatis, uini usu rigatū calore. Haecenus ille. Ex hoc enim & ipso constat, ut phrenitidè,

ait



ita & anginam à solo spiritu excalesceto sine inflammatione posse fieri.

Caterum hoc in loco non tam quaritur, num spiritus suffocare possit, quam num pars affecta angina sit. Neg. enim per se strangulat, sed quatenus fauces adstringit, & exitu fuliginem superfluam prohibet. Angina enim est non qualibet spiritus ablatio, sed qua sit compressis faucibus.

Rectius igitur illud alterum est, quod addit Aretaeus, τὸ ὀργανὸν τῆς ἀναπνοῆς; id quod οὐκ ἔσθ' ἄλλοις intelligi debet. Instrumenta enim respirationis, sunt partes vitales, quae respirationem per se faciunt, ut pulmones, thorax, aspera arteria, guttur, diaphragma & thoracis muscoli. Ex quibus pars agens est diaphragma & muscoli thoracis, qui dilatant & comprimunt. Passiens est pulmo & guttur, quae dilatantur & comprimuntur. Rursus in pulmone ista sunt quatuor: trachea arteria, & propagines illius in pulmonem: uena arteriosa, arteria uenosa, & pulmonis mollis substantia. Guttur est larynx, seu Ἐρῶν καὶ Φάρυγξ, id est, trachea arteria principium. Ex his igitur non qualibet pars sed solum guttur affectum subjectum principale angina est. Minus principale sunt partes quae laryngi (sic enim guttur Graeci uocant) uel contiguae sunt, uel consentiunt. Contiguae sunt oesophagus, glandulae, epiglottis, uertebrae colli & muscoli illarum partium. Consentiant cor et cerebrum, ratione respirationis, quae utriusque communis functio sympathica est, nec non nerui orti à cerebro. Improprie igitur, quamuis non male, uulgo faucium affectus angina appellari solet, cum fauces, ut in nomine huius morbi diximus, sit totum oris internum spatium, ubi gula et aspera arteriae extrema concurrunt. Non male autem dicitur, eò quod una pars sine altera uix affici solet: praesertim cum angina uocari soleat morbus, non tantum uitata respirationis sed & deglutitionis. Et hac in genere.

In specie pars affecta anginae quadruplex est, pro diuersitate quatuor specierum, in quas diuiditur. ἰσχυρὰ igitur subjectum sunt interni: ἰσχυρὰ ἰσχυρὰ externi muscoli gutturis. ἰσχυρὰ ἰσχυρὰ subjectum sunt interni: ἰσχυρὰ ἰσχυρὰ externi muscoli pharyngis, quam gulam uocant.

Afficiuntur autem muscoli faucium uel per se, uel per consensum.

Per se affecti sunt, cum illis morbus, aut causa morbi insidet, id quod sit inflammatione alioue tumore affectis, uel etiam distentis.

Per consensum laborant, cum à parte consentiente coafficiuntur, idque bifariam. Positiue & priuatiue.

Positiue, cum aut catarrhus seu materia pituitosa à cerebro ad asperam arteriam, uel ad oesophagum descendit: aut à uenis jugularibus magna sanguinis irruit copia, aut aliunde, ut cum per crisin angina alteri succedit morbo, ut lethargo, phrenitidi, dolori capitis. Catarrhus igitur transiens ueram anginam non faciet: ueram contra si fauces in tumorem attollat.

Priuatiue: cum uel impeditur spiritus obluxatas colli uertebrae in anteriorem partem & potissimum secundam aut tertiam, quae introrsum uergentes guttur comprimunt: uel deficit, ut cum inflammatur aspera arteria, uel neruus magnus, qui ex uertebrae colli ac per pericardium elatus una cum illo diaphragmati implantatur, unde angina illa occulta, ejusque seu symptomata oriuntur, quorum Aretaeus meminit. Hac igitur notham, non ueram anginam faciunt.

SIGNA faucium affectarum communia alia manifesta sunt, alia occulta. Manifesta sunt, si externi muscoli laborent: & agrotus sensu deprehendit dolorem partis quae praecipue affecta est. Occulta sunt causa, effectus & utraq. simul.

Causa sunt tum adix, tum eadem qua fluxionis, de quibus suo loco. Nam u. g. iuuenis temperatura sanguinea, constitutione humida precedente, fluxionem à capite & à ceruice ad guttur diutius expertus est, quam non magni fecit, unde fauces intumuerunt.

Effectus sunt symptomata propria, ut spirandi & deglutiendi: item loquendi & collum mouendi difficultas.

Utraque simul sunt quod angina hoc tempore grassatur, agrotus ex faucibus laborare consuevit, & gutturi applicata remedia profunt.

SIGNA propria partium affectarum cuiusque speciei anginae sunt haec.



Si inflammata fuerit aspera arteria, agrotus difficillimè respirabit: facilius deglutiet. Si œsophagus laborabit: difficilium deglutiet, facilius respirabit.

Si interni, hoc est, duodecim laryngis musculi inflammantur, nihil apparet, nec foris nec intus ulla caloris aut molis mutatio, uox abolita, sitis uehemens: estq; & hæc occulta angina, cuius Arætaus meminit.

Si externi musculi laryngis laborent: omnia sunt remissiora, foris calor & color ruber apparet, eger non rectè loquitur.

Si fauces interna ad œsophagum inflammantur, potus hic per nares remeat, & à depressa lingua fit tumor conspicuus. Si externa, non solum fauces, sed etiam ceruix & pectus rubescunt, egerq; non uehementer dolet, nec difficulter spirat.

SIGNA faucium per se affectarum sunt magnitudo, numerus & tempus.

Angina enim uehemens est, nec præcessit alius morbus, excepta fluxione, nec intermittit.

SIGNA faucium per consensum affectarum sunt paruitas, numerus, tempus, iuuans. Symptomata enim sunt remissiora, angina alijs superuenit, ut peripneumonia, pleuritidi, præfocationi, luxationi uertebrae ceruicis: facile mutatur & intermittit, nec subsidia gutturi gulae adhibita profunt. Nam v. g. in peripneumonia mala rubent: in pleuritide latus dolet: in præfocatione uterus.

Si prima ceruicis uertebra luxata sint, cognoscetur ex causis, effectis & iuuantibus.

Causa sunt habitus corporis & euentus fortuitus, de quibus alibi. Nam v. g. anginam patitur puer, uel adultus etiam, molli corporis habitu præditus ex ictu suscepto in collo: luxationi enim illi præcipuè obnoxij sunt, quorum uertebrae laxi ligamenti inter se connectuntur, ut sunt pueri & ceteri molli corporis habitu præditi.

Effectus est cavitatis rotunda in ceruice manifesta sine quocunq; tumore, cum summo respirationis, imprimis uero deglutitionis incommodo.

Utraq; simul sunt iuuantia, eò quod ea ledunt quæ luxatam uertebrae adhuc magis in eandem partem expellunt. Iuuant

quæ musculorum & chordarum tensionem laxant: & luxatam uertebrae restitunt.

VIII. Vuula & Columella subjectum est curculio inflammatus uel relaxatus. Hanc enim inter utrumq; morbi nomen differentiam retinemus, quam in nominibus morborum ex iam communi loquendæ consuetudine posuimus, ut uuula sit curculio affectus ex inflammatione: columella ex relatione. Eadem est ratio lori & simbræ: nisi quis aliam interpretationem malit, & tum lorum tum craspedon non ad gargareonem sed ad tunicam palati referat, quæ inflammata à tumore instar alarum uespertilionis sese extendit. Quod genus phlegmones non semel se obseruasse; nec id alijs remedijs, quàm alijs oris inflammationes persanauisse refert Ioh. Riolanus.

Curculio autem afficitur uel per se, uel per consensum, idq; positiuè & priuatiuè non aliter quam fauces, de quibus præcedenti capite. Interdum enim prauis succi ob propriam imbecillitatem partis in ea parte paulatim contrahuntur: sapius uero à uicinioribus partibus, præcipuè ab ipso cerebro malè affecto, & destillationi obnoxio ad eam transmittuntur.

SIGNA simpliciter affecti curculionis alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta sunt, quæ occurrunt in oculos. Apparet enim gargareo, si quis aperto plurimum ore toto linguam deprimat.

Occulta sunt cause, effectus & utraque simul.

Causa sunt eadem quæ fluxionis, ut redundantia humoris alicuius sine pituita, siue sanguinis siue alterius.

Effectus est symptoma proprium, nempe molestia in deglutendo & loquendo, cum curculio non tantum deglutitioni seruiat, sed et sit plectrum uocis.

Utraq; simul sunt iuuantia. Columella enim apposita iuuant, quæ excedentem qualitatem temperant, ac nocent similia, à quibus præsens excessus sine fouetur, siue etiam augetur.

SIGNA curculionis per se affecti sunt, si uehemens sit affectus, si comitem non habeat, si urgeat sine intermissione. Signa per consensum affecti sunt contraria, quibus &

iuuantia



juuantia adjungi debent. Gargareoni enim apposita non juuant. Rarò autem per consensum: sapius per se afficitur.

IX. Tonsillarum nomen & morbum & partem affectam significat, ut supra monuimus. Pars itaq; affecta tonsillarum, tonsilla sunt, hoc est, duæ glandula pharyngis paristhmia dictæ, quæ fauces, os & linguam saliuâ irrigant, ne partes illæ ob continuum motum exsiccentur: & ut gustatio fieri possit. Vt enim coctio in uentriculo sine elixatione non perficitur: ita nec gustatio sine madore.

Nullus autem est morbus, qui hanc partem infestare non possit, & plerumq; etiam soleat, imprimis phlegmone, tumor & ulcerâ: id quod mirum uideri non debet. Glandula enim inter cetera etiam hunc finem habent, ut excrementa suscipiant, & cenosam corporis nostri humiditatem absorbant. Hinc ἰσθμιάζων deductum uideatur, quo non optimè ualentem uitam ducere significant Græci. Quamuis enim glandula plerq;, ut ea, quæ nervis carent, sensum non habeant: ideoq; non admodum agrotent, faciliè tamen laborant, laborante reliquo corpore.

Porro paristhmia sunt locus affectus, tum angina, tum tonsillarum, diuerso respectu. Angina quidem, quatenus harum glandularum phlegmone gulam & asperam arteriam, quibus tonsilla ut isthmus interjacent, constringit, & respirationem impedit. Vt enim isthmus propriè est angustus terra transitus, situs inter duo maria: ita hæc glandula caruncula sunt inter gulam & laryngem.

Tonsillarum uerò subjectum sunt, quatenus exulcerantur & suppurant, & sic hoc capite Aretæus de illis agit.

Huc igitur aphthæ & exanthemata pertinent, ex quibus aphtharum subjectum est tunica oris partium. Exanthematum uerò locus affectus non tam glandula sunt, quàm quacumq; cutis & membrana, ac cutis quidem euidentiū: membrana uerò occultarum partium. Euidentiū ut narium, palpebrarum, faucium. Occultarum, ut pulmonis, intestinorum, renum. Id tamen discrimen non semper obseruari so-

let, cum aphthas appellet Hipp. & Galenus ulcera etiam pulmonis & testium.

Afficiuntur autem tum glandula, tum cutis & membrana uel per se, uel per consensum.

Per se, cum illis morbus aut causa morbi insidet, id quod inflammatis uel exulceratis à causa externa, ut aëris infectione, lacte nutritio mordaci in pueris, & quocumque contagio contingit.

Per consensum, cum à parte consentiente coafficiuntur, id quod ut plurimum contingit à capite in tonsillis, à corde in uariolis. Tonsillas enim catarrhus, uariolas ut plurimum febris synochus, eaq; uel cum, uel sine putredine antecedit, èd quod utrunque affectum nempe febrem & uariolas sanguis efferuescens generat, licet diuerso modo. Vapor enim siue calidus, siue putridus à sanguine efferuescente ad cor transmissus febrem producit. Sanguis autem ebulliens quatenus à corde excutitur, & tota pars illius noxia ad partes cutaneas expellitur, uariolas in modum crisis salubres procreat: in salubres contra, si non tota, sed pars tantum extruditur. Reliqua enim remanens cor obruit, pulmonem item & intestina, aliâq; partes nobiliores lethaliter afficit.

SIGNA paristhmiarum & cutanearum partium tum simpliciter tum distinctiue per se uel per consensum affectarum, sunt partim manifesta, partim non dissimilia signis affecti gargareonis.

Affectas enim amygdalas ex tumore illarum: aut si inflammatae sunt, ex rubro colore & dolore cognoscetur: sed & ex cōmuni difficilis respirationis & transglutitionis incommodo.

Cutem & membranas laborare in exanthematis oculi demonstrant. An uerò sint morbilli uel uariolæ, ex definitionibus illarum apparet, & explicatur alibi.

Quod si lateant, ex febre comitante, & uocis raucedine cognosci potest.

XI. Pleuritis locus affectus Aretæo simpliciter: est ὑπὸ τῆς κοιλίας, id est, membrana subtilis & nervosa, quæ costas introrsum succingit. Hæc & pleura uocatur, sed nomine equiuoco, ut superius diximus. Periphrasi igitur autor uti maluit,



ne ambiguitas offenderet. Pars autem affecta principalis est illa membrana, eò quod affectu primario laborans sola ueram pleuritidem efficit.

Partes affecta minus principales sunt, excepta pleura, omnes partes thoracis dolentes & cuncta respirationis organa. Partium enim thoracis alia sunt dolentes, alia indolentes. Dolentes sunt membrana & musculus.

Rursus membrana uel interna, uel externa est: ex quibus externa huc pertinet. Interna enim *πνεύμων* est.

Musculus uel pectoris est, uel intercostalis, uel diaphragmaticus.

Intercostalis est qui inter duas costas inferitur: estq; alius externus, alius internus.

Partes indolentes sunt costa, qua per se sensu destituta sunt, ideoq; ad pleuritidem non pertinent. Maximè autem dolet membrana: musculus sensu adeo exquisito prae-ditus non est.

Organa respirationis, ut supra diximus, duorum generum sunt: unum agentium, alterum patientium. Agentia sunt membrana & musculi thoracis. Ex membranis est etiam mediastinus & diaphragma & pericardium: praeter internam & externam, de quibus supra.

Patientium rursus aliud excipit, ut pulmones: aliud deducit, ut aspera arteria & larynx. Hac uerò per se respirationem faciunt: per accidens uerò etiam cor & uasa illi adhaerentia, imprimis arteria aorta.

Quaecunq; igitur harum partium affecta notham non ueram pleuritidem efficere potest. Ex quo intelligi potest, non malè dixisse Herophilum, qui membrum patiens in pleuritide, pulmonem esse dixit. Sed et illud, cognatos esse morbos, anginam, asthma & pleuritidem. Cuiuslibet enim horum affectuum locus patiens est respirationis organum, sed principalis pulmo in asthma: larynx in angina, thorax in pleuritide.

Latini similiter generale subiectum pleuritidis, quam lateris dolorem uocant, latus constituunt. Latus enim communi

appellatione est tota costarum regio dextra & sinistra à jugulis ad hypochondria.

Aretaeus tergum & dorsi scapulas ut partes uicinas adnumerat.

Porro locus affectus in pleuritide interdum dextrum latus est, interdum sinistrum, interdum utrunq; simul, quod tamen raro admodum contingit.

Frequentius uerò sinistrum, quod latus dextrum sinistro calidius: unde & humores uel colligi non patitur, uel collectos facile dissipat.

Et rursus thoracis pars uel externa, uel interna laborat, eaq; iterum uel tota, uel pars illius.

Afficitur autem quodcumq; ex praedictis uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur, cum primario affectu laborat.


Per consensum, cum à parte consentiente coafficitur, idq; bifariam, positiuè & priuatiuè.

Positiuè, cum pars consentiens, ut pleura aliquid aliunde, ut uel à musculo interno thoracis, uel à ramis arteria aorta, uel surculis uena caua, uel à capite, uel à gutture, uel à pulmone, alioque membro illapsum excipit.

Interdum enim interni musculi intercostales primum inflammantur, à quibus biliosus sanguis in pleuram traducitur: & contra.

Interdum arteria aorta injuriam pleurae infert, cum singulis costarum spatij ramum de se praebet, qui subter membranam excurrit una cum ramo uena azygos. Saepius uerò surculi uena caua malum pleurae communicant, hq; tres, uena intercostalis, uena azygos & uena thoracica, de quibus supra in nomine morborum uena caua diximus. Aliquando caput primum laborat, à quo frigidum humorem detabentem externi musculi lateris excipiunt: ut factum in catarrho epidemio anni 1580. Saepè guttur aut pulmo inflammatus ad pleuram sanguinem biliosum refundit.

Priuatina *πνεύμων* uix occurrit, nisi tum priuatiuè affici pleuram dicamus, cum non affluit ea sanguinis boni quantitas, quae affluere debuit, quia uel impeditur, ut obstructo



obstructo epate : uel deficit, ut eodem corrupto. Pleuritis uero non tam ex defectu quam excessu sanguinis estimari solet.

SIGNA simpliciter affecta tunicae costis intexta duplicia sunt, manifesta & occulta.

Manifesta nulla sunt, eò quod pleura sensum lateri, nec dyscrasia illius semper apparet in dissectis corporibus.

Occulta sunt causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt uaria, de quibus alibi. Nam v. g. pleuriticus imbecillus habet thoracis partes & abundat sanguine bilioso, quem pleura ob sui densitatem facile suscipit.

Effectus sunt symptomata propria, ut febris, tussis & sputa uaria, ut ait Aretaeus. Sunt autem propria, ut idem ait, non seorsim sed conjunctim sumta. Sparsim enim si adsunt, nec conspirent, non minus pleuram, quam aliam partem thoracis affectam denotabunt. Alioquin & dolor punctorius & pulsus durus certum pleurae affecta indicium sunt : ut alibi dicitur.

Utraque simul sunt iuuantia & ladentia, ut si focus ad remouendum lateris dolorem adhibiti non prosint, eò quod nouam ad locum affectum materiam attrahant : proposit contra repetita sanguinis missio, aliaque praesidia auertentia & digerentia.

Signa distinctiua sunt haec.

Si fuerit pleuritis in tota costis intexta membrana, totus thorax uehementer dolet, id quod lethale est, & raro contingit.

Si in musculis internis uel externis affectus sit, aderit dolor pulsatorius. Arteriae enim non sunt in membrana, sed subter membranam excurrunt.

Si musculi interni laborent uel pleura

ipsa, facilius in latus inflammatum decumbet : difficilius in oppositum. Membrana enim minus tensa minores parit dolores, tensa contra eosdem geminat. Tenditur autem in decubitu in oppositum latus, quia pendula sit, & pondere suo diuellit.

Si musculi externi affecti sunt, facilius in latus oppositum : difficilius in affectum decumbet.

Si spatium inter musculos intercostales & membranam succingentem laboret, soli focus digerentes iuuant, cum pleuritis a flatu oriatur, quem illi discutunt : & locum mutat dolor quamuis non semper

Si mediastinus phlegmone occupetur, tum dolor medium laesit pectus tractum in longitudinem.

Si pulmo inflammetur, adest grauatiuus, non punctorius dolor. Si jecur, magis anxia erit respiratio, & tumet dextrum hypochondrium.

Si diaphragma, costarum extrema dolent ad finem ossis sterni, adest delirium, tumet regio diaphragmatica. Si alia partes, ex suis signis innotescunt.

SIGNA partis affecta per se sunt magnitudo, numerus & tempus. Nam v. g. pleura affecta erit per se, si affectus sit uehemens & dolor continuus, non praecessit alius morbus nec comitetur. Contra partis per consensum affecta signa sunt paruitas, numerus & tempus. Nam v. g. eadem pleura erit affecta per consensum, si morbus sit remissior, alius affectus pleuritidem praecesserit, & dolor saepius remittit. Pleura igitur semper affligitur in pleuritide, interdum tamen acerbius, interdum lenius.

PARS



PARS AFFECTA MORBORVM ACVTO

RVM LIBRO SECVNDO.

I. Peripneumonia pars affecta principalis pulmo est, spirabile organum. Sunt autem infinita respirationis instrumenta, ut ait Aretaeus, quae certis gradibus inter se differunt. δεξιή ἀναπνοή καὶ ἀριστερά Cor primum est autor, id est, causa impulsiva respirationis. Id enim calore maximo praeclatum est, qui flamma instar in sinistro illius sinu exardescit, ut toti corpori calefaciendo, & spiritui vitali generando sufficiat. Ut autem flamma angusto conclavi coercita & aëre non ventilata marcescit: ita calor cordis langueret, tandemq; interiret, nisi conseruaretur moderato frigido, siue aëre inspirato & expirato, quo & noua materia calori subministratur, & fuligo superflua ex nutritione genita expellitur. Cor itaq; ut ait Aretaeus, aëre primum indiget: deinde uerò pulmo, qui & ipse ob uiciniam cordis incalescit: unde uterq; uim trahendi frigidi aëris naturalem obtinet.

Porro aër trahitur & expiratur duplici modo, ἀναπνοή & ἀναπνοή ἀναπνοή, id est, perspiratio siue transpiratio per occulta fit cutis spiracula, unde ἀσθητή in sensilis dicitur. Hac sola uiuunt animalia ἐν τρωα, exanguia, quorum languidus & debilis calor est: similiter & fatus in utero & hystericarum mulierum quam plurima ad tempus aliquod.

Ἀναπνοή, id est, respirationis (quam Hipp. saepius πνεύμα uocat) fit per nares, arteriam & pulmonem: unde conspicua & aspectabilis uocatur. Hac uiuunt animalia perfectiora, quorum calor ingenti uelut flamma exardescit, unde non potest sola transpiratione & arteriarum pulsu temperari, sed & respiratione, ut maiore adminiculo indiget. Ex quo sequitur uerum esse, id quod dixit Aretaeus, ὅτι πάντα τῆς ἀναπνοῆς ἰσχυρὰ, respirationis instrumenta infinita, nomine ἀναπνοῆς etiam ἀναπνοῆς intelligens. Sed & illud, quod pulmo uiscus sit plurimis morbis obnoxium. Nam & attrahendo sibi non raro malū accersit, & materias exclusas ab alijs partibus facillimè accipit.

Leditur uerò in peripneumonia pulmo

uel totus, uel pars ejus.

Totus est totum corpus pulmonis, turgentibus etiam uasis. Pars consideratur uel ratione latitudinis, uel ratione profunditatis. Ratione latitudinis pars alia dextra, alia sinistra est mediana quadam membrana intercepta, quam Διὰ τὴν μέσην Græci, Latini mediastinum uocant. Ratione profunditatis pars alia caro est, alia uena arteriosa, alia arteria uenosa, alia aspera arteria. Caro propriam & maiorem pulmonum substantiam complet, estq; rara & spongiosa. Vena arteriosa à dextro cordis sinu enata in posteriorem pulmonum partem spargitur. Arteria uenosa è sinistro uentriculo prodicens in anteriorem disseminatur. Aspera arteria à faucibus descendens medium pulmonem occupat, indeq; diuisos ramos ad extremam usq; superficiem transmittit. Totam deniq; hanc substantiam tunica quadam obducit tenuis, quam parui attingunt neruuli à sexta conjugatione exorti extra pulmonum substantiam. Hinc fit, ut, quod ait Aretaeus, pulmo dolorem non percipiat.

Pars igitur affecta pulmonis est modo hac, modo illa pulmonis pars, id est, uel dextra, uel sinistra, uel pulmonis parenchyma, uel arteria uenosa, uel uena arteriosa, uel trachea, horumq; propagines. Qua uarietas antiquis occasionem dedit, ut de sede affecta in hoc morbo uehementer certarent, ut scribit Cælius Aurel. Diodes enī solas uenas pulmonū affligi defendebat. Erasistratus, arterias. Herophilus arterias & uenas simul. Asclepiades uerò pulmonis bronchias. Praxogaras lobos pulmonis spina uicinos. Demetrius Herophilus integros pulmones.

Afficitur autem quodcumq; ex prædictis, uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur ea pars cui morbus morbiue causa insidet. Per consensum, quæ uitij expers à parte consentiente compatitur, id quod ut plurimum contingit. Peripneumonia enim raro primarius affectus est, fereq; alijs morbis est succedanea.

Afficitur uerò bifariam. Positiuè & priuatiuè.

Positiuè



Positiuè, cum pars consentiens, ut pulmo, sanguinem pituitosum aliunde siue attrahit, siue non attractum tanquam pars imbecillior excipit, transmissum uel à corpore cordis per uenas & arterias: uel à capite in catarrho: uel à gutture in angina: uel à mediastino, siue etiam pleura in pleuritis.

Prinatiuè uix coafficitur, ut pars quæcunque alia in alijs morbis à plenitudine oris.

SIGNA affecti pulmonis simpliciter sunt duplicia, manifesta & occulta.

Manifesta nulla sunt, cum pulmo sensum fugiat.

Occulta sunt causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt eadem que congestionis & fluxionis, de quibus alibi. Sanguis enim pituitosus interdum à synatrismo sensim aggeritur, ex nutricatus pulmonum copia: interdum à uasis repletis in pulmones subito irruit. Quod si à uirulenta materia, ut à lepore marino morbus nascatur, hoc quoque pulmonis affecti certum indicium est.

Effectus est symptoma proprium, ut color maxille mutatus seu facies rubicunda, ob euaporationem sanguinis in caput.

Utraque simul sunt iuuantia. Profunt que corroborant pulmones, ut pulmonaria & pulmo uulpis. Et egrotus ex pulmonibus laborare consuevit. Sed & hic morbus grassatur in populum.

Signa distinctiua sunt hæc.

SI afficiatur totus pulmo, dolor grauis omnes thoracis partes occupat. Si pars, aliquas tantum.

Si arteria, nullus dolor adest. Cartilaginosa enim est.

Si mediastinus, dolor percipitur medio pectore.

SIGNA pulmonis per se affecti, sunt magnitudo, tempus, numerus & iuuantia. Affectus enim uehemens est & continuus: nulli succedit, & iuuant foris applicata pectori.

SIGNA ejusdem per consensum affecti sunt affectus paruitas, intermissio, consociatio cum alijs morbis, & quod nocent foris adhibita pectori remedia.

II. HAEMOPTYSEOS pars affecta duplex est: uena uel arteria. In utraq, enim hac parte sanguis, qui filius nature dilectus uocatur, ut continetur, ita ex eadem utraq, necessario emanat. Est autem tum uena tum arteria, ex qua prodit aut capitis, aut thoracis, aut alui uentris.

Rursus ex capite emanat aut toto per colatorium, aut ex parte, ut naribus, faucibus, lingua, palato, gingiuis.

Ex thorace similiter aut toto aut parte, ut gula, pulmone, aspera arteria, arteria uenosa, diaphragmate. A uena uero arteriali sanguinem non posse reijci uidetur Conciliatori diff. 190: siquidem illa duabus munitur tunicis & motum pulmonis tantum sequitur, sitq, retrò ad dorsum disseminata, ibi cum pulmone quiescens. Ex alui uentre deniq, aut toto, aut parte, ut ore uentriculi, uentriculo, liene, epate, utero.

Vna quaq, autem harum partium afficitur, aut per se, aut per consensum.

Per se afficitur, cum primario affectu laborat, eaq, uel diuulsi rupture: uel avasosum uel apertione orificij: uel diarrhoea, transcolatione siue resudatione.

Per consensum coafficitur, cum nullo trium predictorum uitio uexatur, sed aliunde transmissum sanguinem ad os emittit, inseruitq, tantum. Positiua hic igitur non priuatiua omnibus locum habet.

SIGNA sanguinis ex ore rejecti, & ex uena uel arteria erumpentis, alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta sunt nulla, ed quod neutrum uasorum sensui expositum est.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Cause hamoptyses uariae sunt, de quibus alibi. Nam v. g. Quidam diutius in aere calidioris uersatus, grauitatem capitis percipit, uenas habet tumentes & faciem rubicundam. Huic sanguis erumpens ex ore, ex uenis aut arterijs capitis prodire iudicatur.

Effectus sunt qualitas mutata & excreta, que uenam & arteriam distinguunt. Ex uena enim prodiens sanguis crassus est & niger potius. Ex arteria uero

exiens



exiens tenuis, flauus & magis feruidus. Deinde ab arteria manans saltu quodam & impetu fluit: à uena non item.

Rursus magna ex uena profluit maxima sanguinis copia, & frequentior & crassior. Ex parua contra.

Utraque simul sunt consuetudo laborandi, morbus popularis, iuuantia. Nam v. g. hæmoptoicus hoc morbo aliàs quoque laborauit.

Signa distinctiua sunt hæc.

EX CAPITE, id est, uasis cerebri sanguis ex ore rejectus prodiens cognoscetur ex causis, effectis & utriusque simul.

Causa sunt duplices: externa & interna, quacunque siue manifestam siue obscuram uasorum intra cranium unitatis solutionem efficiunt.

Externa sunt, occurfus ambientis calidioris, rarefacientis ac fundentis, aut frigidioris exprimentis, cui homo se exposuerit, ebrietas, satietas, consuetudo per narium uenas fluxionis sanguinis suppressio ex certis interuallis, capitis ictus seu uulnus.

Interna sunt, habitus corporis ad hoc uirtutum propensus, temperamentum capitis calidum et siccum, humoris siue copia siue acrimonia, tumor uenarum.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & excreta.

Actio laesa est capitis grauitas & uertigo quae antecessit. Mutata qualitas ut genarum & totius faciei rubor, uenarum frontis, temporum atque oculorum extensio, tinnitus aurium.

Excretorum copia, qualitas, modus educationis.

Copia. Sanguis expuitur in exigua quantitate, interdum multus & copiosus, disrupta aliqua ampliori capitis uena, quod tamen raro contingit.

Qualitas. Sanguis exit simplex, purus, floridus, non ater, conglobatus, spumosus.

Modus educationis. Sanguis plerumque cum aliqua gutturis titillatione & citra tussim reijcitur: raro cum tussi, cum scilicet magna copia confertim ad palatum fluxerit.

Utraque simul. Eodem uitio hæmoptoicus aliàs laborauit, & sanguine educito ager

melius habet, & quacunque mala affectio capitis desinit.

EX NARIBVS, id est, internis narium uenulis sanguis ex ore rejectus prodiens cognoscetur ex causis, effectis & utriusque simul.

Causa sunt duplices, externa & interna.

Externa sunt, ictus seu alia offensio ipsius nasi quae antecessit, aut natatio in loco palustri, ubi multi hirudines degunt, quae interdum nares ingressa fluxum excitant sanguinis, quod tamen raro apud nos contingit.

Ex internis est natua hominis propensio ad sanguinem certis quibusque temporibus fundendum.

Effectus sunt excreta, eorumque copia, qualitas, modus educationis.

Copia. Sanguis qui expuitur paucus est, eò quod è proximo loco prodit.

Qualitas. Ruber est ac sine ulla permutatione spuma.

Modus educationis. Nares emungendo cum aliqua uis sanguis per ipsas effluit, & astrictis naribus facta inde uehementi attractione copiosus in os effertur atque expuitur.

Utraque simul. Inuant siue nocent utilia seu noxia, qua naribus admoventur.

EX FAUCIBVS & gutture sanguis ore rejectus prodiens, cognoscetur ex signis tum manifestis tum occultis.


Manifesta sunt, quae sensus percipit. Nam lingua depressa rubedinem praeternaturalem ejusmodi partium spectandam praebet.

Occulta sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt externa & interna, quacunque ante eruptionem fauces offendere potuerunt, uel rumpendo, uel rarefaciendo. Effectus sunt actio laesa & excreta. Fauces enim dolent, reliqua partes doloris expertes sunt, sanguis exit paucus & subflauus cum sreatu quodam & uox raucescit.

Ex lingua, palato & gingiuis sanguinis ore rejecti eadem ferè signa sunt. Lingua enim rubet: gingiuae tument, & compressa digitis, sanguinem emittunt, palatum sordidum, asperum, ulceratum apparet.

EX



EX THORACE sanguis ore rejectus prodicens cognoscetur ex causis, effectis et utrisq; simul. Manifesta enim nulla sunt, cum uasa thoracis sensum lateant.

Causa sunt externa & interna. Externa sunt, quaecumq; rupturam illorum efficere poterunt, ut uulnus siue ictus, magnus saltus, casus de loco sublimiori, magna cocussio partium per tussim, nimis alta uox, compressio à duro & graui corpore facta, gestatio magni ponderis eiusq; eleuatio.

Interna sunt inflammatio lateris, septi, pulmonis, gutturis.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas et excreta. Sternum enim dolet, sanguis cum ingenti tussi extruditur, isq; non multum flauus, modicè crassus, spuma carens, nisi in transitu pulmoni noxam impertiat. Quod si à latere cum tussi prodeat, satis niger est, leuis, tetri odoris, eò quod putridus et saniosus. Ac dolor quidem percipitur in parte thoracis agrotante, eò quod pectus multis neruorū propaginibus refertum est: & sanguis niger est, quod inter pectus quod sanguinem fundit & os, per quod cum tussi idem reijcitur, magnum intercedit spatium, ex quo colorè amittit floridum, sed & putredinem interdum acquirat. Tempus etiam excretionis notam de se prabet. Qui enim ex thorace prodit sanguis, post somnum experrectis ut plurimum prodit. In somno enim partes pectoris magis incalescunt, uasq; inde apertiora fiunt ad sanguinem fundendum.

Vtraq; simul sunt praesidia utilia, qua iuuant thoraci admota, nocent contra noxia.

EX GULA sanguis ore rejectus prodicens cognoscetur ex causis, effectis & utrisq; simul.

Causa sunt uaria, de quibus alibi. Ex euidentibus est spina & ossis seu alicujus asperioris corporis, aut pungentis aculei deglutitio, hirudinis in gulam ingressio, acris aut salsa destillatio, uariola.

Effectus est actio laesa & excreta. Nam agrotans molestiam quandam in gula percipit, & tunc potissimum, cum uel bene frigida, aut calida, aut acerba uel cibos asperiores, siue etiam acres & salios liquores deglutit. Sanguis subflauus & paucus salinae permixtus, cum uomitu quodam & tussicula detruditur.

Vtraq; simul sunt praesidia, gula admota, qua si utilia sint uitio gula depellendo, iuuant: si noxia, laedunt.

EX PVLNONE sanguis ore rejectus prodicens cognoscetur ex causis, effectis & utrisq; simul.

Causa sunt quaecumq; pulmonem lacerant, ut tussis asperissima, clamor, saltus, casus, ictus: copia sanguinis aut flatuosi spiritus, destillatio à capite acris & salsa materia in pulmonem.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & excreta. Nam pectus graue est, dolorem uerò nullum, ut ait Aretaeus, percipit: uel potius exiguum duntaxat & obscurum. Facies rubet, sanguis repente, id est, cum impetu isq; copiosus emanat, rutilus, spumans & rotundus, id est, minutissimis bullis rotundis obsitus, à spiritu & calore pulmonis, continenter follis modo agitati, maximè si erosionem ut causam agnoscat.

Vtraq; simul sunt praesidia, qua si utilia pulmonis morbis, & potissimum soluta unitati adhibeantur, iuuant.

EX ASPERA ARTERIA sanguis ore rejectus cognoscetur ex causis, effectis & utrisq; simul.

Causa sunt eadem, qua ex pulmone exeuntis, ut tussis, clamor, ictus, salsa pituita destillatio, usus medicamenti erodentis partes oris.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & excreta. Sentitur enim dolor paulum supra aut infra guttur: sanguis uehementer flauus, isq; paucus cum aliqua licet exigua tussi uel solo screatu expuitur. Quod nisi fiat, tussis non desinit. Interdum autem cum sanguine aliquid etiam puris, siue etiam cartilaginis putrescens, & à tunica separata reijcitur. Vox obscuratur & raucescit.

Vtraq; simul sunt praesidia emplastica, qua cum sint utilia huic affectui, si iuuent: contra noceant acria, praesertim sensim ac paulatim deglutita, tracheam arteriam laborare significant.

EX ARTERIA VENOSA sanguinis ore rejecti eadem ferè signa sunt, qua ex pulmone & ex aspera arteria. Id uerò certissimum, si uel

part



pars aliqua arteria siue uena, siue propria substantia pulmonis efferatur. Sed & illud non minus certum, quod ex arteria uenosa detruditur, multus, simplex ac satis floridus: ex substantia uero pulmonis spumosis potius & in minori copia ac cum tussi.

EX DIAPHRAGMATE sanguinis ore reiecti signum pathognomonicum dolor est, circa septum transversum perceptus, usque uelut circularis. Diaphragma enim instar zona totam illam regionem cingit. Id uero contingit rarissime, nec tamen fieri non potest. Sanguis enim ex septo transuerso, ut & thorace per membranam, qua pulmones obducit, ueluti resudat, inque pulmones effunditur, qui postmodum ex pulmonibus tussi per os reijcitur. Reliqua signa eadem sunt, quae thoracis.

EX STOMACHO sanguinis ore reiecti signa sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quaecumque uasorum unitatem soluunt, ut uulnus, ictus, sanguisuga, alimentum, medicamentum exulcerans, erosio, plenitudo.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & excreta. Nam assidue dolet uentriculus, praesertim si quis acria alimenta seu medicamenta deglutiat: adest nausea, angor & deliquium animi & uertigo, ructus crebri & odoris uisulenti, praesertim si materia multa collecta fuerit. Sanguis reijcitur cum uomitu, usque uel humoribus, ut bili pituitaue, uel cibus permixtus, si quis cibum prius sumserit, nullo in hypochondrijs alio aliquo membro laeso. Praeterea exiguus propter uenas paruas, quas habet stomachus.

Utraque simul sunt remedia, quae utilia prosunt ut acerbata, austera, astringentia ac modice refrigerantia: contra nocent contraria, ut acria.

EX EPATE ET LIENE SANGVINIS ore reiecti signa sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt quaecumque uasorum utriusque uisceris unitatem soluunt, de quibus alibi: imprimis uero tumor in alterutro uiscere, qui praesedit.

Effectus est, dolor circa epar, uel lienem, & sanguis qui ex epate magis ruber & copiosus euomitur: ex liene autem subniger magis & concretus, citra quamcumque propriam uentriculi affectionem.

Utraque simul sunt praesidia, quae utilia solis his uisceribus male affectis medetur, frustra adhibitis, quae ad uentriculum sanandum adhibentur.

Reijcitur autem sanguis ex iecore & liene, aut per intestina & uentriculum: id quod facilius contingit: aut per pulmonem & arteriam, id quod fit rarius: nec tamen fieri non potest. Nam, ut ait Aretaeus, in febris ex fluente nare, quae recta uisceri respondet, sanguis a liene & epate prodiens emanat. Petens autem prius uentriculum, uomitu reijci solet.

EX UTERO sanguinis ore reiecti signa sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, uitium aliquod uteri, & tempus, quo alias menses fluere solent, iam uero suppressi sunt.

Effectus est sanguis prodiens uarius, prout materia menstrua uaria est, usque cum grauitate odoris.

Utraque simul sunt praesidia, quae utero utilia adhibita prosunt, nocent contraria.

Ex quibus apparet signa partis affecta in haemoptysi praecipua esse illa, quae ex precedente de uisceribus querela, et sanguinis excreti copia & modo educationis petuntur. Sanguinem igitur sputo reiectum pelui excipere, & uirgulto agitatum lustrare oportet. Omne enim excrementum ideam partis praesert, unde fertur.

Ex copia nota breuiter sic se habent. Sanguis profluit aut multus aut paucus. Si multus, prodit ab pulmone, arteria uenosa, epate, liene, utero. Si paucus, manat ex aspera arteria, gula, thorace, lingua, palato, faucibus, naribus & ex capite, nisi maior uena rupta fuerit.

Ex modo educationis nota breuiter sunt haec. Sanguis profluit aut screando, aut spuenndo, aut tussiendo, aut uomendo. Si manat screando, prodit a faucibus. Si spuenndo, uenit ab ore & gingiuis. Si tussiendo, abit a pulmone, & ceteris partibus respirationi destinatis: si uomendo, prodit a uentriculo, epate, utero.

SIGNA per se uel per consensum affecta partis in haemoptysi sunt affectus proprius, magnitudo, tempus, numerus & iuuantia, quae paulo aliter hic considerari oportet quam alibi factum, ut in subjectis exemplis apparet.

Caput igitur per se, thoracem uero per consen-



consensum affectū esse ostēdet progressus affectus capitis, imprimis percussio, qua si caput tantum tetigerit illeso thorace, idq̄, uehementer doleat, & iuuent apposita illi remedia, sanguinis à capite descendens & per se affecti certum signum erit. Id ipsum uerò per consensum laborabit, thorax contra per se, si thoracis & non capitis affectus præcesserit: nec caput uel uehementi uel continuo dolore affligatur, nec iuuent idonea illi admota præsidia. Ex quo sequitur, ut in hæmoptysi dolor capitis non tam illius uenarum quam thoracis aut pulmonis disruptionem aut apertionem indicare possit.

Nares per se, pulmonem per consensum affici ostendit progressa narium manifesta lesio, illesis pulmonibus, siq̄, ea signa, que narium propria esse supra diximus, pleraq̄, adfuerint, defuerint autem, que pulmōni conueniunt. Contra pulmō per se, nares per consensum laborare dicuntur, si illius manifesta præcesserit lesio, adsit rubedo genarū, aliaq̄, signa, que supra recensuimus pleraq̄: deficient contra ea, que naribus congruunt. Neq̄, enim rarò contingit, ut reserata pulmōnis uena, sanguineq̄, ad nares usq̄, regurgitante præ multitudinem, & contra reseratis uenulis narium, sanguineq̄, ad pulmōnes usq̄, descendente, rursumq̄, ascendente & per os reiecto, dubitetur ex qua nam parte, naribusne an pulmōne primario affecto sanguis profluat.

Eadem est ratio uentriculi, epatis, lienis, uteri, quorum quodlibet per se uel per consensum affectum esse cognoscetur ex signis pluribus simul concurrentibus: ex aduersa uerò parte deficientibus: imprimis uerò ex manifesta cuiusuis partis lesione & signo pathognomonico. Dubia enim sunt ea, que ex colore & tussi & spuma solent peti indicia, nisi cætera simul consentiant.

III. Syncope $\sigma\upsilon\kappa\omicron\pi\epsilon$ & $\tau\eta\varsigma\ \kappa\alpha\rho\delta\iota\alpha\varsigma$ $\nu\epsilon\sigma\tau\epsilon$, ut ait Aretæus, hoc nomine $\lambda\epsilon\mu\phi\upsilon\chi\iota\alpha\upsilon$ intelligens, quam à syncope in specie sic dicta differre supra in nominibus diximus. Interrogatione autem negante utitur, qua sententia affirmanti æqui pollet, ut aduersarium tantò magis urgeat. Subiectum igitur non stomachus est, ut uoluit Oribasius, sed cor, uel spiritus, qui in corde & arterijs continetur: id quod Aretæus confirmat directe & oblique. Directum argumentum est

exemplum hoc. Bubonum subiectum sunt inguina: tetani nerui, epilepsia caput. Ergo syncopa indubitatum subiectum cor est. Vallet consequentia, quia prædicti affectus sunt similiter membrorum proprii & periculosi. Obliquum est, quod constat refutatione objectionis huiusmodi.

Syncope curatur remedijs stomacho adhibitis, ut cibo, uino, frigidâ. Ergo stomachus locus patiens est in syncope. Respondet autem per datam instantiam opponendo absurdum eadem ratione cōsequentia hoc modi. Phrenitici capillorum detonsione & cutis irrigatione releuantur. Ergo phrenitis capillorum capitis & cutis affectus est, quod absurdum esse nemo non intelligit. Verum enim uero argumenta à signis petita certiora sunt, de quibus paulò post.

Quod uerò Aretæus cor domicilium anime, et propriam sedem natura eius appellat, id dextrè intellectum recepto dogmati de sede anime in cerebro non repugnat. Nam $\tau\eta\ \gamma\epsilon\mu\omicron\upsilon\iota\sigma\tau\epsilon\upsilon$ in cerebro: $\tau\eta\ \delta\upsilon\mu\iota\sigma\tau\epsilon\upsilon$, id est, affectus animi, qui sunt lætitiæ, tristitiæ, spes & metus in corde regiam suam habent: ut $\tau\eta\ \tau\epsilon\theta\upsilon\mu\eta\tau\iota\sigma\tau\epsilon\upsilon$ in epate. Hinc Galenus corde calidis audaciam, frigidis timiditatem tribuit. Quod & de corde magno & paruo similiter dici potest. Neq̄, enim cor calidum est, quin sit magnum, neq̄, magnum, quin & thoracis magnitudinem & animi audaciam consecrariam habeat. Et contra de corde frigido. Sic Aretæus eos, qui secundum cor laborant, sensu & mente ualere scripsit. In his enim $\tau\eta\ \gamma\epsilon\mu\omicron\upsilon\iota\sigma\tau\epsilon\upsilon$ saluum est, incolumi temperamento cerebri, à quo sensus & cogitatio: $\tau\eta\ \delta\upsilon\mu\iota\sigma\tau\epsilon\upsilon$ læsum, alterato temperamento cordis.

Cor igitur $\tau\epsilon\theta\upsilon\mu\eta\tau\iota\sigma\tau\epsilon\upsilon$ est, quod potest affici uel secundum humores & spiritus, uel secundum solidas partes, & rursus secundū partem dextram uel sinistram: idq̄, aut per se, aut per consensum.

Per se, cum laborat morbo uel similari, uel organico, uel communi. Alteratur enim ex frigidis uentriculi succis, distenditur à flatu, obstruitur, ulceratur, intumescit à phlegmone. Errant igitur qui cor per se affici posse negant, cum omni morborum genere affligi possit. Quod sensisse uidetur Q. Horatianus, qui indicium manifestum, quo tētari in aliquo naturam cordis intelligeret

Kk nunquam



nunquam sibi claruisse scribit. Et si enim hoc rarius contingere soleat, ut per se cor affectū sit, frequentius ut per consensum, non tamē omnino non contingit.

Per consensum laborat, cum à parte consentiente coafficitur, quæ multiplex esse potest. Cor enim omnibus totius corporis partibus per arterias consentit: imprimis uerò cū pulmone, cerebro, stomacho, epate, liene, utero & artubus, idē, uel positinē uel priuatiuē.

Positinē cum uapor uel humor suffocans spiritus motumq; cordis tollens à prædictis partibus ad cor affluit, ut in malignis febribus, pleuritide, angina, peripneumonia, pulmone ulcerato, cardiogmo, præfocatione uteri.

Priuatiuē, cum quod affluere debuit, ut spiritus animalis, nutrimentum, & spiritus uitalis aut impeditur aut deficit. Spiritus animalis impeditur cerebro laborante in apoplexia, epilepsia, phrenitide, mania. Hinc syncope Hippocratis à concrecente sanguine in uenis & arterijs, dum spiritus animalis aditu ad cor prohibetur. Nutrimentum deficit epate nullum sanguinem generante, uel splene melancholicum sanguinem non expurgante, & hæc syncope marasmus syncoposus appellari potest. Spiritus uitalis deficit affecto uentriculo, epate, splene. Sanguis enim tum generari non potest, ex quo spiritus uitalis ortum trahit. Vnde febris magis dicta interdum oritur, humidum quidem primigenium exiccans sed non ex toto aut perfectē.

Signa cordis simpliciter affecti alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifestum nullum est, cum hoc uiscus sensui expositum non sit.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt externe & interna, quacumq; modo aliquo motum naturamq; cordis labefactant, ut aer malignus, cibus, toxica, uulnus, calor & frigus immodicum, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa & mutata qualitas. Grauis dolor circa cor infestat, pulsus languet, obscurus, rarus est: affectus sopiti sunt, ut spes, ira, timor. Facies albet.

Vtraq; simul sunt iuuantia. Profunt epithemata utilia cordi admota. An uerò

ladantur cordis solidiores partes, uel humores uel spiritus, id cognoscetur ex eo, quod citius ac facilius, uel difficilius & tardius morbus accedit uel recedit. Tenue enim subiectum citius: crassius, tardius lesionem & curationem admittit. Defectus uerò spiritus erit si præcessit diuturna uigilia, summum & insperatum gaudium, maximus timor, uehemens dolor, ingens sanguinis effusio, præsertim ex præcisa arteria. Idē spiritus ad prauam qualitatem alteratus erit si quis uenenum sumserit, morsus sit à uenenato animali, aerem malignum hauserit, abundet copia prauorum succorum. Eadem est ratio humoris, cuius uel nimia copia, uel inopia cognoscetur ex signis, de quibus alibi. Sic dextra pars affecta erit, si illa uim symptomatum maximē sentiat: sinistra, si contra.

SIGNA cordis per se uel per consensum affecti sunt magnitudo, tempus, numerus et iuuantia. Corde enim per se affecto lapsus uirium maior est, & ferè continuus, siue frequentior, mors subita, bene se habent partes, quibus illud consentit. Quo alludens Hipp. dixit aph 41. Qui saepe & uehementer & sine causa manifesta exoluuntur, & repente moriuntur. Contra eodem per consensum affecto, lapsus uirium minor est, & intermitit & partes cordi consentientes malè se habent: nihil deniq; profunt utilia cordi appositā: multū uerò iuuant, quæ proprios partiū consentientium affectus propulsant.

Ex quānam autem parte consentiente laboret, id ex proprijs illius signis cognosci oportet. Nam u. g. ex ore uentriculi per se affecto, corde uerò per consensum, syncope, quæ stomachica dicitur, eueniet, si præcessit uomitus, nausea, morsus & dolor ejus partis. A cerebro, epate, matrice, si præcessit lesio cerebri, epatis, matricis.

A uermibus, si dentes strident, intestina uellicatum, puncturam, dolorem percipiunt, egroti clamant, à somno exterriti expergiscuntur, uermes emittunt.

IV. CAUSI aliud est subiectum, aliud focus. Rursus subiectum aliud primum, aliud secundarium est.

Primum est cor, idē, secundum totam substantiam. Incalescit enim in causa non tantum fibrosa & carnosā, sed & spirituosā



Spiritiosa pars cordis, ut & in quavis febre alia, sed dissimili modo. In febre enim hectica uat' εἰς, secundum habitum: in reliquis uerò κατὰ χρόνον, id est, permanentiam uel momentaneam, ut in ephemeris, uel breuem, ut in caufa, & alijs putridis. Nec tamen illud negari potest, accendi in omni febre proprie & immediate spiritum in cordis mole implantatum, humores & partes solidas mediate, cum calor in spiritu tanquam precipuo subjecto resideat: uel certe eodem uelut proprio instrumento utatur. Est uerò febris nihil aliud quam cordis calor non modo auctus sed & igneus factus, unde πῦρ τοῦ ὄρατος & πῦρ τοῦ ἰγνός igne, Latinis febris à feruore dicitur. Sed nec illud negari potest, interdum spiritus, interdum humores, interdum solidas partes accendi facilius, pro uaria dispositione harum trium partium. Sunt enim interdum solide partes calidiores & sicciore, ideòq; proniores ad recipiendum calorem extraneum, unde hectica. Spiritus contra & sanguis frigidiores, ex uictu progresso: interdum spiritus aut humores primum calefiunt, unde ephemeris & putrida. Ut igitur fulmen massam auream liquat intacto corio, aut lana: sic u. g. putrida febris si causa putrefaciens accedat, humores inuadit, non spiritus aut solidas partes putredini ineptas. Ex quo sequitur, ut ephemeris non semper siue putridam siue hecticam necessario precedat.

Secundarium subjectum caufi, ut & cuiuslibet febris est totum corpus, quod calorem præter naturam ex corde transfusum undiquaq; accipit tum uentura spiritus & humoris fluentis per uenas & arterias, ut in ephemeris & putridis: tum contagione tantum & uicissitudine alterationis, ut in hecticis. Vtrunq; autem subjectum in omni febre coniungi necesse est. Neq; enim fieri potest, ut ulla intemperies imprimis calida totum corpus afficiat, nisi cor principium caloris prius affectum sit: nec febris aliqua dici potest, nisi totum corpus occupet. Ut igitur se habet Sol, cor mundi, irradians, ad aërem quem illustrat: sic cor, sol animalis accensus, ad totum corpus, cui flammam febrilem impertit.

Focus februm est fomes, quem Galenus libro de marasmo sic definit. λέγεται δὲ

ἐστὶν τοῦ πυρὸς τὸ μὲν ἐξ ὧν ἐκείνο τὸ ζῷον τὸ νεώτερον ἀμείψεται. Ὁ πυρὸς δὲ τῶν σέπται μέρους ἐαυτοῦ. Focus febris uero eam animalis partem, qua primum in suis solidis partibus excalesceta tantum fuerit, ut inde cor pariter concalescere possit. & febre facere, qua ante concalescendum cor fieri non potest. Focus igitur febris est locus putredinis uel causa antecedentis, seu pars affecta, unde febris quocumq; modo oritur: eaq; uaria, ut mox dicitur.

Focus autem dicitur πῦρ τοῦ ἰγνός. Ut enim in foco domestico ignis accendi solet: ita febris, quem ignem uocant, in loco certo corporis quem focum uocant excitatur. Differt autem focus à fomite. Focus est locus, in quo putredo tanquam ignis primum accenditur. Fomes est id, quod putredini materiam suggerit. Nec tamen fieri non potest, ut interdum eadem particula sit & focus & fomes putredinis: sapius uerò alia est particula focus & alia fomes. Focus & fomes simul est, cum febris excitatur à materia, qua putruerit in aliqua particula, qua illam non aliunde aliqua ratione suscepit, sed potius ipsa ex proprio uitio illam genuerit, subindeq; gignit, dum uitium illud manet. Focus alius est à fomite, cum materia non generatur in eo loco, in quo postea putrescit, sed ab alijs partibus amandata in eo loco suscipitur, ubi etiam putrescit.

Sic subjectum febris & focus differunt, quod nulla sit pars in corpore humano, qua focus fieri non possit. Subjectum autem febris primum nullum aliud quam cor esse possit.

Cor igitur principale subjectum febris afficitur aut per se, aut per consensum.

Per se afficitur, cum focus est in ipso corde, id quod fit, cum uel laborat ex permanente intemperie calida in sua siue carnosa, siue fibrosa, siue spirituosa substantia, uel putrescit, id quod homine aliquantulum superstiti fieri potest.

Per consensum afficitur, cum focus est extra cor in alijs partibus, usq; uel uenis, uel extra uenas. Rursus uenarum alia majores, alia minores. Majores sunt, qua inter alas & inguina excurrunt. Minores sunt in ambitu habitusq; totius corporis.



Spatia extra uenas similiter alia sunt extra uenas maiores, alia extra uenas minores.

Spatia extra uenas maiores sunt partes thoracis & abdominis, ut pulmo, uentriculus, epar, lien, mesenterium, epiploon, uterus, eaque circa hac uiscera continentur. Spatia extra uenas minores sunt partes capitis & artuum, ambitusque corporis, ut sunt magna ex parte musculi.

Rursus focus aut est unius, aut plures.

Afficitur autem per consensum uel postinè, uel priuatiuè.

Postinè, cum uel spiritus fluens ex euidentibus causis, ut Solis astu uel uino meraciore accensus: uel fuliginosa putridaue exhalatio, ex uenis extraue uenas: uel intèperies calida alicujus uisceris, cordis calorem naturalem corrumpit, feruoremque excitat.

Priuatiuè, cum non affluit quod affluere debuit, eò quod uel impeditur, uel deficit. Impeditur ab obstructione inueterata & putrescente uisceris alicujus. Deficit à corruptione substantia & ulceratione uisceris. Aliam enim priuatiuam συμπάθειαι hic constitutuere non possumus.

Ex quo sequitur, ut tanta sit febrium uarietas quanta fomitis illarum diuersitas: id quod breui diuisione percurrere ab hoc loco non prorsus alienum uidetur.

Febrium enim primum alia primaria est, alia secundaria. Primaria est primigenia, qua fit corde per se affecto. Secundaria est symptomatice, qua fit eodem per consensum affecto. Sic hectica alia primaria est, alia secundaria.

Primaria est, qua cordis primum, deinde reliquarum partium substantiam aequaliter inuasit. Secundaria est, hectica unius membri, qua cuiusque partis, ut uentriculi, epatis, lienis & pulmonum substantiam primum ac per se obsidet: deinceps uerò tumor, tum partes singulas occupat. Eadem est ratio aliarum febrium, ut ephemera & putrida.

Ephemera enim primaria fit à causis euidentibus, ut astu Solis, aère pestilenti, uino meraciore, ira, marore. Secundaria ex magnis partium externarum, uel paruis partium internarum inflammationibus excitatur, ut inguinum, quas Greci bubonas uocant. Nam etsi ibi aliqua continetur postredo, cum tamen

fit conclusa & circumscripta, non tantam inde putridam exhalationem attollit contingit, ut possit ad cor usque pertingere. Unde Hipp. 4. aph. 55. Ex inguinum inflammationibus omnes febres mala, prater ephemeram. Ad ephemeram uerò referri oportet & quintanas & sextanas, & similes. Quod si uerò inflammationes partium internarum maiores sunt, ea putridas generant.

Sic putrida alia primaria est, alia secundaria. Primaria est Epidemica, qua ab aère inspirato cor primum afficiente concitatur. Secundaria est, non epidemica, qua ab interno humore putrescente oritur.

Secundo febrium alia continua est, alia intermittens.

Continua est, cuius nulla est infebriticatio: intermittens, qua in uacuitatem febris desinit. Continua rursus est omnis febris tum primaria, eaque siue ephemera, siue putrida, siue hectica: tum secundaria, cuius materia ut plurimum in uenis continetur. Intermittens uerò nulla est primaria, omnis secundaria: estque illius materia ut plurimum extra uenas in particulis, ad quas uena humores deferunt. Rursus materia, qua in uenis continetur uel uapor est calidus sanguinis uberioris uel sanguis totus, uel unus humor tantum. Si uapor phlogosin faciat, fit synochus non putrida. Si omnes humores simul putrescant, fit synochus putris. Synochus utraque dicitur quasi sine circuitibus. Unica enim accessione continetur à principio usque ad finem, estque triplex: homotonos, epacmastica paracmastica. Homotonos est, qua similis perseuerat à principio ad finem. Epacmastica est qua perpetuo augetur. Paracmastica, qua perpetuo remittit. Si unus humor tantum, is uel phlegma est, uel flaua bilis, uel atra bilis. Si phlegma, fit continua quotidiana. Si flaua bilis, fit tertiana continua & causos. Si atra bilis, fit continua quartana. Quotidiana plurimum consistit in uenis oris uentriculi & intestinorum nec non capitibus: tertiana epatis: quartana lienis male affectis. Species quotidiana continua sunt lypiria, epialos, latica, syncopalis, catarrhalis. Ex quibus epialos ut plurimum intermittens est ex pituita acida extra uenas putrescente, circa intestina, ut in colo.

Lypiria



LYPIRIA est febris ardēs, in qua interiora uruntur, extrema uerò argent, sic dicta δρό τῶν λυπεῶν, quo nomine nuda & arida loca Hipp. appellat. Estq̄ duplex: alia ex bile, alia ex pituita. Biliosa rursus alia mitis, alia saua. Mitis est, cum interiora à bile putrescente non copiosa urūtur, qua externis partibus sic communicatur, ut tepidiores maneant. Saua est, cum bilis putrescens tam copiosa est in partibus internis, ut partes externas omni spiritu & calore destitui faciat.

Pituitosa similiter alia mitis, alia sauior: estq̄, eadem illius quæ biliosa ratio. In miti enim putredo mediocris: in sauiore uehemens est.

EPIALOS est febris lypiriae contraria, in qua interiora frigent: extrema calent: uelut alij definiunt in qua eodem tempore eadem corporis particula inaequalem sensum caloris & frigoris percipit: sic dicta δρό & αἰλός & ἠπίως quod sit instar maris à principio quidem mitis & tranquilli sed difficillimi postea tempestate redditi. Estq̄ duplex: uera & spuria.

Vera est, uel ex acida pituita tantum, uel ex acida & uitrea.

Spuria est, ex acida mixta cum bile, de quibus Gal. 2. de diff. febr. 6. & lib. de inaequali intemperie cap. 8.

LATICA est latens, in qua pituita dulcis putrescit in uenis paruis: in magnis uerò flagrans causos pituitosus nothus dici solet.

SYNCOPALIS est, quam syncope comitatur, ob lesum os uentriculi ex maxima crudorum succorum copia.

CATARRHALIS est, qua oritur ex materia pituitosa genita in capite.

Phlegma enim copiosum producitur aut ob intemperiem uentriculi, aut ab usu immodico ciborum pituitosorum, etiam bene se habente uentriculo: aut à uitio capitis: unde destillans per asperam arteriam in pulmones excurrit, illicq̄, ob longam moram calore prater naturam corruptum febrem procreat.

Quomodo autem causus & tertiana continua inter se differant dictum est in nomine causi. Est enim causus ex flaua bile in uenis cordi uicinis putrescente (ut in thorace & uentre) tertiana uerò continua ex eadem

putrescente in partibus à corde distantioribus.

Intermittens est, cuius materia ut plurimum extra uenas, siue maiores, siue minores, siue in habitu (in quem initijs accessionum spargi saepius solet) continetur, estq̄ uel pituita, uel flaua bilis, uel atra bilis. Ex pituita fit quotidiana periodica. Ex flaua bile fit tertiana interpolata exquisita, ex atra bile fit quartana intermittens. Quod uerò additur, ut plurimum, id ne temere dictum uideatur, pleniorum explicationem requirit. Neq̄, enim februm intermittentium à continuis discrimen semper est in loco, sed etiam in materia quantitate & qualitate, quod Galenus rectè asserit. Fernelius imprudenter negat. Materia igitur si multa sit & crassa lentaq̄, cum sit minimè dissipabilis, etiam extra uenas coaceruata, continuam febrem quæ plures dies duret, producit. Contra eadem si pauca & tenuis fuerit, putrescatq̄, non solum extra uenas, sed intra easdem etiam febrem intermittentem accendit. Hinc febris continua est inflammato cerebro, pulmone, membrana succingente costas, qua nomine partis focum continentis appellatur phrenitis, peripneumonia, pleuritis. Sed & febris continua est ex chylo in uentriculo putrescente: & ex lumbricis & ex putrescentibus excrementis post profusionem aquarum ex aperto hydropicorum abdomine. Quæ omnia suo quodam modo ad humores putrescentes referri possunt. Ac ad sanguinem quidem putrescentem suppuratio pleuriticorum: ad pituitam putrem cibi & uermes putres, aquæ hydropicorum, cachexia uirginum, febris ab ulceribus internis, ut pulmonum, renum & reliquorum.

Eundem uerò statum perpetuò seruat continua: mutat per uices intermittens, quod continua nihil extra uenas extrudit, sed materia saltem peccantis portionem calore febrili resoluit: intermittens materiam aliam è uenis expellit, aliam relinquit, qua totum febris spatium fouet. Non effundit autem continua, effundit intermittens, quod multò sit major in uenis per continuas quàm extra uenas per intermittentes obstructio, ac tanta quidem, ut omnem humorem intus cohibere possit.

Kk 3 Nam



Nam quod plurima continua interdum ab horrore aut rigore primum inuadunt, id non tantum effusa in habitum corporis bili adscribi debet, quàm ei quod collecta p corpus uniuersum materia febrem mox factura hinc inde uagatur, impulsâq; à facultate expultrice membranas per habitum corporis dispersas, quæ maximè sentiunt, uellicat. Sed nec illud negari potest, ex intermittentibus continuas sapè fieri: sicuti ex continuis intermittentes: & illud quidem ingressa uenas febrem faciente materia, si nouum aliquid contingat: hoc uerò reseratis obstructionibus, concoctâq; melius & paratiore reddita materia expulsiōni, unde facultas expultrix insurgens rigorem inducit, propulsa in corporis habitum materia finitoq; ita morbo, si nihil relinquatur. Nec absurdam alicui uideri potest, noxium tantum humorem uenis contentum, sanguinîq; permixtum primo accessionis insultu è uenis in corporis habitum reseratis osculis extrudi, relicto ibidem meliore sanguine. Tam sagax enim tamq; diligens natura est in administrandis suis officijs, ut longè maiora opera, quàm sit hoc, prestare obseruetur in humano corpore: quale est illud, quod sapè uomitione noxios humores reijcit, & cibos utiles retinet, una eademq; opera, uno eodèq; tēpore, secretos illos expellens uel expultrice, retinens hos uel retētrice. Sed & illud obseruari solitū, ut ossium squama magno natura propellētis miraculo sola se extra cutim exerant, et acus deuorata interdum per abdomen sola prodeant.

Tertio, febrium continuarum alia lenta est, alia non lenta. Lenta est continua diuturna. Non lenta continua est breuis temporis.

Lenta rursus triplex: una ab obstructione, altera ab ulceratione uisceris, tertia ab angustia uasorum.

Orta ab obstructione uenarum in præcordijs appellatur febris alba & icterus albus, & morbus uirginæ & febris amatoria: frequens in uirginibus pallidioribus ob sanguinis crassi affluxum & permansionem, de qua Langius & Mercatus lib. de morbis muliebribus.

Orta ab ulceratione uisceris est abscessuum suppuratorum in uisceribus, estq; frequens in

phthificis. Plerumq; enim phthifici in principio debilem quendam calorem habent, febris nomine insigniri non solitam: in progressu uerò acquirunt febrem ueram non solū hecticam, sed & putridam.

Ab ulcere enim pulmonis non solum summi et uapores putridi, sed ipsa quoq; materia putrida ad cor uicinum facile transmittitur.

Orta ab angustia uasorum est anonymos, qua cor ob defectum aeris frigidi inuadit.

Cum enim uasa nimis angusta sint, exiguum aerem admittunt, qui quamuis frigidus sit, à calore tamen thoracis & pulmonū facile excalescit, ut cordi pro natura præscripto refrigerando minime sufficiat. Excalescitur igitur illum cor excipiens, uniuerso corporis habitui comunicat, indeq; febrem excitat. Si quis autem tres illas species in hecticam, in quam tandem desinunt, referre uelit, cum eo non contendemus, modo ordinem doctrina consensui utriq; tum positiuo tum priuatiuo congruentem à nobis hic obseruatum intelligat.

Quartò febrium intermittentiū alia simplex est, alia composita.

Continua enim febres sunt confusa tantum, plures uerò esse non possunt. Nam qua confusa sunt ex materia diuersa in iisdem uenis, mixta confusâq; putrescente, oriuntur. Simplex igitur intermittens est una ratione sedis unius, eaq; uel exquisita uel notha. Exquisita est legitima cum in una parte unus humor putrescit, uel etiam plures, sed tanta imparitate mixti, ut unius obscurissima signa nusquam compareant, alterius sint illustrissima.

Notha est illegitima & confusa, eaq; uel simplex, uel composita.

Simplex confusa est composita è duorum humorum simul mixtorum in eadem parte putredine, & aliquando tanta paritate, ut neutrius signa seorsim sint conspicua. Composita confusa est ea impuritate, ut unius humoris uires motusq; euidentiores sint: estq; tertiana notha, quotidiana notha, quartana notha, qua nomen à uincente humore sortitur, ut in humorum præter naturâ mixtione & nomenclatura, cum u. g. phlegmone erysipelatodes, erysipelas phlegmozodes & sic deinceps appellatur. Sic bilis in tertiana notha superat, phlegma superatur, ut bilio-

phleg-



phlegmaticam febrem (si ita loqui liceat) constituat. Contra pituita in quotidiana notha copiosior uincit: bilis parcius putris est, ut phlegmatico biliosam febrem non male quis nominauerit. Eadem est quartana notha ratio. Ex quo apparet, materiam in uno loco contentam misceri aut obscure, aut euidenter. Si obscure, est febris exquisita. Si euidenter, est notha & confusa. Miscetur uero aut equaliter, aut inaequaliter. Si equaliter est confusa simplex. Si inaequaliter, est confusa composita.

Composita intermittens est implicita, cum eadem uel diuersa materia diuersis in locis putrescit, estque duplex: aut enim intermittens continua, aut intermittens intermittenti implicatur. Intermittens continua, ut tertiana intermittens cum pituitosis continua, & contra. Vtraque hemitritaeos appellatur. Intermittens intermittenti implicita est, uel eadem, uel diuersa specie. Eidem specie ut tertiana, quotidiana, quartana duplex aut etiam triplex. Diuersa specie, ut tertiana & quotidiana: aut quartana etiam cum alterutra prior implicatio frequentior est: posterior rarior, primisque diebus obscurior.

SIGNA cordis simpliciter affecti in omni febre occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Manifesta enim nulla sunt, cum cor abdium lateat.

Cause sunt, quaecumque intemperiem calidam inducunt, ut calida dispositio aeris, regionis, alimentorum, quibus aliquis longo tempore usus est, calidum temperamentum, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est cordis tremor, palpitatio, oppressio, syncope, pulsus celer & diuersus, irium languor, eo quod uniuersum corpus cordi laboranti consentit.

Mutata qualitas est caliditas praeter naturam, praesertim pectoris.

Mutatum excrementum est deiectionis, urinae, sudoris & sputi quantitas uel superflua uel diminuta.

Vtraque simul sunt febres communiter uagantes, nocent calida, prosunt frigida, facili lapsio in febres.

SIGNA cordis affecti in distinctis febribus.

In ephemera spirituum cordis affectorum signa sunt cause, effectus & utraque simul.

Cause sunt euidentes ferè, ut aer calidus, exercitatio immodica, perturbationes animi: densitas cutis, & obstructio, interdum bubo, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est uitalis imprimis, ut respiratio & pulsatio paulo maior & celerior naturali. Pulsus tamen à marore, metu, labore, uigilijs, inedia, cura, paruus est sed frequentior. Diastole citatior, systole tardior, quia minima fuligo, pulsus mollior quam in hecticis.

Mutata qualitas est calor suauis minus quidem quam naturalis, sed magis quam in putridis & in hecticis. Subiectum enim tenue est, nempe spiritus. Explorandus autem est apposita manu praesertim thoraci agrotantis. Idem calor inuadit sine horrore, uelox est, & diem unum durat, nisi ab interna causa foueatur.

Mutatum excrementum ephemera ut morbi est nullum. Urina enim & excrementa alui secundum naturam sunt: cum spirituum tantum & non sanguinis & humorum facta sit euidens alteratio, nisi cruditas aliqua & perturbatio animi subsit, unde excrementum mutetur. A cruditate enim urina alba: sicuti ab ira ruffa est. Accessionis uero declinantis excrementum est sudor moderatus, ros, & uapor suauis.

Vtraque simul sunt iuuantia & ledentia praeter communia omnium febrium, quod primo die prodest usus balnei, neque inde sequitur horror: prodest & cibus & potio, sed obest abstinentia.

In putrida humorum cordis affectorum signa sunt cause, effectus & utraque simul.

Cause sunt, quaecumque humores putrefaciunt, suntque duplices, externa & interna.

Externa, ut calor ambientis, qui auget calorem internum per se, diminuit per accidens, usus ciborum mali succi, ars destinata lanarum lotioni & similia.

Interna sunt, temperamentum calidum & humidum, aetas iuuenilis, humor multus, crassus & glutinosus, obstructio & alia, de quibus alibi.

Effectus



Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus inaequalis & ephemera contrarius: systole n. breuior & citatior, diastole tardior est, eò quod major sit expurganda fuliginis, quam cordis refrigerandi necessitas: id quod est febris putrida signum pathognomonicum. Pulsui respōdet respiratio, qua inspiratione maior est.

Mutata qualitas est nigredo linguae & calor acrior quam in ephemeris & uaporosus. Subiectum enim crassius est, unde calidū innatum cordis magis igneum redditum est. Idem calor inuadit cum frigore, horrore, rigore.

Nigredo autem linguae hic intelligitur profecta uel à combustione, uel à putrefactione: potest enim nigrescere etiam à fumo & fuliginibus humoris melancholici in uentriculo existentis, & hac nigrities febrem putridam non designat.

Mutatum excrementum est urina cruditas seu obscura concoctio primo die. Febris enim putrida ex non cocta, ut ephemera ex cocta materia constat. Vnde in ephemeris signa coctionis prima die apparent.

Utraque simul sunt iuuantia. Profunt frigida & humida, nocent calida & sicca. Iuuant item qua humores digerunt & euacuant: nocent, qua eosdem retinent, aut obstruendo, aut astringendo.

IN HECTICA solidarum cordis partium affectarum signa sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quaecumque calefaciunt & exsiccant, sed efficacius & diutius quam in ephemera, ut medicamenta plus iusto uacuantia, uictus ratio similis, praecedens febris ephemera siue putrida, imprimis ardens, empyema, ulcus pulmonis, & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, indolentia, pulsus paruus & uelox, similiter & respiratio: paruus est, quia utraque facultas, uitalis & animalis languet. Velox, refrigerandi cordis gratia.

Mutata qualitas est calor assiduus & mordax, eò quod solidas partes afficit,

imprimis in regione arteriarum cordi contiguarum. Est autem in principio hectica debilis, in processu fortis: contra in principio putrida fortis, in processu debilis. Sed & calor hectica aequaliter omnes partes occupat, & per unam uel alteram horam à cibo augetur.

Mutatum excrementum est in primo gradu hectica, urina sana, sed citrinior: in secundo pinguedo telis aranearum similis lotio innataus: in tertio dejectiones unctuosae, & urina oleaginea, ruffa uel liuida.

Utraque simul sunt iuuantia & ledentia, praeter communia omnium febrium, quaedam iuuat mirum in modum cibus & potus: ledit abstinentia. Prodest item per multos dies usus lactis.

SIGNA cordis per se affecti, id est, febrium primariarum sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Febris enim uehemens est, non succedit alteri affectui, non intermittit, & profunt idonea cordi adhibita, ut aqua cordialis, bezoar, cornu cerui.

SIGNA cordis per consensum affecti, id est, febrium symptomaticarum sunt paruitas, numerus, tempus & iuuantia. Febris enim mitior est, comitatur alium affectum, intermittit, & profunt utilia non cordi, sed parti consentienti adnota.

Ex quamquam autem parte consentiente laboret, id ex proprijs cuiusque partis affecta signis deprehendi oportet. Nam u. g. Si uenter per se affectus sit, adest uomitio, singultus, lipothymia. Si epar & lien, apparet circa has partes dolor, tumor, tensio, sentitur nausea & fastidium. Si pulmo, affligit sitis implacabilis & rubent maxilla. Si habitus, id est, muscoli, praecedat lassitudo, dolor, grauitas membrorum; & per initia accessionum frigus, horror, rigor, sequitur sudor per meatus obscuros fluens & febrem soluens.

SIGNA febris continua & intermittens sunt causa, effectus, & utraque simul.

Causa continua in genere sunt eadem qua intermittens: unde & diuisio utriusque, eadem in febres pituitosas, biliosas, melancholicas.

In specie



In specie uerò causa continua sunt, quacūq; continuū humoris putrescentis feruorē faciunt, ut uel sedes illius siue in corde, siue locis cordi uicinis, uel ejusdem aut copia, aut crassities & lentor. Vicinitas enim facit, ut perpetua sit uaporum ad cor à suo foco delatio. Ex nimia quantitate & uitiosa qualitate magna existit obstructio, unde aut nulla, aut imperfecta excretio, & sic cōtinua afflictio.

Intermittentis causa contra sunt, quacūq; interruptū humoris putrescentis feruorem faciunt, ut uel situs illius extra uenas, unde cor non facile ferit: uel ejusdem paucitas & tenuitas, quae facile dissipatur, & ante quidē quam noua repullulet putredinis materia, ubicūq; collectus sit humor, siue intra, siue extra uenas: de qua re etiā supra diximus.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus intensior & uarius sine ordine & rhythmo in continuis: remissior, nec uarius, sed cum ordine & rhythmo in intermittentibus. Varius autem pulsus est inaequalis, qui non semper sibi similis est. Ordinem seruans est, qui inaequalitatis suae parem & consimilem mutationem retinet, ut si, v. g. fiant tres pulsationes magna, & deinde una parua, & deinceps similiter procedant. Contra inordinatus est, qui similem mutationem non retinet, ut sēv. g. fiant tres pulsationes magna, post una parua, tum dua magna, post dua parua, & tum una magna, & sic deinceps. Sic rhythmum seruans est, qui tempus, quod absimitur in arteria distentione cum ejus quiete habet aequale tempori constrictionis & ejus quietis. Non seruans est, qui contra.

Mutata qualitas est, caloris diurnitas & modus inuasionis. Continua enim calor febrilis horas 24. excedit, nec inuadit eam horrore aut rigore. Intermittens contra intra 24. horas desinit, & cum rigore, aut horrore, aut frigore incipit. Ac cum frigore quidem, si humor putridus concitatus tum, turgensq; paucus est, aut ejus parua acrimonia, motusue lentus ac languidus. Cum horrore uerò, si idem copiosior est, aut acrior, aut ejus impulsus concitator. Cum rigore deniq; plurimus, isq; uehemēter acer ac mordax magno impetu in sentientia mēbra excutitur.

In omni enim inuasionē febris inter-

mittentis interioris ardoris uehementia instar cucurbitula, calorem ad se tanquam centrum ex circumferētia corporis reuocat: unde sit initio accessionis caloris concentratio: contra in statu sit ejusdem per uniuersum corpus expansio.

Nec tamen interdum & intermittens rigore caret, cum scilicet materia aded benigna est & exigua, ut debili suo motu rigorem efficere nequeat. Sic contra continua interdum suum rigorem habet, quamuis raro, cum minima portio tenuior uel putredinis commota primo insultu febris e uasis in habitum excidit, relicta interim crassiori portione.

Quod si rigor sit longus et intensus, indicat febrem continuam per subingressum: sit exiguus & breuis, indicat uerè continuam proportionatam, cujus materia in uenis remotis putrescit.

Mutatum excrementum est sudor, qui nullus est in continua. Manifestus uerò in intermittente febre, qui & sensim febris terminat.

Utraq; simul sunt iuuantia. Nocet uinum in omni continua, quocūq; tempore: prodest in declinatione febris intermittētis.

SIGNA SYNOCHI non putris, sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt, quacūq; uel obstruunt, uel sanguinem copiosum generant. Obstruunt cutis constipatio, contactus rerum astringētū, lentor humorum. Sanguinem copiosum generant, uictus ratio opipara, adoleſcētia, tēpus calidum & humidū, euacuatio aliqua intermissa & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa ratione cordis est, pulsus magnus, plenus, uelox.

Ratione materia, dolor capitis, somnus profundior solito, lassitudo.

Mutata qualitas est calor febrilis non multum mordax, sed uaporosus, tumor uenarum in temporibus, rubedo faciei, oculorum & totius corporis, quarto die aut citius desinit.

Mutatum excrementum est, sputum sanguinolentum, fluxus sanguinis narium, sudor feridus, urina rubra uel subrubra, cum sedimento laudabili.

Utraq;



Vtraq, simul sunt iuuantia. Prodest sanguinis misio & inedia, nocet balneum acibus.

SIGNA SYNOCHI PYTRIS, sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, humores putrescentes accumulunt, imprimis esculentorum multitudo, exercitatio praesertim à cibo & in uere, otium immodicum & cetera, de quibus alibi.

Effectus sunt, actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus inordinatus, magnus, uelox, frequens. Ratione materiae dolor capitis intensior, inquietudo, uigilia, metus alienatio, de quibus alibi.

Mutata qualitas est dolor acrior quam in synocho non putri & tactu mordax.

Mutatum excrementum est egestio fatida, urina crassa, turbida, rubra, sine sedimento.

Vtraq, simul sunt iuuantia. Profunt inedia, sanguinis misio, & qua magnopere refrigerant: nocent qua sanguinem uel nouum generant, uel collectum retinent: praeserea qua calefaciunt.

SIGNA CONTINVAE QUOTIDIANAE sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, putredinem intranasa & pituitam generant, ut pordrum clausio, obstructio, otium, cibi pituitosi, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa ratione cordis est pulsus latus, mollis, tardus, inequalis.

Ratione materiae, stupor, grauitas capitis, sitis modica aut nulla.

Mutata qualitas est facies tumida & cutis mollis.

Mutatum excrementum est urina alba, interdum ruffa, crassa, liuida.

Vtraq, simul sunt, quotidiene communiter uagantes. Profunt qua pituitam uel euacuant, uel citra excessum caloris ipsam extenuant atq, incidunt. Nocent qua pituitam uel contrahunt, uel crassorem, aut frigidiorrem reddunt.

SIGNA CONTINVAE TERTIANAE sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, bilem flauam in uenis, siue omnibus, siue remotioribus putrefa-

tiunt, ut transpiratio impedita, regio calida, uictus ratio calida, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus uelox & spissus cū densitate quadā, sitis intensa, uigilia immodica.

Mutata qualitas est calor acrior & mordacior quam in intermittente, facies citrinior. Mutatum excrementum est urina rubra uel subrubra cum liuiditate quadam, subtilis substantia.

Vtraq, simul sunt iuuantia. Profunt inter morbi initia humorem biliosum, cum sit tenuis, uacuantia.

SIGNA CAUSI sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, bilem flauam uel pituitam saliam in uenis siue medijs, siue circa uiscus aliquod, ut epar, pulmonem, os uentriculi putrescere faciunt, ut obstructio, balnea calida, inedia, crapula, uictus ratio pituitosa, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus magnus, uelox, frequens cū duritie, magna spiratio, deliquiu animi.

Mutata qualitas est feruor maximus circa illas partes qua affecta sunt, ut cor, epar, pulmonem, os uentriculi. Mutatum excrementum est uarium. Si pulmo sit affectus, adest tussis sicca. Si epar laborat, urina rubet, lucescunt, scintillat. Si os uentriculi, tum spurum & os amarum est & defectio biliosa. Causus autem nothus à salsa pituita, linguam salisam legitimus tantum nigrum habet.

Vtraq, simul sunt iuuantia. Causi hoc tempore uulgariter grassantes.

Profunt qua uehementer refrigerant, aut leniter flauam bilem purgant: nocent ea qua uel calidiorrem reddunt uel gignunt eandē.

SIGNA CONTINVAE QUARTANAE sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, melancholicum humorem accumulunt, eug, intra uenas putrefaciunt, sunt q, alia externa, alia interna.

Externa sunt tempus anni, celi constitutio, regio, praecedens uictus ratio frigida & sicca. Interna sunt, aetas declinans, natura frigida & sicca, obstructio, impedita transpiratio, humorum crassities.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio



Actio lesa est pulsus uelocior & frequentior quam in intermittēte, tardior tamen aliquo modo & rarior quam in alijs febribus. Dolor item & tumor epatis, splenis, uentriculi, si cæ partes affecta fuerint.

Mutata qualitas est inuasio cum frigore extremorum absq; rigore, calor minus quam quotidiana fumosus, sed acrior: minus tamē quam tertiana. Circuitus quoq; exacerbationum quartanus.

Mutatum excrementum est urina rubra, subrubra, turbida.

Vtraq; simul sunt quartana hoc tempore grassantes. Profunt quæ atram bilem educunt uel leniunt: nocent quæ contrahunt atq; exasperant.

SIGNA LYPIRIAE sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt duplices, cum lypiria duplex sit, biliosa & pituitosa. Vnde non solum inter quotidianas sed & inter ardentes ab alijs referri solet. Quæcumq; igitur uel pituitam uitream, uel bilem eamq; putrem in uentriculo uel epate accumulanti, lypiriam efficiunt.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est, anxietas et molestia maxima: unde & ἀσώδης dici potest à fastidio & iactatione estuq; corporis. Vigilia in biliosa: carus in pituitosa. Pulsus in pituitosa paruus, debilis, uelox, diuersus. In biliosa pulsus ut in caufa.

Mutata qualitas est ardor internarū, frigus externarum & extremarum partium corporis.

Mutatum excrementum est urina tenuis & crudissima.

Vtraq; simul sunt iuuantia. Prodest in biliosa post phlebotomiā & lenē aliā subductionem largior aqua potus: nocet in pituitosa.

Propriè uerò profunt, quæ tota substantia prauitati medentur: cum pestilentem amuletur ualdè obsunt ea, quæ putredinem augendo prauitatem simul augent.

SIGNA EPIALISunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt, quæcumq; pituitam acidam ex parte putrem colligunt, ut uita otiosa, temperamentum, tempus anni, uictus genus frigidum, calor innatus languidus, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est, pulsus ut quotidiana, sed minor, tardior, rarior, somnolentia similiter minor quam in quotidiana, cardialgia cōtra major, indeq; lipothymia stomachica crebrior.

Mutata qualitas est color faciei ut quotidiana, sed magis albidus, calor habitus minus fumosus & acris, sed algorem ubicunq; comitem habens.

Idem asiduus non est: quòd materia extra uenas in præcordijs putrescat: ob imperfectam tamen intermissionem & pituita copiam inter continuas referri solet.

Mutatum excrementum est dejectio ut quotidiana, sed aquosior & pituitosior è frigidiori uentriculo: urina similiter crudior.

Vtraq; simul sunt iuuantia. Profunt quæ concoquunt & paulatim exhauriūt pituitā, nocent quæ ipsam contrahunt uel subito educunt.

SIGNA LATICAE FEBRIS sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causæ sunt, quæcumq; pituitam subdulcem uel inspidam eamq; putrem generant, ut uigilia immodica, otium & similia.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est pulsus mollis: frequens uerò & languidus, cibi inappetentia & similia.

Mutata qualitas est cutis albicans & sub-tumida, qua in re ab hectica differt, in qua cutis arida euadit. Sed et in laticis aliqua intensio quotidie obseruatur. Nulla caloris acrimonia.

Mutatum excrementum est ut in quotidiana, ratione pituita, quæ redundat.

Vtraq; simul sunt iuuantia. Profunt pituitam inspidam educuntia.

SIGNA FEBRIS SYNCOPALIS sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quæcumq; magnam crudorū succorum copiam, uel bilem ueneficam cumulant, ut balnea intempestiua, immoderatus usus aquæ & uini crassioris, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est, pulsus minor quam pro caloris ratione, obscurus & inæqualis omnino, status plurimi, ructus acidi & frequens syncope.

Mutata



Mutata qualitas est mala affectio oris uentriculi, hypochondria inflata, totum corpus tumidius, color albidior, fere hydropelaborantis similis, interdum plumbeus.

Mutatam excrementum est, ut epiali, cum quo magnam cognationem habet.

Utraq, simul sunt iuuantia. Nocent uacuantia, profunt frictiones.

SIGNA febris catarrhalis (qua & cerebralis dici potest) sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, pituitosum succum putrem colligunt & catarrhum efficiunt, ut error externus, cerebri & uentriculi dyscrasia, eparjusto calidius, obstructio, & alia, de quibus alibi. Error externus est usus sex rerum non naturalium, pariens uel succum pituitosum, uel intemperiem praedictorum uiscerum.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum. Qua ratione cordis eadem sunt cum signis febris quotidianae.

Ratione aliorum uiscerum primario laborantium diuersa sunt.

Nam cerebrum laborat aut calida, aut frigida intemperie. Si calida, aderunt uigilia, si frigida, aderunt somni longiores.

Eadem est ratio mutatae qualitatis & mutati excrementi. Si calida est intemperies cerebri, facies erit colorata, destillans materia erit densior, saporis amari uel salsi: coloris flauis uel uiridis. Si frigida est intemperies cerebri, facies erit pallida, materia destillans aquosa, alba, omni sapore destituta.

Utraq, simul sunt iuuantia. Si calida est intemperies cerebri iuuabunt refrigerantia: si frigida, proderunt calefacientia.

SIGNA quotidiana periodica sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, pituitam putrem accumulans, ut tempus anni frigidum, uictus ratio pituitosa, oppilatio, & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est initio pulsus tardus, rarus, paruus, uentriculi dolores, dormiendi cupiditas.

Mutata qualitas est inuasio cum frigore extremorum potius quam rigore. Calor

humens sine fumosus, quasi ex succensis uiridibus lignis uapor sublatum.

Mutatam excrementum est alui dejectio pituitosa, urina primis diebus alba & tenuis, deinde rubra, crassa, turbida. Inclinas accessio primis diebus nullum, postea uero paucum sudorem effundit, pro uaporis specie pinguem & uiscosum.

Utraq, simul sunt quotidianae populariter grassantes.

SIGNA tertiana interpolata sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt quaecunq, bilem flauam extra uasa putrem accumulans, ut tempus anni calidum & siccum: uictus ratio calida & sicca, inedia, ira, furor, sollicitudo, cibus corruptus, mali humores in uentriculo cibum corrumpentes, prohibita euentatio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt laesa actio, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus initio contractus, paruus, postea maximus, frequentissimus, celerissimus, sitis uehemens, dolor capitis.

Mutata qualitas est inuasio cum rigore, id est, sensu rei magis acuta & pungentis quam frigoris, & aestu interno, quo plerunq, corpus omne concutitur, sub cuius finem excussa bilis saepe uomitione redditur: hinc calor breuis accenditur & in omne corpus effunditur, mox ad uigorem festinans, acer & iniectam manum acriter feriens, sed statim mitescens. Intermisio horarum 12. aut longior.

Mutatam excrementum est urina flaua aut flammea, substantia mediocris & odore grauis. Solutio in sudorem multum, eumq, calidum & uaporosum.

Utraq, simul sunt tertiana populariter grassantes, & quod agrotans antea hac febre laborare consuetus: iuuat item uomitus flauae bilis, & potio in fine accessionis sudorem mouens: nocet uel sudorem uel uomitum retinens.

SIGNA quartana intermittens sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, melancholiam putrem generans, ut anni constitutio frigida & sicca, uictus ratio terrenam substantiam habens, aetas declinans, humoris melancholici copia, obstructio, & alia, de quibus alibi.

Effectus



Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est pulsus initio accessionis languidior, minor, tardior ac rarior: postea uero ualidus, magnus, frequens & celer, & quam in ceteris febribus inaequalior, dolor lienis, appetitio cibi interdum nulla, interdum nimia.

Mixta qualitas est inuasio cum frigore ualido, eaq; internas partes uerberante (qua in re à tertiana differt) quod eouq; sensim inualefcit, dum horrorem, ac uehementem interdum rigorem, non pungentem quidem sed contundentem inuehat, quo corpus uersum tremore concutitur, dentes strident: sub cuius finem uomitio erumpit amara, cum praesertim uia patent in uentriculum: hinc calor non ut tertiana uehemens, sed quam quotidiana ardentior, neq; is toto corpore aquabilis, sed cum quadam frigoris permissione. Accessio ferè 12. horas occupat.

Mutatum excrementum est alui dejectione nigra, & urina primis ferè diebus tenuis, alba, aquosa: postea uero & substantia & colore & contentis saepe mutabilis, quod ejus materia plerunq; uaria sit. Exit sudor multo magis quam in quotidiana.

Utraq; simul sunt quartana populariter grassantes. Inuant qua educunt uel leniunt humorem melancholicum: nocent qua eundem contrahunt atq; exasperant.

SIGNA febris alba sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causae sunt esus prauis alicujus alimenti, uatura temperata, unde pulchriores magis hoc morbo laborant, humor seculentus, suppressio uel defectus mensium. Nam cum uterius sanguinis crassi ac uiscidi copiam nec recipere, nec expurgare ob innatam uasorum angustiam possit (quod aliquando uiduis uel nuptis contingit) sequitur enim subinde necessario ad membra utero proxima per uenas omnibus communes remeare, & remorari in eisdem, nunc in solis uenis: nunc facta etiam obstructione in jecore, mesaraeo, uentriculo & splene.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus celer & frequens (cum deficiat necessaria uentilatio) pulsatio arteria temporum & dorsi frequens & maximo cum dolore (conatur enim cor uehe-

menti motu periculum sibi impendens excutere) difficilis respiratio, praesertim in motu uehementiori (in quo cum diaphragma citius & magis dilatari debeat, distentus ab obstructione uiscerum dilatari non potest) Contremiscunt cor & totum corpus ad quouis corporis motum, adest lassitudo & carnisum fastidium.

Mutata qualitas est coloris genarum & labiorum rosei in subalbidum declinantis, nunc ad flauum, nunc subfusum (pro uarietate humoris obstruentis & uisceris obstructi) mutatio, tumor palpebrarum, oculorum & crurum juxta malleolos sub noctem.

Mutatum excrementum est dejectio alui & urina uaria, nunc pituitosa & flaua consentiente jecoris obstructione: nunc alba & subnigricans compatiante simul splene.

Utraq; simul sunt iuuantia. Prosunt, qua menses mouent uimq; laxandi habent: nocent, qua densandi, ut frigus, uel per se, uel juncta cum siccitate, ut adstringentia omnia.

SIGNA febris suppuratorum sequacis alia sunt febris, alia suppurationis. Febris signa eadem sunt qua hectica. Suppurationis uero signa sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa est pus uel in pulmone, uel in ipso thorace, quod nisi statim extra reijciatur, ibi contentum solet calorem praeter naturam cordi indeq; alijs partibus impartiri.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est tussicula absq; ulla sputi educatione, item ciborum inappetentia.

Mutata qualitas est calor in digitis eorumq; summitate, rubor genarum, pedum tumor, pustula totius corporis, aduncitas unguium, oculorum cauitas.

Mutatum excrementum est sudor continuus seu potius mador totius corporis, imprimis circa collum & jugulum.

Utraq; simul sunt iuuantia. Prosunt qua pus educunt: nocent, qua retinent.

SIGNA febris ex angustia uasorum laborantium alia sunt communia febris hectica, alia angustiae uasorum. Febrem enim hecticam emulatur, tum quod assidue affligit, nullam seruat periodum, nullamq; statis horis intensionem remissionemue. Ab eadem uero differt, quod in hac febrilis calor primo statim contactu manifestè persentitur, & pulsus licet frequens & uelox & paruus sit,

Ll mollis



mollis tamen est. Excrementa qua inter tus-
sendum foras mittuntur, nullam junctam
purulentiam ostendant, sed pituitam natu-
ralem praefereunt. Angustia uasorum signa
manifesta sunt.

SIGNA februm exquisitarum & no-
tharum sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa exquisitarum sunt, quaecunq; sin-
cerum: ut spuriarum, quaecunq; non purum
sed mixtum humorem uno loco procreant,
ut pituitam biliosam uel bilem pituitosam.
Sunt autem aer uarius, uictus ratio diuersi
generis & similia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas,
& mutatum excrementum: qua in exqui-
sitis sunt simplicia: in nothis composita &
mixta, magisq; accedentia ad signa illius,
cujus spuria magis est particeps. Ut enim
composita sunt causa, ita composita etiam
sunt symptomata.

Utraq; simul sunt morbi exquisiti uel spu-
rii populariter grassantes; & iuuantia ex-
quisita febris ex parte iuuant, ex parte no-
cent. De quibus singulis perquirere nimis
longum & superuacaneum uidetur, praeser-
tim cum in febribus exquisitis optimè exer-
citus ipsarum notharum cognitionem nō
difficiliter assequi possit. Ceterum ne quis
facile hallucinetur, tertiana notha sit instar
exempli.

SIGNA tertiana notha intermitten-
tis sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt, quaecunq; copiosam bilem plus
minusue pituita mixtam eamq; putrem, uel
solā uitellinam procreāt, ut materia escul-
torum & poculentorum non aequè calida
& sicca, ut qua generat flauam bilem sine-
ram: sed mixta & inaequalis, quāquam ma-
jori ex parte idonea, qua in flauam bilem
conuertatur: itē calor uiscerum ope calo-
ris externi non ita ualidus, ut qui flauam
bilem sinceram efficit: deniq; obstructio seu
prohibita euentatio.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas
& mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus uelox, frequens, in-
aequalis, diuersus, sitis magis tolerabilis, ui-
gilia, qua facilius expugnatur, affectus praeter
naturam non tantum epatis, sed uentri-
culi etiam.

Mutata qualitas est rigor principio ac-
cessionis cum minori concussu ac minori sen-

su pungentium: ita ut horrorem potius re-
ferat. Sapius etiam praerigore grauitas ca-
pitis cum somnolentia. Calor in progressu
paulo minus acris & magis fumosus percipi-
tur, & diutius manet accessio quam in ex-
quisita, cum 12. horas superet, & interdum
ad 40. duret. Alternis diebus inua-
dit.

Mutatum excrementum est urina sub-
rufa & pallidior, sed crassior quam in ter-
tiana exquisita. Desinit sapius madore aut
insensili transpiratione quam sudore copio-
so, nisi fortasse in statu & declinatione.

Utraq; simul sunt, tum tertiana spuria
populariter grassantes, tum qua profunt
aut obsunt. Magis enim iuuant & minus
nocent, qua copiosam bilem, siue mixtam,
siue uitellinam generant.

SIGNA februm simplicium & compo-
sitarum sunt causa, effectus & utraque
simul.

Causa simplicium sunt, quaecunq; unum
humorem uno in loco putrem generant.

Compositarum sunt, quaecunq; siue eun-
dem, siue diuersos humores, sed in diuersis
locis putres procreant. Si eundem, erunt
plures quotidiana, plures tertiana, plures
quartana. Si diuersos, erunt tertiana &
quotidiana, quemadmodum in hemitritico,
uel quartana alterutri juncta. Putrescet
ergo, v. g. in uno loco flaua bilis, in altero
pituita.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas
& mutatum excrementum, qua diuersa
sunt pro diuersitate februm. Nam si eisdē
speciei sunt, necesse est, ut diuersis horis in-
uadant. Nam eadem hora una esset febris
duntaxat. Quod si diuersis horis, plures
erunt. Eadem autem erit natura omnium,
idem calor, eadem causa, eadem symptoma-
ta, nisi quod diuersis horis reuertentur.

Eadem est ratio utrorumq; simul, qua ea-
dem erunt.

Quod si diuersa speciei febres junguntur,
poterunt ea diuersis & eadē hora accedere.
Si diuersis horis, apparebit diuersus calor, ut
alijs ualdē acris & parum fumosus; alijs pa-
rum acris & ualdē fumosus. Quod si ea-
dem hora concurrant, erit calor inaequalis,
mixtus & quasi compositus. Symptomata di-
stincta sunt, ut tertiane & quotidianae,
ubi diuersis horis inuadunt: ubi eadē
mixta

mixta & confusa. Deniq; unaquaq; diuersis horis inuadens suis signis supra enarratis cognoscetur, ut exemplo uno hemitritae intelligi potest, quod jam sequitur.

Illud uerò non pratermittendum, notharum februm compositionem crasin, id est, mixturam seu temperaturam: implicitarum ἡμιτρίτων q. complexionem appellari. Ex quo enidens inter utraq; febres differentia colligitur. Notha enim eadem hora inuadunt: implicita uel una, uel diuersis.

SIGNA HEMITRITAEI sunt causa, effectus & utraq; simul.

Sic autem appellatur q. semitertiana uel sesquialtera tertiana, cum ἡμι Græcis utrunq; significet & semis & sesquialterum: ut ἡμιόλιον & semiasinus h. e. mulus: & ἡμιόλιον totum cum altera parte.

Hemitritæos igitur erit uel febris, cuius una pars est quotidiana continua: altera est tertiana intermittens. (Ex utraq; enim tanquam totum componitur) uel tertiana tota cum dimidia. Est enim tertiana longior, durans non tantum horas 12. ut simplex, sed 6. horas plus, uel etiam amplius.

Causæ sunt, quæcunq; pituitam in uenis, & flauam bilem extra uenas putrem generant: ut aer inæqualis, qualis Romanus, esculentæ & poculentæ contraria simul sumpta, id est, tum calidæ & sicca, tum frigida & humida, uentriculus frigidus & epar calidius, etas arilis, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio læsa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio læsa est pulsus inæqualis & inordinatus, sitis ob uim flauæ bilis, somnus grauior ob uim pituitæ, animæ defectio, quod uterq; mordere possit os uentriculi.

Mutata qualitas est inuasio cum horrore primo die ob mixtionem frigoris & rigoris: secunda die nullus horror, sed leuior paroxysmus, & quotidiana formam tenens & sic deinceps. Adest igitur calor assiduus in medio corpore contractus, qui quotidie reuertitur, sed tertio die cum multiplici horrore, altero uerò cum frigore duntaxat, aut cum modico horrore externarum partium semel inuadente.

Ex quo sequitur, ut dies impares sint longè molestiores, quod præter quotidianam tertiana superueniat, cuius rigor in horrore degenerat, quod uis illa uehemens flauæ bilis à pituita remittatur.

Mutatum excrementum est sudor & dejectio uaria ac inæqualis, flauam bilem ac pituitam indicans. Similiter urina colore remissior & substantia crassior.

Utraq; simul sunt, hemitritæos communiter uagans, & quod profunt & nocent, quæ prodesse aut obesse tertiana uel quotidiana supra diximus.

SIGNA februm epidemicarum, quarum focus in corde est, uel locis cordi maxime uicinis, alia sunt febris uerè pestilentis, alia non uerè pestilentis, ut catarrhi epidemici, morbi Hungarici seu lenticularis, febris, cui morbilli & uariola succedunt. Est autem uerè pestilens ea qua communiter uagatur & simul perniciofa est. Non uerè pestilens, qua uagatur quidem communiter sed non ualde perniciofa est.

Differt uerò pestilens à maligna, tanquam species à genere. Omnis enim pestilens maligna est, non omnis uerò maligna, pestis est. Maligna dicitur ab excellenti quadam putredine, ob quam febres inde ortæ omnibus etiam diligenter administratis nihilo meliores fiunt.

Febris igitur uerè pestilentis, ejusq; putridæ signa sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causæ sunt, quæcunq; in pluribus humores putrefacere possunt: ut aer siue calidior tantum, siue calidior & humidior, ideoq; putris: contagiū eorū, qui pestilenti febre laborant, siue per exhalationem, siue per uestes, etiam: & alia de quibus alibi.

Effectus sunt actio læsa, mutata qualitas & mutatum excrementum, quæ omnia cognata sunt typhicæ symptomatis, de quibus supra.

Actio læsa est inquietatio, delirium, obliuio, uigilia, magna & subita uirium imbecillitas, difficultas anhelitus, deprauatio uocis, syncope, pulsus imbecillior quam in alijs putridis, celer, frequens, inæqualis, morsus in ore uentriculi, caligo, sonitus aurium, neruorum distentio aut resolutio, incredibile cibi fastidium, sitis inexhausta, nullius tegumenti tolerantia.

Mutata qualitas est calor internarum partium urēs, externarū tepidus, præsertim primo contactu, isq; continens non tamen sine circuitu quodam uel tertiana ut plurimū, uel quotidiano, ut raro. Ab ardentibus igitur



non pravis pestilens differt, quod in non pravis calor quo diutius tangitur, eò magis superari uidetur caloris acrimonia: in pestilente idè diutius tangenti acriorem se ostendit.

Præterea rubor faciei & oculorum, linor in uarijs partibus corporis & eryspelatis species, in ore fator, distentio præcordiorum, pustula in cute rubra, nigra, arida, carbunculi, tumores glandularum, ut inguinum, alarum, aurium, gangrenæ manuum, pedum, genitalium.

Mutatam excrementum est fluxus ex uarijs sanguinis nigri, alui fluxus, dejectio biliosa uel atra, caë, fatida, sæpe cum lumbricis, plerumq; etiam collignatiua, que liquatim adipem præfert: urina aut turbida, aut aquosa ac tenuis, in qua aut nihil, aut quasi tela aranea in lana speciem coacta residet: interdum eadem ut & pulsus sanis similis.

Utraq; simul sunt febres similes que communiter uagantur, & iuuantia. Ut enim tempore, quo sicus maturescunt, quamlibet autem ficedulam esse ajunt, ita tempore pestis, quamlibet febris esse pestilens iudicatur. Profunt uerò non solum que putredini obstant, sed antidota quoq;: nocent contra maximè, que putredinem augent.

HECTICAE pestilentis signa occulta sunt, causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt eadem, qua putrida.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est, pulsus longè imbecillior q̄ in putrida, sed tamen equalis, in magnitudine & celeritate moderatus: siquidem calor qui est in substantia cordis temperatur à frigore humorum, quos idem cor continet. Adest summa uirium imbecillitas.

Mutatam qualitas est anhelitus fator, calor magis siccus & asidè acris circa thoracè, quamuis agrotantem fugiat & medicum de febre dubitare faciat, estq; sine ullo circuitu. Non apparent in cute neq; rubores neq; tumores, eò quod neq; humores putrescunt, neq; si putrescerent ad cutem detrudi possent, ob summam naturam imbecillitatem.

Mutatam excrementum est urina ferè naturalis.

Quomodo autem febris hectica pestilens dari possit, erudite differit Massaria lib. 5. sua practicae cap. 24.

DIARIAE pestilentis signa occulta

sunt causa, actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Causa sunt eadem qua putrida.

Actio laesa est, frequens animi deliquium.

Mutatam qualitas est calor satis blandus, uehementior tamen quam hectica: pulsus ferè naturalis.

Mutatam excrementum est lotium optimum.

Atqui nullam esse febrem pestilentem diariam confirmat loco citato Massaria: alij contra aliquam constituunt, sed qua celerimè in putridam abeat. Sic febrem Anglicam, que una die extinguit homines, quidam ad diarias referunt: alij ad putridas, & quidem rectius, quippe cum ex putredine spirituum oriatur, & copiosis sudoribus se prodatur, qui proprij sunt putridarum. Potest enim spiritus, ut & res quæcunq; alia putrescere, uno excepto igne, ut asserit Aristoteles in meteoris.

SIGNA febris catarrhalis epidemica nõ uerè pestilentis anni 1580. quam quidam morbum Arietis, Itali Mazuchi, aut Cocculucas uocant, sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt, quæcunq; pituitam in capite & humorum ichores in uenis maioribus, ijsq; cordi uicinis in maxima hominum parte putres accumulant. Tanta enim hujus febris fuit sauitia, ut spatio sex septimanarum omnes ferè Europa gentes affligeret, ex quibus uix uigesimus hujus morbi expertus fuit, & qui fuit, alijs monstri loco fuit, præsertim in Saxonia & Hispania.

Tam communis igitur morbi communem fuisse causam necesse est, eamq; non ab alimentis, aut terra aquisue, sed ex aere uel calo potius perdentem: nempe magnam illius & præcedentis anni aeris inaequalitatè & intemperiem & antegressos infaustos superiorum planetarum congressus, & magnos Solis & Lunæ defectus: unde copiosa humorum heterogeneorū & ichorum soboles succreuit, que facta meatuum constipatione & prohibita euentatione primùm ebullijt, & paulò post putrescens febrem intra uenas putridam excitauit: ut eruditè confirmat peculiari commentario Lucas Stenglius, Medicus olim Augustanus.

Effectus



Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est duplex: una cordis, altera cerebri, ex quibus utrunq; primò & per se laesum est: reliqua uerò corporis partes per consensum.

Ratione igitur cordis in hac febre quàm primum inuadit, omnes uires languent, praecordia grauitatem, cor compressionem sentit & palpitat, pulsus parui, celeres & inaequales sunt, & anhelitus difficilis. Ratione cerebri graue caput est & ingrauescente morbo egroti tam languent, ut tremant & concidant: quidam uigilent, alij somnum profundiore habent. Ratione partium consentientium actio laesa uaria est pro habilitate membrorum recipientium. Fluens enim ex capite acrior & subsalsus humor ad thoracem cunctis ferè tussim sine sputo mouet: alijs irruens ad fauces anginam, ad pulmones peripneumoniam, ad cauitatem thoracis empyema: ad latera pectoris pleuriti-dem: ad uentriculū & lumbos & extremas partes, dolores uagos & pungitiuos excitat.

Mutata qualitas ratione cordis est calor & horror initio inuasionis uniuersum corpus, maximè thoracem & caput occupans, indeq; paulatim succrescens, ad tactum non mordax quidem, sed internè acerbus magis & cōtinuus, modo intensus, modo remissus. Ratione partium aliarum rugitus & flatus crebri, tinnitus aurium, rubor oculorum cum dolore.

Mutatum excrementum est urina primum tenuis, mox crassa sine hypostasi: aluus nonnullis suppressa, alijs fluida: alijs sanguis è naribus fluit: alijs bilis porracea uomitu mox ab initio, pleriq; sudor copiosus erumpit in statu & declinatione; quo & febris finitur quarto ut plurimum die. Interdum enim sed raro longius protrahitur, ut ad septimum, nonnum uel undecimum diem.

Utraq; simul sunt iuuantia. Pro sunt dia-phoretica & antidota putredinem inhibētia: nocent putredinem augentia & euacuantia sanguinem.

Id uerò deniq; pratermittendum non est, cōtrouersum fuisse inter Medicos, qui principem in arte Medica locum tenēt, de genere huius febris, cum alij synochum non putrem, alij putrem esse contenderent. Quam ob causam nos quoq; in nominibus morborū

synochum non putrē uocauimus: praesertim cum hanc initio non putrem in putrem siue corporū dispositione siue errore quodā facile mutari potuisse cōstet, de qua re alibi.

SIGNA MORBI HUNGARICI siue lenticularis sunt causa, effectus & utraq; simul.

Cause sunt, quaecunq; humorem quencūq; sed potissimum flauam bilem & pituitam tota substantia natura nostra inimicam inuenis cumulant, ut uitium aeris calidi aut etiam putris, & contagio eorum qui huiusmodi febre laborant, eos tantum insciens, quorum corpus obstructum uel astrictum est, uel prauis succis redundat.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est praecipuus lapsus, inquietudo, grauitas capitis, delirium, hebes sensus, prostratus appetitus cibi & interdum potitionis, pulsus uariis, rarus & humilis, saepe deficiens, reciprocus, interdum miurus, deficiens & alia similia, sed minus graua, quàm in febre uerè pestilenti.

Mutata qualitas est calor fumosus, feruens in partibus internis, minus acris in externis primum tangenti, deinde acrior tangenti diutius, isq; cōtinuus cū uario, ut plurimum uerò duplicis tertiana notha circuitu, cuius typum ferè seruat. Tangi autem potest manu applicata tum carpo & regioni cordis, tum uentriculo, capitiq; temporibus,

In cute superueniunt maculae rubrae, interdum permanentes, interdum euanescentes, pro ut natura uel superat uel superatur. Sed & abscessus accedunt, & lingua sordida & oculi rubri. Exacerbatur uerò uesperè.

Mutatum excrementum est dejectio corrupta ac fatida, urina primò interdum naturalis, saepius alba & aquosa, mox rubra aut etiam turbida, rhinorrhagia nihil aut parum iuuans, sudores & copiosi & frequentes, sed uel circa unum locum uel algidi.

Utraq; simul sunt febres tales communiter uagantes, & quod iuuant tota substantia prauitati occurrentia, uel ualde nocent putredinem augentia.

SIGNA febris cui morbilli & uariolae tanquam propria symptomata superueniūt, sunt causa, effectus & utraq; simul.

Cause sunt quaecunq; sanguinem biliosum, ut in morbillis, aut sanguinè pituitosum efferuescentem, ut in uariolis, siue generāt,



sive in habitum concitant, uel ut alij referunt, quacunq; tennem sanguinem solum, ut in morbillis, uel crassiorem duntaxat effervescentem, ut in uariolis siue procreant, siue ad cutim membranamue extrudunt. Diuersa enim de morbillis & uariolis autorum opinio est, cum morbilli quibusdam sint macule tantum, non pustula: alijs tum morbilli tum uariola sunt pustula. Sed illi minores ex rubro magis flavescentes: hamajores altioresq;, in ambitu & basi rubra, ad acumē albicantes: illi erysipelatis, ha phlegmonarū naturam magis referentes. Ex sententia uerò Arabum, quacunq; reliquias sanguinis mēstrui, ex quo generamur in nobis feruere faciunt, cuius una pars tenuis & biliosa est, altera crassa & uelut fex, ex quibus utraq; in nobis retinetur, dum processu temporis ferueat. Generant autem flauam bilem & sanguinem eadem, qua in ardente febre & synocho recensuimus.

Iisdem feruorem inducit status aëris uel astuosi, uel pestilentis, perspiratio impedita & suppressa quotidiani excrementi effluxio, de quibus alibi prolixius.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa est, pruritus narium, pulsus teporum, timor in somno, anxietas in gutture & thorace, jaectatio totius corporis, lassitudo artuum tensiua, oscitatio, tussis, grauis & difficilis respiratio, pulsus frequens, celer, uehemens, tussis.

Mutata qualitas est calor uehems, minor tamen in internis quam externis partibus, usq; astiduus sine intermissione, raucedo, rubor faciei & oculorum, pustula tales, quales supra descripsimus.

Mutatum excrementum est sputū crassius, dejectio liquida, difficultas intestinorū,

urina turbida & rubra.

Utraq; simul sunt pustula similes communiter uagantes, & quod profunt refrigerantia intus sumta, obsunt extrinsecus imposita: contra iuuant calefacientia adhibita partibus externis: nocent intus sumta.

SIGNA distinctiua sunt, haec.

SIGNA uariolarum & morbillorum sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa uariolarum sunt, qua pituitosum sanguinem generant, & contagio illius, qui ex uariolis laborat, tum corpus ipsum egrotantis, quod si morbillos expertū fuerit, uariolas expectabis. Contra causa morbillorum sunt qua biliosum generat, & contagio illius, qui ex morbillis laborat, nec non, quod uariolas egrotans antea habuit.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lesa in uariolis est somnolentia in principio febris, capitis grauitas, pruritus totius corporis, dolor dorsi uehemens. In morbillis, uigilia, capitis leuitas, sensus pungentium, dolor dorsi mitior.

Mutata qualitas in uariolis calor plurimus & parum acris, oculi tumidi, pustula paruas inflammationes referentes. Sed & morbilli statim ex cute exeunt: uariola paulatim: in morbillis calor acrior & non ita multus, oculi non ita tumidi: pustula parua erysipelata referentes.

Mutatum excrementum in uariolis est fluor lachrymarum prater uoluntatem: in morbillis non item.

Utraq; simul sunt iuuantia. Nam ei cui superueniunt morbilli refrigerantia interna magis profunt & externa magis nocent: quam ei cui uariola.

Sequuntur duæ Tabulæ, quibus præcedens febrim doctrina prolixior breuiter comprehensa est.

TABV.



TABVLA DE PARTE AFFECTA ET

diuisione febrium.

		<p>Primarium est cor, quod totum incalescit, uel <i>καθ' ἑξῆς</i>, ut in heclica, uel <i>κατὰ χρόνον</i>, id est, permanentiam siue breuem, ut in putridis, siue momentaneam, ut in ephemeris.</p>
Subjectum aliud	Morbi duplex	<p>Secundarium est totum corpus, quod calorem à corde transfusum accipit, uel uectura spiritus per arterias, ut in ephemeris: uel humoris per uenas, ut in putridis, uel contagione, ut in heclicis.</p>
	Causarum	<p>Focus, in quo putredo tanquam ignis primum accenditur. Fomes, id quod putredini materiam suggerit, uel ubi materia putredinis generatur. Interdum uerò eadem particula est & focus & fomes putredinis. Se, unde febris primaria, eaq; uel ephemera, uel putrida, uel heclica. Et rursus uel Epidemica, uel non Epidemica.</p>
Febris aliud	Primarij. Cor afficitur uel per morbi	<p>Consensum, unde febris secundaria, eaq; similiter uel ephemera, uel putrida, uel heclica. Et rursus uel catarrhalis, uel syncopalis, uel lypiria, uel epialos, uel latica, uel alba, uel lenta, uel anonyms. Nulla uerò epidemica. Catarrhalis, à destillatione capitis. Syncopalis à magna crudorum succorum copia & bile uenosa in præcordijs, præsertim ore uentriculi. Lypiria à pituita nitrea, uel bile putri in uentriculo uel epate: epialos, à pituita acida ex parte putri: latica à pituita dulci putrescente in uenis paruis: alba à suppressis menstruis: lenta ab ulceratione & suppuracione uiscerum: anonyms ab angustia ualorum.</p>
	Secundarij.	<p>Calor præter naturam totum corpus occupat, uel assiduus, unde febris continua: uel non assiduus, unde febris intermittens. Quæ tamen diuisio etiam ex foco & fomitis quantitate deduci potest, ut mox sequetur.</p>
	Foci qui est spatij uel	<p>Cordis, siue in uenis cordi uicinis, siue alijs sed maioribus à corde remotis, siue extra uenas sed cordi uicinas, unde febris continua. Extra cor, siue in uenis minoribus à corde remotis, siue extra uenas similiter à corde remotas: unde febris intermittens.</p>
	Quantitas	<p>Pauca est & tenuis, siue extra, siue intra uenas fuerit: unde febris intermittens, eò quod quod facile dissipetur. Multa & crassa, non solum intra, sed & extra uenas, unde febris continua, eò quod argè dissipetur, ut inflammato cerebro.</p>
	Fomitis materiaz cuius peccatum	<p>Vapor calidus sanguinis, qui phlogosin facit, unde synochus no putris. Sanguis totus putrescens, unde synochus putris. Phlegma putrescens, unde quotidiana siue continua, siue intermittens. Humor Flaua bilis putrescens, unde causos & tertiana siue continua, siue intermittens. Atra bilis putrescens, unde quartana siue continua, siue intermittens.</p>
Diuisio ratione	Qualitas	<p>Impeditur obstructione uenarum in præcordijs, unde febris alba. Ulceratione uisceris, unde febris lenta phthisicorum, nephriticorum, pleuriticorum. Deficit uel Angustia ualorum, unde febris anonyms. Quæ diuisio tum ex fomite, tum ex consensu deduci potest.</p>
	Foci & fomitis simularum uterq; uel	<p>Exquista, cum in una parte unus humor putrescit, uel etiam plures, sed unius signa manifestissima, alterius obscurissima apparent. Notha, in qua duo humores in uno loco miscetur uel eodem, sed uel æqualiter uel inæqualiter. Si æqualiter est confusa simplex Si inæqualiter est confusa composita, eaq; tertiana notha, quotidiana notha, quartana notha. Nam v. g. bilis in tertiana notha superat, phlegma superatur. Homogenea, cum intermittens miscetur intermittenti eisdem specie, ut quotidiana, tertiana, quartana duplex aut etiam triplex. Heterogenea: Intermittenti diuersa specie, ut tertiana & quotidiana, aut cum intermittens quartana etiam cum alterutra. Continua, ut tertiana intermittens, cum pituitosis continuis & contra. Vtraq; hemitritæus appellatur.</p>

CHOI

TABV



TABVLA DESIGNIS PARTIS AFFECTÆ & certæ speciei februm.

Signa februm alia	Partis affectæ, ut cordis uel	Non simpliciter (sed uel)	Per se in	<p>Simpliciter. Calidus aër, pulsus celer & diuersus, caliditas pectoris præternaturam, nocent calida.</p> <p>Genere. Febris uehemens est, non succedit alteri affectui, non intermittit.</p> <p>Specie. Epidemicæ, eusq; uel ueræ pestilentis tum diariæ, tum putridæ, tum hecticæ, cuius signum commune fluxus alui : uel non ueræ pestilentis, ut catarrhi epidemici, luis Hungaricæ, febris uariolaris, quarum signum desillatio, maculæ, pustulæ & pruritus narium.</p> <p>Non epidemicæ, eadem, quæ continuæ.</p>
			Per conseruatum in	<p>Genere. Febris contra se habet. Mitior est, succedit alteri affectui, intermittens, nisi focus sit uicinus cordi, aut humor copiosus. Epialos igitur sæpius remittit, ceteræ ferè continuæ sunt.</p> <p>Specie. Ex quam parte consentiente labore, id ex proprijs cuiusq; partis affectæ signis deprehendi oportet, ut v. g. in syncopali per se affectum esse uentriculum indicat dolor illius, qui præcessit, adest uomitio, singultus & alia.</p>
	Subiecti primarij. Sic signa alia	Foci uel fomitis alia	Continuarum in	<p>Ephemerarum, quarum origo ab externa causa, uel bubone, pulsus semper æqualis, calor suavis, inspiratio expiratione maior, urina cocta semper.</p> <p>Putridarum, quarum origo sine causa externa recenti, pulsus inæqualis (cum in principio sit paruus & rarus, in statu maximus & celerrimus in uno ictu) respiratio, qua fuligo expurgatur, inspiratione, qua cor refrigeratur, major calor acris pungens & fumosus, inuadens cum frigore, rigore, horrore : nigredo linguæ : urina parum uel ualde cruda.</p> <p>Hecticarum, quarum origo ab externa causa, uel præcedente ephemera siue etiam putrida febre : pulsus semper æqualis, isque paruus & uelox, calor acris sed squalidus, æqualiter omnes partes occupans, qui à cibo augetur.</p>
				Intermittentium in
	Certæ speciei ratione	Foci uel fomitis alia	Intermittentium in	<p>Genere, humoris paucitas & tenuitas, calor intra 24. horas desinens, & cum rigore aut frigore incipiens, sudore manifesto finiens, uinum prodest in declinatione.</p> <p>Specie. Quotidianæ, inuasio cum frigore extremorum.</p> <p>Tertianæ, inuasio cum rigore externo pungente & astu interno.</p> <p>Quartanæ, inuasio cum horrore externo & frigore interno.</p>
				Unius alia
	simul	Foci & fomitis	Plurium ut implicatarum	<p>Homoginearum. Diuersis horis inuadunt, eadem uero eorum natura, eadem causa, sed in diuersis collecta locis, idem calor, eadem symptomata.</p> <p>Genere. Accedunt & diuersis & eadem hora. Si diuersis, erit diuersus calor, alijs ualde acris, alijs parum acris, & sic alia symptomata. Sic eadem hora, erit calor mixtus & quasi compositus.</p>
				Heteroginearum in

V. CHOLE-



V. CHOLERAE subiectum duplex est: primarium & secundarium.

Primarium est uentriculus, isq; ut plurimum totus, supra & infra: interdum tamen magis illius pars superior, uel pars inferior. Materia enim morbifica morsu uel pondere contristans uentriculum per utrumq; os, stomachum & pyloron uno & eodem tempore summa cum perturbatione, celeritate ac frequentia expellitur.

Secundarium duplex est, gula & intestina. Os enim uentriculi supernum uomitu per gulam: infernum deiectione per intestina noxium humorem eijcit. Non male igitur, si dextrè interpretemur, Alex. Trallianus χολάδας dixit esse partem affectam in cholera: ut nec Cornel. Celsus, qui hoc uitium stomachi atq; intestinorum commune uideri scripsit. Errauit autem ille in Etymologia nominis, ut supra diximus. Sunt uerò & alia partes affecta minus principaliter, ut cor, nerui, totum corpus. Uentriculus enim pars corporis praestans est, & praecipuis membris, quibus corpus nostrum regitur, uehementer congruit.

Afficitur autem uentriculus uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur, cum intemperie calidior laborat, estq; tam igneus ut alimenta licet bona in acrem & nidorulentam qualitatem conuertat. Id quod fit potissimum in sicca cholera: in humida non item. Siccam autem uocant, quae fit ex flatuoso spiritu, qui siue excernatur siue retineatur partes neruosas lancinat ac mordicat. Humidam, quae gignitur ab humoribus aliunde in uentriculum retro fluentibus.

Per consensum autem uentriculus afficitur, cum uitij expers est, & aliunde coafficitur: idq; fit uel positiuè, uel priuatiuè.

Positiuè, cum transmissam ad se materiã recipit, uel à toto corpore, uel à certa parte. Interdum enim in uniuerso corpore succus prauus, isq; imprimis acris & biliosus plusq; oportet redundat, qui tandem ob causas aliquas externas uel internas ad fluendũ irritatus orificia uasorum, quae ad uentrem pertinent, mordicans aperit, & ad uentriculũ tanq; sentinam transfusus cholera excitat. Estq; hac cholera proprie, q̄ Aret. eius χαλινοροσον Φορήν definit esse τ̄ ὕλης τ̄ ἐν τῷ πάντι ἐς τὸν σῶμα χον, καὶ τὴν καλὴν καὶ τὴν ἐν τῷ σῶματι, id est,

reciprocã materia delationẽ à toto ad gulam, uentrẽ & intestina. Neq; enim siue alimenta praua, siue humores maligni qui continentur in stomacho hunc affectũ uerè excitant, nisi alij humores aliunde magno impetu irrunt, & stomachum ad expulsionem irritent. Nec minima hac ratio est, cur cholera sit morbus distinctus à simplici tũ uomitu, tũ fluxu alui.

Interdũ uerò prauus succus, isq; imprimis bilis non in toto corpore: sed in certa parte redũdat, ut in uesicula fellis, in epate, in mesenterio, in liene, in capite. In his enim partibus is humor cumulari solet, cũq; supra modũ auctus natura grauis & infestus esse ceperit, huc illuc impellitur ac diffluit, tandẽq; in uentriculum excussus tam aduersatur, ut eo percussus agrotãtes saepe toxicũ se bibisse opinentur. Nulla uerò critica est cholera, quod quidam putant, cũ bilis in hoc affectu non expurgetur uel per unam tantum partem, uel probè concocta, uel cum facili agrotantis tolerantia: quae triplex condicio in omni bona crisi requiritur.

Priuatiua uerò coaffectio hic in intestinis tantum locum habet, quae non recipiunt, uel per sedem non deijciunt id, ad quod recipiendũ extrudendumq; à natura comparata sunt, ac humores quidem superfluos in cholera humida, qui per os uiam non naturalem exeunt: uapores uerò acres in cholera arida, qui uentrem inflant, strepitum & dolorem tum laterum tum lumborum excitant, nec aluum soluunt sed astringunt.

Sed & eadem intestina non recipiunt, quae affluere debuit, bilem, occluso uesicula fellis canali, per quem illa ab hoc ut suo domicilio in duodenũ transfundi solet. Ex quo apparet cholera esse ictero admodum similem. Vt enim biliosum excrementum à jecore & uesicula fellis in uniuersum corpus regurgitat in arcuato: sic idẽ cũ alijs prauis succis confertim magnoq; impetu retrorsum ab uniuerso corpore in uentrẽ fluit in cholera.

SIGNA simpliciter affectarum partium in cholera sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causae sunt prauis succi, qui uentriculũ & intestina uellicant, orti siue ab alimentis, siue à medicamentis bilẽ gignentibus aut humores corrumpentibus, ut lacte, fungo, ueneno potu, putrido uel uini uel aqua,

uel



uel frigida in ieiunio subsequente cibo crasso & alia, de quibus alibi. Memorabile uero illud est, quod recenset Massaria de imperito quodam Medico, qui integram agarici unciam assumsit, unde in hunc affectum, à quo agrè liberari potuit, incidit. Idem uero fit assumpto antimonio, colocynthide, ueratro.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est uaria diuersarum partium. Ventriculi quidem tam multiplex, ut nullus sit ferè morbus stomachi qui xodēpōvras non affligat, ut dolor, nausea, inappetentia, sitis, uomitus, angor, morsus, singultus. Gula, tensio, intestinorum tormina, cordis syncope & pulsus uermicularis, formicularis, deficiens. Nervi, contractio manuum & pedū. Totius corporis, rigor & extremorum dolor frigidus.

Mutata qualitas est febris interdum, cū nimirum larga qua sit per utrumq; orificium euacuatio uitio expurgando satis esse non potest, sed pars materia in uenis putrescit.

Mutatum excrementum est, maxima biliosi excrementi corruptorumq; & interdū putridorum succorum copia per os atq; aliū excretio, qua uisu deprehenditur. Sic & uapor acris, quem agrotans exire percipit.

Utraq; simul sunt, quod hic morbus in populum grassatur & agrotans eodem laborare consuevit. Sunt enim quidam quibus certo quodam tempore prauis succi ad uentriculum magno cum impetu feruntur, unde cholera oritur, qua excitata deinceps integra sanitate intermedio tēpore fruuntur. Quod si uentriculi pars superior magis affecta sit, eam partem dolor magis affliget: si pars inferior, eius symptomata grauiora erunt.

SIGNA uentriculi affecti per se sunt magnitudo, numerus, tempus, iuuantia. Cholera enim uehemens est, non succedit alteri affectui, non intermittit, iuuant qua uentriculo admoventur praesidia.

SIGNA uentriculi per consensum affecti sunt paruitas, numerus, tempus, iuuantia. Cholera enim mitior est, succedit alteri affectui, parum aut nihil iuuant, qua uentriculo: multum, qua alijs partibus per se affectis admoventur praesidia. Quenam autem illarum sit, id ex signis proprijs deprehendi potest.

VI. ILEI subjectum Aretaeo, ut & Aetio & Marcello & Celso, & interdum Galeno, in genere omne intestinum est, idq; tum tenuius tum crassius. Nunc ilei nomen angustius est, nec tam latè patens, inuento nouo colica nomine, ut supra in nominibus morborum diximus. Cum itaq; qui bene distinguit, bene doceat, nobis quoq; eam differentiam, praesertim cum usu multorum seculorum jam confirmata sit, retinere & cuiusq; partem affectam seorsim explicare commodius uidetur.

ILEI igitur πέντον δευτέρων principale est intestinum tenue, ileum uocari solitum: colica uero intestinum crassius, quod colon uocant. Rursus afficitur dolore intestinum siue tenue, siue crassius, uel totum, uel pars tantum.

Partes affecta minus principales sunt consentientes intestino utriq;, ut tenui quidem, uentriculus, epas, septū transversum: crasso renes, lūbi, uesica, podex & musculi illius.

Afficitur autem intestinum utrumq;, uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur, cum subsidet ab inflammatione tumore iue proprio, aut ob intemperiem siccam, aut plagam, aut intestinalem herniam, de qua Aretaeus. Obstruitur siue flatu, siue copia cruda & crassa pituita: constipatur copia faecum, lapide interjecto, grumis, lumbricis.

Per consensum laeditur, cum uitij expers aliunde coafficitur, idq; tum positiuè, tum priuatiuè.

Positiuè cum meatus intercluditur à compressione. Priuatiuè uix coafficitur nisi quis putet posse aboleri meatum à coalitu, ut pulmonum pleurae agglutinatorum motus deprauari in asthma solet, hic locū ob intestinorum amplitudinem non habet. Omnis enim tum ileos, tum colica angustia est, cuius causa residet uel in intestinis, uel extra intestina. Si in intestinis, est uel subsidentia, uel obstructio, uel constipatio. Si extra intestina est compressio uel coalitus. Comprimatur uero tenue, uel crassum intestinum tumore uicinarum uiscerum, ut mesarai, epatis, renum uteri, uesicae felleae, uesicae urinariae, quam magna urina copia distendit. Id uero uel nunquam uel raro fieri inde apparet, quod praegnantibus utero etiam plurimum postremis mensibus distento, dolore

tamen



tamen nullo siue iliaco siue colico infestentur multo minus uel ille, uel alij ob tumorem aliorum uiscerum. Ventriculo autem uel epate in tumorem eleuatis intestina male affici constat, non tam ratione tumoris, quam humoris siue calidi siue frigidi redundantis, quo in intestina transfuso, ea dolorem concipiunt.

SIGNA intestini simpliciter affecti sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecumq, angustia intestinorum quaecumq, speciem faciunt, ut subsidentiam, constipationem, obstructionem, compressionem, de quibus alibi. Est autem ilium inflammationi maxime obnoxium ob uasorum sugentium copiam. Quae uero causae praecesserint ex relatione aegrotorum & astutium cognosci possunt.

Effectus sunt, actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est sensus inuolutionis seu impletionis, sed & retractionis, qua omnia inferiora sursum trahuntur: & acutissimus dolor modo supra umbilici regionem, modo infra. Intestinum enim neruus à sexto paricerebri recipit.

Mutata qualitas est, quod sonant intestina, si fiat morbus à stercorum retentione, flatu uoluitur & uertitur in intestino, tota hypochondria ferè eleuari uidentur & in tumorem efferrit, plerumq, febris sequitur, praesertim ubi ab inflammatione ileos oritur.

Mutatum excrementum est urina suppressio, alui constipatio, stercoris per os excretio, uomitus frequentissimus tam alimentorum quam humorum, praecipue bilis modo flauae, modo porraceae, interdum intestini putrescentis rejectio.

Neg, tamen interdum dejectio prorsus abolita est, ut nec flatuum emissio. Nam, ut inquit Aretaeus, nihil facile (non autè omnino) exit infra uel supra. Sed & interdum emittitur id, quod forte ante hunc dolorem fuit in colo. Dejectiones uero, quae prodeunt, crude sunt & tenues, praesertim si morbus sit ex inflammatione: sic uomitus non semper adest, nisi mors imminet. Nec stercus proprie est quod in ileo rejicitur, cum quod excernitur stercoris formam non habeat, antequam ad intestinum perueniat.

Utraq, simul sunt morbi similes commu-

niter grassantes. Est enim ileos morbus contagiosus, ut uult Auicenna. Iuuant quae astrictionem siue obstructionem intestinorum depellunt: nocent, quae eadem augent.

Num uero totum alterutrumque intestini uolumen sit affectum, an pars tantum, id ex doloris situ cognosci oportet. Totum enim ilium affectum erit, si partes illius omnes doleant, dextra & sinistra, & quae circa medium uentrem & umbilicum continetur. Pars tantum, eaq, uel prima, uel media, uel ultima, si quaecumq, ex illis dolor urgeat.

Ac prima quidem si doleat circa jecur. Media, si circa ilium sinistrum. Ultima, si circa ilium dextrum, iuxta humiliorem sedem dextri renis. Sic totum colon affectum erit, si totum doleat circa utrumq, ilium & infra umbilicum, & supra uersus fundum uentriculi. Pars tantum, eaq, uel prima, uel media, uel ultima, si cuiusq, ex illis grauitas maior inhaereat. Ac prima quidem, si ilio dextro: media, si ileo sinistro: ultima, si infra umbilicum. Sic enim situm partium affectarum in ilio & colica Capouaccius descripsit, qui & ipse quamuis paulo aliter ex emendata nostri temporis intestinorum descriptione in dysenteria supra à nobis proposita intelligi potest, ad quam lectorem remittimus. Neg, enim colon tam infra quam supra est, ut ilium, quod olim creditum fuit.

SIGNA intestini per se & per consensum in ileo & colica affecti sunt, magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Si enim uoluitus, uel colica sit uehemens, si alteri affectui non superueniat, si non intermittat, si iuuent ilio & colo applicata, has partes per se affici argumentum erit. Sin contra, per consensum. Ex quarum autem partium consensu coafficiatur, id ex proprijs illarum, ut epatis, mesarai, renum, uesicae utriusq, affecta signis cognosci oportet.

Sic signa partium consentientium sunt uaria illarum symptomata. Ventriculum enim affici uomitus & fetor: (quod in eo uapores putridi cumulentur, qui cum aere expirato miscentur) distendi septum transversum, spiritus difficilis: uesicam urinae difficultas: musculos podicis illius clausura offendi indicat, & sic de alijs.

SIGNA



SIGNA distinctiua iliaci & colici affectus sunt haec.

Causa ferè eadem, sic tamen ut externe magis ileon, interna magis colicam inducere soleant.

Effectus similiter in genere iidem, unde & unum nomen uterq, affectus olim habuit: ac ileos quidem & chordapsus appellatus à retractione intestinorum, qua utriq, conuenit.

Est uerò quadam actio laesa & aliqua qualitas, ut & excretio, qua unum ab altero differre facit.

Actio laesa: Iliacus dolor Aretaeo tenuis & acutus est, id est, pungitiuus: colicus humidus & gravis. Alijs non sine limitatione ille interdum uehementior, interdum remissior. Ac uehementior quidè iliacus, remissior colicus, si prodeat ab inflammatione, aut aridis fecibus: cum gracilia intestina ob raritatem tunica sensum q̄ crassa quorum substantia densior exquisitiorem habeant, & materiam morbificam diutius detineant. Contrà uehementior colicus, remissior iliacus, si prodeat à pituita & flatu, quam materiam crassa intestina longiori mora intra se conclusam sustinent, praesertim cum ob tunicae crassitiem eadem diffuari nequeat.

Quod ad situm doloris in utroq, affectu diuersum attinet, de eo supra diximus. In genere uerò dolor magis fixus est & magis in circuitu umbilici in ileo: contra magis in lateribus & paulò infra uentriculum in colica. Praeterea ileos acutus morbus: colica diuturnus est.

Mutata qualitas. Colica in ileum: ileus contra in colicam uix permutatur. Sed & in ileo magis ex parte febris comitatur: in colica non item.

Mutatam excrementum est. In ileo nihil mittitur infra, sed tantum supra: & primum quidem pituitosi aliquid, deinde biliosum: quibusdam stercus morte iam imminente, quamuis proprie stercus non sit, ut supra diximus: in colica uariae feces, ut mucilagines uel stercora per sedem exeunt, nec tamen sine ope clysterum & aliorum medicamentorum. Urina utrobique rubra est. Sudor uerò in ileo magis frigidus quam in colica, propter maiorem membrorum nobilium sympathiam.

Utraq, simul sunt iuuantia. Dolor iliacus superatur usu potionum per os assumptorum: non tollitur infusione clysterum. Dolor colicus contra uincitur inditus per anum: non iuuatur per os acceptis.

SIGNA distinctiua iliaci siue colici & dysenterici nec non nephritici & uterini affectus sunt haec.

DYSENTERIAE et colica discrimen à solo excremento mutato satis euidens est. In dysenteria enim aluus semper aperta est: in colica ferè semper astricta.

NEPHRITICI uerò & colici siue etiam iliaci doloris tanta cognatio est, ut uel ipsum Galenum aliquando discrimen fefellerit, ut ipse testatur 2. de loc. aff. 5. & alibi.

SIGNA igitur utriusq, affectus, alia sunt communia, alia propria.

Communia sunt dolor abdominis & dorsif, tremor crurum, & impotentia flectendi corpus, nausea item, uomitus, alui stipatio.

SIGNA propria sunt causa, effectus, & utraque simul.

Causa colica sunt retentio fecum, & usus rerum frigidarum & flatuosarum, ut fructuum: nephritidis non item.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est stupor renum, dorsif, crurum in nephritide, in colica non item. In illa quoq, uentriculus minus: in hac magis afficitur.

Affectus intestinif dolor est perforanti similis, & quasi infixi pali, certòq, loco interdum insistit, interdum circuit, ut plurimum in inguen sinistrum, & utrunq, renem sursum reuulsus, ut sunt flexus coli intestinif, quod relicto recto intestino in sinistrum inguen reuertitur, & ad sinistrum renem ascendit, ubi angustius est, unde in hac parte dolor colicus grauius affligit, & renalem representat. Laesis renibus dolor magis fixus est, eandemq, partem assidue ac uehementer infestat: porrigitur uerò in uesicam & mouetur à partibus supernis ad infernas secundum ureterum progressum, dum per hac uasa lapis in uesicam prolabitur.

Dolor colicus magis inclinatur ad anteriora & ad pectus: nephriticus semper ad posteriores partes uergit.

Dolor intestinorum majus spatium: renif minus occupat. Dolor itaq, colicus est maior secundum



secundum extensionem, quia plures partes in se stat: renalis maior secundum intensiorem, quod instat acūs pertundit & torquet grauissimè.

Dolor colicus interdum est in loco renibus altiore, magisq̄ uentriculo icino, uinterdum infra renes: renalis semper in eadem parte, ubi renes siti sunt.

Dolor colicus ferè semper subito inuadit: renalis paulatim incipit, & semper ad finē usq̄ augetur. Breui namq̄ tempore intestiniū angustatur: lapis non citò creatur.

Mutata qualitas est grauior & magis asiduus uomitus, nausea, alui stipatio in dolore colico: contra in renali dolore uehementior sepiusq̄ & citius affligens dorso & crurum tremor, & flectendi corporis impotentia. Intestina namq̄ magis uentriculo: renes magis dorso & cruribus consentiunt.

Mutatum excrementum est uomitus pituitosorum & corruptorum: & retentio excrementorum in colica. In nephritide uomitus rarior & deiectione frequentior. In colico, stercora, quae deijciuntur sunt arida & canina: in nephritide multò magis mollia.

In renali dolore semper affectus à dorso & cum urina difficultate incipit: in colica non item.

Nephriticis à principio urina supprimitur, uel mingitur primum filamentis plena, aquosa & tenuis, deinde crassa & arenosa, interdum cruenta & cum calculo.

Colicis haec praedicta non eueniunt.

Utraq̄ simul sunt iuuantia. Colicus dolor inanitionis tempore leuior est, grauior repleto cibus homine. Contra renalis inanitionis tempore ingrauescit, mitescit cibus asumptis. Repletus enim uentriculus colon comprimit: uacuuus non item. Contra cibus asumptus renes non affligit, nisi descendat. Portio namq̄ tenuior & aquosior dum petit renes, uim anodynā obtinet.

Dolor colicus laxantibus, flatu discutientibus atq̄ irritantibus clysteribus in alui iniectione maximè lenitur: renalis etiam sed minus. Nephriticus ab initio anodynis & relaxantibus plurimum iuuatur: deinde uerò diureticis et calculos comminuentibus, renesq̄ detergentibus: colicus non item, nisi eadem unā flatu discutiant. Hic conuiescit per uomitum uel deiectionem alui: ille non item.

SIGNA distinctiua colici & uterini doloris sumta à causis, effectis & utriusq̄ simul sunt haec. Uterinum dolorem praecedit uel partus, uel mensium suppressio, uel difficultas eo tempore, quo menses fluxuri sunt.

In dolore uteri mulieres suffocari uidentur ex uaporibus eleuatis: minimè autem in dolore colico.

Dolor uteri ad inferiora, pubem & coxas magis pertinet, unde coxendicus uidetur: ad superiora magis tendit colicus.

Dolor uteri ex difficultate mensium magis torquet, cum menstruum tempus appetit, isq̄ potius circa renes quàm in penitioribus partibus. Circa renes enim uena & uasa spermatica ad uterum tendunt, quibus repletus sit dissentio.

Dolor uteri, si leniatur aluius, non cessat: contra colicus lenitur eductis fecibus.

VII. Acutorum epatis affectuum, id est, haemorrhagia & phlegmones commune subiectum epar est. Oedema enim nunquam aut raro generatur in epate uel thoracis partibus.

Afficitur autem in haemorrhagia tantum per se & primario, cum ex eo sanguis sincerus effluat, siue extra corpus siue in intestina, uel propter uulnus, uel plagam, uel multitudine. Effluit enim ex eodem etiam in alijs affectibus, ut in epatico fluxu, in dysenteria, in haemoptysi, in cachexia & hydrope, sed diuersis modis. Fluens in epatico fluxu & dysenteria per intestina tantum, sed illic aquosus & lotura carniū similis, hic crassus & seculentus. In haemoptysi per os. In cachexia & hydrope aquosus & imperfectus per totum corpus, eo quod uena mesenterica occlusa sunt.

SIGNA haemorrhagia ex descriptione manifesta sunt: nota fluxus epatici, dysenteriae, haemoptyseos & cachexia ex suis locis petantur.

In phlegmone autem epatis afficitur uel caro, uel membrana, uel uena epatis. Si carnosissima substantia, ea uel tota leditur, uel pars tantum, ut conuexa uel concava: quamuis, teste Galeno, fieri nequit, si altera ex ijs partibus afficiatur, quin reliqua consentiat, ob uenarum communionem uel propter partium continuitatem. Et haec sunt partes affecta principaliter.

Mm Partes



Partes minus principales sunt, quacumque epati consentiunt, ut musculi abdominis, pleura, cor, uenter, septum transversum, caput & imprimis uena mesaraica. Cava enim jecoris parte laborante inflammatione mox necesse est has uenas inflammari, eò quod ex uena porta, que in sima epatis parte continetur, originem ducunt.

Afficitur autem epar ejusque partes tantum per se & non per consensum, dum jam inflammatur. Ratione uero causa, aut per se aut per consensum.

Per se, cum aut sanguine multo abundat, aut morbofo calore et dolore torquetur: unde sanguinem à partibus molestatis aut copia ejus aut qualitate aut utroque simul ad re trahit.

Per consensum, cum uisus expers aliunde coafficitur, idque positiuè. Priuatiuè non item fieri potest.

Positiuè quidem, cum aliquid aliunde il-lapsum excipit, ut à uesicula fellis si quando obstruitur, & bilem expurgare non potest, unde ad epar regurgitans inflammationem excitat: similiter à liene qui succum melancholicum non attrahit: aut à uentriculo qui chylum epati non rectè preparat, aut à matrice, ex qua superfluitas menstruo tempore fluere solita non emanat: aut ab hemorrhoidibus suppressis alijs uel membris, ut intestinis, renibus, spiritalibus obstructis: unde sanguis ad epar refluens inquinatur & calidior efficitur.

SIGNA jecoris simpliciter affecti sunt causa, effectus & utraque simul.

CAUSAE sunt, quacumque sanguinem uel copiosorem, uel calidiorum quam pars postulat, cumulant, ut multa aeris caliditas, cibi calidi & crassi, balneum post crapulam, cucurbitula pleno corpori adhibita, & alia de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est dolor grauis in dextro praecordio circa costas menses, isque major agro super sinistram latum decumbente, minor eodem super dextrum reuoluto. Major item cum agrotus magnam trahit spirationem: minor cum non trahit.

Decubitus uero in omnem partem molestus est ubi abscessus fieri incipit. Quod si prius factum est, dolor minuitur.

Mutata qualitas est color corporis citrinus instar auriginis, Aretaeo plumbeus, lin-

gua uero color initio magis ruber, deinde niger: febris asidua, eaque inaequalis qua plerumque ad noctem exacerbatur, item rigor cum suppurari incipit.

Mutatum excrementum est aluus robusto uiscere in principio inflammationis sicca & exusta: in processu factio infirma, liquida & chylosa, quando non trahit à uentriculo, aut fetida, nigra, corrupta, porracea: parum urina meitur, atque cum grauidior est tumor nihil. Quae uero mingitur, crassa est, rubicunda, turbida.

Utraque simul sunt iuuantia. Iuuat inedia, uel saltem uictus tenuis, sanguinis item missio saepius repetita: nocent contra, quae sanguinis copiam augent, uel ad epar adducunt.

SIGNA partium epatis affectarum distinctiua sunt haec.

Si carnosae pars jecoris inflammetur, dolor urget obtusus & grauis, cuiusdam quasi ponderis incumbentis, pulsus est uelox & mollis, eò quod caro mollis & laxa est.

Si membrana epar circundans laboret, uel uena ejusdem, tunc dolor affligit acutus: & pulsus durus, ferrinus, tardus est, eò quod membrana pars dura ac densa est.

Si inflammatio gibbam siue connexam partem epatis occupat, major ex hac parte dolor est, qui spirando percipitur, magis ad dextrum ascendit jugulum, ut interdum id detrahi uideatur, eò quod uicina septo transuerso & toti thoraci est. Sed & molestus in latum dextrum decubitus & tumor euidentis est, qui injecta manu & interdum uisu deprehenditur, nisi eger fuerit ualde carnosus, aut laborare hydrope incipiat, aut parua aut dura sit inflammatio.

Si affectus simam seu concauam partem detineat, nullus tumor obseruatur, praeter quamdam tensionem. Quod si quis hypochondrium comprimat, agrotans dolorem obscurum sed internum percipit, eumque magis urgentem, si in sinistram partem decumbat: apparent magis symptomata, quae consensu uentriculi fiunt, ut nausea, uomitus, bilis, sitis, singultus.

SIGNA affectarum partium consentientium sunt illarum symptomata, ut capitis, mens tarda & hebes: interdum delirium: cordis, syncope: uentriculi, nausea: septi transuersi, depressio: pleura, dolor. Epar enim ob pondus



podus sedit diaphragma, unde membrana succingens costas diuellitur.

SIGNA distinctiua phlegmones epatis et musculorum abdominis & pleuritidis, & colici doloris sunt haec. Interdum enim inflammatio gibbae partis epatis pleuritide: phlegmone uero cauae partis colicum dolorem mentitur.

Musculos epati incumbentes inflammari ostendit tumor externus, qui potest tangi & uideri, isq; oblongus in angustum uerges instar musculorum umbilicum comprehendens. Contra in phlegmone epatis tumor rotundus est & figurae epatis representat, estq; minor, nullam uel non euidentem rubedinem exhibens.

Pleuram inflammari & per se affici ostendit pulsus durus & serenus, tussis cum sputo, nisi pleuritis sit lethalis, dolor pungens & grotus si maxime spiret (ut autem spiret laborantem admonere oportet) se premi & superiores partes suspendi sentiet. Contra inflammata gibbae parte epatis, pulsus minus durus est propter uarietatem partium, quae inflammantur, tussis exigua & semper arida, dolor grauis, deiectiones interdum similes loturae carnis nuper mactatae & durities quaedam in dextro hypochondrio: sed & si egrotans spiritum trahit, ipsa partibus inferioribus ad superiora, aliquid surgere uidetur. Deniq; inflammato epate totum abdomine grauelescit: inflammatus musculus & pleura non item. Dolor colicus febre caret ut plurimum, aluum habet astrictam, clystere carminante demulcetur. Phlegmone cauae partis epatis comitem febrem habet, singultu, inappetitiam, uomitum sine etibus, diarrhaam eaque lethalem, clystere carminante intenditur.

SIGNA epatis per idemmodum affecti eadem sunt quae affecti simpliciter. Per idemmodum uero inflammatione affecti, nota sunt illa quae monstrant proprias agitudines aliarum partium jecori congruentium, ut uesculae fellis, lienis, uentriculi, renum, intestinorum, uteri, haemorrhoidum, de quibus alibi. **VIII. ACUTORVM** uena caua affectuum locus affectus uena caua est, repleta distensa, ac quasi uaricosa facta a multo eoque calidior sanguine, ut in causo, in uariolis, in phlegmone epatis, pulmonum & aliorum uiscerum. Solet uero eadem etiam nodoso tumore instar arboris distorqueri, ex humo-

re crasso & melancholico in uarice crurum, femorum, inguinum, temporum. Qui affectus cum acutus non sit per se & proprie, huc non pertinet: nisi ratione haemorrhagiae, cum rupta uena sanguinis & spiritus tanta copia effluit, ut hominem de uita periclitari faciat.

Afficitur autem uena caua nunquam per se tantum, sed per se & per consensum simul, cum affici solet quatenus locus sanguinis est uniuersi corporis.

Per se afficitur, quatenus laxitate & imbecillitate laborat.

Per consensum, quatenus humorem magna copia aliunde affluentem recipit, certo loco remorantem detinet. Consensus itaque positiuus tantum hic locum habet.

SIGNA sunt causa, effectus, & utraque simul, ut in causo, febre uariolarum & phlegmone epatis, aliorumq; uiscerum, de quibus supra. Signa autem uaricum alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta sunt amplitudo uenarum, crassities, tumor, quae oculis obseruantur.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt quaecumque copiosiores, eumque imprimis crassiores & flatulentum sanguinem generant & ad uenas detrahunt, ut uictus ratio frigida & sicca, temperamentum melancholicum, uehemens corporis concussio, iter laboriosum, oneris gestatio, mensium suppressio, & similia.

Effectus est impotentia generandi, dolor partis uaricose, qui incessu & compressione exacerbatur: color item subiecta cutis liuidus aut subater.

Utraque simul sunt iuuantia. Pro sunt abstinentia, nocet satietas, liberat uel melancholia.

IX. ACUTORVM AFFECTVVM, quibus renes infestantur, ut obstructionis & inflammationis subjectum renes sunt, non tamen sine limitatione.

Afficitur enim in obstructione uel caro, uel meatus renum, per quem urina percolatur. In phlegmone laeditur uel exterior reni tunica, uel uena & arteria ex quibus constant & quae per ipsos sparguntur, uel carnis substantia, uel membraneum illud corpus, quod interiori uentri praetensum est.

Rursus in utroque affectu laeditur uel uentus reni tantum, uel uterq; simul, dexter & sinister.



Partes minus principales sunt, quaecumque renibus consentiunt, ut uena, arteria, cerebrum, epa, uentriculus, septum transversum, uesica, ureteres, uterus, intestina, crura & femora.

Afficitur autem ren uel p se, uel p cōsensum.

Per se afficitur in obstructione, cum illi morbus causaue morbi insidet, ut intemperies, humor uiscidus, flatus, inflammatio, arena, calculus, grumus sanguinis, pus, lumbricus. Tot enim sunt ex quibus obstrui potest. Rarior tamen inflammatio, quod renū substantia firma, densa & dura sit. Qua si adfit, non tātum coarctat, sed & materiam purulentam gignit, unde fit obstructio.

Per consensum afficitur positiue uel priuatiue.

Positiue cum à cerebro destillationi obnoxio humorem noxium: à pectore purulentam materiam: ab alijs partibus, ut epate & liene malè affectis alias superfluitates excipit: sed & serosum excrementum non excernit, ob uesicam obstructam, unde regurgitans renes obstruit.

Priuatiue, cū consuetū serosum excrementū nō recipit, malè affectis ijs partibus unde recipere debuit, unde subsidet & obstruitur.

In inflammatione uero ren afficitur tum nat idiomate, tum nat dōmōmate. Nat idiomate, cum humores sanguinei renem inflammant per collectionem: nat dōmōmate, cum per influxum ex alijs partibus, ut epate, uenis, arterijs, ex quibus ren id quod non debebat accepit.

SIGNA renis obstructionis alia sunt communia, alia propria.

Propria eadem sunt qua causarum, ut humoris uiscidi, inflammationis, arena, calculi, grumi & ceterorum.

Communia sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causa sunt renum intemperies & facultas expultrix debilis. Effectus est grauitas renū & quod humor serosus nō excernitur. Quod si perfecta sit obstructio, urina excretio prorsus intercipitur: cum perfecta non est, diminuitur.

Utraq; simul sunt iuuantia. Prosunt, quae ex obstruēdi & detergēdi uim habent nocent his contraria.

SIGNA propria uiscidi humoris in renibus cōtēsi sunt causa, quae prauos humores gene-

rant, aut ad renes detrudunt, ut usus medicamentorū urinam prolocantiū: effectus, ut urina turbida: utraq; simul, ut quod iuuant cacochymiam euacuantia.

SIGNA flatuū sunt causa quaecumque flatus generant, ut cibi & potus flatuosi: effectus, ut urina spumosa ac bullis referta, quae cum impetu ac pudendorum distentione detruditur: utraq; simul, ut quod iuuant quae flatum discutunt, sine intus dentur, sine exterius admota sint.

SIGNA inflammationis seu ulceris sunt causa, effectus & utrunque simul.

Causa sunt, quaecumque sanguinē copiosum uel generāt, uel extra uenas & arterias extrudunt. In omni enim inflammatione sanguis extra uenas & arterias reperitur, ibique putrescit & tam acris euadit, ut abradat. Est autem sanguis extra uasa uel per diapedesin si tenuior sit: uel per anastomosin, dum idē copia premit uel magno impetu fertur, uel acrimonia uellicat: uel per diaretesin, dum continuū soluitur, à casu, à uulnere, imprimis à calculo, siue contundente ob grauitatem siue exasperante ob inaequalitatem.

Effectus sunt actio lesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio lesa est ingens dolor in carnosā parte ipsorum renum cum loci tensione & grauitate, isq; seuior cū egrotās se quocumque mouet, aut concutitur, aut rectus stare, aut proprijs pedibus incedere conatur. Decubitus supra latus offensum facilius quā supra sanū. Ita enī nulla fit suspensio partis inflāmate. Quod si inflāmatio ad musculos lumborū uergat, sentitur potius grauis sine pulsū, eō quod partes arteriosae ab inflātionis pondere non offenduntur. Sin arteriarum emulgentium fines et uasorum ureterū initia una cū renū interna parte inflāmentur, pulsatio molestā est in ea parte & dolor acutus, non grauis percipitur, imprimis dum ager supinus potius q̄ pronus recumbit.

Mutata qualitas est astidua febris cū horrore inordinato & ardore in parte affecta: praesertim cū inflāmatio ad suppurationē uergit: saepe extrema et potissimū pedes frigent.

Mutatum excrementum est quod alius plerunq; adstricta est, arida uel omnino suppressa, uel si qua ejus portio redditur, aquosa tenuisq; admodum est ab initio, dum sit rubra, crassa & mucosa.

Utraq;



Vtrag, simul sunt iuuantia. Prodest medicis abstinentia, seu uictus tenuis, nocet summa inedia, eò quod acrimoniam humorū auget: sed & nocent medicamenta diuretica, presertim initio inflammationis, quod fluxum humorum ad renes auget, qui hoc tempore prohiberi debet.

SIGNA arena & calculi sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt usus uini nigri, crassi & dulcis: sed & albi, potentis, tenuis & clari in notabili post cibū assumptum quantitate, cibi & cruditates, renum meatus natura angustior, eorundē renū caliditas siue intensa, siue remissa (ab utraq, enim utrunq, oriri potest) humor crassus & uiscidus, unde calculus: humor crassus non autem uiscidus, unde arena.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est dolor renū quandoq, acerbissimus, ac more infixi aculei pungens, quandoq, grauis. Ac pungens quidē in calculo dū in paroxysmo pulsus à carne per membranā in uentrē penetrat: uel in urinarios meatus: grauis extra paroxysmum, cum quietus est, nec mouetur. Renes enim per se obtusi & modici sensus sunt, propter neruos quos exiguos ut jecur habent. Lenitur uerò dolor, cū quis in agram decumbit partē, aut cibo uacuus est: augetur contrā, cum in contrarium latus decumbit, aut cum sumtus cibis est, isq, descendere ad intestina jam incipit.

Mutata qualitas est frequens ructus, febris superueniens, exacerbatio: interdum de mense in mensem, interdum de anno in annum reuertens.

Mutatum excrementum est, quod aluus astringitur eademq, fece uel flatibus premit renem & dolorem auget. Si ea soluitur, cum spiritu subbiliosum excrementum reddit. Urina pro diuersitate temporū uaria est, alia ante paroxysmum, alia in paroxysmo. Ante paroxysmum his qui calculo renum sunt obnoxij, multo tempore urina ferè crassa, subrubra, quæ alias sedimentum habet rubrum, subuiscosum, arenosum, alias turbida manet & si panno percoletur, in eo similem propositi sedimenti sordem deponit. Initio paroxysmi eadem uel supprimitur, uel fit tenuis, clara & sine sedimento, retenta substantia crassiori ob canalium angustiam: dum

postea ob calculorum attritionē & cōmotiōnem, quæ renes et ureteres lacerat, reddatur cruenta & saniosa: eadem uerò referta multis arenulis ut & humore crasso copioso, presertim post grandioris alicujus calculi expulsionem, qui eorum retentionem antea pepererat. Sanguinis igitur excretio sepe renis calculum patefacit, qui neq, dolore, neq, alio significabatur indicio, aded ut ne subesse quidem putaretur.

Vtrag, simul sunt iuuantia, profunt incidētia et extenuantia crassos humores, ipsosq, aded calculos cōminuentia, moderatè tamen adhibita, eaq, moderatè calefacientia, ne crudos succos magis comburant: nocent contrā quæ crassos succos producant, aut quæ facile eosdem detradi prohibent.

SIGNA grumorū sunt, quod antecessit aliqua sanguinis effusio extra uenas, deinde subsecuta grauitas insueta in renibus, & simul urina suppressio, uel saltem longè minor copia, quam & homo antea mingere solebat & copia potionis atq, humidorum esculentorum assumptorum requirit.

Eadem est ratio puris, quod colligitur ex signis alicujus ulceris renum & urinis, in quibus pars aliqua puris excernitur.

SIGNA lumbricorum in renibus redundantia, certa uix ulla haberi possunt, priusq, excreti in conspectum ueniant. Obscuram autem notam prebet assiduus, isq, diuturnus renum dolor cum erosione & uellicatione, cujus historiam raram & memorabilem Vi dius libro 10. recitat.

SIGNA distinctiua renis alterutrius affecti & partium in renibus affectarum sunt hæc. An alter ren, an uterq, affectus sit, è causa & sede doloris cognoscetur. Dexter enim laborabit, si causa calculum pariens ad dextrū latus uergit, & homo de dolore ejusdem lateris magis queritur: sed & cruris uas iuxta è directo renis dextri stupeat: sinister, si contrā. Uterq, si causa & dolor utrunq, renem aequè affligit.

Carnosa pars renū affecta erit, si dolor sit grauis: contrā membranosa, si idē acrior & pungitiuus. Rursus aut in uentre, aut in ipsa renū carne. In uentrē seu cavitatem, si dolor sit grauisissimus in solo transitu per meatus urinarios: aliàs uerò non admodū molestus. In ipsa renū carne si idem affligat non solū inter excundum, sed & ipso curationis tēpore.

M m 3 Cum



Cum in uesicam delabitur, dolor cessat. Et dolor uehemens in ilijs ad ischion extensus calculum uteteris adesse significat.

SIGNA distinctiua arenæ & calculi renum & uesica sunt hæc.

Nephritis propriè renibus, lithiasis uesica conuenit. Senibus accidit lapis renum magis quàm uesica, pueris contrà. Calculi geniti in renibus ferè minores & rubri sunt, molliores, & minus asperi, & magis friabiles: exeuntes è uesica contra majores, duriores, asperiores, ad colorem album uel fuscum uergentes. Color enim mutatur pro materia uarietate & gradu caloris. Arena itaq; & calculus ortus ex sola pituita crassa & uiscida, est ut tophorum in aquis sponse calidis adnascentium, cinerei coloris. Ortus ex pituita crassa, cui sanguinis aliquid mixtum sit, est mixtus ex pallido alboq; aut ex rubro & albo, aut ex flauo & albo. Ortus ex sanguine dominante, aut cui pituita minor portio misceatur, rufus erit, qui ad atrius uel flauius uergit. In renibus uerò calculi potius rubri sunt, id est, & flauii & rubri; ratione sanguinis, & ob calorem loci & partis colorem. Sic lapides longi sunt in ureteribus: rotundi in uesica & renum cavitatibus: hispidi in locis angustioribus.

Reliqua signa distinctiua obstructionis renum & uesica ex sequenti capite petantur. Distinctiua uerò nephritidis & colici doloris supra capite sexto explicata sunt.

SIGNA per se & per consensum affectorum renum sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia.

Obstructio enim si uehemens sit, non succedat alteri affectui, nec intermittat, profint uerò soli reni applicata remedia, ren per se affectus erit. Contra si parua aut mediocris sit obstructio, succedat alteri affectui, intermittat, nec prosunt reni admota remedia, idem per consensum affligetur.

SIGNA partium consentientium, à quibus ren uel noxam accipit, uel eandem transmittit, sunt causa, effectus & ledentia, quæ ad partes pertinent: ac illas quidem primario affectas: has uerò secundario, cum nulla interim signa adsint, quæ per se & propriè has egrotare patefaciant. Sic cerebri affecti signum est assidua destillatio: pectoris affecti suppuratio: uentricu-

li, nausea & subuersio: uesica, suppressio urina, si uterq; ren affectus sit: coxa & crurum, stupor. Et sic de alijs.

X. ACUTORVM AFFECTVVM, quibus uesica infestatur, ut obstructionis & inflammationis principale subjectum uesica est, eaq; uel tota, uel collum ejus tantum. Partes minus principales sunt renes & quæcunq; renibus consentiunt, ut caput, epar, uentriculus & reliqua, de quibus supra.

Afficitur autem uesica uel per se, uel per consensum.

Per se afficitur collum in obstructione, cum illi morbus causæ morbi inheret, ut intemperies sicca, multitudo urina, humor uiscidus, flatus, inflammatio, arena, paruus calculus, grumus sanguinis, pus, caruncula. Obstruunt enim collum omnes illæ causa ferè, quæ & renes obstruunt. Ex quibus multitudo urina obstruit, eò quod totum corpus uesica extendit, ideoq; & collum coarctat. Colligitur uerò copia urina potissimum, cum homines uel non possunt mingere, ut uersantes in hominum frequentia: uel possunt quidem sed contemplationibus se totos dedunt, adeò ut urinam non reddant. Eadem est ratio flatus copia, quæ & ipsa uesica corpus extendit.

Per consensum afficitur positiuè uel priuatiuè.

Positiuè, cum à renibus & ureteribus accipit serum cum arenulis seu calculis commixtum, siue quæpiam alia ratione male affectum, ut calidius, acrius, mordacius, putridum.

Priuatiuè, cum non recipit uel à renibus & ureteribus serum quale & quantum oportet: uel à cerebro per propaginem nerui sexti paris consuetam uim sentiendi proprias molestias, & præcipuè irritationem à multitudine siue ab acrimonia proficiscentem, ut in lethargo & phrenitide: uel alimentum, quo nutritur ab epate & uenis.

In inflammatione uerò uesica afficitur tum nat' idiomate, tum nat' d'omogoniat' non aliter quàm ren, ut priori capite in inflammatione renum diximus, unde quæ huc pertinent, peti possunt, ut & signa utriusq; affectus & obstructionis & inflammationis, quæ ferè eadem sunt.

Obstru-



Obstructionis enim nota sunt debilitas expultricis, urina suppressio, quæ plerumq; repente accedit & recedit, denuoq; reuertitur, prout obstruentes cause una cum urina, orificio vesicæ occurrunt, excretio aliujus crassi puris seu viscidum humoris, aut concreti prius, mox dissoluti sanguinis siue comminuti calculi, aut separati carnis germinis, unde urina minus supprimitur, quam ante cujuscunq; ejusmodi substantia excretionem fieri potuit: profunt ex obstruentia, sanguinis concreti grumos dissoluentia, humores crassos incidentia, calculos comminuentia, callum absorbentia.

Inflammationis uero vesicæ nota sunt casus, percussio supra pubem aut perinaeon, unde calidioris sanguinis affluxio, totius corporis à materia sanguinea uel biliosa repletio, uel membri alicujus propinqui aut recti intestini, renum, matricis: calculus item per quem sit dolor, à dolore autem humorum attractio, loci affecti ardor, dolor cum granitate, sitis, febricula, urina suppressio, iuuant quæ vesicam relaxant & auertunt humores, qui ad eam concurrunt: nocent his opposita. Paruus autem calculus promptius urinam retinet, eò quod in meatu urinario facilius quam magnus figitur.

SIGNA calculi vesicæ propria alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta sunt duo, cerea candela uel siringa quæ immissa in collum vesicæ & occurrens calculo grandiori cedit: & digiti longi oleo dulci illiti in anum immisso, quæ & calculum à vesicæ collo repellit & duriem illius percipit, ut docet Aegineta & C. Celsus. In quibusdam tamen cathetere probari non potuit, quibus mortuis calculi inuenti sunt: ut in celebri quodam Vormatiensi jurisconsulto ante paucos annos accidit: idq; tamen imprimis cum uel caruncula ingressum catheteris impedit, uel calculus summa vesicæ adherescit & quasi ex illa pendet.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa ferè ut in renibus tres, strictura nimirum orificij, materia crassior & caliditas siue remissa, siue intensa. Calor enim materia crassa, quæ ab angustia orificij diu-

tius detinetur, humidum resoluit & indurat: ac remissus quidem longiori: intensus breuiori tempore, de quibus alibi prolixius. Generatur uero calculus in uesicæ citra doloris sensum, ob uesicæ capacitatem: in renibus cum dolore, ob angustiam.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est dolor. Vbi enim dolor, ibi morbus. Dolet itaq; in nephritide lumborum regio, in lithiasi hypogastrium & imprimis in collo uesicæ, in uirga & pectine: ardet uesicæ, præputium & glans ob pruritum molestum fricatur. uirga tentigine erigitur: sensus punitionis propè anum dum quis sedet. In pueris præter hæc adest prostratio in terram, querula lamentatio, inuita mictio in lecto dormientium, ualida conatus ad mingendum cum stillicidio. In faminis non item hæc omnia. Meatus enim earum amplior est, unde & plus quam marces bibunt.

Mutata qualitas est indusium urinam semper redolens.

Mutatam excrementum est urina quæ in uesicæ calculo perpetuo supprimitur in paroxysmo ubi lapis in uesicæ cernicem incidit, in renum calculo non item, cum duo sint hi, uesicæ unica. Eadem est alui ratio, quæ & ipsa cum urina ob uicinum calculum astringitur. Ante paroxysmum urina quandoq; subcruenta, quandoq; alba & crassa, in qua sedimentum purulentum & narium macori simile. Interdum exitus recti intestini ob conatum excernendi maximam: aliquando inuita dejectio & mictio. Quæ calculos renum sequi non solent. Reliqua signa sumta ex arenularum colore incertiora sunt, de quibus præcedenti capite, unde peti possunt.

Utraq; simul sunt ludentia. Nocent causa quæ calculos generant & generatos augent: iuuant, quæ generari prohibent, aut calculos genitos comminuunt siue exturbant.

SIGNA caruncula uesicæ obstruentis similiter alia manifesta sunt, alia occulta.

Manifesta est immisso catheteris uel candela, alteriusue instrumenti, cujus transitum caruncula impedit.

Occulta



Occulta sunt causa, & mutati excrementi qualitas.

Causa est procedens continui solutio, unde caro increfcit, urethram claudens urinamq; supprimens, fluxus sabulosus uel calculosus, humor acris erodens, lues gallica, uulnus, catheter intromissus ab imperito artifice & imprimis gonorrhœa, uesica collū excorians.

Excrementi qualitas est urina tortuose micta et aliquando bifurcata, longeq; tenuior solito ac guttati effluens. Mentitur tamē carunculam interdū orificij uesica rugositas ejusq; naturalis angustia, unde difficilior mictio, præsertim dum à multitudine urina contrahitur.

SIGNA per se & per consensum affecta uesica sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia, ut in alijs partibus.

SIGNA partiū consentientium à quibus uesica uel noxam accipit, uel eandem alijs transmittit, sunt causa, effectus et lædētia, ut in renibus. Sic neruorum affectorum nota est conuulsio, tremor, horror: cerebri affecti, delirium: intestini, alui astrictio: renum & ureterum, dysentia: uentriculi, uomitus & singultus: cordis febris: artuum, frigus: de quibus Aretæus.

XI. UTERI STRANGVLATVS subiectū principale duplex est, ut nomē præfert: uterus & membra spiritalia. Hysterica enim passio est spirationis ob uterum peruersum prinatio. Uterus uerò aut ipse afficitur, aut partes illius, ut uasa & ligamenta, qua ad illum pertinent. Galenus enim uterū moueri loco negat nisi cum procidit: uenas tantum tumere & ligamenta tendi abbreviariq; & inde uterū ad latera uel sursum extendi putat: alij contrā, ut Plato & Fernelius, moueri affirmant, cuius rationem probabilem refutat Massaria lib. 4. cap. 6. Sunt autem duplicia uasa uteri, alia intra, alia extra uterum. Intra uterum sunt uena propria uteri. Extra uterum sunt, qua deferunt materias ad uterum, semen scilicet & sanguinē menstrui. Præfocatio autem uteri fit, ob uencnū frigidum generatum propter obstructionē uasorū non uteri, sed uasorum ad uterū pertinentium. Vasa enim sanguine illo frigido repleta dum extenduntur, proxima uincula simul irrigant ac madefaciunt, unde uterus continuò retrahitur & peruertitur. Quod

si extensa uasa & uincula aequaliter trahantur, tunc uteri transmutatio uersus partes superiores recta erit & in neutram partem inclinabit. Sin contrā, ad eam partem, qua magis trahit, uterus extendetur. Membra spiritalia sunt cor, pulmones & septū transversum, quod in præfocatione præcipuè afficitur, dum illud humor frigidus ab utero ascendens refrigerat & à motu arceat, indeq; anhelitum corrumpit.

Partes affecta minus principales sunt, qua præter organa spiritalia utero consentiunt, ut nerui, uena, arteria, cerebrum, jecur, uentriculus.

Afficitur autem uterus uel per se, uel per consensum.

Per se, cum noxam intra se consinet, nec aliunde accipit, ut cum inflatur & intumescit: uel repletis ob retentionem seminis siue sanguinis menstrui uenis aut ligamentis, qua ad ipsum pertinent: uel iisdem etiam à nimio profluuio inanitis, reuellitur. Et sic præfocatio inter morbos acutos refertur.

Per consensum, cum uitij expers noxam à partibus, quibus consentit, accipit, uel cum culpa illarum uasa, quibus susperditur, retrahuntur.

Noxam autem accipit à partibus, quibus consentit, dupliciter: positiuè & priuatiuè.

Positiuè, cum recipit à cerebro destillationi obnoxio, nec non à uentriculo prauis succis seu alimentis referta: ueluti & à multis alijs partibus, ut epate & liene, cum quibus per uenas consentit, eos affectus, quibus illa laborant.

Priuatiuè, cum non recipit siue sanguinem siue semen, qua recipere debet, idq; uitio earum partium qua ei consentiunt, ut testium ac uasorum spermaticorum, jecoris, cordis, uenarum, arteriarum atq; habitus totius corporis. Vitium partium est, cum uasa uteri retrahuntur à stomachi repletionē, uel epatis lienisue malè affectorum culpa.

SIGNA uteri affecti alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, qua uel ab ipsa egrotante, uel obstetrice assistente obseruantur: uel à medico audiuntur. Illa enim



enim uterum tangentes, cum retrahi, & ut putant, instar globi in uentriculum efferrī, ceruicem uerò inclinatam percipiunt.

Occulta sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quacūq; uenas uteri obstruūt, & uterum refrigerant, ut aēr frigidus, diuturna à coitu abstinentia, pororum per quos uterus expurgari debet angustia, mensium suppressio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa alia cōmunis est, alia propria.

Communis est, tristis circa uterum sensus & retractio & peruersio ipsius uteri.

Propria est uaria, ut & in ceteris morbis, pro diuersitate naturae mulierum, quae afficiuntur, temporum anni, status calis, regionū, causarū quae praefocationem faciunt, ut sanguinis uel seminis retenti atq; aptitudinis partium corporis, quibus uterus congruit, sic tamen ut semper imbecilliores & propinquiores facilius infestari soleant.

Quaedam igitur sine sensu & motu iacent cum obscuro paruōq; pulsū: interdum sine ullo, sed cum insensibili transpiratu.

Quaedam sentiunt quidem & mouentur, integrāq; sunt ratione, sed animo deficiunt & difficulter respirant. Alijs deniq; cum his brachia & crura contrahuntur. Tot enim differentia seu gradus constitui solent.

Mutata qualitas est initio accessionis pallida facies: in declinatione rubor malarum: in augmento & statu refrigeratio tū uteri, tum totius corporis à uapore frigido: unde & hic effectus dictus est flatuosa perfrigeratio & syncope frigida.

Mutatum excrementū est salina uomitus in accessione: humiditas quaedam à locis muliebribus excurrens in remissione.

Utraq; simul sunt iuuantia. Profunt in uera praefocatione naribus admota fatida: nocent odorata. Contra profunt inferioribus partibus admota odorata: nocent fatida. In spuria uerò praefocatione, quae ab immodico profluuio sanguinis oritur, contra se res habet.

SIGNA diaphragmatis affecti duo sunt praecipua: difficilis & quasi abolitus anhelitus & uocis interceptio. Vapor enim uirulentus à uasis uteri eleuatus septumq; petens, idem instar scorpj insicit, ne moueri possit:

efficitq; simul, ne materia sufficiens uocis nepe aēr mittatur, qui respiratione trahitur, et reijcitur expiratione, dilatato & compresso pectore. Quae utraq; symptomata cum tam saua sint: interdum hysterica esse uel apoplectica, uel epileptica, uel lethargica, uel synoptica, uel prorsus mortua uidetur: inter nosci autem sic debet. Apoplectica omnis summa cum difficultate spirat, atq; etiam, nisi ualde leuis sit apoplexia, stertit, resolutas habet partes, sensum amittit: hysterica uidetur priuari beneficio respirationis, transpiratio est illi loco respirationis, non stertit, non habet partes resolutas, nec sensum amisit quamuis obtusum habeat. Nam si pili extrahantur, uel pungantur, sentit, & manu adhibita circa collum se suffocari indicat.

EPILEPTICA spumat circa os, conuellitur, oculos uertit: hysterica non spumat, non conuellitur, oculos non uertit nisi in tertio huius passionis gradu, cum suffocatio in epilepsiam abit & quandoq; post accessionem in maniam uel melancholiam.

IN LETHARGO dolor capitis praecedit, sequitur obliuio, comitatur febris cum pulsu undoso, faciei color parum mutatur, affectus multis durat diebus: in suffocatione manet recordatio, febris non urget, pulsus non uel uix percipitur, color apparet cadauerosus, affectus citius terminatur.

In syncope pulsus cessat, sudor frigidus apparet, color pallidus admodum: in praefocatione uteri pulsus remanet, sed exiguus est, rarus & languidus, uultus tumet ac rubet, nisi tam fortis sit accessio ut mors sit in propinquo. Est enim morbus acutus, eadem die interdum perimens.

An uerò hysterica sit mortua, id plerūq; practici sic explorant. Lanam carptam, gossipium, tenue linamentum, candellam accensam, cyathum aqua plenum admovent ori, naribus, pectori, abdomini. Quod si quodcūq; ex his quomodo cūq; uel etiam obscurissime moueatur, hystericam adhuc uiuere pronunciant: sin minus, mortuam. Sic speculum ori adhibitum si non insiciatur, similiter defunctam esse dicunt. Dubium uerò uel potius fallax id indicium est. Nullum enim ex illis notis ablationem uita, sed ablatam tantum respirationem ostendit.

cum



cum qua tamen uita stare potest, quia permanet transpiratio, qua pro uita sustentatione sufficere potest in hoc casu. Calor namq; exiguus, arteriarum cordisq; officio conseruari potest in hysteris & per transpirationem satis euentari, ne prorsus extingatur.

SIGNA per se & per consensum affecti uteri sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Si enim praefocatio sit uehemens, si nulli alteri affectui superueniat, si non intermittat, & si prosint utero adhibita praesidia, uterum per se affici argumentum erit. Sin minus per consensum.

SIGNA partium consentientium sunt symptomata illis adhaerentia, ut cerebri, cui quo uterus maximè consentit, affecti nota est delirium: nervosi generis & meningum, tremor & conuulsio: cordis, asphyxia & deliquium animi: uentriculi, nausea & uomitus: uenarum carotidum sopor, sensuum abolitio, capitis grauitas.

X. SATYRIASIS subjectum duplex est: aliud in uiris, aliud in feminis. In uiris pars affecta est membrum genitale ejusq; partes, ut arteria, neruus fistulosus, ligamenta, glandula parastatum, testes.

In Satyriasi enim orificia arteriarum immodicè patent, neruus caernosus & ligamenta instantur, glandula interdum inflantur, testes aliquando pulsant & quasi singultiunt, summum pudendum saepe ulceratur: totus coles intumescit & rigidus sine intermissione extenditur.

In feminis membrum patiens est os & collum matricis, quod pruritu quodam & flatibus in festatur. Id enim quamuis neget Aretaeus, absurdum tamen non est. Etsi enim fame mentula & seroto careant, habent tamen his partibus analogam ceruicem & uterum: utq; uiris uirga & serotum: sic feminis ceruix & uterus tentigine affici solent. Nec tam familiaris uiris hic affectus quam feminis est, sed in uiris priapismus, in feminis satyriasis à quibusdam appellatur.

Partes affecta minus principales sunt, qua peni & utero consentiunt, ut caput, uentriculus, epar, renes, uasa spermatica.

Afficitur autem tam penis quam collum uteri uel per se, uel per consensum.

Per se, cum utrumq; membrum uel ulceratur, uel intemperie frigida laborat, unde

calor debilis, cuius uitio crassi succi redundant, & flatus crudus seu uapor crassus, quo inflatur, gignitur: id uero raro, praesertim in uiris euenire Galenus docuit.

Per consensum laborat idq; posituè, cum aliunde aliquid excipit, quod affluere non debuit, ut uel calorem praeter naturam ab inflammatis glandulis uel testibus, uel spiritum flatuosum copiosorem à patefactis arteriarum orificijs, qui in cauernis paulatim colligitur, deinde subinde augetur admodum, donec colem tendat & tumefaciat, id quod saepius accidit. Priuatiuè uero in feminis tantum affici uidetur, is nimirum, quibus uterus natura ualde siccus est, unde lassata uiris satiari non possunt. In uiris hæc siccitas & inanitas locum non habet: sola plenitudo hanc, nequorum distentionem efficere potest.

SIGNA membri genitalis in uiris simpliciter affecti sunt: duplicita, manifesta & occulta.

Manifesta sunt ex relatione agrotantis, qui de hac parte affecta queritur, sed et si coles detegatur, uidetur.

Occulta sunt, causa, effectus & attragere simul.

Causa sunt, quaecumq; uel crassos succos generant, uel quod saepius accidit lumbos calesfaciunt & orificia uenarum & arteriarum, qua ad colem tendunt, dilatant. Primi generis sunt temperamentum frigidum, tibi frigidi & flatuosi & similia, unde melancholici, ut & elephantiaci priapismo saepe tentantur. Secundi generis sunt decubitus super lumbos, temperatio totius corporis calida & humida, alimenta boni succi & una simul flatuosa, uel multum seminis generantia, ut ciceres, allia, oua, pultes, ostrea, eruca, nuclei pini & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio lasa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio lasa Aretaeo est penis erectio cum appetitu coeundi inexplibili.

Is enim satyriasis tantum meminit: priapismu, qui fiat sine ueneris desiderio agnouisse non uidetur. Nunc pleriq; actio lasa tam satyriasis quam priapismi est inuita penis arrectio sine illo precedente ad libidinem impetu, idq; uerosimilius. Nam etsi ueneris desiderium, ut & frequens cogitatio



Et aspectus rerum Venerarum, & diuturna membri genitalis incassum tractatio, hunc affectum excitare solet: eo tamen tandem excitato stimulus libidinis perit: nec naturalis colis erectio ab inflatione morbosa, qua priapismus est, aliter differt, quam quod illa sit procedente imaginatione & cum comite uoluptate: hac sponte & citra libidinis stimulum: sed & cum dolore quasi tetanico. Quibusdam inuita penis extensio est citra palpitationem in priapismo: cum palpitatione in satyriasi. Sic enim illi hæc duo distinguunt: inter qua Galenus nullam differentiam facit.

Mutata qualitas est, rubedo penis & faciei, odor hircorum in libidinem ruentium, uentris inflatio morte jam imminente.

Mutatum excrementum est spuma labris ut hircis insidens, alui resolutio, lotij post longam retentionem albi & crassi effusio.

Virag, simul sunt iuuantia. Profunt carminantia simul & refrigerantia: nocent, qua lumbos, renes ac testes cum uasis spermaticis excalescunt, ac simul ora uenarum aperiant.

SIGNA membri genitalis in feminis simpliciter affecti sunt causa, effectus & uirag, simul.

Causa sunt tum eadem que in uiribus, tum flatuosa substantia mensura retentoribus.

Effectus est collum uteri rigidum sine Veneris appetentia, non aliter quam dum Venerem appetunt, pruritus pudendorum, ita ut mulier assidue locis manus admo- neat, falsi humoris & mordacis effluxio. Quod si uterus sit siccus, eum Valescus ex fissuris labiorum dignoscere docet, ut supra quoque monuimus.

Virag, simul sunt iuuantia. Profunt uictus tenuis, & qua humorem ustum, unde pruritus, educunt: nocent, uictus plenus & qua ustum humorem cumulant in primo genere. Profunt contra Venus & uictus humidus: nocet abstinentia & uictus tenuis in altero genere satyriasis.

SIGNA penis affecti per se & per consensum hic, ut in morbis etiam quibusdam alijs, locum non habent, eò quod satyriasis passio sit semper idiopathica, quamuis orta ex pene primùm per consensum affecto.

Tam altè enim radices egit, ut sympathica affectionis condiciones non admittat, deuteropathica uerò appellari possit.

SIGNA partium consentientium affectionum sunt symptomata illis inhaerentia, ut capitis affecti nota grauitas est ad motum: uentriculi, auersatio ciborum, epatis, sitis, renum, lotium crassum & sic de alijs.

PARS



PARS AFFECTA

MORBORVM DIV-

TURNORVM LIBRO PRIMO.

I. DOLORIS CAPITIS. Subjectum doloris capitis in genere est caput, membrum diuiniſſimum, sed morbis maximè obnoxium: idq̄, uel totum, uel pars aliqua. Est autem pars uaria, externa, interna, anterior, posterior, dextra, sinistra. Externa est extracaluarium: interna contra. Ad partem tam internam quam externam pertinent membrana, nerui, uena, arteria & diploe, hoc est, duplicatura illa medullosa ossis caluarie. Ad internam propriè meninges & cerebri substantia: ad externam cutis, muscoli, pericranium, spatium inter cutem & pericranium, frons, sinciput, uertex, occipitium. Rursus ex partibus dolet uel interna tantum, uel externa tantum, uel utraq̄, simul. Caput igitur hic accipitur non totum id, quod supra ceruicem est, sed illa pars tantum, que capillis tegitur. Nam dolores oculorum, dentium & aurium, capitis dolores dici non solent. Imprimis uerò dolor capitis partium neruofarum est, ut membranarum: & ratione earum alijs quoq̄, partibus tribuitur. Sic substantia cerebri membranis conjuncta doloris particeps dicitur. Et sinciput dolor frequentiusprehendit non tam ob cranium ibi tenuissimum & fistulosum, quam ob panniculos suturis illic intersertos, & copia tenuium uasorum ibi sparsorum, quam facile percellit materia omnis seu uapor eò tanquam ad fumarium perueniens, unde & ferè semper illic sudor incipit. Diploma uerò caluarie affici in sanis capitis doloribus confirmat historia rara, quam recitat Fernelius de lue Venerea cap. 7. Euenire enim id malum solet illitis ab hydrargyro.

In specie subjectum cephalæe quibusdam est totum caput: cephalalgia pars anterior: hemicrania medium latus, siue dextrum, siue sinistrum, ad sinciput usq̄: monoplegia seu clauis una tantum particula, ut mentinx, aut alia, cui ad similitudinem pali infixi dolor inheret: doloris deniq̄, crinalis, prodromi arthritidis, cutis capillata, uel spatium inter cutem & extimam partem tunice pericranij, in quo dolor etiam radices pilorū ferit.

Aretæo, ut plerisq̄, alijs cephalæa & cephalalgia non subjecto, sed duratione doloris differunt.

Afficitur autem caput uel per se, uel per consensum.

Per se, cum illi morbus, causæ morbi immediatè insidet, id quod fit dum materia uel uapor in capite gignitur ob frigidam humidamue illius naturam. Eam enim ob causam plurima excrementa colligit, que si crescant aut à facultate expultrice non extrudantur, debito tempore, caput doloribus perturbant.

Per consensum, cum à parte quadam corporis læsa coafficitur, idq̄, bifariam, positiuè & priuatiuè.

Positiuè, cum uel attrahit, uel suscipit humorem uaporemue siue à toto corpore, ut in febre & crisi, siue ab affectu unius partis, ut uentriculi & uteri per neruos: epatis per uenam cauam: lienis per arteriam magnam: cordis per arterias: pulmonis & septi transuersi, quod hæ partes illi subjectæ sunt, uel per neruos quoq̄: harum deniq̄, & reliquarum partium tum sola connexionem, & quasi contagione, tum per arteriam & stomachū, que sunt corporis ucluti maiora fumarium.

Partes uerò certæ capitis à se inuicem per consensum affici solent: ac externæ quidem, cum uapor uel humor à cerebro, ejusq̄, membranis tanquam redundans, uitiosusq̄, foras pellitur: internæ uerò cum ab externis ad cerebrum materia morbifica detruditur.

Priuatiuè, cum non affluit quod affluere debuit, ut alimentum humorue conueniens in fame, exercitio, Venere immodica, animi perturbatione.

Afficitur igitur caput in cephalæa et monoplegia per se tantum: in cephalalgia & heterocrania per consensum maxima ex parte. Id tamen negari non potest in cephalæa & monoplegia simul per se & per consensum affici. Nam ex longo dolore solet debilitari, ut excrementa partium aliarum facile recipiat, cumq̄, spiritus diuturno affectu resoluatur, temperies & uirtus digestiua alteratur



alteratur, indeq̄ cerebrum plurima excrementa generat. Cephalgia autē & heterocrania, nisi in cephalæam abeat, cum à sola intemperie, aut nunquam fiat, aut non diu duret, in ea caput per se affectum esse non dicemus.

SIGNA capitis simpliciter affecti, alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt ex ægri relatione, qui se ex capite toto, uel dimidio, uel particula quadam laborare conqueritur, nisi mens agrotet.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quacumq̄ uel alterant caput, uel continuitatem eius soluunt, uel utrunq̄ faciunt, ut percussio, aer calidus, crocus, datyli, oliuæ nigra, grana sauina, myrrha, humores, uapores, uermes, & alia, de quibus alibi.

Cephalæa autem in specie, quæ materiam terrestrem & uiscidam cumulant.

Effectus est dolor, qui cum plures ejus sint species, potissimum grauans est, quem Aretæus cum Hippocrate καυὸς καὶ κεφαλή nominat. Sunt uerò pro ratione partium affectarum & alij, quædam simplices, tū compositi. Simpliciter, ut præter grauem, tendens, pungens, ulcerans, pulsans. Compositi, ut grauans & tendens simul, aut tendens, grauans & pulsans, ut inflammatorius. In specie cephalæa nota est, quod ægri non possunt ferre splendorem siue Solis, siue ignis: leduntur clamoribus, alloquijs, sermonibus.

Utraq̄ simul sunt, quod agrotans dolore capitis aliàs laborare consuevit ob imbecillitatem, uel acrem sensum, uel laxitatem, uel malam figuram capitis.

SIGNA distinctiua partium sunt hæc.

Externarum et internarum partium affectarum signa alia manifesta sunt, alia occulta,

Manifesta sunt ex relatione agrotantis, qui uel extrinsecus, uel intrinsecus in profundo capitis se affligi indicat.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa doloris externarum partium sunt externa ut plurimum. Sic pericranium à frigore frequentius ob similitudinem: citius ab æstu, sordibus, multis capitis integumentis, ut in mulieribus & similibus. Contra

causæ doloris internarum partium interna sunt status, aut humor flatulentus & pituitosus, & alia.

Effectus est dolor, isq̄ uariis.

In pericranio & meningibus pungens, in membranis ossium profundus & frangens: in medulla cerebri obrusus cum delirio & propensione ad somnum: in uenis ex plenitudine, dolor compressu quodam grauidus: in uenis & arterijs internis, pulsus temporum & sæpè comes febris ephemera: in arterijs spirituum plenis quæ membranas concutiunt, dolor pulsans & contundens, ut ille recurrens statis horis quotidie, cuius Aretæus meminit. In neruis tendens, trahens, conuellens, quiq̄ parti cui inseritur, communicatur, ut si laboret neruus quinta conjugationis, aurium sensus afficitur. In carne musculosa & neruosa, laxans, diuellens, lacerans.

In genere uerò partium affectarum intra cranium nota dolor est obtusus, quiq̄ ad radices & cavitatem oculorum penetrat, ed quod neruus opticus à tunicis cerebri suas accipit. Contra externarum, dolor manifestus, quemq̄ palpebra tantum sentiunt. Signum tamen hoc interdum fallit. Nam non tantum interni sed & externi dolores ad radices oculorum subinde pertingunt, quod pericranium oculorum cauum (cui insident) succingit. Verum dolorem illum non tam punctilem esse probabile est, quàm si à meninge existeret.

Utraq̄ simul sunt iuuantia. Si dolor externus sit, dura frictione capitis percipitur: si internus, per contactum non exacerbatur.

SIGNA distinctiua totius corporis & partium certo situ determinatarum affectarum sunt hæc.

Si dolor cum febre permanente sauiat, totum caput laborabit. Si absq̄ febre, uel totum affectum erit, uel pars siue dextra, siue sinistra.

Si sit à bile, dextrum latus exercet: si à melancholia, sinistrum. Vesicula enim fellis, unde bilis, dextram partem: lien, unde melancholicus humor, sinistrum occupat. Signum tamen hoc controuersum est, cum & uena caua & arteria magna à jugulo in utrumq̄ latus uenas traducant, ut nulla restet alia ratio quàm rectitudo, quæ uix locum habet in ijs, quæ per uias communes

Nu trans-



transferuntur: praesertim cum epar & lien humores ad caput transmittant, non per se, sed transmissos prius ad uentriculum.

Quod si sit à uentriculo & intestinis, partem anteriorem: si à renibus uel ab utero, uerticem, occiput & ossa temporalia infestat, uel illic incipit, propter consensum uteri cum cerebro per spinalem medullam, cui robustis uinculis connectitur.

SIGNA capitis per se & per consensum affecti sunt magnitudo, numerus, tempus et iuuantia. Dolor enim si uehemens sit, si uel nulla alia pars affecta sit, uel aliqua cui caput non facile consentit: si iuuent soli capiti applicata remedia, per se caput laborabit. Per consensum, si dolor sit paruum uel mediocre, si pars aliqua in corpore ante hunc dolorem aliquid passa sit, patiatur ue, etiam nū & quidem grauius quam caput, si crescat decrescatq̄, prout pars communicans magis uel minus turbatur, nisi dolor iam factus sit in capite per essentiam. Si paruum aut nihil profint capiti admota praesidia, qua parti consentienti profunt aut obsunt.

Quod ad tempus attinet, hoc signum incertum est. Dolor enim intermittens est & per se & per consensum affecto capite. Per se, si nimirum per interualla materia generetur in capite. Per consensum, si materia extra caput genita in caput semper euaporet. Hoc igitur in casu caterorū signorum adminiculo uti oportet.

SIGNA partium consentientium à quibus caput noxā accipit sunt symptomata illarū, ut totius corporis affecti nota febris est, & plenitudo & perturbatio ut in crisi: uentriculi, nausea, ruētus, dolor: epatis, grauitas in dextro hypochondrio: lienis, grauitas in sinistro: intestinorum, contorsio & agitatio: cordis & arteriarum, pulsus auctus priusq̄ dolor capitis incipiat: pulmonis, difficilis anhelitus: uteri, mensium retentio, & sic de alijs.

Heterocrania igitur raro per essentiam est, nec continua sed interpolata, cum à temporum pulsatione oriri soleat contagione subditarum partium, & quandoq̄ periodos habet, de quibus Aretaeus.

II. **VERTIGINIS** simplicis pars affecta principalis in genere cerebrum est & spiritus animalis. In specie sinus cerebri an-

terior principaliter, & posterior minus principaliter. Tenebrosa autem uertiginis subjectum est triplex: cerebrum, spiritus animalis & oculi. Cerebrum enim in omni uertigine retentricem habet debilem: ut si quid prater naturam contingat, non possit seruare spiritum, quo minus in gyrum moueatur. Spiritus animalis nisi indebito peruersoq̄ motu feratur, uertigo non oritur. Oculi in uertigine tenebrosa affecti sunt, eò quod in hac prater rotationem repentina tenebra oculis offunduntur: unde & σκότωμα & ἰδύριον uocatur ab ἰδύριον, quod est oculus apud Iones, autore Polluce, uel ἰδαίειν, quod Hippocrati est oculos perueriti. Ventriculi deniq̄ cerebri in specie affici dicuntur, eò quod repleti peregrina materia, nempe spiritu debitum situm non seruante. Prior autem pars cerebri, seu aptici illius sinus leduntur principaliter, quia leditur primario imaginatio: posterior pars cerebri, seu posterior illius uentriculus minus principaliter, quia aboletur motus & sensus secundario. Spiritus enim animalis in anticis uentriculis primum rotatus imaginationem deprauat: tandem uero ad posteriorem delapsus ledit sensum & motum: in specie non distributus in oculos uisionem abolet. Rursus idem si agitetur solum in cerebro, imaginantur uertiginosi, caput circumduci: si secundum oculos, exteriora circumagi putant.

Partes minus principales sunt, quae cum cerebro consentiunt, ut totum corpus, imprimis tibia.

Afficitur autem cerebrum uel per se, uel per consensum.

Per se, cum morbo laborat proprio, ob quem uel spiritus crassus aut flatuosus, aut solus spiritus cum multo uapore mixtus gignitur, qui uel quod feruet, uel quod ob sinus cerebri semiestructos retinetur, circumagitur.

Per consensum afficitur, cum idem spiritus uel uapor siue feruidus, siue à mala conformatione, ut semi angustia cerebri retentus, non ut indigena, sed ut ad uena aliunde sursum transfertur, ut uel à toto corpore, uel à parte aliqua inferna, ut à uentriculo, epate, liene, pulmone,

utero,



utero, totoq; hypochondrio inquinato, & mesenterio, nec non testibus & uasis spermaticis. Sursum enim modo per uiam crisis, modo sine crisi, siue per uasa, siue per alios ductus ascendens reflectitur à cranio, atq; illic uertiginem, ueluti uentus in angiportu turbinem excitat: uel potius more flamma & fumi in furno coërciti. Caput enim instar furni rotundum est, unde & uentriculorum cerebri cameratio, qua Pandoðes corpus dicitur.

SIGNA cerebri per se affecti in uertigine sunt duplicia: manifesta & occulta.

Manifesta sunt ex relatione patientis, qui non tantum omnia circumagi sibi uideri, sed & uisum accidere, auferri uel deprauari refert.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt, quacumq; turbulentos spiritus procreare, uel procreatos commouere possunt, ut intemperies cerebri, imprimis pituitosa & melancholica, humores crassi & flatuosi, aspectus rerum profundarum & in gyrum rotatarum, motus in gyrum, balneum post repletionem, semiangustia meatuum cerebri, & similia, de quibus alibi.

Effectus est lesio functionum cerebri, ut imaginationis, sensus & motus. Vertiginosis enim uidetur caput proprium circumduci, uel exteriora, uisio similiter deprauatur, uel etiam diminuitur, ut cum quasi per nebulam uident, uel aufertur prorsus: sed & concidunt, uel lapsuri uidentur, nisi alicui adhæreant. Ratiocinatio uero salua est, eò quod falsam esse suam & uisionem & imaginationem agnoscunt. Adest præterea, ait Aretæus, grauitas capitis, & summet eger propinquorumq; ignarus est.

Utraq; simul sunt, quod uertiginosus hoc morbo sæpius laborare consueuit, & profunt, que uertiginem tollunt: nocent, que eandem procreant. Quod si hic affectus sit in uis spiritus uisui, erit sine casu in terram: sin in uis spiritus motiui, erit cum lapsu.

SIGNA distinctiua uertiginis, cephalæ, epilepsia, apoplexia & hypochymatis sunt hæc.

Cephalæa semper cum dolore est, cui interdum quadam confusio & obtenebra-

tio oculorum jungitur: uertigo sine dolore est.

EPILEPSIA ab humore acri & maligno oritur: conuulsionem & casum in terram adfert. Vertigo ab humore aut uapore crasso, turbido & caliginoso oritur, & fit sine strepitu, clamore, conuulsione, perfecta priuatione sensus & motus.

APOPLEXIA ex toto sensum & motum adimit, quod nec in epilepsia, nec in uertigine contingit.

Hypochyma causam habet in oculo, nempe aquam uel fumum: uertigo in cerebro: alioqui in utroq; obtenebratio & fami, nubes, musca uolitare creduntur. Tanta igitur cum sit horum morborum cognatio, uertigo multorum morborum præludium esse solet: ut melancholia, epilepsia, apoplexia, aliorumq;: aded ut uertiginem quidam paruam epilepsiam appellare soleant: nec raro prædictos morbos uel præcedere, uel comitari solet.

SIGNA cerebri per se & per consensum affecti in uertigine sunt magnitudo, numerus, tempus, & iuuantia. Nam si sit uehemens hic affectus, si præcurrit ualidus capitis dolor & grauitas, aurium sonitus, & aliquis sensuum, ut olfactus & gustus sensim uiolatur: & leui ex causa malum recurrit, nec ullum in parte inferiore uitium præcessit, & iuuant capiti apposita remedia, cerebrum per se affectum erit. Per consensum, si contra.

SIGNA partium consentientium, à quibus uertigo oritur sunt hæc.

A toto corpore impuro existit, uel febre implicito, uel febris experte. In febre enim ascendit uel spiritus, uel vaporosus & calidus, ut in tertiana: uel halitus frigidus, ut in pituitosa. Extra febrem autem, idem vapor emergit in bilioso corporis habitu ex ubertate feruidi & spirituosæ sanguinis, quod fit ex recursu hæmorrhoidum & mensum: idq; utrunq; per uenas jugulares & carotidas. Coëctionis tempore & cum à somno surgunt scotomatici uehementius uertuntur: tenuis urina est, pauca, aluus dura, color humori redundantis similis. Eadem est ratio crisis natura conante fecernere humores per crisis, & uapores ad cerebrum transferente.



A reliquis partibus oriri, propria illarum symptomata ostendunt, ut à ventriculo vel malè concoquente siue pituita, corruptisue cibis referto existere, denotant ructus acidi, & diata qua præcessit: vel eodem alijs prauis succis referto, imprimis bile, demonstrant morsus, nausea, oris amarus, post inediam, dum calore alimenti inopia humores noxios exagitat, acres incidit & calescit.

Ab epate, & liene, grauitas utriusq;, & sic de alijs. Si à mesenterio oriatur vertigo, collum dolere affirmat Arculanus. Quod si irreat vapor per arterias & uenas qua foris sunt, sentitur ipsarum tensio, pulsio & tumor maior solito. Si per internas, intus sentitur tensio & pulsio. Si per nervos, dolet collum totum.

III. EPILEPSIAE subjectum hic explicari necesse non est, cum supra id iam factum sit inter morbos acutos, ad quos ratione accessionis saepe lethalis epilepsia etiam recensetur.

IV. & V. MELANCHOLIAE & MANIAE pars affecta non est alia, quam vel vertiginis, vel epilepsia. Differunt saltem proprijs quibusdam symptomatis. Cerebri enim substantia laborat affectione caliginosa in melancholia: ignea in mania: circulari in uertigine. Timent igitur præter iustam causam melancholici: furiunt maniaci: imaginantur objecta circumagi uertiginosi. Nec raro accidit, ut hac duo coniungantur, melancholia nimirum & uera mania, cuius exemplum Hipp. 3. Epid. de uxore Dealcis recitat, quam scribit toto ferè morbo modo fuisse taciturnam, modo nimum loquacem & insanientem. Etenim cum solus sanguis feculentus, qui neq; comburatur, neq; putrescat, in uasis & uisceribus redundat, apparet taciturnitas, suspiria, lachryma, stupiditas: idem uerò ubi crematur aut plusculum calescit, aut putrescit, uapores acres & fados in cor atq; cerebrum partim raptos, partim pulsos effundit, qui uiscera ueluti expungentes & graniter percellentes tetram insanam pariunt. Hinc Aræto melancholia imania initium est & pars quadam, ut supra explicatum habetur in nominibus.

Nec illud prætermittendum, quod ais:

idem Aræto, bile in uertigine rejecta per uomitum, furorem: atra, melancholicam: pituita excurrente morbum comitialem effici. Alij ex alijs signis id colligunt.

Nam si qua, ajuunt, oculis obuersantur, spectra sunt rubentia & sanguinolentiora, denunciant maniam, in qua non modo phantasia, sed & ratio laesa est: sin rubore saturata, seu purpurea, comitiale.

Afficitur autem cerebrum vel per se, vel per consensum.

Per se afficitur, cum melancholicus succus in cerebro genitus, ipsum duntaxat cerebrum occupat, & melancholia uera dicitur.

Per consensum, cum idem aliunde in cerebrum affluit, uel à toto corpore, uel à partibus: cum ab hypochondrijs, flatuosa & hypochondriaca dici solet: cum à toto corpore, melancholicus affectus: cum ab utero, uterina melancholia à quibusdam appellatur. Tot enim sunt partes principales, à quibus affectis cerebrum in melancholia affici solet.

Melancholici igitur affectus subjectum totum corpus est: melancholiae hypochondriaca, uentriculus, epas, lien & uena mesaraica: melancholia uterina, uterus.

Partes affecta per consensum in his tribus speciebus sunt cerebrum, intestina, oculi, aures, nerui, musculi.

SIGNA per se affecti cerebri est continua aestitia cum perpetuo periculi cuiusdam imminentis timore.

SIGNA per se affecti totius corporis, cerebri uerò per consensum est maror intermittens & alacritas quadam principum facultatum & sensuum omnium, summaq; in agendis rebus prudentia sine delirio.

SIGNA melancholiae hypochondriacæ sunt uentriculi, lienis, epatis & uenarum mesaraicarum propria symptomata, ut uentriculi affecti signa sunt tarda cibi ingestio, digestio, inappetentia, cruditatis, ructus, flatus, affectus cardiacus, inflatio, & haec interdum omnia, aliquando quaedam tantum.

Epatis affecti signa sunt uapores nimum exhalantes ex secunda coctione, & urina substantia, & color & contenta præter naturam.

Lienis



Lienis affecti signa sunt gravitas sinistri hypochondrij, punctiones & exhalationes.

Venarum mesaraicarum affectarum signa sunt abdominis tensio, dolor, decubitus in eâ partem, quæ affecta est, melior & facilior.

SIGNA affecti cerebri per consensum sunt proclivitas in somnum, memoria debilitas, facilis repletio ex potione meri licet minus larga, catarrhi.

SIGNVM affectorum intestinorum est, alui adstrictio. Oculorum, scotomia & quasi muscarum paraularum obvolitantium offusio.

Aures affectas esse, susurrus earum indicat: ut nervos & musculos, locutionis interdum impeditio, & membrorum externorum lassitudo.

SIGNA melancholia uterina sunt menses vel suppressi, vel diminutè fluentes: & quæcunq; causa melancholicum humorem in venis uteri cumulant.

Quibusdam etiam molesta rei gravis veluti infixi pali cujusdâ in gula perceptio.

VII. PARALYSEOS subjectum duplex est: primum & secundarium.

Primum est cerebrum, spinalis medulla, nervus & musculus. Ex quibus modo cerebrum, modo spinalis medulla, modo nervus aut musculus laborat.

Secundarium sunt partes eâ, quarum nervi & musculi leduntur. Affectum autem in paralyse non ut in apoplexia totum cerebrum est, sed ejus pars tantum, vel prior, vel posterior, vel media, vel meninges.

Spinalis medulla similiter vel tota, vel pars tantum, ut processus illius superior in prioribus: vel inferior in posterioribus vertebris.

Nervus quasi rivus est, per quem spiritus tanquam aqua, ex cerebro & spinali medulla suo fonte sensum & motum ad omnes partes diffundit: ideoq; causa conjuncta in omni paralyse illi inheret necessario. Hinc paralyse, nervorum resolutio appellari solet. Sunt autem septem nervorum paria à cerebro: à spinali medulla triginta paria, secundum communem opinionem. Recentiores enim priores nervos ab initio spinalis medulle deducunt. Illa paria motibus partium capitum, ut instrumentorum visus & vocis: intestinorum item & viscerum serviunt: hæc sensui tactus omnibus communi, & moti-

bus partium sub capite & artuum. Rursus nervorum alij sunt majores, alij minores, ut capillares, qui per cutem sparguntur.

Musculus, cum & ipse motus organum sit, in paralyse pars affecta est: patitur autem per nervum, & afficitur in sua parte nervosa non carnosâ.

Quidam igitur paralysem definiunt esse motum ablatum musculi.

Partes resolutæ non sunt corpus universon (sic enim apoplexia esset) sed vel universon latus dextrum aut sinistrum ad pedes usq; protensum, cum vel sine facie dextra vel sinistra: vel quadam tantum particula, ut oculus, lingua, larynx, tonsilla, isthmus: eaq; vel tota vel dimidia, ut naris usq; ad medium, lingua media, una tonsilla & isthmus, ipsaq; gula dimidia, ut refert Aretæus. Neg, enim ulla pars corporis est, siue externa, siue interna particeps motus & sensus, quæ paralyse obnoxia non sit. Sic Herophilus eos qui subito moriuntur, ex cordis paralyse perire dixit. Et quidam præceptorum Joh. Heurnij sinistri renis resolutionem vidit. Hæc particularis paralyse appellatur, & à parte, cui inheret nomen obtinet, ut lingua, œsophagi, vesicæ, penis, oculi, cubiti manus, truris, pedis. Universon contra, quæ certarum partium est, paralyse in genere, & semia apoplexia appellatur.

Quod autem quidam etiam hæc ad universon corpus pertinere ajunt, id & rarum est, & citra offensionem facultatum principum contingere necesse est.

Afficitur autem pars quæcunq; vel per se, vel per consensum.

Per se, cum illi morbus, causæ morbi insidet, præsertim spina, nervo, musculo & parti resoluta. Morbi enim cerebri per se affecti ferè apoplexiæ autores sunt. Pars autem alia quæcunq; vel refrigerata, vel obstructa, vel vulnerata facultatem motricem non recipit: sed & intemperies pravaos succos colligit, indeq; implet poros nervorum, quibus obstructis spiritus aditu exituque in partes subjectas prohibetur, vel prorsus evanescit.

Per consensum, cum medulla cerebri, nervus & musculus vitij expers aliunde coafficitur, idq; positivè & privativè.

Positivè, cum aliquid ad nervum musculum affluit, quod affluere non debuit, ut

Nn 2 humor



humor aliquis, vel spiritus siue vitalis, siue animalis, isq; vel nimis crassus, vel mala qualitate manifesta occultane affectus, vel nimis paucus, ideoq; præstando sensui & motui ineptus. Rursus humor affluit vel à toto corpore, vel à peculiari aliqua parte. A toto corpore, cum inclinantibus febribus materia morbifica in nervos transfertur. A peculiari aliqua parte, cum fortis natura contentio per viam crisis materiam morbificam in nervos transmittit, vel à cerebro in catarrho, apoplexia, epilepsia & lethargo: vel à pleura in pleuritide: vel ab intestinis, in colica. Humor autem affluens paralyfim fecit, eò quod nervos molliores redditos extendit & relaxat, scuti & tendones.

Privatiuè, cum musculus motui destinatus privatur vi animali, quia facultas à cerebro in musculos fluens, vel impeditur, vel deficit.

Impeditur ab angustia meatuum siue nervi, siue spinæ medulla, eaq; vel coalescentia, vel subsidencia, vel compressione, vel constipatione, vel obstructione. A coalitu, dum cõtinuum nervi solutum consolidatur callosumq; factum est. A subsidencia, cum nervus vel coarctatur, vel corrugatur, quod tamen raro accidit. A compressione, cum nervus comprimitur laqueo, vel concussione, vel lapsu, vel manibus constringitur, vel coarctatur à vertebra aliqua repente luxata, secundum obliquum) Nam secundum rectitudinem facta luxatio non facit paralyfim) sitq; vertebra cervicis, ubi nervus prodit è loco medio inter vertebra superiorè & inferiorè. Luxata enim vertebra lumborum non facit paralyfim, eò quod totus nervus in lumbis à vertebra superiori prodit. A constipatione, cum pars aliqua phlegmone tumoreuè alio obsidetur. Corruptus enim sanguis vasa opplens cunctas spirituum vias cohibet. Hæc verò angustia composita est è compressione & constipatione. Nam tumoris materia ut penetrat, habet vim constipandi: ut comprimit, habet vim comprimendi. Ab obstructione, ubi nervi repleti sunt ab humore crasso, ideoq; crassiores redditi facultatem non recipiunt, neq; transmittunt.

Deficit vel nervo abscisso, vel incisa spina, vel cum spiritus animalis aliò abducitur. Vis enim motrix secundum nature leges per nervos continuos influit, quam continuita-

tem abscissio vel incisio tollit. Cum verd v. g. dexter musculus temporũ inflamatur, eò se vertit tota facultatis vis, indeq; sinister musculus resolvitur. Similiter in capitis vultneribus calamitosi aduersa pars laxatur.

SIGNA partis simpliciter resoluta, alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt ex auditu & visu. Aegrotans enim ait se non exactè percipere sensilia in proprio quaq; sensorio: nec libere moveri posse, vel totum corpus, vel certam partem. Quod si ab altero attollatur, mox pondere suo cadit.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Cause sunt, quacumq; nervos vel immodicè humectant & refrigerant, vel impediunt, ne virtus ad nervos perferatur, ut corpus frigidum & humidum, vapor argenti vivi, Luna radius, obstructio, & alia, de quibus Aretæus.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas & mutatum excrementum.

Actio laesa est paralyseos vel exquisita, vel imperfecta, vel imperfectissima.

Exquisita est, motus & sensus privatio: imperfecta, in qua perit motus illaso sensu: imperfectissima, à $\alpha\upsilon\alpha\delta\eta\sigma\iota\alpha$ Aretæo, in qua perit sensus illaso motu. Aboletur autem in paralyfi motus non naturalis, sed voluntarius. Nam motus animalis editur & perficitur absq; musculis & nervis, sine quorum læsione paralyfis fieri non potest. Rursus aufertur motus & sensus simul, cum nervi, qui motum & sensum præstant, simul laborant, ut si oculi nervus opticus, qui visui destinatus est, & nervus secunde conjugationis, qui motui seruit, obstruatur, oculus & sensu & motu privabitur: quod in caro & apoplexia communi læso nervorum principio contingit. Perit motus illaso sensu, si nervus motum præstans labore: non laboret sensui destinatus, ut in exemplo oculi, si nervus secunde conjugationis afficiatur, non affectus sit opticus: unde immobiles erunt oculi, quem affectu $\pi\eta\zeta\iota\upsilon$ & $\alpha\iota\kappa\eta\nu\iota\alpha\iota\upsilon$ vocat Hipp. Sic lingua impeditus motus vocatur paralyfis imperfecta, eò quod incolumi servato huius partis sensu, motus ex toto nõ perijt, ijs nimirũ nervis aliqua ex parte impeditis, qui à septima cerebri conjugatione propè spinalis medulla initium dcrimantur.

Quod



Quod si adsit inopia spiritus animalis, tamen si facultas utraq; & motrix & sensifica ab unico neruo influat, tamen manet sensus, qui passio est: perit motus, qui actio, quae majore facultatis robore indiget. Perit sensus illa so motu, si neruus qui sensum praestat duntaxat, laboret: saluus sitis qui motui seruit, ut in gutta serena, in qua solus opticus obstruitur, illa so neruo secunda conjugationis, unde exringuitur videndi actio, illa so oculi motu. Videt enim oculus per opticum, mouetur per neruū secunda conjugationis. Quod si capillares duntaxat nerui, per cutem distributi, affecti sunt (quod plerumq; ab externis causis oritur) nec interni nerui, musculiue ledantur, similiter partes sensu tantum, non motu priuatur: id quod & in somno accidit, in quo externa cutis sensu destituitur, contracto ad internas partes calore. Pulsus in paralyse languidus, paruus, tardus est.

Mutata qualitas. Pars resoluta celeriter friget, laxa, mollis & grauis est: cumq; iam diu malū protactū est, ea gracilescit et cōtabescit atrophia. Nam euacuatur omnis pars resoluta, cum attractum minimè conscicere possit. Sana contra pars opposita plerumq; videtur calidior, & quodammodo inflammata, quod omnis spiritus ad eam confluit.

Mutatam excrementū paralyse est urina, quae ut plurimum apparet alba & tenuis propter obstructionem: interdum si minor sit obstructio, crassa ob pituitae multitudinē: saepe rubra propter debilitatem vel renum, vel venarum epatis, quae sanguinem à serofitate non separant.

Utraq; simul sunt iuuantia. Prosunt quae neruos moderatè calefaciunt & exiccant, quaeq; efficiunt ut nerui ceu habena trahentem facultatem sequantur.

SIGNA partis affectae per se & per consensum sunt numerus, tempus & iuuantia. Si enim pars priuatim sensum aut motū aut utrunq; simul amiserit: si à congestionem obstructionis mater materia succreuerit à parte tacta intemperie & sensum arripit: si iuuent illi admota idonea praesidia, signum est originem mali positam esse in illa ipsa parte affecta, & partem per se affici. Contra per consensum, si non priuatim relaxetur, & si confertim dato impetu praecipit materia irruat, nec iuuant illi admota praesidia, quae paralyse conueniunt.

SIGNA partium in specie per se affectarum, alia sunt cerebri, alia spinae, alia nerui, alia musculi.

Cerebrum affectum erit, si dimidia pars vultus & linguae, siue dextra, siue sinistra una cum tota dimidia parte inferiore dextra vel sinistra relaxatur: ac dextra quidem cerebri pars, si paralyse sit dextri lateris: sinistra, si sinistri.

Ventriculus posterior cerebri solus ledetur, si dimidia pars corporis siue dextra, siue sinistra infra ceruicem resoluatur, toto vultu in columi manente. Alijs pars affecta meninx est & exortus spinalis medulla.

Ventriculus posterior & tota simul origo medulla spinalis laborabit, si absq; faciei detrimento totum corpus laxum sit, & cuius capitis stupeat, eò quod nerui per eam dispersi à ceruice prodeant.

Cerebrum anterius & medium affligetur, si pars faciei sit paralytica, reliquo corpore sano: ac dextra quidem facies, si pars cerebri anterioris & medij dextra: sinistra si pars ejusdem sinistra laboret. Qui enim in faciem feruntur nerui ab ijs cerebri partibus existunt. Ejus autem partis faciei, quae resoluta est, puta dextra, morbus non apparet in dextra affecta, sed potius in sinistra, quae sana est, ut refert Merc. cap. de paralyse. Cōmunia signa affectae dimidia partis sunt & haec. Pulsus unius lateris est diuersus à pulsu alterius. Nam in brachio affecto percipitur tardus & rarus, in latere autem sano est velocior & frequentior, secundum proportionem caloris ejus. Oculus in latere paralytico gracilescit ob nutrimenti defectum: idq; & manui & brachio, & uniuerso lateri contingit.

SPINAE prima pars, siue ceruix, quae septem constat vertebrae, si affecta sit, pectus dilatari non potest, unde mors impendet.

Ejusdem media pars quae thoracis vertebrae duodecim continet, si affecta sit, tum pars superior illa sa est, paralytica, inferior.

Ejusdē pars infima infra pectus, quae quinque lumborum vertebrae comprehendit affligetur, si nec urina nec feces siue retineri, siue expelli possint.

Os sacrum uel ejus regio laborabit, si crura et pedes afficiantur, partes supra os sanae sint.

Contingit



Contingit tamen interdum ut affecta spinali medulla superiore parte, ut in ceruice aut dorso femoris & cruris motus pereat, ille so brachij & thoracis, qui propius absunt ab ea, motu & sensu. Cujus causam reddens A. Laurentius, ego, inquit, lumbarium & dorsaliū neruorum capillamenta quaedam à ceruicali medulla interdum enasci saepe obseruauī, ut eadem sit medulla spinalis, quae cauda equina disperso, cuius pili quidam à superiore parte orti, alij in supremam caudae partem, alij in mediam desinunt: alij ad extremum usq; feruntur: quod & Piccolominius se obseruasse refert. Fieri itaq; potest, ut uulnerata spinali medulla, ejus nerui principium afficiatur, quod ad crura & pedes disseminatur, illæsis neruis, qui in thoracem & brachia diuaricantur. Sed & idcirco illud fieri potest, quod percussa superiore medulla tenuis & serosus humor ibi latitans ad inferiores neruos decurrit, eosdem madefaciens & resoluens. Offenso autem uno latere alterum saluum manet, quod spina & meninx in duas medietates per membranā quandam tenuissimā diuiditur. Quae igitur medietas leditur, illius latus offenditur.

Neruus afficitur vel in suo exortu, vel in progressu.

Si in exortu, plures partes liduntur, & remedia spina admotā iuuant.

Nam ab origine plures nerui in varias se effundunt partes. Sin ductus nerui offenditur, unica solum parti, cui ille inseritur, molestia euenient, intactis alijs partibus. Anatomie autem docet ex qua spinalis medulla parte in unum quodq; membrum neruus distribuitur.

Oculorum igitur v. g. resolutio indicat laesos esse neruos ortos à secunda conjugatione. Palpebrarum, neruos tertiae conjugationis. Labiorum ad latum musculum, neruos è primis uertebra, & ramos è tertia conjugatione. Linguae, neruum à tertia aut septima conjugatione. Vocis instrumentorum, quartam uertebra, unde ἀφωβία. Brachiorum, neruum in septima ceruicis uertebra. Manuum perfecta resolutio quod ad sensum & motū quintā ceruicis uertebra. Earundē imperfecta paralytis, sextā colli uertebra. Nam prima brachij partes illesae seruantur: in reliquis uis sentiendi & mouendi perit.

Thoracis maximum nocumentum indicat

neruos affici septima aut octaua uertebra: manuum contra parua resolutio octauam uertebra afflicta. Parui digiti & mediae partis annularis, neruum in cavitae cubiti: aliorum uero trium ceteris illesis, spinalis medullam circa principium neruorum brachij. Crurum & pedum, neruos in uertebra lumborum aut inguinibus. Et sic de alijs. Quod si nerui affecti sunt, qui musculis non inseruntur, solam à uarijs partibus afferunt.

Musculus afficitur in paralyti uel per se, uel per consensum.

Per se, si principium neruorum integrum, seu neruus extra musculos saluus sit: praesens sit percussio musculi, frigus illius manu percipitur: & carnosa ejus pars subito in maciem & languorem abit.

Per consensum, si neruus ingressurus musculum extra musculum resoluatur: nec praesens externa causa: carnosa uero musculi pars serò macrescit.

Majori enim nutritu musculum quam neruus indiget abit.

In specie musculi uesica resoluitur, sed & pudendum erigi non potest, existente seminis flatulenti multitudine, si nerui ab osse sacro uesicae inserti ac pudendo affecti sunt.

Si descendat intestinū, musculi suspendentes male habent, qui sunt in ipsis lateribus.

Sphincter resolutus est, si excrementa per aliquod tempus retineri non possunt.

Musculi abdominis resoluti sunt, & stupent nerui uesicae, si urina non redditur, & uesica in duritiem exturgescit. Id tamen etiam à meningis & renis resolutione euenit. Exemplum ex historia Heurnij recitauimus, qui & hoc addit. Laboranti ex resolutione renis sinistri Medicus admonit castoreum collo, itidem naso (Nam ex resoluta meninge uitium erat) reddidit sex urinae libras, tamen obiit.

SIGNA distinctiua paralyseos, apoplexie, arthritidis, conuulsionis, elephantis, stuporis, tremoris, in quibus sensus & motus aufertur, sed diuersis modis, sunt haec.

Apoplexia cunctorum neruorum & musculorum resolutio est. Paralytis non omnium, sed alterutrius tantum partis, uel omnium facultatum excepta cogitatione. Paralytis igitur dicitur, quasi diminuta δύσις, ut paraphrenitis, quasi diminuta phrenitis, ubi & in cōpositione minuit.

Arthri-



Arthritidis subjectum est nervi tunica, qua afficitur: paralyseos ipse nervus. Paralyticus igitur audeat progredi sed non potest: arthriticus potest, sed difficulter.

Elephantiasis perit sensus externarum partium ille so motu, resiccatis ab humore atro & nervis & cute. Paralyticis perit sensus relaxatis ab humore aquoso: aut obstructis nervis.

Paralyseos sedes est in nervo interno seu medullari, convulsionis in musculo externo seu membranoso à meningibus procedente. Illius natura est τὴ δύσεια, huius est τὴ πάσις. Membrum enim convulsim retrahitur: resolutum extenditur, relaxato atq; ita mollicato nervo. In paralyti nervus extenditur in longum: minuitur in latitudine: in convulsione nervus seu musculus minuitur in longitudine, in latitudine augetur. Ibi enim materia fluida & aquosa, hic crassa & viscida.

In paralyti & convulsione partes distorquentur, sed in paralyti pars affecta & resoluta à parte sana trahitur: in convulsione pars affecta trahit ad se partem sanam. Sic tortura oris est vel paralyti, vel spasmus cynicus. Paralyti, cum partis laborantis sensus hebes & torpidus est, & labrum affectum à parte sana trahitur. Spasmus cum pars affecta sentit, nec torpet, & labrum sanum à parte affecta contorquetur.

In tortura igitur oris, cum paralyti est, si dextra pars per se affecta est, oris distortio in sinistra parte magis apparet, eò quod partes huius musculi agentes oppositam trahunt, cuius quidem musculi resoluti prorsus otiantur. De qua re etiam supra in nomine paralyseos, dum musculorum frangentium discrimen explicavimus.

Ex quo illud sequitur, ut contractura sit in paralyti & convulsione.

Resolutio enim & convulsio unius partis efficit contractionem partis alterius.

Stupor servat motum, aut eo leuiter laeso sensum amittit, vel debilem habet.

Paralyti utroq; partem agram priuat, illas tamen internas sensibus.

Tremor est symptoma infirmæ facultatis; illæ etiam instrumentis, unde motus deprauatio: paralyti symptoma est functionis ablate facultatis motricis, & interdum abolite, interdum diminute sensitivæ.

VII. PHTHISEOS subjectum duplex est, primariam & secundariam.

Primarium est pulmo, qui ulceratur. Secundarium est totum corpus quod macrescit.

Afficitur autem pulmo, vel per se, vel per consensum.

Per se, cum laxatis illius vasibus sanguis putrescens ibi congeritur.

Per consensum positiue tantum, cum aliunde affluit humor, sicut à capite in catarrho. Cunctando enim ibi pituita dulcis putrescit. A gutture in angina. A pleura in pleuritide. Ab alijs partibus aliter.

Totum verè corpus afficitur per consensum priuatiue tantum, ex distributionis inopia. Omnes enim partes ob febrem heceticam comitem exestuant incendio, ita ut non possint alimenta coquere, sed potius hæc ut incendij in tenues auras evanescant.

SIGNA affecti pulmonis sunt, quæcumq; vim habent aperiendi, erodendi, ulcerandi pulmonem, ut aura uenenata in tubiculis, expirans ex vestibulis, uariolæ, & alia, de quibus alibi. Tussis adest expers doloris, pulsus parvus & languidus, vigilia, febris quotidiana, vespertina extremorum frigiditas, & matutina caliditas: fætet anhelitus: sudor usq; ad pectus caliditate infestus, pus excluditur sine dolore, quod aqua injectum ac quassatum facile soluitur. Nam sæpe putrida pituita viscida fallit puris imagine. Plura in capite de peripneumonia, marasmo, febre hecetica & hamoptysi. Nam ut inquit Hipp. 7. aph. 25. A sputo sanguinis, sputum puris.

VIII. SUPPURATIONIS in pectore subjectum est spatium inter thoracem & pulmonem, & pulmo ipse, cum pus ex thorace aut latere proueniens per pulmonem excretur. Rursus spatium intra thoracem repletur purulenta vel totum, vel pars tantum, siue dextra, siue sinistra. Non enim datur excursio materie à dextris ad sinistras partes, eò quod mediastinum ossi pectoris annexum id non admittit.

Afficitur autem spatium thoracis vel per se, vel per consensum.

Per se, cum materia purulenta, id est, pituita & sanguis putrescens in thorace à succorum synatrismo & humorum crudorum lateribus hærentium, ac jam putrescentium copia colligitur.

Per



Per consensum, cum humor ad cavitatem pectoris delabitur, vel ex toto corpore, vel ex parte corporis. Ex toto corpore serosus salsusq; humor excutitur, quia vel pellitur, vel attrahitur. Ex parte, cum fit, erit vel ex ore, ut in angina: vel ex abdomine: ut in hydrope & suppressis mensibus: vel ex pleura, ut in pleuritide, vel ex pulmone, ut in peripneumonia & vomica.

SIGNA affecti thoracis sunt modica aut nulla expurgatio sputi in peripneumonia & pleuritide: infecta medici curatio intra 14. diem: rigor qui antea non fuerat: gravitas partis, concussio in loco empyematis, fortis dyspnaa. Plura in capite de pleuritide & peripneumonia & hamoptysi.

IX. VOMICAE pulmonis subjectum pulmo est, qui vel inflammatur, unde peripneumonia, vel ulceratur in materia mordaci, ut in phthysi. Quod si sparsa materia in phlegmone in sinum se colligat, vomicam, id est, tumorem ad suppurationem uergentem facit, qui & apostema appellari solet. Rursus vomica rupta materiam purulentam effundens in cavitatem thoracis, empyema efficit. Ex quibus apparet, qua sit horum affectuum inter se cognatio. Id verò etiam fieri solet interdum, ut nulla precedenti inflammatione materia in pulmone coaceruetur, cystiq; obducatur, ita ut oui magnitudine interdum extusatur.

SIGNA sunt actio laesa thoracis & pulmonis, quae intercipitur, puris ex pulmonibus expectoratio, & alia de quibus in phthysi & empyemate.

X. ASTHMATIS subjectum principale pulmo est: minus principale, thorax, spatium à thorace comprehensum, cor, diaphragma & musculi. Respiratio enim praecipua thoracis actio est. Agit autem thorax per musculos tum pectoris, tum abdominis, & potissimum per septum transversum. Musculi enim thoracem mouent: ut thorax pulmonem. Diaphragma instrumentum est lenis respirationis: thorax verò cum suis musculis, uehementis, qua fit cum exsuffiatione.

Pulmo dilatatur & comprimitur, afficitur & patitur. In pulmone autem sunt ista quatuor: pulmonis mollis substantia, vena arteriosa, arteria uenosa & trachaa arteria, qua quam primum ex faucibus de-

orsum protenditur, mox in duos pares ramos bipartita, unum dextris pulmonis bronchijs, alterum sinistris porrigit, qui demum in ramulos ferè innumeros, quos bronchios & bronchia vocant, per pulmones distributi, parem cum pulmone sedem occupant, & proximè ad respirationem faciunt.

Rursus pulmonum bronchia laborant vel omnia, vel quadam, et si quadam, uel dextra, uel sinistra.

FINALE organum est cor. Respiratio enim propterea fit, ut cordis calor refrigeretur, & ventilatione seruetur. Calidum namq; omne, ut ait Hipp. moderato frigido uiuit.

Afficitur autem pulmo eijusq; bronchia, aut per se, aut per consensum.

Per se, cum illi morbus causaue morbi immediatè insidet, ut intemperies vel humor, qui ibi, ut indigena, colligitur.

Per consensum, cum aliunde coafficitur, positiuè uel priuatiuè.

Positiuè, cum aliquid praeter naturam aliunde excipit, ut humorem vel à toto corpore in plethora, vel à capite in catarrho, quem autumnale frigus interdum exprimit: à matrice in suffocatione uteri, quae uapores malos suggerit: ab alijs partibus aliter affectis similiter.

Priuatiuè, cum spiritus animalis uel aer utilis, qui ex una parte naribus uel ore, in spirando attrahitur, ex altera uero parte inutilis cordi, expirando expelli debet, uel impeditur, uel deficit.

Impeditur aer expirandus & inspirandus ab angustia meatuum spirabilium organorum, eaq; uel coalescentia, uel subsidentia, uel compressione, uel constipatione, uel obstructione.

A coalescentia, eò quod pulmo ad plenam certis locis per fibras agglutinatur, cuius historiam raram recitat Ioh. Bauhinus lib. de thermis Bollenfis.

A subsidentia, cum pulmo uel coarctatur, uel corrugatur, ob ariditatem, uel etiã nimium madorem, qua subsidere faciunt bröchia, & ad motu rebellia, id quod chymicis nonnunq; contingit et auri ferrig; fabris.

A compressione, cum aliquid extra bronchia pulmones comprimit, ut si gibbus nascatur distortis ad interna uertebrae ob humorem pituitosum,

que

qua occupantur spinae ligamenta, quod sensim euenire solet: aut si tumor uel inflatio vicinarum partium, ut spinae & diaphragmatis comprimat pulmonem: uel tumefactio infernarum partium, ut ventriculi & totius ventris inferioris in hydrope partes spiritales sursum impellat, uel pendulum epaer & lien deorsum trahat: uel totus thorax in supino decubitu supra spinam concidit, & pulmonem in angustiam abducit: uel leues arteriae turgescens asperam arteriam comprimunt, uel pectus plus quam decet natura adstrictum est. Ex quo apparet, cur supinus homo asthmae fatigatus decumbere non possit.

A constipatione, cum aliquid praeter naturam intra bronchia existit, ut pus, crudum tuberculum, grando & calculus, in qua superfuitates in pulmonibus generate uel caloris circumiacentium partium degenerant. Hinc suppurati etiam difficulter spirant.

Ab obstructione, cum flatus aut humor copiosus crassusq., uel utrunq., simul intra bronchia continetur, non tantum ductus organorum obstruens, sed & tendendo diaphragma opprimens.

Deficit spiritus animalis, cum aut nerui qui ad pectus & diaphragma feruntur, conuelluntur, uel soluantur: aut spinalis medulla obstruitur, aut uertebrae colli intrinsecè uel extrinsecè luxatae sunt: aut guttur in synanche obstructum est, quo in casu aer per os nec attrahi, nec expelli potest.

SIGNA pulmonis in asthmae simpliciter affecti sunt causa, effectus & utraque simul.

Causae sunt, quaecumq., pulmonum meatus claudunt, ut aer putridus, cruditas, otium, somnus à cibo, locus humidus, & alia, de quibus alibi.

Effectus est respirandi difficultas, qua in omni motu concitatiorè maximè se profert, dolor aliquis in pectore & praecordijs, interdum & in scapulis, respiratio creberrima & uelox, modo non sit ex imbecillitate: tunc enim non est uelox.

Utraq., simul sunt iuuantia, Profsunt quacumq., calori aucto satisfaciunt, ut si agrotans ad fenestram uel alium locum adducatur, ubi frigidior ac magis apertus aer expiret, aut flabellis is qui alioquin cali-

dior est circa agrotantem frigidior reddatur.

SIGNA pectoris affecti per se & per consensum sunt, magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Nam si asthma sit uehemens, si solitarium, si perpetuum, si pectori accommodata praesidia profunt, pectus per se laborabit. Per consensum, si contra. Interdum uerò laborat per se & per consensum simul, similiter ut in dolore capitis. A quam parte consentiente afficiatur, id symptomata illius patefacient. A capite enim u. g. noxam accipiet, si destillatione laboreat, aut sit ad catarrhum dispositum, subitò asthma adueniat, catarrhæ crescente inualescat, remittente, mitescat. A tumore hydropico, si asthmaticus tussè non careat, qua tamen sicca est & sine sputaminibus. Et sic de alijs.

SIGNA distinctiua partium sunt haec.

Si mollem carnem pulmonis obsederit materia, tussis laboriosa fatigabit, aderit stertor, dilatatio constrictione difficilior erit, sputum indolenter excernetur. Pulmo enim sensum nisi grauitatis non habet. Si angustia ob flatus in pulmone sit, expirationis & pulmonis constrictionis pariter difficilis reddi solet: nullum pondus sentitur, nulla tussis.

Si tuberculum obsederit, sensim increuit materia, sine stertore, sineq., expectoratu, & in exercitio praeter morem anhelat.

Si materia stabulatur in arteria uenosa, uel in uena arteriosa, asthma ferè erit sine tussè, uel saltem cum inani tussicula.

Arteria uenalis si fuerit à materia occupata, tremulus edetur pulsus, ac ipsum etiam cor tandem in tremorem ac syncopen abripitur.

Si malum confederit in leuibus arterijs, qua nascuntur ex uena arteriosa & ex arteria uenosa, praecessit pulsus inaequalis, ut euenit Antipatro.

Si sit materia in trachea arteria, aderit grauitas pulmonum, sonus, stertor et sibilus, aeger conqueretur se maiore anxietate emittere q̄ admittere spiritum, cartilago tussè interdum reijcietur. Quo autem materia morbifica longius recesserit ad exiguos tracheae arteriae ductus, eo agrius expectorabitur,



Si fuerit ab affecta spina uel neruis, tunc etiam partis alicujus resolutio aderit.

Thorax laborat, si cum dolore sputū excernatur. Hic enim totus ossis & nervosus exactè sentit. Si pars illius exterior affecta sit, grauius in partem affectam decumbet: si pulmo contra.

Angustia ob flatu inter pulmonem & pectus si fuerit, inspiratio & pulmonis dilatatio difficilis erit.

XI. PVLMONARI pars affecta pulmo est, ut asthmatis, cuius & quædam species est, ut Aretæus testatur. Cum uerò triplex illius differentia constitui soleat, ut in nomine asthmatis diximus, nempe dyspnæa, asthma & orthopnæa, non temerè aliquis ad orthopnæam, summum asthmatis gradum referat. Signum proprium est frequentissima respiratio, irritus labor extuſiendi, & sputum si quod redditur, exiguum, album, rotundum, grandinosum.

XII. SCIRRHI & suppuratiōis epatis partem affectam ipsum nomen affectus denotat. De quo cum supra inter morbos actos explicatio etiam huc pertinēs contineatur, hoc loco nihil aliud explicandū restat.

Obstructionis uerò epatis, quæ frequenter admodum contingit, & mater morborum epatis dicitur, fitq; ab humore (alioquin enim esset uel constipatio, uel compressio uel angustia species.) subiectum sunt uena capillares, quæ per epar sparguntur, ejusq; substantiam uel cauam, uel gibbam, uel utraq; simul.

Afficiuntur autem uena capillares tum per se, tum per consensum.

Per se, cum primariò jecur imbecillum est in noxijs humoribus siue attenuandis siue expellendis.

Per consensum, cum uel uicina partes, ut lien & cystis fellea non attrahit: uel remota partes, ut uentriculus & cerebrum malè concoquunt.

SIGNA uenarum capillarum epatis simpliciter affectarum sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causæ sunt, quæcunq; obstruunt, ut cibi uiscidi, crassi, dulces, astringentes, uita otiosa, somnus multus, retentio fecum, hemorrhoides, menses, exercitia & balnea statim à cibo, medicamentajecori parum dextrè adhibita, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt actio laesa, mutata qualitas, & mutatum excrementum.

Actio laesa est pigrities ad motū, & grauitas jecoris, quæ uel aliqua est, uel nulla. Si aliqua, uel permanens, uel mutabilis. Permanens est, ab humore calido. Mutabilis à uapore. Nulla ab humore frigido.

Mutata qualitas est pallor quidam faciei & totius corporis, eò quod sanguis ille fluidus non ut antea generatur.

Mutatum excrementum est lotium exiguum, eò quod obstructio transitū impedit.

SIGNA distinctiua sunt hæc.

Gibba pars si obstruitur, adest durities abdominis, septum transuersum comprimitur, unde respirandi difficultas, excretio minus liquida. Sima pars obstruitur, si tactu nihil percipitur: dolor adest dextræ hypochondrij magis profundus, minor difficultas anhelitus & impotentia ad motum, inappetentia & sitis, & diarrhæa, & fluxus epaticus affligit.

Si materia obstruens meatus, qui ad uescam felleam pertinent, occupat, color aderit citrinus: si meatus ad lienem, color erit niger: si ad alias partes non erunt signa icterici, ac in gibba parte epatis excrementa erunt sanguinolenta, quia sanguis distribui non potest: in sima parte epatis, excrementa non erunt sanguinolenta, quia chylus nondum in sanguinem conuersus est.

XIII. SCIRRHI & empyæ lienis subiectum similiter ex ipso nomine cognoscitur. De quo & ipso explicatio prolixior necessaria non uidetur, cum non sit dissimilis explanationi scirrhi & suppuratiōis epatis. Est enim lien alterum epar, & quod ibi dictum de dextro, hic de sinistro latere intelligi debet.

Obstructionis uerò lienis pars affecta sunt exigua illius uenula, quæ afficiuntur tum per se, tum per consensum, ut uenula epatis, de quibus præcedenti capite, unde hæc explicatio peti potest.

SIGNA sunt causa, effectus & utraq; simul.

Causæ sunt, quæcunq; humorem crassum generant, ut cibi crassi & uiscidi, calū crassum, aqua canosa & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt grauitas & punctio sinistri hypochondrij, tarditas in motu, timor & tristitia præter rationem, & interdum melan-



melancholica insania, prauus totius corporis color, lividus, plumbeus, potissimum faciei: niger icterus, ulcera in cruribus, spuum copiosum, serum copiosissimum quod per venas expurgatur, urina nigra humori melancholico permixta.

Vtraque simul sunt, propensio naturalis ad hoc vitii genus, & quod iuuant diuretica, & ea quae sudores promouent.

SIGNA distinctiua doloris splenici & colici sunt haec.

Colon enim intestinum spleni alligatur & incumbit, quod flatibus distentum saepe fallit. Sed dolor splenicus grauis est: colicus distendens & mollis. In splene dolor grauis, in una parte fixus & sinistra: in colo acutus, mobilis & vagus. In colico totus venter flatibus distenditur, in splenis affectibus sola pars sinistra.

Scorbuti vero pars affecta principalis est lien: minus principalis est os, gingiuae, crura, nerui, epar, cutis totius corporis.

Afficitur autem lien tum per se, tum per consensum.

Per se, cum vitioso humore melancholico maligno, aut sincero, aut pituita mixto repletur & obstruitur.

Per consensum, cum aliunde coafficitur, ut à tota praecordiorum regione prauis succis referto: imprimis vero ab epate è norma proprii sui temperamenti procul egresso.

SIGNA lienis affecti sunt eadem quae obstructionis, eo excepto, quod ðθείον hic accedit, hominibus proletarijs. ignotum: prudentibus tantum obuium: & usus esculentorum & potulentorum nauis, usitato-ram, ut panis biscocti & mutidi, carniuum & piscium sale fumoq; duratorum, & aqua maritima & canosa: maxime in agrotis Aquilonijs.

SIGNA partium consentientium affectarum sunt illarum symptomata, ut oris & gingiuarum fator, pruritus, laxitas, dentium vacillatio: tiliarum discolors macula: neruorum, resolutio, crurum, totius corporis lassitudo, & hinc inde macula: cordis, pulsus similis quartanarijs, epatis: urina crassa, rubicunda, fatida.

XIV. MORBI REGII pars affecta Aretaeo ð παντάδης est, id est, uniuersum corpus. In hoc enim morbo bilis toto corpore redundat, nec ulla omnino pars siue externa siue

interna est, in qua diffusa non sit, solis aliquando exceptis intestinis. Alij subiectum faciunt cutem totius corporis: alij summam extimamq; corporis partem colore praeter naturam defadatam. Neq; enim tantum cutis, sed & alba oculorum membrana vitioso colore tinguntur. Icterus igitur alij aliter deservunt. Quibusdam enim est bilis per totum corpus effusio: alijs biliosi excrementi per summa corporis effusio. Afficitur autem cutis tota in ictero: in alijs affectibus ut in erysipelate & vitiligine pars tantum, ea nimirum quam erysipelas & vitiligo occupat. In brutis ictero laborantibus cutis non afficitur, sed oculi membrana tantum, in homine utrunq; simul, ed quod cutis hominis raram & tenuem: brutorum densam & crassam texturam habeat.

Afficitur autem totum corpus, vel per se, vel per consensum.

Per se, si sit iusto calidius, unde alimentum etiam probum in cutem delatum in bilis naturam conuertit.

Per consensum, cum materia biliosa aliunde affluit, ut ab epate, liene & vesicula fellis. Sed & ut ait Aretaeus, ventriculo, renibus, laxo intestino, & alijs partibus vel obstructione phlegmoneue infectis, vel per morborum biliosorum crises, vel suppressis mensibus, ut in virginibus & quibusdam mulieribus. Rursus vesica fellis vel ipsa obstruitur, vel meatus illius, siue à vesica ad intestina, siue à jecore ad vesicam tendens.

SIGNA affectarum in ictero partium in genere sunt manifesta & occulta.

Manifesta sunt, quae visui patent. Pallor enim in albis oculorum & partibus faciei, quae temporibus propinqua sunt, item in malis, palmis manuum atq; in pedibus apparet.

Occulta sunt, causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quaecunq; bilem cumulat, aut in summa corporis effundunt, ut intemperies, obstructio, inflammatio epatis, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, pruritus & sensus aculeorum uniuersi corporis, pigrities, motus sensusq; hebetior, gustatus amarorum non amarus, non tamen dulcis, dulcium vero amarus, pulsus rarus & durus: color et sudor

00 corporis



corporis bilis speciem referens: urina crassa & impura, dejectio alui sicca & alba. Id vero non proditur à certis autoribus, ictericos omnia qua vident iudicare esse flaua & varijs imaginibus vexari: nec confirmat experientia.

Vtraq; simul sunt iuuantia. Iuuant ea que bilem propulsant: nocent qua augent.

SIGNA totius corporis per se & per consensum affecti sunt, numerus, tempus & iuuantia. Si enim materia non fluat ab epate, si morbus non uniuersim sed sensim nascatur, si iuuent corpus apposita remedia, sed & si totum corpus tactui sese calidum offerat, & excrementa ut urina et dejectio non, vel parum mutantur, corpus per se affectum erit. Alimentum enim quod corrumpitur sensim accedit. Per consensum, si contra.

SIGNA partium consentientium sunt earum symptomata & morbi, ut epatis affecti signa obstructionis, inflammationis & scirrhi, de quibus supra.

SIGNA vesiculae affecta sunt, si absq; febre deiciant alba alui excrementa, urinae sunt flaua, grauius dextra hypochondria, color cutis flauus.

SIGNA meatus à vesica ad intestina tendentis obstructi sunt, si prater flauam aut urentem urinam dejectio reddatur alba, vel nimis colorata rufa, & sapius quasi canium dura. Signa meatus à jecore ad vesicam fellis tendentis obstructi sunt, si urina flaua & saepe uirens reddatur, sed sine grauitate, ubi imbecillitas tractionis adfuerit: cum grauitate, ubi obstructum epar fuerit.

SIGNA lienis affecti sunt signa obstructionis illius, tensio in sinistro hypochondrio, vigilia, abundantia cruditatim & flatuum, inappetentia, color cutis niger.

SIGNA epatis & lienis simul affecti sunt mixta utriusq; symptomata, & imprimis color cutis ex utraq; bile mixtus & uirescens, unde ex viridi flauescit, ut in puellis quibusdam, qua $\chi\lambda\omega\pi\alpha\delta$ sunt, id est, ex viridi flaua. Signa affecti cordis à veneno affecti sunt eadem qua veneni, color ad viridē vergit & mutatur pulsus.

SIGNA affectarum aliarū partium ut in febribus per crises est antecedens febris

biliosa ac potissimum tertiana continua admodum erodens atq; acuta, post cuius summum vigorem icterus cum maxima morbi remissione repente superuenit. Nulla vero qua adsit praterea in jecore aut vesicula fellis obstructio, aliaue prater naturā affectio: si iuuant item, qua robur natura addunt, bilemq; ad cutem transmittunt, & leniuntur incommoda omnia, qua ex crisi aderant.

XV. CACHEXIAE subiectum duplex est: totum corpus, & pars illius aliqua, ut caput, cerebrum, oculus, pulmo. Rursus totum corpus afficitur vel per se, vel per consensum: ut in nomine cachexia diximus, unde haec peti possunt.

SIGNA uniuersalis cachexia sunt causa, effectus & utraq; simul.

Cause sunt, morbi longi ut plurimum, qui antecesserunt, praesertim epatis, splenis, intestinorum: itē consuetudo excretio prohibita.

Effectus sunt, difficilis spiratio, imbecilla vires, ita ut crura inter eundem vacillet, fastidium, sitis, in gingiuis caliditas. Color cum virore albicans flatus.

Vtraq; simul sunt iuuantia. Profunt qua calefaciunt & siccant.

SIGNA particularis cachexia, gracilitas aut pallor, aut tumor unius partis.

SIGNA distinctiua cachexia & aliorum cutis morborum sunt haec.

Et bona fiat nutritio, iusta requiritur appositio, agglutinatio & assimilatio.

Ex laesa appositione sequitur atrophia, id est, alimenti priuatio. Ex praua agglutinatione, tum nutrimentum apponitur quidem, sed non agglutinatur, fit cachexia. In vitiosa assimilatione nutrimentum agglutinatur quidem, sed manet vel crudum, vel adustum. Si crudum, album, pituitosum, fit morphaea alba. Si adustum & biliosum, fit scabies, impetigo, elephas. Rursus sanguis aquosus, in epate genitus, & venas ingressus, easdem vel immodicè replet, vel non immodicè.

Si immodicè, aded ut praemultitudine aqua, oscula venarum aperiat, & è venis exeat, fit anasar-

ca. Si modicè, ut oscula non aperiat, fit ca-

chexia. PARS



PARS AFFECTA MORBORVM

DIUTVRNORVM LIBRO SECVNDO.

I. HYDRO-PIS subjectum duplex est: aliud uniuersalis, aliud particularis.

Uniuersalis hydrophis pars affecta Aretæo est ἐξ ὅλων, id est, habitus corporis: & ἀσπληνία, id est, viscus, imprimis epar. Particularis, membrum patiens est una aliqua particula, ut caput, thorax, jecur, lien, uterus. Rursus habitus corporis, vel totus afficitur, cum exturgescit, ut in anasarca: vel abdomen tantum, seu imus venter in maiorem molem ingrauescens.

In anasarca humor aquosus non solum in ipsis spatij carnis, siue inter meatus & poros ipsius carnis totius corporis, ut aqua in foraminibus spongia colligitur (quod sensit Aurel.) sed & in venis, in quibus sanguis aqua mixtus, simulq; cum eo generatus redundat, quod graues alij autores sentiunt.

Rursus abdomen vel totum affectum est, ut in tympanite, vel non totum, sed spatium tantum inter epiploon, peritoneum & intestina, ubi aqua colligitur. Quodenim Alexander ait in tympanite flatum per totum corpus diffundi, id vel mendoso textui ascribi debet, vel veritatem non habet. Flatus enim in corpore genitus vel dilatatur, vel in unum locum colligitur. Si expanditur in totum corpus, mox euanescit, ed quod à quolibet vel minimo calore discutitur. Si colligitur in certo loco, palpitationem vel œdem a flatu osum facit. Aquosus verò humor in anasarca per totum corpus: in ascitè per ventrem tantum coaceruatur, ed quod aqua genita in epate venas vel permeat, vel non permeat. Si permeat, in uniuersum corpus spargitur, & anasarcam facit. Si non permeat, ad renes abit, ibiq; male purgata, in ventrem tanquam utrem effunditur, siue propter solam alicujus uasis disruptionem, ut quidam ajunt, sed perperam: siue propter transcolationem per cacos meatus, id quod fit ut plurimum. Si ruptis sit uasis, ascites repente oritur, estq; incurabilis. Si rarefactis poris peritonæi, sit paulatim & longo tēpore. Non omnes autem inuadit hac affectio, ed quod non aequè omnes uasa ita relaxata habent, ut aqua transcolari possit. Ex quo apparet cur aliquando post exitum lapilli renu subito hydrophis fiat. Ruptus enī aliquis ureter est, unde urina cum in vesti-

cam non abeat, in ventrem effunditur.

Epar alterum subjectum est, idq; commune omnium specierum hydrophis.

Omnis enim hydrophis est affectus epatis frigidus, nec aqua vel flatus aquosus (à quibus hic affectus hydrophis appellatur) ab alio viscere, q̄ ab eo gignitur, quod sanguinem, adeoq; omnem succum generat. Ut igitur nulla febris nisi laborante corde: ita nullus hydrophis, nisi affecto epate.

Quod si hydrophis uniuersalis sit mixtus, pars affecta erit tum habitus corporis, tum abdomen simul. Longa enim experientia obseruatum est, raro aut nunq̄ tres hydrophis differentias simpliciter & solas reperiri, sed ferè misceri inuicem & confundi, nunc altera cū altera, nunc simul omnes: ut & Aretæus testatur: singula verò à vincete vel aqua, vel flatu, vel pituita nomen obtinere solent.

Afficitur autē habitus corporis vel per se, vel per consensum, vel per se & per consensum simul. Per se, dum caro corporis ueluti in aquam resoluitur, illa se primum epate, tandem verò & ipso contagione refrigerato. Per consensum, cum ab epate primum refrigerato ladicur, quod aquosum humorem continuo ad habitum transmittit, quo ubi peruenerit, hydrophis primum existit.

Epar similiter vel per se, vel per consensum afficitur. Per se, cum illi morbus, causa morbi insidet, ut frigida intemperies caloris in epate existentis, obstructio, tumor, scirrhus. Per consensum, cum aliunde coafficiur, idq; positiue & priuatiue.

Positiue, cū epar frigiditate, q̄ alia partes primò habuerūt, secundariò accipit vel à liene, vel ventriculo, vel mesenterio, vel intestinis, imprimis jejuno, vel ab alijs partibus, ut vesicula fellis, pulmone, renibus, septo trāsuerso. Nā splen magnus frigore suo epar inficit: similiter ventriculus, mesenterium, jejunū, frigore nimis affecta per alterationē continuam epar refrigerant. Ac magnus quidem lien, quia humorem melancholicum trahit, unde intumescit, & frigus epati è regione posito cōmunicat.

Intensa autē jecoris frigiditas, ascitem remissior, anasarca & tympaniten facit. Sed et tympanites imprimis frigiditate uentriculi sequi solet.

Do 2. Priua-



Privatiuè, cum non affluit quod affluere debuit, ut spiritus vitalis qui deficit vel per inediã, vel à corde refrigerato, vel per immodicas sanguinis ex naribus, utero, hamorrhoidibus profusiones: vel per suffocationē à plethora, cacochymia, suppressa cōsuetà aliqua vacuatione. Tum eni excrementa restuant in epar, unde suffocatur.

HYDROPS igitur ut plurimum succedit longis morbis, ut phthisi, hectica, asthma, ictero, diarrhœa, podagra, dolori coxœdico, continuis & longis febribus. Partibus enim, qua in his morbis laborant, epar propter vicinitatē & vasorū magnorum societate consentit: vena ab epate exorta in prædictis morbis debilitantur, calor natiuus, qui mediocris, à febrili qui exuperans extinguitur: aqua in spatio thoracis in asthma collecta in ventrem effunditur.

SIGNA totius corporis per se & per consensum affecti sunt, ut in alijs morbis, imprimis iuuatia. Iuuant habitui applicata remedia, si is per se sit affectus: nocent, aut parum iuuant si per consensum tantum ledatur.

SIGNA epatis per se affecti sunt similiter eadē. Laditur non tantum epar, sed & muscoli abdominis & septum transversum, tuus arida aut breui desinens, alui fluor ditius perseverans, nec tamen hydropem leuans. Si sit cum inflammatione jecoris, pulsus erit densus & durus: si sine inflammatione, idem erit mollis & laxus. Si per consensum affectum sit, contrã.

SIGNA epatis per se & per consensum affecti, id est, hydropis in genere alia sunt manifesta, alia occulta.

Manifesta sunt, qua sensus, id est, visus & tactus percipit. Tumentem enim habitum corporis & ventrem oculis videmus, & manibus tangimus.

Occulta sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quacung, habitum corporis, vel epar refrigerant, ut immoderatus fructuū, lactucarū, herbaceorū usus, gelida largior frequentiorq, potus, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, spirandi difficultas, tumor, grauitas, cibi fastidium, sitis, inflatio pedū, febricula interdum, vitiatu color, ex virore nimirum albicans, urina pauca & rubra.

Vtraq, simul. Ulcera hydropicorum proprie incurabilia, vel saltē curatu difficilima,

ut etiam in lienasorum ulceribus contingit. SIGNA distinctina specierum sunt hæc.

Anasarca pueros magis affligit, ascites iuuenes, senes uterq, hydrops, magis tamen tympanites.

Anasarcam sequitur, ait Arætem, fræquēs animi deliquium, imprimis morte imminente, & spes bona sanitatis, cum tamen maximum periculum impendat: cui contrarium in alijs morbis contingit, in quibus agroti timent, quamuis non ita periclitentur. Sunt verò & alia signa, ut pulsus mollis & undosus, inflatio non tantum ventris, sed et totius corporis, pars affecta compressa digito, foveam diu durantem retinet, anheliu fator, & vomitus dejectionq, alborum & crassorum humorum.

Asciten demonstrat pulsus cum tensione subdurus, minor & crebrior quàm conueniat, cutis tenuis & tensa, præsertim circa collum, jugulum & circa pectus, frigus partium, torpor corporis, fragor & murmur aquæ motæ circumuerso corpore, tanquam utre aquæ semipieno agitato: pauca stercora, pauca urina.

Tympaniten ostendunt pulsus subdurus, aliquantisper tensus, celerior, minusq, imbecillis quàm in ascite, eructationes fræquētes, qua nonnihil iuuant, inflatio totius ventris, uniuersi autem corporis macies, tumor rotundus & tensus: venter percussus ut tympanum resonans.

Partes affectæ & signa particulari hydropis sunt hæc.

HYDROCEPHALI pars affecta spatium est inter cutem & caluariam contentum.

Afficitur vel una tantum pars capitis, dextra vel sinistra, vel utraq, simul.

SIGNA sunt manifesta. Apparet enim tumor prementibus digitis cedens, mollis & concolor, interdum indolens.

Occulta sunt, causa & effectus.

Causa, eaq, eadem qua ædematis: in infante verò mater vel obstetrix. Nam illa dum utero gestaret, ac præsertim duobus postremis mensibus frigidiorē & humidiorē uictū retinuit. Hæc verò infantis caput pressit, unde humor aquosus ob raritatem meatuum in partem affectam affluxio.

HYDROPS thoracis pars affecta vacuū thoracis est, quod interdum copiosa aqua repletur. Demonstrat id sectio cadauerum.

in qua



Percepitur ab agrotante in thorace ut ascites in ventre. Fieri putatur, cum pulmo tuberculis aqua plenis scatet, quibus disruptis hydrops thoracis gignitur. Huic cognatum empyema est.

HYDROPI pulmonis pars affecta pulmo est, cui aqua innatat. Affectum prater alia, ut perceptam agitationem humoris aquosi, interdum velox, interdum rara & tarda respiratio ostendit. Viscus enim hoc ubi frigida intemperie laborat, continentem respirationem non requirit: nisi noua materia à capite ed ingruat. Huic cognatus est abscessus pulmonis.

HYDROPI uteri pars affecta est uteri capacitas, vel substantia, vel spatium inter uteri tunicas. Aquosus enim humor vel pelliculis quibusdam in uteri capacitate adnatis continetur, vel inter uteri tunicas concipitur, vel humor pituitosus uteri substantia inhaerescens, tumoris instar testes exercet. De hoc Aretaeus prolixius, & Massaria lib. 4. cap. 10. Signa sunt tumor in imo ventre aniuersario uteri amplitudinem circumscribens, latus & mollis, & bonus decensq; color corporis. Tumor enim à scirrho durus est: ab affecto vero epate calorem corrumpit.

II. DIABETIS subjectum principale Aretaeo à πρῶτον καὶ πᾶσι, id est, uniuersum corpus, quod carne & membris constat: partes affecta minus principales sunt, renes & vesica. Ut enim in hydrope corpus in aquam: sic in diabete idem in urinam mutatur. Alijs & quidem rectius partes affecte principales renes sunt: minus principales, vesica, totum corpus, ventriculus, vena mesaraica, epas. Renes enim à vehementi calore trahunt potum à jecore, jectur à venis mesaraicis, hæ à ventriculo, & à solidis partibus, priusquam ille ab his immutari concoquiq; potuerit, unde totum corpus consumitur, ac velut liquefscens in aquam resoluitur. Tractus autem potus minime ob immodicam ejus copiam & renium imbecillitatem retinetur, sed sua gravitate delabitur in vesicam, qua non trahit sed recipit.

Renes igitur afficiuntur tum per se, tum per consensum.

Per se, cum laborant ex intemperie calida & sicca, per quam attractrix deprauatur,

& retentrix leditur.

Per consensum, cum aliunde coafficiuntur, ut ab habitu totius corporis & alijs partibus, potissimum à jecore, uenis & arterijs, quacum ab humoris serosi abundantis acrimonia, aliaque prava qualitate irritantur, per vias urina aptissimas, renes & vesicam molestum sibi humorem expellunt. Ex quibus apparet diabetem fieri non tantum per modum attractionis, sed & transmissionis.

SIGNA partium affectarum ut totius corporis & renum sunt causa, effectus & utraque simul.

Causa sunt, quacumq; totum corpus & renes nimis calefaciunt, ut potus vini generosi, morsus dipsadis, abundantia acrimum succorum, vehemens algor aquositate exprimens, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, anxietas, praecordia graui, colliquatio renum, dissolutio totius corporis, insignis in internis visceribus feruor, calor & frigus à ventre in vesicam tendens, sitis vehemens, ejus quicquid bibitur simul ut acceptum est, rejectio, lumborum, coxarum ac testium tumor cum gravitate, si forte urinam aliquantisper contineant, urina multa & cruda sine sedimento, os humiditate priuatum, salua atra & spumosa.

Utraq; simul sunt iuuantia. Pro sunt renibus applicata idonea praesidia, & intrus adhibita, qua cum crassitudine aliquem lentorem habent, ut carnes testudinum, capita hedorum, lac. Nocent diuretica. Si lotium fluat, quia attrahitur ab immodica renum caliditate, est diabetes, in quo refrigerare oportet. Si transmittitur, est diabetes notus, & potius calefacere oportet. Si per utrumq; modum simul, refrigerantia calefacientibus temperari conuenit.

SIGNA distinctiua sunt hac. Diabetes continetur urina profluuio, ut species genere. Vrina enim copiosior effunditur, vel quia attrahitur & transmittitur simul, ut in diabete. Vel quia transmittitur tantum, ut in ureticis, stragulas nocte permingentibus, & per crises.

Stragulae sunt saepe mingentes vitia vesicae, cum vel deflusione & multitudine urinae, vel frigore, vel ictu, vel casu, vel vulnere, aut similibus, nerui qui musculum claudunt, resoluuntur, tuncq; prater voluntatem urina noctu diuq; effluit.

••• Stragulas



Stragulas nocte permingentes sunt, qui urinam non satis continent, vel propter siccitatem, ut senes: vel propter laxitatem & mollitiem, ut pueri. In profluvio critico acri non stitunt & urina sunt crassa, non tenues, cruda & aquea, ut in diabete exquisito.

III. IV. RENVUM & vesica affectuum subjectum ipsum nomen indicat. Affectus autem utriusq; partis sunt varij, ex quibus aliquos tantum Aretaus recenset, ut in nominibus morborum diximus: imprimis calculus, cujus explicatio non alia est, quam ea quae in morbis acutis habetur, unde peti potest.

SIGNA profluvij sanguinis ex renibus sunt haec. Si rupta aut erosa vena sanguis effluit, aut aliunde ad renes transmittitur, quod accidit aliquando mutilatis, nec non ijs, quibus menses aut hamorrhoides subsistunt, concretus sanguis subsidet. Sin sanguis pra imbecillitate non discernatur, lotium cruentum in vesicam descendit, urina veluti tincta sanguine apparet, concretus sanguis non subsidet.

F. GONORRHOEAE subjectum aliud principale, aliud minus principale.

Principale sunt membra generationi destinata, ut testes & vasa spermatica, quae flexus multos instar capreolorum varie implexos habent, in quibus semen naturaliter & generatur & retinetur. Minus principale est, pudendum tum viri, tum mulieris, per quod tanquam viam semen genitale excernitur: quodq; in viris vel flaccidum vel extentum existit. Gonorrhoea enim non solum viris, sed & mulieribus, & quidem magis abominanda accidit.

Afficitur autem membrum spermaticum, vel per se, vel per consensum.

Per se, cum illi morbus, causaue morbi inheret, ut intemperies qualibet insignis, & potissimum humida: vel mala compositio, ut nimia dilatatio: vel paralysis, vel convulsio, vel lues Venerea.

Per consensum, cum aliunde coafficitur, ut vel à capite in catarrho: vel à renibus nimium excalescētis: vel à toto corpore siue copioso eoque bono sanguine, siue tenui & acri abundante, & ad testes transmittente.

SIGNA membrorum spermaticorum simpli-

citer affectorum communia sunt causa, effectus, & utraq; simul.

Causa sunt, quaecumq; vasa spermatica debilitant, dilatant, & renes lumbosq; excalescunt, ut immodicus coitus, alimenta pravi succi, diuturna ac violenta exercitatio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt, fieri effeminatum, molle, segnem, timidum, extenuatum, praesertim circa lumbos, pallidum, & circa oculos canum, incuruum, imbecillum.

Praecipuus autem effectus est assidua seminis eaq; inuisa egressio, ex qua sola melius quam ex alijs signis omnis gonorrhoea cognoscitur. Ex quo apparet similem esse profluvio, in quo quis urinam inuitus ob resolutam facultatem contentricem emittit.

Utraq; simul sunt iuvantia. Pro sunt quae vasa spermatica exiccant & adstringunt.

SIGNA per se affectorum vasorum ab intemperie humida sunt eadem, quae superflua humiditatis, ut causa humectantes, frigida potus, aquae dulcis balnea. Nocent quae relaxant: pro sunt, quae astringunt.

A nimia dilatatione seu apertione vasorum orta gonorrhoea per essentia signa sunt, immodica Venus, nimium exercitium, immodicus motus, non intentum membrum genitale.

A paralysis, ut & ob humoris tenuitatem affectorum signum est, nullus dolor in tali fluxu, nulla pudendi erectio, semen pannos non vel parum inficiens, corpus marasmo sensim macrescens.

A convulsione si fuerit, dolor inguina & partes vicinas obsidet, penis ut in priapismo erigitur.

A lue Venerea si fuerit, antecessit attritatio hac lue laborantis, adsunt ulcuscula pudendorum, bubones inguinum, pustulae capitis, faciei, frontis, profluvium capillarum, ulcus in ore, cephalaea, virus album ac subcitrinum excidens, & iuvant, quae hanc luem propulsant: non iuvant caetera praesidia.

A capite si fuerit, adsunt catarrhi indicia.

A renibus existit, si semen effluat crassum & viscidum, idq; interdum urinam antecedens, interdum sequens, aliquando simul emanans.

A copia



A copia seminis oritur, si γονόσπος sit boni habitus, & eam abundantiam paulatim contraxerit, dum multis alimentis boni succi diutius usus est, diu à Venere abstinuit, profusionem seminis facile tolerat, & post paucos dies educta copia seminis conualescit.

Ab acredine seminis proficiscitur, si ténigo accedat, si semen cumuletur & cum aliqua delectatione fundatur, si mordax, præcalidum, fetidum sit, si superior vita biliosum sanguinem generauerit. Ex quibus apparet gonorrhæam fieri pudendo vel staccido, vel extento.

SIGNA distinctina gonorrhææ & uterini fluoris sunt hæc. In utroque vitio humor assidue promanat: sed in gonorrhæa multo crassior, & cum ulcere ferè ab acri virulentior, excremento, nec cessans fufus menstruis.

In fluore uteri autem tenuior sine ulcere, & cessans in ipsis menstruis, & paulo post.

VI. AFFECTIVVM STOMACHI subjectū est stomachus, id est, orificiū vētriculi superioris, de quo cum sit pars ventriculi sequenti capite iam agetur.

VII. AFFECTIVVM ventriculi subjectū ex nomine innotescit.

Afficitur autem ventriculus, rex totius corporis vel totus, vel pars interna vel externa.

Interna est os, fundum & pylorus. Externa sunt, vena triplix: alia à ventriculo ad epa euntes, alia ab epate ad ventriculum euntes: alia à splene ad ventriculum.

Rursus ventriculus afficitur aut per se, aut per consensum.

Per se, cum illi morbus, causæ morbi infidet. Morbus verò duplex est: simplex & compositus. Simplex iterum aut similis, aut organicus, aut communis. Compositus est tumor.

Similaris est intemperies qualibet, calidior, frigidior, humidior, siccor. Ex siccitate immoica substantia ventriculi tenuitas, quæ & ipsa inter morbos retinetur. Organicus est, magnitudo inepta, numerus vitiosus, figura, superficies, meatus malè compositus, situs prauus. Communis est, solutio continui.

Per consensum afficitur, cum aliunde

coafficitur, idq̄, vel positivè, vel privativè.

Positivè, cum accipit ea quæ non deberet, etiam si per se non laboret. ut, ab ore minus paratos, aut prave affectos & coinquinatos cibos, ob dentium defectum siue corruptionem, siue ob famem, aut sordes emanantes ab aliquo oris ulcere: aut à cerebro nimis multam, vel etiam pravam pituitam: aut à jecore, liene, utero, aut vesica fellis ea excrementa, quæ per alias vias excerni deberent: aut ob vitium totius corporis putri acutaq̄, febre laborantis, putres, acres, prauos succos.

Privativè, dum non accipit vel ab ore, vel à cerebro, vel à corde, vel ab alijs partibus, id quod accipere debet. Ab ore, cum cibos consuetos dum appetit, non accipit: idq̄, ob penuriam, vel abstinentiam: vel ore jam acceptis & ritè mansis ob gulæ aliquod impedimentum frui non potest.

A cerebro, dum acrem & exquisitum sensum per nervos, superno ejus orificio insertos non accipit, eò quod cerebrum vel nervi affligantur,

A corde, alijsq̄, vicinis partibus, ut epate & liene, dum consuetum caloris fomentum & coctionis subsidium non accipit, eò quod una vel altera illarum partium, vel omnes simul laborant.

SIGNA per se, & per consensum affecti ventriculi sunt magnitudo, numerus, tempus juvenantia.

Si enim affectus sit vehemens, si solitarius, nec præcessit alius ex quo dependet, si non intermittat, & si præsidia illi admota profint: ventriculam, ejusque partem per se affectam cognoscetur. Per consensum, si contra. Ex quânam autè parte consentiente coafficiatur, symptomata illius partis quæ præcesserunt, patefacient, ut oris, cerebri, cordis & aliarum partium, nota ex signis tñ obscuris, tum manifestis. Percontari igitur oportet, quânam pars in corpore ante hunc illum affectum, ut cardialgiam, vel diarrhæam aliquid passa sit. Quæcūq̄ enim illa fuerit, ea ventriculū in consensum trahet. Sin minus, is per se (accedentibus alijs signis) affectus erit, vel intemperie, vel morbo organico, vel solutione cōtinui, vel tumore, quorum explicatio prolixior, quod ad signa attinet, aliò pertinet.

Erucia



Breviter signum intemperiei in genere est ventriculi lasa actio, id est, non bona coctio, sic tamen ut in ventriculo non sit vel tumor, vel ulcus, nec cibus corruptus.

In specie qualibet intemperies cognoscetur ex causis, effectis & utriusq; simul.

In calida intemperie. Prægressa est vita calefaciens, ut usus aromatum. Adest sitis & fames imminuta, sentitur calor circa ventriculi regionem, prava fit cibi coctio, quam sequitur ructus nidorulentus & saliva lufosa, id est, lenta & viscida (Calor enim absorbit partes fluxiles non viscidas) & venarum extuberantia, frigida juvant, nocent calida.

In frigida intemperie prægressa est causa refrigerans, adest sitis imminuta, fames intensa, sentitur frigiditas vel tepor ad tactum, fit coctio vel ablata, vel imminuta, vel corrupta, quam sequitur ructus acidus non nidorulentus, præsertim si cibi ingeruntur vel frigidi, vel temperati.

In humida intemperie causa præcessit humectans, adest sitis imminuta, fames exigua, appetitus cibi siccioris siue assii. Humiditas autem excedit vel secundum quantitatem, vel secundum qualitatem. Si quantitas peccat, præcessit cibus copiosus, aut appetentia imminuta citra nauseam, coctionis vitium vix sentietur, abdomen erit autentum, sed citra tumorem, nocet cibus copiosus, juvat paucus. Si qualitas peccat, præcessit victus humidus, adest nausea, saliva copiosa, mollities abdominis, imminuta magnitudo carnis juvant siccantia.

In sicca intemperie præcessit causa exsicans, adest sitis, fames, cibi liquidi & elixi, non assati, tensionis sensus, imminuta coctio (Vbi enim siccitas, ibi calidum innatum deficit) & magnitudo abdominis: nocent siccantia juvant humectantia. In simplici intemperie signa sunt tantum simplicia, ut calida tantum, si noceant tantum calida. Composita, si contra, ut calida & sicca, si noceant non tantum calida, sed & austera.

Si magnus sit ventriculus, nunquam ferè impleri potest, & cibo potuq; repletus, membra vicina comprimit. Si parvus sit, tantum cibi, quanto opus est, capere non potest, & ob hoc gravem extensionem sentit.

Si cavitatem offendit numerus vitiosus,

ut pravi aut corrupti succi, cibi malè affecti, grumi sanguinis, flatus, vermes, aut aliqua animalia, dolorem & subuersionem percipit.

Si sit parvus rotundusq;, pronus secundum hypochondria inclinatur, cujus historiam recitat Gal. c. 75. artis Medica. Oblongum enim & orificij angustioris esse convenit.

Si cavam superficiem nimis asperam habeat, cibum & potum diutius retinet, si nimis leuem, eundem ante coctionem fluere permittit.

Si meatum vitiosum habet, & texturam nimis raram, calor nimis euaporat. Si eandem nimis densam, calor nimis retinetur, vel à membris vicinis transmissis non admittitur.

Si vulneratus, vel ulceratus, vel excoriatus ab acerbis humoribus, aut veneno, vel disruptus intus vel foris, ex causis evidentibus apparet.

Si flatuosus tumor eum distendat, qui vel figitur in poris ejus, sicut aqua in foraminibus spongia, vel imbibitur in propria substantia, veluti tinctura in panno, ex dolore cognoscetur. Tumoris autem humoralis vel calidi vel frigidi eadem ratio est.

Os vero ventriculi superius peculiariter urget sæpe sitis non naturalis & imprimis compressio à xyphoide cartilagine, durities & obstructio è tuberculo, cujus historiam notabilem recitat Fernellius. Deinde symptomata communia, ut sensatio & appetentia abolita, diminuta, deprauata. Sensatio abolita est ex paralyfi, quæ nervos sexta conjugationis imprimis occupat. Diminuta est in torpore, quem appetitus diminutus sequitur.

Deprauata est dolor, qui cardialgia, cardiogmos, & cardiaca affectio dicitur. Eximio enim sensu præditum est, & principibus partibus cordi ac cerebro conjunctum sua vitia impertit: cordi quidem syncopen stomachicam, cerebro soporem, incubum, delirium, spasnum, obscuritatem visus.

Appetentia est fames & sitis, eaq; rursus abolita, imminuta & deprauata.

Fames abolita est ἀνορεξία. Imminuta est δυσορεξία. Deprauata est ναρσορεξία, cujus species βᾶδιμ, canina fames & pica, de quibus prolixius in nominibus morborum. Eadem est ratio sitis.

Ad fundum ventriculi pertinet chylosis lasa



lafa, qua in fundo perficitur, estq; vel abolita, vel diminuta, vel deprauata. Abolita, ut in lienteria & vomitu. Diminuta, ut in caliac. Deprauata, ut in ructu nidorulento, acido, fetido, pisciumve corruptorum saporem excitate.

Pylorum affligunt tarditas vel velocitas descensus chyli à stomacho.

Vena ad epar è vètriculo euntes si obstru-
tae sunt, singulũ ex repletionem pariunt. Vena ab epate ad ventriculũ euntes si obstru-
tae sint, fit sanguinolenta excretio. Haec nãq; vena ducunt originẽ à ramis venarũ portae. Per has igitur sanguis prohibitus ad intestina regurgitat, & cũ fecibus egreditur. Ductus splenis ad ventriculum si obstructus sit, appetitum minuit, eò quod humor melancholicus acidus ad os ventriculi non amplius profluit. Reliqua qua huc referri possunt in nominibus morborum explicata sunt.

VIII. COLICAE subiectum ex nomine apparet. Intestinũ enim plenius in colica afficitur, ut ilium in ileo, cuius utriusq; explanationem in ileo prolixiorẽ una eademq; opera absolvimus, unde, qua huc pertinent, peti possunt.

IX. DYSENTERIAE subiectum est volumen intestinorum, idq; non totum eodem tẽpore, sed pars tantũ quadã, siue superior, siue media, siue inferior. Omne enim genus intestinorum ulcerari potest, sed omnia uno eodemq; tempore affici ulcere non possunt, eò quod anteq; hoc fieret, homo interiret. Rursus cum partes intestinorũ sint varia, ut in nomine dysenteriae diximus, adeps, crusta, tunica interior, tunica exterior, vel simplicius sic: pinguedo, superficies interna et vera intestinorum substantia, tres inde sunt dysenteriae gradus. In primo abraditur pinguedo, in secundo superficies exeditur, in tertio interna vera intestinorum substantia ulceratur.

Ratione sanguinis, propriè venae tantum intestinorum affecta sunt, à quibus sanguis siue purus, siue mistus, cum succis excrementisq; prodit. Dysenteria enim sic definitur solet, quod sit fluxus alui, in quo sanguis per aluum egreditur.

Intestinum autẽ afficitur vel per se, vel p cõsensum. Per se, cũ illi morbus causae morbi p q̄ retentrix facultas laeditur, insidet, ut soluta unitas, ratione ruptionis & contusio-
nis: (qua ad chirurgos pertinent) imprimis

verò exulcerationis, orta ab acri & erodente humore in intestinis genito, ut in tumore & inflammatione.

Per cõsensum, cum aliquid morbificum & prater naturam aliunde occurrit, quod venas intestinorũ aperit, siue per diapedesin siue p anastomosis, ut humor sanguisue peccans vel quantitate, vel qualitate, erumpes aut à toto corpore, aut à determinatis partibus, ut capite, ventriculo, epate, liene, magnis vasibus & vicinis partibus. Defertur enim humor pravus ad ventrem, interdum ab ipso capite, salsa et acri destillationi obnoxio: vel à ventriculo in lienteria, eò quod temporaria processu cũ alimentis inconcoctis acres, putresq; succi miscentur: vel ab epate, à quo propter imbecillitatem sanguis generatur serosus, feci similis: vel à liene à quo atra bilis, & hinc tormina seuissima, & cancriformis ulcus oritur: vel ab uniuerso corpore, vel febre correpto, vel febris experte. Ab uniuerso corporis habitu putridis ac biliosis febribus detento, biliosa materia per crises ad intestina detruditur, unde exulcerantur. A corpore febris experte, sanguis copiosus promanat in mutilatis, & ijs quibus menses aut haemorrhoides supprimuntur, aut ijs qui cũ exercitationem consuetam intermiserunt, tamen laetè viuunt.

SIGNA intestini simpliciter affecti sunt cause, effectus & utraq; simul.

Cause sunt, quaecunq; abradendi et aperiendi venas facultatẽ habet, ut humores acres, usus mellis, piperis, medicamenta, & alia.

Effectus sunt impedita ipsorum intestinorũ functio & distributio sitis, ciborum fastidium, dolor & torsio, alui deiectiones varia, pro ratione cause. In dysenteria à bile constata, sunt feces spumosa, coloris flauo aut viridis. Ab humore pituitoso nitroso, feces alba & viscida, sitis urget & caliditas. Ab humore vitreo, sitis non urget, neq; caliditas. Ab humore melancholico, feces nigrae terram veluti acetum fermentantes. Febris verò non quamuis dysenteriam comitatur, sed eam tantum, cuius humor acerrimus est: isq; è visceribus aut è venis magna corporis perturbatione effusus.

Utraq; simul sunt, quod hic morbus populariter grassatur in populum, & quod egratans huic morbo fuit obnoxius.

SIGNA distinctina partium sunt haec.

Sanguis



Sanguis erumpet ex intestinis superioribus, si precedit dolor circa vel supra umbilicū, deinde recedente eo longe post cruor & ramenta cū excrementis mixta reijciuntur. Ex intestinis crassis & inferioribus, si primo precedit dolor sub umbilico, sed statim cruor supernatans excretioni appareat. Ex medijs partibus erit, si dejectiones ijs, qua ab ulcere manant admodum permixta, neq; omnino discreta fuerint.

SIGNA distinctiua gradus sunt haec.

In primo gradu dejectio mucosa est sine sanguine, cū tensione & dolore. In secundo gradu excretio ramentorū interna tunica, cum dolore acriore & fatore stercoris. In tertio gradu, excretio ipsius carnosae & desoris substantia, unā cum guttis sanguinis.

SIGNA per se, & per consensum affecti intestini in genere sunt haec.

Per se affecto intestino sanguis modicus, crebro & paulatim excernitur cum dolore.

Per consensum affecto, confertim & copiosus sine ulla abrasione.

In specie signa sunt, magnitudo, numerus, tempus & iuuantia, ut in alijs morbis.

SIGNA partiū consentientū, à quibus intestinū afficitur, sunt illarum symptomata, ut capitis grauitas: vetriculi, fluor chylosus: epatis, dolor dextri hypochondrij qui praecessit: lienis, dolor circa sinistrū hypochondrij: uniuersi corporis, febris & plethora. Dysenteria, qua fit intestino per se affecto, intestinalē & cruentam vocant: qua vitio capitis, catarrhalem: qua vitio epatis, epaticum fluxum: qua vitio lienis, atrabiliarem: qua per crises, symptomaticam. Idiopathica fit p solutionem continui. Sympathica per malā cōpositionē, ut diapedesin & anastomosin.

SIGNA distinctiua cognatarum specierū sunt haec. Haemorrhoidis seu fluxus haemorrhoidalis à dysenteria differt, eò quod in dysenteria retentio venarum intestinorum laeditur sine tensione & tumore, & cum fluxu mixti sanguinis. In haemorrhoidē retentio venarum ani, cum fluxu sanguinis sinceri, tensione & humore circa venas. Strophia ab eadem dissentit. σπῶσι enim sunt tormina intestinorum à mordacitate humorum, vel staturoso spiritu. Dysenteria ab ulceratione intestinorum.

Tenesmus ab eadem differt, subjecto, dolore, iuuantibus. Dysenteria pertinet ma-

gis ad omnia intestina, qua sunt supra reatum: affligit cum tensione & grauitate, & aluum deponendi voluntate minore, leuatur ijs qua per os sumuntur. Tenesmus est ad rectum & infimum intestinum, affligit cum maiore grauitate, ac quasi pondere quodam assiduo in fundo abdominis, & maximo conatu deijciendi, quamuis pauca deijci possint. Leuatur per aluum injectis.

X. LIENTERIAE subjectum Aretae simplex est, nempe intestinum: alijs duplex: ventriculus & intestina. Lienteria enim ex longa consuetudine Medicorum omnis fluxus est, in quo nec retinetur, nec coquitur quod ingestum est, siue procedat ex vitio ventriculi, siue intestinorum. Hoc igitur nomen duas affectus nunc complectitur, caeliacam & lienteriam.

Afficitur autem utrumq; vel per se, vel per consensum.

Per se afficitur, cum utriq; morbus, causaue morbi insidet, per quam facultas retentrix impeditur, ut vel mala intemperies siue frigida tantum, siue frigida & humida ventriculum intestinalēq; debilitans, vel redundantia humorum acrim in iisdem genitorum, vel ulcus, vel leuitas, vel cicatrix, siue in ventriculi, siue intestinorum superficie. Est igitur hic affectus comes dysenteriae, quamuis sine dysenteria etiam esse possit. Dum enim materia petit partem laceratam, irritat expultricem, qua insurgens ita agit, ut retentrix secundario laedatur: leuitas cibum priusquam perfecte concoquatur elabi permittit: quam cum solam huius morbi causam primi onomatopaei putarent esse, lienteriam inde appellarunt. Cicatrix ob leuitatem & densitatem simul ciborum per corpus distributionem fieri non permittit, venarum, qua alimenta ex intestinis ad se eliciunt orificijs obturatis.

Per consensum afficitur, cum aliunde afficitur, idq; positiuē & priuatiuē.

Positiuē, cum humores aliunde ad ventriculum & intestina mittuntur, qui modo intemperiem, modo ulcera, modo tumores, modo repletionem acrim succorum faciunt, conseruantq; ut in destillatione à capite, vel sine destillatione ab alijs partibus.

Priuatiuē, cum precedit intemperies caelida, ob quam retentrix laeditur. Substantia enim



enim calidi innati ob vehementiam caliditatis dissipatur, unde succedit frigiditas, quae operationes naturae destruit.

SIGNUM utriusque visceris affecti est ipsorum laesa functio, ciborum scilicet certo tempore dum exacte concoquantur retentio. In lienteria enim esculenta non mutata, statim ut assumpta sunt, exeunt: adest fastidium cibi, animi deliquium, color defaenatur, corpus extenuatur & tabescit. Interdum ventriculus cibum complectitur, non quiete, sed modo quodam tremulo. Alij retinent potum tantum, non cibum solidum: quidam contra cibum solidum, non potum, ut in diabete, sed rariores sunt haec, quorum causas Mercurius in sua praxi explicat.

SIGNA distinctiva sunt haec. Si vitio fiat ventriculi, cibus egreditur, aut nihil immutatus, aut formam chyli non adeptus, & caliaci nomine peculiari vocatur. Si vitio intestinorum: chylus exit, mixtus fecibus siue excrementa aliquam chyli formam habentia, & lienteria speciatim appellari solet.

Laditur alterutrum viscus nuda intemperie, eaque frigida, si nulla adsit sitis, feces immoderate, ciborum frigidorum usus. A calida, si adsit sitis, excrementa sada, corpus calidum. A tumore, si feces albae, ardor & inflammatio. A cicatrice intestinorum, si successit dysenteria, & chylus, non cibus eicitur.

SIGNA visceris utriusque, per se & per consensum affecti, sunt magnitudo, numerus, tempus et iuuantia, ut in alijs morbis. Interdum autem lienteria remittit, per certas periodos, aliquando continenter affligit, id quod utrumque potest fieri, visceribus per se, & per consensum simul affectis, ut in dolore capitis diximus.

SIGNA partium affectarum consentientium sunt earundem symptomata, quae praecesserunt, ut capitis grauitas si eueniat vitio capitis: & sic de alijs. Id denique praetermittendum non est, caliacam, id est, ventralē affectionē & lienteriam ab iisdem, sed minus efficacibus causis ortū ducere, retentricē facultatem in caliacis esse diminutam, in lientericis abolitam, illos cibum retinere breui tempore, hos nihil retinere, illos deijcere dimidiatē coctum: hos crudū prorsus. Utrumque vitium a diarrhaea et dysenteria differt, quod in caliacā & lienteria cibus siue crudus, siue semicoctus exit: in dysenteria mucus & ramenta intestinorum cum sanguine, in diarrhaea non cibus nec mu-

cus, sed quatuor humores ijs simpliciter, vel mixti excernuntur, sine cruenta deiectione & tensione.

XI. EXUTERI MORBIS profluvij uterini subiectum est, uterus ipse, vel cervix uteri. Quavis enim undique, fere ab omnibus partibus concurrat ad uterum sanguis, proximē tamen ab hoc funditur.

In omni vero fluxu muliebri os uteri aperitur, & veluti relaxatur: quibusdam etiam uterus procidit. Rursus non tam uterus colligē afficitur, quam vena seu canales corporis, vel cervicis uteri per quod sanguis immodicus effluit.

Afficitur autem vel per se, vel per consensum.

Per se, cum illi morbus, causaue morbi insidet, ut intemperies, mala compositio, solutio continui, tumor, quorum ratione excrementum in utero generatur, & profluvium uterinum in specie appellari solet.

Ac intemperies frigida et humida, eò quod vel albos menses efficit per congestionem, et uterus recipit plus quam concoquere valeat: vel quod functionem complectendi in ipsis venis imbecillē reddit, praesertim si sanguis crudus in acetabulis, id est, orificijs venarum uteri contineatur, in quibus materia mestrurorum preparatur.

Mala compositio est, cum orificia venarum per avaritiam nimis patent, apertaque sunt. Solutio continui, cum substantia venarum erosa est, aut excisa, seu quapiam alia ratione disrupta, ut uteri gestatione, partu, contusione, inflammatione, ulcere. Interdum et vena in collo uteri extumescens per circuitus extra tempus lunaris purgationis sanguinem fundit.

Per consensum afficitur, cum excrementum extra uterum generatur, & aliunde in uterum transmittitur, ut fluxus profluvij muliebri proprie appellari solet. Gignitur autem & coarctatur vitio vel partium naturalium principalium, quae coctioni seruiunt, ut ventriculi & jecoris, vel universi corporis. Quo in casu sanguis per uterum non aliter expurgatur, quam interdum solet per renes, vel per alium: ut quod, vel e toto corpore, sese in uterum exonerante, generali rheumatismo, vel e parte aliqua, ut epate, liene, ventriculo, capite.

SIGNA profluvij in genere sunt causa, effectus, & utraque simul.

Causa sunt, quaecumque vim expultricem irritant, ut excrementa per uterum protrudat, ut sunt omnia, quae sanguinem copiosum, acrem & aquosum generant, ut diata, medicamenta, morbi longi.

Effectus



Effectus sunt, pulsus frequens, inenarrabilis tristitia, difficilis spiratio, fastidium ciborum, malus color corporis, frigidus sudor circa frontem, refrigeratio extremorum, pedum tumor, loci muliebres perpetuo humidiores & madidi, excretio mensium deprauata, ratione quantitatis, temporis & modi. Tam immoderata enim est, ut excedat 18. vel 20. uncias, paulo plus seu minus, vel tanta saltem, ut vires mulieris dissoluant, nec contingit semel quolibet mense, sed ter seu quater, vel etiam ferè assidue: vel exiens non sit naturale, sed vitiosum, quale vel in utero, vel toto corpore redundat, ut ichor vel humor biliosus, pituitosus, melancholicus. Unde veteres *ἡσπέρων* & *αἰσπέρων* vocarunt.

Vtraque simul sunt iuuantia. Pro sunt quæ citra immodicum calorem exiccant totum corpus, cum affectus sit maximè humidus: nocent contraria.

SIGNA distinctiua partium sunt hæc. Materia exiens per venas cervicis copiosa non est, & durat post conceptum, & tempore gestationis uteri. Exiens per venas uteri, materia copiosior est & post conceptum, & tempore gestationis uteri cessat.

SIGNA uteri per se affecti sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia.

Profluvium enim vehemens est, reliquæ partes bene habent, præcessit retentio mensium, vel immoderata purgatio, vel alia uteri affectio, ut contusio & corruptio, color materia erit albus, & materia non exit admodum copiosa. Ex intermissione autem certum indicium sumi non potest, similiter ut in dolore capitis.

Per se enim affecto utero profluvium potest esse & continuum, & per intervalla intermittens, prout materia movetur: unde menses decolores, ut vocat Hipp. vel anticipantes, vel postponentes. Iuuant in uterum injecta: profunt minus alijs partibus adhibita.

In specie signa uteri affecti ab intemperie sunt eadem, qua intemperie uteri, de quibus alibi.

SIGNA affecti per ἀνασφύωνν apertis venis uteri, sunt eadem qua sanguinis tenuis, serosiq., vel tenuis ac mordacis, antecessit usus alimentorum eorum qua tales succos procreant, iuuant, qua orificia obstruunt.

SIGNA affecti per ἀνασφύωνν, quod rarior contingit, sunt signa erosionis & exulcerationis, ut purus & ruber sanguis, qualis è dissecta vena, causa difficilis partus, abortus, contusionis, icterus, casus.

SIGNA affecta vena in collo uteri sunt manifesta. Videri enim potest per dioptram, eò quod tuberculum subrubrum & cruentum eminet.

SIGNA uteri per consensum affecti, sunt paruitas, numerus, tempus & iuuantia.

Profluvium enim minus græue est, facilius toleratur, aliæ partes male habent, materia copiosa exit, nec tam alba, eò quod confluat in uterum per venas supra uterum, unde ob sanguinis præsentiam excrementi color non nihil mutatur: iuuant partibus consentientibus adhibita remedia.

In specie, signa partium consentientium, à quibus uterus noxam accipit, sunt signa indicantia vitia vel totius, vel alicujus partis non ignobilis, ut jecoris, ventriculi, cerebri. Totius, ut cruda superfluitates in toto corpore, nimia quies, animi tristitia, temperamentum satis moderatum, habitus carnosus, & alia signa pleuritidis, iuuant remedia toti corpori adhibita, intacto utero. Sed & femina tenuiori & pituitosiori habitu prædita, interdum prorsus non purgata fuit, interdum parcius aut liberalius. Id enim materia redundantis in venis varia ratione contingit, ex qua menstrua alba existunt. Sic cute inspissata dum per ea sudor elici non potest: & renibus oclusis ad eò, ut quod in sanguine serosum est attrahere nequeant, totum corpus vitioso humore repletur.

Epatis affecti signa sunt eadem qua epatici affectus, de quibus alibi.

Eadem est ratio capitis, lienis & aliarum partium.

In genere, si humores fuerint biliosi & calidiores, quales sunt colore flavi, pallidi, virides, liuidi, tunc illi vitio jecoris, quod calida & sicca intemperie laborat, maxima ex parte generantur: si serosi & aquosi, tunc vitio jecoris aliquo modo refrigerati. Si ijde pituitosi fuerint, quales sunt colore albicantes, tunc prodeunt ex vitio male diata, vel ventriculi frigida & humida intemperie laborantis. Iuuant, qua cacochymiam expurgant.

Succorum



Succorum verò colores sic cognoscuntur. Lintea infecta aresacta ex simplici aqua lauentur, & siccentur in umbra, & postea inspiciuntur diligenter. Lota enim & exicata colorem redundantis excrementi referunt. Si sit ichor, materia est tenuis vel aquea. Si humor, instar mellis crassior.

SIGNA distinctiua cognatorum affectuum sunt haec.

In menstruis immoderatis sanguis prope modum sincerus effluit, concrescit, intermittit, & certas seruat periodos: in fluxu autem muliebri planè varia procedunt excrementa, per qua uniuersum corpus solet purgari, isq; sanguis qui exit non concrescit, per aliquot annos durat, nec certas periodos seruat.

GONORRHAEAE subiectum sunt vasa spermatica: profluuij uterini, vena uteri, Plura in gonorrhoea. Cum ab utero vitium est, perinde est ac si ulceratio esset: differt tamen ab ulcere. Excrementum enim ulceris, pus est crassius, fatidius, albius. Vlcus irritatur coitu: profluuium uterinum nullam sentit molestiam in coitu, & maiorem feri copiam quam puris emittit.

Ceterum post eiusmodi purgationes sunt ulcera in utero rodentia & virulenta à biliosa: putrida & sordida à pituitosa materia: scirrhi & carcinomata à melancholico, de quibus Aretaeus. De prolapsu verò uteri prolixè in nominibus morborum.

XII. ARTHRITIDIS subiectum aliud commune, aliud proprium est. Commune est ἀρθρον, id est, articulus quilibet factus propter motum voluntarium, isq; dexter vel sinister, vel uterq; simul: unde arthritis, alia dextra, alia sinistra partis, cuius curatio difficilior: alia utriusq; simul.

Rursus ἀρθρον, id est, conjunctio ossium quorumlibet facta per articulationem, non per symphysin. Ossium enim compositio duplex est: alia articulatio, alia σύνθεσις. Articulatio est naturalis ossium structura, in qua duorum ossium extrema sese tangunt, eaq; triplex: Ἀρθρωσις, συνάρθρωσις & mixta.

Διάρθρωσις est laxa & cum motu manifesto. συνάρθρωσις est stricta, & ita comparata, ut nullum subsit ad motum manifestum spatium.

Neutra est utriusq; particeps: ratione

quidem obscuri motus, synarthrosis: ratione autem insertionis, id est, cavitatum & capitum diarthrosis. Talis est costarum cum sterno & vertebris: ossium octo carpi & ossium tarfi articulatio. Symphysis est duorum ossium in unum concretio. Fit igitur arthritis in articulatione tantum, eaq; triplici, frequentius in diarthrosi: rarius in synarthrosi & mixta, qualis est in pedio, & in carpo & metacarpo. Fines enim ultimi sunt articuli, ad quas partes humorum siue multitudi- ne siue acrimonia grauata & irritata suas superfluitates expellunt, ubi mora & compressione calorem concipiunt, doloresq; excitant, idq; per certas ferè periodos.

Rursus omnis articulus, in quo materia extendens dolorem facit, motumq; impedit, ex varijs constat partibus, ut sinu, ossibus, ligamentis, membranis, nervis & cute, qua partim humorem peccantem excipiunt, nec dolent, partim dolorem percipiunt. In humido verò & carne musculorum (qua & ipsa sunt partes articulorum) arthritis non consistit, eò quod humor viscidus dolorem non efficit: caro verò pauca est & potius externa quam interna. Iste dolor profundas partes occupat, ut uult Merc. Sinus est cauum articulationum spatium, idq; profundum, in quo humor fluens primò suscipitur & retinetur, ob suam vel multitudinem, uel crassitiem & visciditatem, qua facultatem retentricem deprauat, & expultricem diminuit, vel abolet.

Si enim vel sola intemperies adsit, vel humor per carnem diffusus, partesq; circumjacentes diuersa est affectio. Quod verò quidam recentiorum in cavitare humorem reperiri nulla ratione posse autumat, id & à communi omnium consensu, & ab ipsa ratione vehementer dissentit: ut demonstrat Campilongus libro de arthritide cap. 16.

Ossa tum recipiunt, tum dolorem suo quodam modo sentiunt, id quod alij negant. Aretaeus constanter affirmat, & quidem duplici modo.

Primum enim potuit ille ossa accipere à periostijs non sejuncta, sed iisdem inuoluta, quam ob causam illa dolorem pati nemo negauerit, cum natura interdum ossium cavitates repleat: interdum inter os & periostium residere soleat. Deinde quod ossa carere sensu non putarit, id quod & Auenzoar magni



nominis Medicus contra Gal. Auicennam & Aristotelem asseruit, modesta quadam limitatione. Carent enim, inquit ille, ossa sensu exquisito, habent obscurum ut pedes rusticorum, cum nuditerram calcant. Et si enim sentire non videantur, quia sensus obscurus est, eos tamen aliquo modo sentire, negandum non est. Quarens autem Aretaeus, quam ob causam fiat, ut ossa ab internis causis doleant: ab externis, ut sectione & collisione non item, veram huius mirifici eventus causam solum DEO notam esse ait: probabilem veram afferri posse hanc, quod nimirum densa vehementer tactus sensum nullam habeant, & propterea cum non possint exasperari, nullam etiam asperitatem, ex qua dolor oritur, sentiant. Quod vero calorem quendam habeant & denso quodam spiritu vivant, ijs alteratis per intemperaturam aliquam, dolorem, quamvis obscurum ut percipiant, necesse est.

Ligamenta sunt δεσμά τῶν ὀστέων, quae ossium extremitates inter se copulant, quaeque substantia constant nervis quam simillima. Hac igitur humorum redundantiam ad se delatam excipiunt, à quo replentur: repleta tendines & reliquas partes vicinas comprimunt & tendunt: unde solutio unitatis & dolor. Quamvis igitur non sentiunt, eorum ratione ad dolorem non pertinent pro causa tamen efficientis subiecto habentur.

Membranae sunt, quae ossium extremitates ipsosque sinus articularum & tendines inuestiunt, quae & ipsae ut ossa humorem tum excipiunt, tum sentiunt. Inflammantur autem, ut & ligamenta absque tumore conspicuo primis maxime diebus in corporibus non plethoricis: postea vero ob sanguinis influxum phlegmone partium carnosarum quae adjacent, plerumque adematodes vel erysipelatodes accedere solet. In periostio etiam arthritis gallica sedem suam imprimis habet, ubi humor viscidus impactus, inque status conuersus distendit, suaque mordacitate & maligna qualitate dolor non tantum articulos, sed & medias artuum regiones infestat, nocturno maxime tempore.

Eadem est ratio membranae carnosae & cutis.

NERVI humorem non suscipiunt, ut quidam volunt, dolorem vero percipiunt, dum illos ligamenta repleta comprimunt, adque

extensionem suam distendunt. Verisimile tamen non est materiam ad articulum confluentem imbibi durissimis ligamentis, non mollioribus nervis ac tendinibus, id quod & Aëtius asserit. Quod enim ajunt, si repleantur, orituram inde conuulsionem, quae in podagricis nunquam visa est, id adeo firmum non est, cum id aliam ob causam eveniat, quod nimirum in arthriticis principium nervosa generis obstructum non sit. Huc accedit, quod humor excrementitius foris tantum tendines humectat: intimam illorum substantiam non penetrat, quae si illa sit, conuulsionis metus abest.

Rursus subiectum arthritidis sunt partes articularum, vel omnium aut plurimorum, & dicitur arthritis, vel quorundam tantum, & à partibus sua appellationem sortitur, ut dicatur chiragra, ischias, gonagra, podagra.

Chiragra manum infestat, ejusque vel carpum, vel digitorum articulos, ceterosque quibus ligamenta circumjacent.

Ischias in junctura ioxis consistit, id est, coxa seu ossis, quod femoris caput excipit. Excruciat igitur coxendicum ossa & in femur, suram extremumque secundum nervorum ductum diffunditur, quod hac nec situm nec figuram naturalem retineat. Non autem in magna coxae articulo, sed altius heret ad summam partem, ut vult Fernelius.

Gonagra, genua tantum infligit, quae & gonalgia dici potest.

Podagra, malleolos, calcanei extremitatem, pedium, cauum pedis: maxime vero pollicis articulum vexat. Est vero & aliarum partium arthritis anonymos, ut vertebrarum cervicis & dorsi, & ossis sacri, quin & ejus partis colli quae ὀδῶς, id est, dens dicitur, & ὀμῶς, id est, humeri (Sic enim textus Aretaei corrigi debet, ubi Ἔσῆ & ὄν & corruptè legitur) denique maxillarum, temporum, maxillarum & suturarum capitis, in illis nimirum ossium compaginibus, quae natae quae ὀστέων & ὀστέων connexae sunt, quod tamen ingrauescente hoc malo tantum contingit.

Afficitur autem articulus ejusque pars quaecumque, vel per se, vel per consensum, vel per utrumque simul.

Per se, cum illi morbus causae morbi insidet, ut intemperies, ob quam proprium suum alimentum male conficit, & humore

per



per congestionē cumulat, id quod imprimis fit in sphyliade & in ischiade ijsq; osium juncturis. qua per synarthrosin & symphyisin copulantur. Sunt tamen quidam, qui negant materiam in locis articularum genitam, posse arthritidem gignere, quos confutare hoc in loco opera pretium non videtur. Falli autem existimo, nisi putent solam congestionem non sufficere, sed transmissionem semper accedere simul.

Per consensum, cum aliunde coafficitur, corriuante in cavitatem articularum, & partes vicinas humore quasi eluue quadā, vel à toto corpore, vel ab ejusden partibus, ut capite, ventriculo, epate, intestinis, renibus, hemorrhoidibus, utero, ijsq; vel plethora, vel cacochymia grauatis. Humor enim non influit, si corpus inane sit, aut excrementis & cruditatibus liberum. Febres itaq; continua, alijsq; morbi acuti, ut & colici dolores saepe per malam crisin in arthritidem finiunt, non autem in podagram. Et autore Hipp. mulieres qua recte purgantur, eunuchi, pueri, podagra non laborant, sed ab arthritide tamen non sunt immunes, teste Galeno 6. aph. 30. Iuuenes saepe non agrotantes ex plethora impura, in arthritidem incidunt, qua nunquam postea, aut post longum incertumq; interuallum redit. Contra arthritidis podagrica, hoc est, periodica, qua à pedibus incipit, causa est vel pituitosus humor sub solo pericranio collectus, ut voluit Fernelius: vel, ut alij rectius judicant, excrementum cerebri, quod ex chonana per palatum aut nares naturaliter expurgari deberet: vel ut Demetrius Pagonaeus putat, excrementum quod in singulis corporis partibus prouenit. Arthritidem sanguis à jecore calidiori genitus, & ventriculi frigida excrementa nonnunquam pariunt. Humores mordaces cum phlegmate tenuiore mixti ex intestinis, venisq; vicinis in aluino ventre à natura robusta, per crisin malam protrusi, in musculos artuum influunt: indeq; in articulos abeunt, tandemq; paresin quandam artuum & dolorem inducunt, quam Hipp. 6. Epid. 4. arthriticum nominat. Quae verò causa calculi, eadem & topi in podagra, humor videlicet terreus ac pituitosus: unde nephritici saepe podagrici esse solent.

Ab hemorrhoidibus deniq; & utero non

rare materia decurrit, cum viris fluxus sanguinis per mariscas expurgandi intercipiatur: mulieribus verò supprimuntur aut puerperia, aut menstrua: unde Hippocrates mulierem podagra consiliari negat, nisi menstrua defecerint.

Ex quibus arthritidis catarrhalis ferè frequentior est, in qua excrementum colligitur in capite, tam secundum internam quam externam partem, ed quod cerebrum naturā frigidum humidumq;, quando collectio ejus parum firma est, plurimum superflua humiditatis cumulat.

Via per quas membra suos humores detrudunt sunt partes, non tantum externa, ut voluit Fernelius, sed et interna, eaq; tum manifesta, tum obscura, & rursus alia in arthritide à toto corpore, alia à certis partibus, ut à capite. Ex toto corpore, ut & epate excrementorum expulsio immediate fit ex venis in articulos. Ex capite, qua via sunt, controuertitur.

Alij tantum ex occipitio sub cute, per summa corporis in extimas partes materiam influere ajunt. Alij negant, quidam limitant, ut interdum per illos externos meatus detru di afferant, interdum per internos. Nam si coctior sit superflua pituita, & pars quadam in vasis remaneat, cerebrum collectam intercranium et meningem materiam per spinalis medulla foramen inter membranas medullam inuoluentes offusa, spine & velamina neruorum: ita tamen ut substantiam medulla & neruorum non subeat, in musculos artuum, tandemq; in articulos propellit.

Eam verò, qua per suturas inter cranium & pericranium exoneratur vis expultrix sub cute in partes inferiores, cervicem, scapulas, maxillas extrudit, donec in articulis ob angustiam hereat. Obscurum spatium est, ubi dolor colicus in coxendicum migrat. Neq; enim meatus aliquis euidentis est, per quem à colo intestino ad artus coxae vapor deferatur, nisi id quod ait Hipp. totum corpus esse οὐρανὸν ἔσπερον. Ex quo apparet humores, qui podagrā efficiunt intra venas non contineri, & phlebotomia euacuari non posse: contineri autem in arthritide. Sed & illud, materiam per neruos non transmitti, quod conuulsionem faccret.

SIGNA articularum simpliciter affecto-

rum



rum sunt causa, effectus & utraq, simul.

Causa sunt, quaecunq, materiam, qua transmittitur, cumulant, vias patefaciunt, & articulos sua natura imbecilles, raros, laxos, humidos faciunt, ut suppressa aliqua consueta euacuatio per nares, menses, hæmorrhoides, nimia ingluuies, vinum potens à jejuno sumtum, creber balneorum usus, luxatio, & alia, de quibus alibi.

Effectus sunt languor artuum, dolor articularum, isq, intensior cum mouentur, quam cum quiescunt (Motus enim afflictas partes tendit, & inde magis lacerat) sudoris consueti, urinae suppressio: pars affecta ex leui occasione fatigata, aque frigida calidag, offenditur.

Utraq, simul sunt, quod hoc malo agrotans detineri soleat, & profunt arthritica, qua nervos et articulos roborant, ut chamæpitys, paralytis, & alia.

SIGNA specierum, sunt manifesta ex relatione agrotantis. Arthritis enim erit, si omnes articulos, vel plurimos sibi dolere dixerit. Chiragra, si languentes manus. Podagra, si pedes: gonagra, si genua, & sic de alijs. In specie, in chiragra nec non in gonagra adest ferè dolor pulsatilis, rubor, calor molestus ex doloris vehementia, inflammatio, inappetentia, vigilia, febris. In ischiade humerorumq, arthritide nullus tumor, aut rubor apparet.

Cavitas & membrana articularum affecta erunt, si tumor externus aut rubor appareat nullus, tumeat pars interna, dolor in profundis partibus percipiatur, id quod initio fieri solet. Ligamenta humorem imbiberunt, si tumor sit externus & evidens: & dolor in superficie sentiatur. Sub cute, humor dolorificus latet, si dolor partem affectam comprimendo exacerbatur. Inter musculos in parte intimiori erit, si dolor partem laesam comprimendo nõ augetur. In ischiade articulis erumpentibus ejus partis motus cessat, à qua recedunt & in ea nonnihil seruat, in quam prorumpunt, cum ibi aliqua ex parte à musculis moueri possint: et semper tumor est in ea parte, in quam os erumpit, & sinus in ea à quo recessit. A sua autem situ exeunt articuli in ischiade velex toto, vel aliqua tantum ex parte, ut notat Galenus libro Methodi secundo. Ex toto igitur femoris utriusq, capita exciderunt, si motus illarum

partium ex toto ferè perit: siq, inter ossa femoris caput utrumq, prolapsum sit agrotans per cruris utriusq, circumvolutionem incedit, ut boues, ut notat Hipp: lib. de articulis.

SIGNA articuli per se & per consensum affecti sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia. Per se enim affectus erit & materia collecta per congestionem, si dolor sit vehemens, precessit aliquis dolor vel calor, quorum ratione humor aliunde attrahitur: si multum iuuent illi applicata remedia. Intermissione autem hic certum signum non est, similiter ut in dolore capitis.

Per consensum, id est, per transmissionem solam seu decubitus affectus erit, si contra. Neq, enim precessit aliquis dolor vel calor in parte ad articulos pertinente, antequam arthritis inceperit, & profunt parti transmittenti adhibita præsidia.

SIGNA partium transmittentium sunt illarum symptomata. A toto igitur erit, si febris aliqua precessit, aut adsunt signa plethoræ & cacochymia, nec arthritis sit periodica. A partibus determinatis erit, si in illis dolor aliquis precessit, ut à capite, si agrotans dolorem erinalem, somnolentiam, grauitatem capitis & ceruicis, frigusq, vel paruum horrorem prius perceperit, & narium fluxum consuetum amiserit. Ab epate & venis magnis, si citra hæc dolor præhædat partem aliquam, sed cum febricula, vel aliqua inæqualitate pars cito intumescat, rubeat, doleat, ab una parte in aliam moueatur. Ab utero, si suppressa menstrua & sic de alijs. Per musculos erit transitus, si dolor non percipitur propter laxitatem.

Quod autem modo in una, modo in alia parte fiat arthritis, ajunt quidam id fieri propter decubitum. Homine enim frequenter in hoc vel illo latere decumbente materia modo in hoc, modo in illud latas prolabitur.

SIGNA humorum abundantium aliò pertinent: utilia tamen etiam hic ad partis affecta cognitionem. Sanguis enim copiosus à jecore calidiore, & bono copiosus, chylo: pituita è frigiditate ventriculi, & cibis pituitosis gignitur: uterq, simul, si ventriculus sit frigidus, aut simul caput: & calor cum humiditate abundat in epate. Iuuant alterantia prædita facultate siccandi ac refrigerandi, si sit à sanguine & sic de alijs.

Rare



Raro autem defluxio sincera est à venis, cum humores omnes contineant: sincerus vero, si à recrementis cerebri, vel per conge-
sionem fiat.

XIII. ELEPHANTIS subjectum est caro & habitus: ut lepræ & scabiei, cutis ac summa caro corporis. Lepra igitur, teste Galeno, in Elephantiasin: & elephan-
tiasis in lepram interdum abit. Nam si humores, qui in cute lepram faciunt carnes totas oppleant, elephantiasin faciunt: rur-
sus si humores in carne contenti, qui ele-
phantiasin faciunt, ad cutem conuertan-
tur, lepram faciunt. Habitus autem cor-
poris complectitur solidas partes, quæ in
elephantiasin ita affectæ sunt, ut ipsa quoq;
ossa, quæ impuro succo fruantur, vitari
dicantur. Hinc elephantiasin, cancerum
totius corporis vocant, & Aretæus talem
affectionem intellexit, cum ait Elephan-
tem quouis presidio validiorem, ita ut à
nullo possit superari. Ex quo sequitur ut
vera Elephantiasis non sit, nisi dyscrasia &
qualitas venenata, tumorq; non tantum
extimas, sed & intimas partes corporis in
speciem elephantis immutet. Nec tamen
tumor unus est in toto corpore, sed multi-
plex & inæqualis, & per uniuersum corpus
hinc inde dispersus. Quod cum alicui
mirum videatur de internis visceribus ut
dixis scateant tuberculis, Aretæus id con-
firmat experientia. In victimis enim
prauos humores habentibus, carnes gran-
dinis plenas reperiri asserit. Cui consen-
tiens Ioh. Riolanus, vidi, inquit, porcum cui
minima pustula suberat sub lingua, tum re-
liquo corpore sanus videretur, talisq; à la-
nionibus iudicabatur: facta tamen disse-
ctione inueni totam carnem grandine con-
spersam: quin imo sanguis percolatus, totus
erat grandinosus.

Est verò quædam elephantiasis Auicen-
na, in qua non totum corpus, sed pedes tan-
tum cum varicibus denigratis aequali infra
supraq; crassamento, columnarum instar tu-
ment, ut sunt crura Elephantum.

Afficitur autem caro & habitus corporis
aut per se, aut per consensum.

Per se, cum illi morbus, causaue morbi
insidet, ut dyscrasia imprimis calida & sic-
ca, contracta vel ab externis causis, vel à
lue Venerea, vel à semine elephantico, vel à

contagio, quod insicit concubitu, accubitu,
assidua vitæ consuetudine. Crassi igitur
partium solidarum vitata, virtus assimi-
latrix leditur, ut suo munere non recte fun-
gatur, proq; carne rubra, agram & granu-
losam generet. Sed & expultrix imbecil-
la redditur, ut sordem ac veluti fecem de-
trudere nequeat.

Per consensum afficitur, cum vitæ experts
aliunde coafficitur, id est, humorem vitio-
sum ab epate recipit in eo collectum, vel per
se, vel per consensum.

Per se, cum jecur natura retorridum est,
id est, calidum & siccum, affans non elixans,
indeq; atram bilem generans.

Per consensum, cum lien non bene fungi-
tur suo munere, neq; ad se allicit ex epate
fecem sanguinis: vel ventriculus frigidus &
humidus copiam pituitæ cumulat, quæ ob-
struens non permittit humorem melancho-
licum à liene attrahi, unde mixtus cum
sanguine in totum corpus spargitur: vel
menstrua non respondent, vel varices cohi-
bitæ, vel clausæ sunt venæ anæ, quæ fecem
hanc effundere solebant. Ex quo appa-
ret interdum partes externas corporis prin-
cipio agrotare, & processu temporis etiam
internas: interdum nihil in summis cor-
poris partibus conspici, sed in visceribus,
liene videlicet & jecore malum per initia
delitescere, deinde partibus interioribus
deuictis, ad extremas, tandemq; ad cutem
se se conferre, in qua vel congeritur, vel at-
trahitur nimis calefacta, vel ob exercita-
tionem, vel ob aërem calidum, vernum
imprimis, quod eam ob causam tanquam
aptissimum ad leproso explorandos etiam
iudicari solet, quamuis & ob auctam facul-
tatem expultricem viscerum fieri possit.
Tum enim corpus uniuersum accepto robore
à solis ad verticem nostrum regressu, hu-
mores abditos è profundo in altum ad exti-
mam cutem protrudere, atq; certiora morbi
intus latentis testimonia præbere solet.

SIGNA cutis lepra affecta, sunt causa,
effectus & utraq; simul.

Cause sunt, quæcumq; sanguinem cras-
sum ac limosum procreant, & ne vacuetur
prohibent, ut regio vel percalida, vel supra
modum frigida, vina crassa & potentia,
succus melancholicus, & alia, de quibus
alibi.



Effectus, alij sunt communes, alij proprij.

Communes sunt, pulsus languidus ac debilis (ut in hectica) stupor partium extremarum (ut in plerisq; nervorum affectibus, & interdum à sola refrigeratione) color obscurus & ex rubore liuescens (ut in quadam vitiliginis specie, & in ijs qui calidiori sunt epate, pravaq; victus ratione utuntur) pilorum defluuium (ut in alopecia ophiassi, achoribus, morbo gallico, post febres acutas) tales (ut in phthisi, febribus acutis & morbis diuturnis) cutis aspera (ut in omni scabie) vox rauca (ut in catarrho, & alijs vitij instrumentorum vocis) corruptio & consumptio digitorum manus & pedis (ut ab epoto ueneno, lue Venerea, gangrana & perionibus) urina tenues, alba aut cinerea, vel jumentorum lotio similes, & fatida (ut in lienosis, quartanarijs, viscerum obstructionibus) formidulosa insomnia, sanguis niger, obscurus, trumbosus, vafricies, calliditas (ut in omni vitio ab atra bile orto) ulcera fada, pustula, tumores (ut in morbo gallico.)

Proprij sunt, fada & terribilis faciei deformitas, satyrorum picturam referens, facis fadata, nodi duri sub cute, cutis tuberosa, sanguis incisa vena vasculis exceptus percolatusq; grumosus repertus, stupor tan-

tus, ut puncti non sentiant. Iubent ergo critici leproforum, ut oculis clausis locū ac punctum digito designent, hoc si non possunt, & cetera concurrant, morbus confirmatus est, contagiosus, insanabilis.

Vtraq; simul sunt iuuantia. Profunt in recenti, nec dum confirmato elephante, qua habitum corporis humectant, jecur & sanguinem ad temperiem reducunt, humores prauos vacuant, ut balneum aqua dulcis, moderatè calefacientia, cutem detergentia. Confirmatum ostendit, si omnem medendi viuendiq; rationem aspernetur, & nullis remedijs cedens ingrauescat.

SIGNA per se & per consensum affecta carnis vel habitus corporis sunt magnitudo, numerus, tempus & iuuantia, ut in alijs morbis.

Breuius, si aliqua in facie appareant signa, de quibus jam dictum, & rectè valeant viscera, caro vel habitus per se afficitur.

Per consensum, si nulla in facie conspicua sunt, & malè valeat epar, ventriculus, lien, id quod ex illorum symptomatis colligi potest, ut alui segnitie, ructu, maculis cutis, ijsq; varia, pro varietate humoris affluenti.

F I N I S.



IN ARE.



IN ARETAEI LIBROS ET G. HENISCHII COMMENTARIUM INDEX.

<p>A. Ex abortu signum partis affecta 354. Abortus tetanum facit 5. Abinthium medela stomachi 232. Abinthij usus intus & foris in phrenitide 144. Abinthites vinum 301. Abstinencia nocet phreniticis 136. Acetum astringens in sanguinis reiectione quale 182. Ex actione laesa partis affecta signa 352. Adolescentes obnoxij epatis phlegmone 81. ietero 88. satyriasi 49. Adstringentia qua 264. Adstringentia & refrigerantia qua 185. Aeris mutatio in cephalaa 219. Aeris motus in cholera 195, 196. Aer qualis in sanguinis reiectione 179. Aer in syncope 189. qualis 191. AEgrotantibus gratificari oportet 181. AEgrotorum ignorantia 213. AEgroti obedientia 52. AEgroti omnes sanari non possunt 233. AEgyptus obnoxia consillarum affectibus 13. AEstas obnoxia cholera 33. diarrhae 110. dysenteria 116. melancholia 58. ileo 35. stomachi dolori 108. AEtas omnis obnoxia hydropi 95. AEtas podagra obnoxia qua 125. Ab atate agroti signa partis affecta 352. Alba febris signa 393. Alcola nomen 313. Alica, vide halica Alices Avicennae 313. Alodes vires 232. Alphos niger 333. Alii excretionis vis 222. à somno commoda 227. Alius siccor in cachexia 90. Alius sicca in elephantiasi cur 130. Ambulatio ubi 227. Ambulationes bona qua 227. Amygdala quid 313. Αμύγδαλην quid 21, 23. Αναμων quid 376.</p>	<p>Anasarca quid 92, 335. Anasarca subjectum 431. signa 93, 94. 432. Anaesthesia quid 64. Ανεσθησις quid 320. Angina quid 7. cum coincidentia 165. Angina causa 10. 163. curatio 10. 162. divisio 7. duo genera ib. dua species 162. nomen 311. 312. 313. permutatio 9. utriusq. prognostica 9. 10. remedia 10. subjectum in genere 370. in specie 371. per se, per consensum 371. signa ib. symptomata 9. & 10. tumor intus & foris 165. Ex angustia vasorum febris signa 393. Ani runctionio in cholera 194. ileo 197. pneumonia 177. syncope 192. Ani prolapsus 345. Animi affectus phreniticis ut curandi 135. Ex anni partibus signa partis affecta 352. Anodyna in arthritide 295. ileo 298. Anoptesia quid 339. Antirochon instrumentum 214. A parentibus signa partis affecta 352. Aphtha quid 112. Aphtharum nomen 313. pars subjecta qua 373. Apoplegmatisimi in cephalaa 215. lethargo 150. vertigine 220. Apoplexia quid *** b. 64. Apoplexia nomina 310. pars affecta principalis, per se, per consensum, signa 363, 366. Apoplexia causa crapula 153. prognostica 151. In apoplexia pusilla partes resoluta 152. Apoplexia remedium phlebotomia 152. Apoplexia & epilepsia differentia à parte affecta 366. Apoplexia & paralysis discrimen 424. Apoplexia & vertiginis differentia 419. Apoplexia ab uteri strangulatu differentia 413. Αποπληξια quid 338. Apostematia qui 71, 332. Appetentia vitriata nomina 339. Appetentia laesa stomachi vitriata 436. Aqua</p>
---	---



I N D E X.

<i>Aqua frigida usus in cholera</i>	194.	<i>Bronchia quid</i>	75.
<i>Aqua frigida porus in phrenitide</i>	144.	<i>Ex bronchio excrescentia signa partis affecta</i>	354.
<i>Aqua frigida noxa in pleuritide</i> 175. & quando valet ib.		<i>Bubones quid</i>	29.
<i>Arena & calculi signa distinctiua</i>	410.	<i>Buprestis causa hydrophis</i>	95.
<i>Aretaus scripsit chirurgica</i> 214. de febris 134. de muliebribus morbis	151.	C.	
<i>Arquatus morbus, vide icterus.</i>		<i>Cachexia quid</i>	88.
<i>Arteria sectio in angina nocet</i>	165.	<i>Cachexia causa</i> 89. <i>curatio</i> 254. <i>nomina</i> 334. <i>prognostica</i> 88. 89. <i>signa</i> 88. 89. <i>particularis signa</i> 430. <i>subjectum ib.</i>	
<i>Arteria sectio in cephalaa</i> 214. <i>epile-</i> <i>psia</i>	225.	<i>Cachexia & aliorum cutis vitiorum signa</i> <i>distinctiua</i>	430.
<i>Arteria sanguis</i>	25.	<i>Cacochymia quid</i>	88.
<i>Apodov quid</i>	346.	<i>Ex calo signa partis affecta</i>	351.
<i>Arthritis quid</i>	121.	<i>Calcolorum causa</i> 100. <i>colores ib.</i> <i>Curatio</i>	204. 205.
<i>Arthritis majorum & minorum membro-</i> <i>rum</i>	122.	<i>In calculo consentientes partes</i>	103.
<i>Arthritidis causa unica</i> 124. <i>causa opinata</i> 123. <i>curatio</i> 295. <i>initiu unde</i> 123. <i>nomi-</i> <i>na</i> 346. <i>partes affecta</i> 121. 123. <i>pro-</i> <i>gnostica</i> 123. 295. <i>remedia</i>	124.	<i>A calculi exitu hydrops</i>	431.
<i>Arthritici paroxysmi</i>	295.	<i>Calculi incisio ubi</i>	206.
<i>Arthritis & paralysis discrimen</i>	425.	<i>Calculi renum signa</i>	409.
<i>Ascites quid</i>	92. 339.	<i>Calculi signa ex urinis</i>	103.
<i>Ascita signa</i>	93.	<i>Calculi signa</i>	99.
<i>Ascites ex tympania</i>	93.	<i>Calculi vesica signa</i>	411.
<i>Asthma quid</i>	75.	<i>Calculo laborantium symptomata</i>	101.
<i>Asthmatis curatio</i> 243. <i>nomina</i> 332. <i>partes</i> <i>affecta</i> 76. <i>signa</i> 76. 432. <i>subjectu</i> 426.		<i>Calculus vesica magnus & parvus</i>	102.
<i>Asthma ex podagra</i>	125.	<i>Calofacientia in gonorrhoea</i>	265.
<i>Atra lingua & tumor in praecordijs in le-</i> <i>thargo</i>	148.	<i>Ex calore partis affecta signa</i>	383.
<i>Atram bilem purgantia</i>	231.	<i>Calorem educentia qua sint</i>	178. 179.
<i>Atra bilis morbi</i>	56.	<i>Cancer quid</i> 120. <i>duplex ib.</i>	
<i>Atrophia quid</i>	331.	<i>Canis rabidus</i>	8.
<i>Aussatz</i>	348.	<i>Canum proprietates</i>	8.
<i>Aurigo. Vide icterus.</i>		<i>Cantharidum usus qualis in epilepsia</i>	226.
<i>Aurumnus obnoxius causo</i> 41. <i>phlegmona</i> <i>epatis</i>	38.	<i>Capitis doloris nomina</i> 323. <i>partes affecta</i> 416. <i>prognostica</i> 213. <i>remedium per cu-</i> <i>curbitulam</i>	155.
B.		<i>Capitis fomenta noxia neruis</i>	160.
<i>Balneum olei in calculo</i>	261.	<i>Capitis grauitatis remedium</i>	150.
<i>Balneum frigida in gonorrhoea</i>	265.	<i>Capitis hydrops</i>	95.
<i>Balneum in lethargo</i> 151. <i>in phrenitide</i> quando 145. <i>renum affectu</i> 204. <i>satyri-</i> <i>asi</i> 211. <i>vertigine</i> 223. 224. <i>uteri stran-</i> <i>gulatu</i>	200.	<i>Capitis hydrophis signa</i>	432.
<i>Balnea aspidu in elephantiasis</i>	201.	<i>Capitis irrigationes in lethargo</i>	147.
<i>Balnea in tabe</i>	151.	<i>Capitis partium affectarum signa distin-</i> <i>ctiua</i>	417.
<i>Bellaria. Vide tragemata.</i>		<i>Capitis per se vel per consensum affecti</i> <i>signa</i>	417.
<i>Bilis varia genera</i>	86.	<i>Capitis pressio</i> 223. <i>tonsio in delirio</i>	142.
<i>Bistinu medicamentu</i> 203. 229. 295. 250. 265.		<i>Capitis pilorum detractio</i>	214.
<i>Booium quid</i>	352.	<i>Capitis pilorum abrasio cephalaa reme-</i> <i>dium</i>	216.
<i>Breune unde</i>	312.	<i>Capitis rasio in lethargo</i>	150.
		<i>Capitis vitiorum commune remedium</i>	214.
		<i>Cardiaca curatio. Vide syncope.</i>	<i>Cardial-</i>



I N D E X I

Cardialgia quid	107.	Cerebri in melancholia & mania affecti signa	420.
Cardiognos quid	108. 339.	in vertigine per se & per consensum affecti	419.
Cari causa ** b.		Cerebrum principii nervorum quomodo	365.
Carnes qua bona qua mala	218.	Cervicalia phreniticorum qualia	140.
Carnes qua bona in epilepsia	229. pleuritide	Chalcitidis usus in affectu faucibus	168.
	171.	Charonaa loca	8.
Carnium variarum usus in pleuritide	171.	Chiragra quid	221. 326.
Cartilaginum natura	74.	Chelades quid sint	311.
Caruncule vesicam obstruentis signa	415.	χοιράδες quid	314.
Caryceia quid	218.	Cholera curatio 194. definitio 32. nomina	315.
Casæi noxa	218.	prognostica 194. 196. subjectum	401.
Castorei vis in epilepsia	226. usus in paraly- si 237. tabe	duplex 401. affecti simpliciter signa	401.
	151.	symptomata	33.
Castorei usus in potu in tetano	161.	Cholera & syncopa cognatio	195.
Castoreum prodest in lethargo	149.	Chordapsus quid	34. 316.
Castoreum ulceri inspergitur in tetano	161.	Cicadarum facultas	206.
Cataplasma attenuans in phlegmone lienis	251.	Cibi amentiam parientes 60. boni in epi- lepsia 228. humectantes medicamentosi	170. qui 234. lotium mouentes 201. mol- lientes ventrem 213. in paralyti 236. phreniticorum quales 136. utiles in pneu- monia 178. purgantes quales 198. quales in rejectione sanguinis 184. refrigeran- tes 211. forbiles. in syncope 190. in verti- gine
Cataplasma refrigerans	200. 210.		224.
Cataplasmata in angina 164. in pleuritide calida servanda & quomodo id fieri de- beat 172. ileo 198. melancholia 235. pa- ralysi 237. renum phlegmone 204. tetano	161.	Cibus in causo 203. humidus in pleuritide	137. medicatus in lethargo 146. qualis in syncope
	161.		189.
Catarrhalis febris signa	392.	Ciborum exhibendorum tempus pro phre- niticis	136.
Catarrhalis febris epidemica anni signa	158. 396.	Clauditas ex ischiade	122.
Cateadion instr.	216.	Clyster in angina 136. 164. cephalaa 215. columella 165. causo 202. ileo 197. lethar- go 146. 153. pleuritide 174. pneumonia 176. qualis in renum affectu 204. satyriasi 210. suffocatione uteri 208. syncope 188. ex hiera in tetano 162. in tremore	148.
Catheter quid	239.	Clyster loco phlebotomia	152.
Catheteris abusus	156.	Clysteres veterum	142.
Catheteris usus in calculo	206.	Cneoros quid	226.
Catochos quid	47.	Coagulum hædi in rejectione sanguinis	186.
Catochi & tabis eadem remedia	151.	Coalescentia rara exemplum	426.
Cava vena diuisio	317.	Chochlea valde elixa purgant	199.
Causi definitio 31. nomina 315. signa 187. species 41. subjectum 382. symptomata 31.		Coctionem iuuantia	268.
Causi, tertiana continua & synochi disci- men	315.	Caliaca quid	109.
Causus causa syncopæ	30.	Caliaca nomina 340. signa	109.
Cauterium in cephalaa 216. epilepsia	223.	Caliaci qui	266.
Cedmata quid	40. 320.	Caliacorum remedia	266.
Ceparia quid	323.	Coli nomina 341. intestini abscessus 114. af- fecti iuxta splenem & epas signa	110.
Cephalaa nomina 323. recidiua 216. subje- ctum	410.	Colica	36.
Cephalaa & vertiginis signa distinctiua	419.	Colica causa 111. nomina 341. subjectum	437.
	419.	Colica	
Cephalalgia quid	52.		
Cephalalgia forma varia	52.		
Ceratorum varietas in pleuritide	173.		
Ceratum in angina	165.		
Cerebri affecti in paralyti signa	423.		
Cerebri diuisio duplex ratione longitudinis & latitudinis	365.		
Cerebri medulla duplex	365.		



I N D E X.

<i>Colica & dysenteria discrimen</i>	404.	<i>Coriandri usus in rejectione sanguinis</i>	185.
<i>Colica & nephritidis discrimen</i>	404.	<i>Cornu caprinum *** a.</i>	
<i>Colici qui</i>	110.	<i>Corpulentia melancholicis</i>	63.
<i>Colici & iliaci doloris signa distinctiua</i>	404.	<i>Craspedon quid</i>	11. 312.
	404.	<i>Crisera quid</i>	164. 312. usus in syncope
<i>Colici & splenicis doloris signa distinctiua</i>	429.	<i>Crustra quid</i>	12.
	429.	<i>Cucubut quid</i>	328.
<i>Colici doloris & epatis phlegmones & pleuritis & aliorum morborum discrimen</i>	457.	<i>Cucumeris usus</i>	229.
	457.	<i>Cucurbitula sicca in calculo</i>	261.
<i>Colici & uterini doloris discrimen</i>	405.	<i>Cucurbitula in capitis morbo</i>	155. causo 202.
<i>Colicorum curatio</i>	268. signa 110. sympto-	<i>cephalaa</i>	214. cholera 195. in occipitia
<i>mata & partes consentientes</i>	111.	<i>& pectore in columella</i>	165. melancholia
<i>Colicorum & nephriticorum similitudo</i>	262.	<i>231. paralyfi</i>	237. phlegmone epatis 200.
	262.	<i>phrenitide</i>	143. pleuritide varijs modis
<i>Colicum pharmacum</i>	341.	<i>adhibita</i>	172. 173. 174. renum phlegmo-
<i>A colo icterus</i>	84.	<i>ne</i>	204. satyriasi 210. syncope 188. verti-
<i>Colon & renes contigui</i>	260.	<i>gine</i>	220. uteri suffocatione
<i>Ex colo aqua profluens</i>	114.	<i>Cucurbitula in ileo</i>	198. usus vetitus in le-
<i>In colo concoctio</i>	84.	<i>thargo à phrenitide</i>	147. usus in phreni-
<i>Collum, κίων</i>	312.	<i>tide</i>	142. usus in tetano
<i>Ex colore partis affecta signa</i>	352. 353.	<i>Cucurbitula inanes in pneumonia & quan-</i>	177.
<i>Colores animalium varij excepto elephante</i>	126. viscerum varij	<i>do</i>	430.
	86.	<i>Cutis vitiorum & cachexia signa distincti-</i>	
<i>Columbrinus simus</i>	164.	<i>na</i>	8.
<i>Columella affectus</i>	11 cicatrix 168. conuul-	<i>Cynanche etymologia</i>	9.
<i>sio</i>	68. curatio 165. prognostica ib. & 167.	<i>Cynanche nomen</i>	311. symptomata
<i>Columella & uua differentia</i>	165.	<i>In cynico spasmo & conuulsio & resolutio</i>	330.
<i>Columella & uua differentia</i>	165.	<i>Cypselis quid</i>	85.
<i>Columella & angina cognatio</i>	165.		
<i>Columna quid</i>	11. 312.	D.	
<i>Coma phreniticorum in pulmonia</i>	20. quid	<i>Deglutionis impedita remedia</i>	156.
	107.	<i>Delirium quid</i>	328.
<i>Compressio quid</i>	426.	<i>Delirium in phrenitide perpetuum quomo-</i>	363.
<i>Conceptus aboliti curatio</i>	290.	<i>do</i>	
<i>Concoctionem qua promouent</i>	266.	<i>Deliria in quibus morbis * b.</i>	
<i>Constipatio quid</i>	427.	<i>Dextra & sinistra partis differentia</i>	65.
<i>Ex consuetudine laborandi signa partis af-</i>		<i>Diabetes hydropis species</i>	258. quod
<i>fecta</i>	356.	<i>Diabetis causa</i>	96. 97. curatio 258. etymo-
<i>Conuulsio ex cholera quando</i>	194.	<i>logia</i>	97. nomina 336. prognostica 96.
<i>Conuulsionis causa</i>	369. remedia	<i>signa</i>	96. 97. subjectum
<i>Conuulsionis remedia ex vulnere. Vide</i>	147. 211.	<i>Diata post curationem quando necessaria</i>	265.
<i>Tetanus.</i>		<i>Diata in pleuritide</i>	170.
<i>Conuulsionis & paralyfis discrimen</i>	425.	<i>Diaphragmatis inflammatio *** a.</i>	
<i>Cor radix arteria</i>	202.	<i>Ex diaphragmate phrenitidis signa</i>	363.
<i>Cor quando non sanescit</i>	143.	<i>Diaphragmatis in uteri strangulatu affecti</i>	
<i>Cor spirandi principium</i>	18.	<i>signa</i>	413.
<i>Cordis affectus</i>	18. 28.	<i>Diaphragma parulentum</i>	47.
<i>Cordis in febre affecti simpliciter. per se, per</i>		<i>Diarrhoea quid</i>	376.
<i>consensum signa</i>	383. 384. 387. in ma-	<i>Diarrhaa quid</i>	108.
<i>rasmo</i>	364. 365. syncope		
	382.		



Diarrhœa ex morbo longo 110. ex potu aqua frigide 110.	Embroscha in paralyse 230.
Diarrhœe nomina 540. prognostica 110.	Emplustra qualia in rejectione sanguinis 181.
Diatrium pipercon in paralyse 237.	Emprosphotonos quid 4.
Dierum judicatoriorum syncope 188.	Emprosphotoni nomina 311.
Digerentia in pleuritide 169.	Empyematis quid 21.
Diploc quid 217. uteri 120. 345.	Empyematis causa 72. nomina 331. signa 72.
Dipsadus morsus 198.	Empyema quid 23.
Discutientia ex aloë 200.	Empyematis nomina 332. signa 426. subjectum 425.
Discussoria motus, vigilia 148.	Empyematis quid 71.
Discutientibus quâdo utendum & cur 175.	Empyematis curatio 241. symptomata 74.
Dodecathron medicamentum 242.	Empyematis sit pleuriticus 16.
Doloris varie species 345. alterans, distendens ib. grauens, lacerans, mordicans, nkerosus, pruriginosus, perforans, profundus, acutus, pulsans, stupidus 355.	Epar radix uendarum 78. 202.
Ex dolore situ signa partis affecta 354. doloris mutatione, specie ib.	Epatitis natura 199. nomina 332. acuti affectus 36. curatio 246. color 86. in hæmorrhagia affectu signa 405. 406. obstructionis subjectum quod 428. signa ib. phlegmones & musculorum abdominis & pleuritis & colici doloris discrimen 307. phlegmones causa 81. curatio 199. prognostica 80. 199. profluvia 37. purulentia 74. 79. purulenti prognostica 79. purulentia curatio ib. pur. signa ib. ulcera & purulenta curatio 248. vomica 87.
Doloribus conueniens victus 217.	Epatitis & splenis collatio 78.
Dorsi vena tantum dolet 39.	Epatitis fluxus 249.
Dorsi vena inflammationis symptomata 201. inflammatio causus est ib.	Epatitis quid 316. 332.
Dysenteria quid 111.	Ephemera febris duplex 384.
Dysenteria parua cachexia 189.	Ephemera signa 387. pestilenti signa 386.
In dysenteria partium affectarum signa 112.	Epialis signa 391.
Dysenteria ex longo morbo 110.	Epidemicarum febrium signa 395.
Dysenteria causæ 112. curatio 271. nomina 342. 343. signa 114. imminenti signa 116. subjectum 437. prognostica 114. 116. species varia 111. 343.	Epiglottidis usus 155.
Dysenteria & colica discrimen 404.	Epilepsia quid *** a. per consensum ib. signa ib. quis morbus 230. morbus interdum perpetuus 157. ex contagio 54. ab uteri strangulatu discrimen 413.
Dysenteria & fluxus hæmorrhoidalis discrimen 438.	Epilepsia causa 56. 157. 225. 226. curatio 224. 157. descriptio 55. nomina 55. 324. paroxysmorum leuantia 158. pars affecta principalis, minus principalis, per se, per consensum signa 367. 368. prognostica 157. remedia secreta 227. signa per se *** b. symptomata 156. 224.
Dysenteria & tenesmi differentia 438.	Epilepsia & apoplexia eadem remedia in paroxysmo 157.
Dyspnœa quid 332.	Epilepsia & cephalalgia eadem remedia 223.
Dysuria nomina 321.	Epilepsia et uertiginis signa distinctiua 419.
E. 224. 227.	Epilepsia qua faciunt patefaciant 227. 228.
Eclogma in epilepsia pro pueris 158.	Epileptica quid 311.
Eclogma medicamentosum in pleuride 170.	Epiplasmata in lethargo 145. tetano 160.
Eckyma quid 170.	Episcenium contractum in elephantiasi 131.
Etæryi usus 170.	Epithe-
Elephantis ab alijs animalibus discrepantia multiplex 126.	
Elephantiasis cum elephante multiplex similitudo 120. subjectum 120. 121.	
Elephantis curatio 298. & 303. nomina varia 128. 347. prognostica 132. 299. signa 129. symptomata 132.	
Elephas morbus contagiosus 23. 299.	
Elephantis & paralyse discrimen 425.	
Embrasmata in epilepsia 228.	



I N D E X.

<i>Epithema in causo</i> 203. <i>epilepsia</i> 226. <i>phrenitide</i> 143. <i>syncope</i> 191. <i>sanguinis rejectione</i> 181. <i>stomachi vitijis</i> 266.	<i>Fotus per lanam oleo tinctam in pneumonia</i> 178. <i>sanguinis rejectione</i> 180. <i>per spongiam</i> 181. 200. <i>cum vesica bubula olei calidi semiplena</i> 160.
<i>Erosio vena quid</i> 24.	<i>Fotus in angina</i> 164. 165. <i>calculo</i> 261. 160. 198. <i>phrenitide</i> 142. <i>pleuritide</i> 169. 172. <i>tetano</i> 160. <i>vertigine</i> 221.
<i>Eschara quid</i> 12.	<i>Fotuum materia</i> 148.
<i>Exanthemata quid</i> 13.	<i>Frena quid</i> 13.
<i>Exanthematum nomen</i> 313.	<i>Friccio in cephalaa</i> 217. <i>crurum</i> 222. <i>durior in epilepsia</i> 228.
<i>Exercitationes bona qua</i> 228. <i>in cephalaa</i> 217. 219.	<i>Ex frigiditate partis affecta signa</i> 353.
<i>Exercitationis varia genera</i> 222. 225.	<i>Frigoris extremorum remedium</i> 247.
<i>Ab excretis signa partes affecta</i> 333. 354.	<i>Vide extremorum.</i>
<i>Exquisitarum & notharum februm signa</i> 349.	<i>Fructus horai qui</i> 172. <i>noxij</i> 219. <i>qui nascent in pleuritide</i> 171.
<i>Extremorum friccio in cholera</i> 194. <i>frigiditas in causo</i> 202. <i>ut curanda</i> 192. 194. 196.	<i>Furfures quid significent</i> 353.
<i>Ex uiperis pharmacum</i> 226.	<i>Furor. Vide Mania.</i>
F.	G.
<i>Faba incommoda</i> 241.	<i>Gagates lapis **** a.</i>
<i>Famis morbosa nomina</i> 339.	<i>Galla usus in rejectione sanguinis quando</i> 185.
<i>Fames est res frigida & sicca</i> 159.	<i>Galli ydem qui celta</i> 300.
<i>Fascia astringentes in suffocatione</i> 209.	<i>Gargareon quid</i> 312.
<i>Fauces quid</i> 311.	<i>Gargarismi in angina</i> 164.
<i>Faucium morborum curatio</i> 167. <i>prognostica ib.</i>	<i>Genitura effectus, virilitas & alia</i> 105.
<i>Faucium & tonsillarum morborum cognatio</i> 167.	<i>Glandulos irritanda alius assidue</i> 142.
<i>Febris acuta</i> 19. <i>continua</i> 384. <i>lypiria, epialos, latica, syncopalis, catarrhalis</i> 385. <i>intermittens ib. lenta, non lenta, simplex, composita, exquisita, notha</i> 386. <i>continua & intermittentes signa</i> 388. <i>cura in lethargo</i> 155. <i>hectica triplex genus februm continet</i> 364. <i>morbillose signa</i> 397. <i>pleuritica</i> 169. <i>quid</i> 387. <i>quotuplex</i> 389. <i>subiectum unum</i> 364.	<i>Glans in epilepsia pro pueris</i> 158.
<i>De februm parte affecta & diuisione tabula</i> 399.	<i>Globuli dandi sub lingua continendi in pleuritide</i> 174.
<i>De februm partis affecta & certa speciei signis tabula</i> 400.	<i>Gonorrhoea quid</i> 104. <i>muliebris</i> 119. <i>ex satyriasi</i> 105.
<i>Februm simplicium & compositarum signa</i> 394.	<i>Gonorrhoea curatio</i> 267. <i>nomina</i> 337. <i>signa</i> 434. <i>subiectum ib. virorum & mulierum differentia</i> 105. <i>& uterini fluoris discrimen</i> 435.
<i>Fimbria quid</i> 312.	<i>Gracilitas ex diarrhoea</i> 299.
<i>Fistula vesicae</i> 102.	<i>Gula obstructio</i> 155. <i>resolutio ib.</i>
<i>Flatus discutientia</i> 148.	<i>Gurgulio quid</i> 11. 312.
<i>Fluor alui multiplex</i> 340. <i>sanguinolentus ib.</i>	<i>Gutta morbus</i> 310.
<i>Fluoris muliebris species</i> 344.	<i>Guttur quid</i> 371.
<i>Focus febris quid</i> 383. <i>unde dictus ib.</i>	<i>Gygartus quid</i> 238.
<i>Fomes febris quid</i> 383.	H.
<i>Fotus qualis in pleuritide</i> 172.	<i>Hamoptyscos pars affecta varia, signa affecta simpliciter, per se, per consensum</i> 377. 378. 379. 380.
	<i>Hamorrhagia quid</i> 21. <i>venarum</i> 320. 340. <i>virorum</i> 48. <i>similis strangulatus uteri ib.</i>

Hamor-



I N D E X.

<i>Hamorrhoidalis vena duplex</i> 320. fluxus & dysenteria discrimen 438.	<i>Hysterica affectio. Vide uterina affectio</i> 413.
<i>Halice facultas</i> 170. in peripneumonia 178. proptisana 241.	<i>Hysterica ansit mortua signa</i> 413.
<i>Halicacabi radix</i> in gonorrhoea 265.	I.
<i>Hætica febris nulla mentio apud veteres</i> & cur 310. definitio *** a. divisio ib. & 384. signa 388. febris pestilentio signa 396.	<i>Îcteri causa</i> 83. color 85. curatio 252. dua species 86. etymologia ib. nomina 337. pars affecta 429. signa ib. & 84. prognostica 87.
<i>Hellechorus albus, niger</i> 302. remedium quale 219.	<i>Îcteri albioris signa</i> 86. à colo signa 85. à licne signa 84. nigri signa 86.
<i>Hellebori exhibendi modi</i> 221. 231. tempus 300. usus in arthritide 295. caliaci 267. melancholia 231.	<i>Îcterus quid</i> 83. niger 333. post phlegmonem epatis 38. uniuersi corporis 86.
<i>Hemiplegia quid</i> *** b.	<i>Igni similia pharmaca in faucium morbis</i> 187.
<i>Hemiplegici signa</i> 395.	<i>Ilei causa</i> 34. curatio 197. nomina 316. pars affecta principalis minus principalis 402. prognostica 197. symptomata 35.
<i>Herculeus morbus elephantiasis</i> 128. 347.	<i>Ileos quid</i> 34. unde ib. hamatites 333.
<i>Heterocrania quid</i> 53.	<i>Iliscus quid</i> 328.
<i>Heterocrania nomina</i> 323. remedia eadem qua cephalæa 219.	<i>Înârnov quid</i> 312.
<i>Hiera facultas</i> 210. laus 233. 153. usus in cephalæa 214. elephantiasis 209. epilepsia 225. ileo 198. mixtum castorium & alia in paralyti 236. potio.	<i>Indolentia in morbis securos facit</i> 28.
<i>Hirudines in satyriasi</i> 210. 153.	<i>Inedia mala in lethargo</i> 146. syncope 189. tetano. 159.
<i>Hirudinum usus</i> 200.	<i>Inedia in phlegmone epatis</i> 199. remedium pleuritis si sit à repletionem cibi & potus 169.
<i>Hominis vita in duobus consistit</i> 18.	<i>Inflammationis in abscessum conuersa curatio</i> 199. remum signa 408.
<i>Hordei cremoris facultas</i> 201.	<i>Insania quid</i> * b.
<i>Horrores ab ulceribus</i> 167.	<i>Instaurantia diata</i> 265. quanam sint 186. 193. 235. 260.
<i>Humidum duplex</i> 346. primigenium quid ib.	<i>Inunctiones palati in angina</i> 164.
<i>Hydrocephalus quid</i> 95.	<i>Intestini calefacti signum</i> 356. in dysenteria affecti signa 437. in ileo affecti simpliciter, per se, per consensum signa 403.
<i>Hydrocephali pars affecta</i> 432.	<i>Intestinorum divisio</i> 110. 342. in lienteria affectorum signa 439. tunica 113.
<i>Hydrophobia quid</i> 328.	<i>Ionchi quid</i> 264. 313. in arthritide 124.
<i>Hydropis causa</i> 94. curatio 255. mixti signa 94. nomina 335. 336. prognostica 95. pulmonis signa 433. signa 92. soluti ex coli profluuium 114. species 92. 350. ampullosa 95. specierum conjunctio 92. subiectum 431. uteri signa 433.	<i>Iracundi natura amentie obnoxij</i> 60.
<i>Hydrops quid</i> 91. ex cachexia 88. 90. ex colica 111. ictero 88. in curabilis 91. ex podagri 125. ex pulmonaria 78. ex scirrho epatis 81. scirrho lienis 83. unius partis 95.	<i>Iracundia incommoda</i> 228.
<i>Hyems obnoxia colica</i> 111. paralyti 67. pleuritis 17. renum affectibus 45.	<i>Irrigationes capitis in phrenitide</i> 138.
<i>Hypochondriorum nomen</i> 327.	<i>Îschias quid</i> 121. 346. claudos facit 122. vena que 317.
<i>Hypochymatis & scotomatis differentia</i> 419.	<i>Îschiadis curatio ex Aegineta</i> 296. initium unde 123.
<i>Hypopia quid</i> 131.	<i>Îschuria quid</i> 103.
	<i>Îschuria causa</i> 203. nomina 321.
	<i>Îtrion quid</i> 224.



I N D E X

<i>Exjuuantibus & ladentibus signa partis affecte</i>	356.	<i>Libido melancholicorum</i>	63.
<i>Iuuenes obnoxij cholera 33. gonorrhæa 105.</i>		<i>Lichen quid</i>	348.
<i>femina vulvae strangulatus 48. tetano minus</i>	5.	<i>Lien purulentia rard corrumpitur</i>	81.
		<i>Lien purulentus</i>	74.
		<i>Lienes magni</i>	333.
		<i>Lienis color 86. indolentia 82. inflammatio- nis curatio 201. 251. nomina 333. scirrhi curatio 250. scirrhi prognostica ib. signa 82. scirrhi & empya subjectum 428. obstructionis signa ib. scirrhus 81.</i>	
K.		<i>Lienteria quid 116. ex logo morbo 110. 117. ex hydrope</i>	117.
<i>Kalbaumen</i>	315.	<i>Lienteria causa 116. 117. curatio 274. ety- mologia 117. nomina 343. prognostica 117. signa ib. subjectum</i>	438.
<i>Kardialgia quid</i>	339.	<i>Ligatura in angina ubi 163. pedum 208. in sanguinis rejectione 180. in vertigine</i>	221.
<i>Kiur quid</i>	312.		
<i>Koilin quid</i>	340.	<i>Limnestus quid</i>	359.
<i>Krâge unde</i>	348.	<i>Lintea qualia in syncope</i>	192.
<i>Krampff quid</i>	369.	<i>Lipothymia quid</i>	64.
<i>Krimpffsuche</i>	351.	<i>Liquoris quid</i>	60.
<i>Krumbhals</i>	311.	<i>Lithiasis & nephritis differunt.</i>	410.
<i>Kurfes nomen</i>	313.	<i>Lorulum quid</i>	312.
<i>Keveiw quid</i>	203.	<i>Lotium scientia profunt phreniticis</i>	137.
<i>Kúsis nomen</i>	337.	<i>Luis Hungarica nomina 315. signa</i>	397.
		<i>Luis Venerea nomina</i>	346.
L.		<i>Lues Venerea cognata arthritidi</i>	346.
<i>Lac asinae quale 193. 204. bubulum 203. caprinum 203. 204. equinum 204. mulieris</i>	193. 203.	<i>Lumbricorum in renibus signa</i>	409.
<i>Lac in elephantiasi 299 phthisi 240. medela tabis</i>	151.	<i>Lux an conueniat phreniticis</i>	135.
<i>Ex lacte signa partis affecta</i>	354.	<i>Lycanthea nomen</i>	311.
<i>Lactis facultas 202. noxa</i>	218.	<i>Lypiria signa</i>	391.
<i>Laserpitij usus in tetano</i>	161.		
<i>Latica febris signa</i>	391.	M.	
<i>Latus quid sit</i>	374.	<i>Magnus morbus elephantiasis</i>	128.
<i>Lectica usus in lethargo</i>	153.	<i>Mala elixa conceduntur in pleuritide</i>	171.
<i>Lectus mollis in tetano</i>	158.	<i>Mala extantes & rubida</i>	70.
<i>Lentis facultas 218. usus in rejectione san- guinis</i>	185.	<i>Malagma ex seminibus</i>	200.
<i>Lenticularis morbus</i>	313.	<i>Malazcy</i>	348.
<i>Léo morbus</i>	186. 347.	<i>Malua seminis usus</i>	233.
<i>Lepra Arabam quatuor species 348. in ele- phantiasin transitus</i>	445.	<i>Mania & delirium differunt 60. indicium</i>	63.
<i>Lepra & elephantiasis discrimen</i>	347.	<i>Mania definitio 59. causa 61. 62. curatio 236. cum melancholia collatio 57. & me- lancholia differentia 420. exempla 61. nomina 328. obnoxij qui sint 60. pars affecta 62. 420. species 59. 61. sym- ptomata 61. varia genera</i>	328.
<i>Lepra Græcorum 347. unde ib.</i>		<i>Mania & melancholia remedia eadem</i>	236.
<i>Lethargici aer 145. causa ib. cubile ib. cura- tio ib. medela per vena sectionem 146. materia *** b. nomina 309. purgatio 146. signa *** b.</i>			
<i>Lethargi pars affecta per se & p consensum & signa 363. & phrenitides cognatio 147. ab uteri strangulatu differentia</i>	413.	<i>Marasmi definitio *** a. & b. signa ib. curatio</i>	
<i>Lethargus tenebra 145. phrenitidi succedens 146. contrarius ib.</i>			
<i>Leucophlegmatias quid</i>	333.		



I N D E X.

<i>curatio</i> 101. <i>nomina</i> 310. <i>causa subiectum,</i>	<i>Mulsa usus in tetano</i>	259.
<i>symptomata</i> 363. 364.	<i>Mulsa vires</i>	141.
<i>Marasmius duplex</i> 310.	<i>Musculus pars affecta in paralyti</i>	421.
<i>Masticatoria</i> 150.	<i>Musculi in paralyti affecti signa</i>	424.
<i>Medicamentum excipiens</i> 198.	<i>Mutter morbus</i>	341.
<i>Medicationis tempore multi non conuale-</i>	<i>Mysterium medicamentum</i>	267.
<i>scunt</i> 234.	<i>Mydriasis quid</i>	66.
<i>Medici commoda qua</i> 233. <i>officiū</i> 211. 213.	<i>Mytoton quid</i>	112.
<i>Medicus non potest omnes sanare</i> 233.		
<i>Medulla doi si membrana</i> 65.	N.	
<i>Mel semicoctum pro cataplasmate in phre-</i>	<i>Nares vulnerandi modus</i>	216.
<i>niticis</i> 142.	<i>Naturam vitiat omne copiosum & sub-</i>	
<i>Melancholia in capite</i> 231. <i>erotica</i> 59. <i>pars</i>	<i>tum</i> 188.	
<i>manie</i> 57. <i>ex stomacho</i> 107. <i>à suppressis</i>	<i>Nausea nomina</i>	338.
<i>menstruis & hemorrhoidibus</i> 232. <i>ex</i>	<i>Necrosis quid</i>	45.
<i>vertigine</i> 54. <i>unde</i> 56.	<i>Nehres unde</i>	348.
<i>Melancholia causa</i> 58. <i>curatio</i> 230. <i>defi-</i>	<i>Nephritici & colici doloris discrimen</i>	354.
<i>nitio</i> 57. <i>hypochondriaca signa</i> 420. &		404.
<i>mania differentia ib. nomina</i> 327. <i>origo</i>	<i>Nephritis quid</i>	321. 337.
<i>52. pars affecta</i> 420. <i>prognostica</i> 232.	<i>Nephritis & lithiasis differunt</i>	410.
<i>studiosorum ex stomacho signa</i> 107. <i>sym-</i>	<i>Nerui in paralyti affecti signa</i>	424.
<i>ptomata</i> 58. 107. <i>uterina signa</i> 421. <i>va-</i>	<i>Neruorum affectus arthritidis</i> 121. <i>chiasmus</i>	
<i>ria genera</i> 327.	65. <i>doloris remedium</i> 147. <i>pars alia ca-</i>	
<i>Melancholici affectus signa</i> 420.	<i>nitas, alia substantia</i> 368. <i>principium</i>	
<i>Melancholici flatuosi dicti</i> 56.	<i>cerebrum quale</i> 365. <i>remedium castore-</i>	
<i>Mensium suppressionis curatio</i> 232. 276.	<i>um</i> 149. <i>resolutio. Vide paralyti</i>	64.
<i>Menta facultas</i> 218.	<i>Neruus quid</i> 421. <i>illius paria que ib.</i>	
<i>Menti inunctio in tetano</i> 160.	<i>Nerui & musculi lesi simpliciter per se &</i>	
<i>Metaphrenon quid</i> 6.	<i>per consensum in spasmo</i>	369.
<i>Metrenchytes in pleuritide</i> 174. <i>suffocatio-</i>	<i>Nominum cura Medico necessaria</i>	309.
<i>ne uteri</i> 208.		
<i>Mithridatium</i> 235. 260.	O.	
<i>Mithridati usus in epilepsia</i> 226.	<i>Obstructionis renum signa</i>	408.
<i>Mole curatio</i> 286.	<i>Ocij incommoda</i>	227.
<i>Morbilorum signa</i> 398.	<i>Oculi anei in elephantiasi</i> 131. <i>concaui</i> 63.	
<i>Morbi acuti & longi definitio</i> * a.	89. <i>prolapsus</i> 344.	
<i>Morbi longi signa quatuor</i> * a. 51.	<i>Odoramenta in lethargo</i> 149. <i>vertigine</i>	
<i>Morborum longorum curatio non differen-</i>	221. <i>fada in strangulatu uteri</i> 208. <i>in</i>	
<i>da</i> 212.	<i>syncope qualia</i> 189. 192.	
<i>Ex morbo grassante signa partis affecta</i>	<i>Ex odore partis affecte signa</i>	352.
355.	<i>Olera bona qua</i> 218. <i>qua prosunt in epi-</i>	
<i>Morbus gallicus. Vide lues Venerea.</i>	<i>lepsia</i>	229.
<i>Morbus regius. Vide icterus.</i>	<i>Omiplatarum dolor quando</i>	106.
<i>Morborum nomina unde</i> 309. <i>vetustorum</i>	<i>Omphacium quid</i>	191.
<i>remedium unicum helleborus</i> 302.	<i>Opisthotonos quid</i>	4. & 6.
<i>Moretum quid</i> 112.	<i>Opisthotoni nomina</i>	311.
<i>Morphaa alba</i> 348.	<i>Oris apertio in vertigine</i> 221. <i>collutio ex</i>	
<i>Mortis periphrafi</i> 32.	<i>vino in syncope</i> 189. <i>ventriculi medela</i>	
<i>Mulieres obnoxia asthma</i> 76. <i>gonorrhoea</i>	<i>in phrenitide</i>	143.
<i>laborantes</i> 105. <i>melancholia obnoxia</i> 58.	<i>Orthopnaa quid</i>	76. 332.
<i>podagra difficilius laborant & cur</i> 125.	<i>Oryza improbat in pleuritide & cur</i>	179.
<i>tetano</i> 170.	<i>Oryze facultas</i>	170.



I N D E X.

Offis facri dolor	36.	Peripneumonia pars affecta	376. progn.
Ossa quando dolent	121.	stica.	74.
Ossium dolor in arthritide	124.	Peritonai inflamatio pro lienis phlegmone	
Oua qualia in syncope	190.	81. tumor similis epatis dolori & diffe-	
Onorum qualitas in vertigine	223. 224.	rentia	79.
usus varius in pleuritide	171.	Pharynx quid	313.
Oxymellis usus in pleuritide quando	175.	Phenigmus in cephalaa	217. caliaci
		epilepsia	226. gonorrhoea
		Philonis antidotus	265.
P.		Phlebotomia linguae in angina	163. a nasi
Panis aridus cum mulsu sumtus	170. qualis	venis	216. cachexia
in pleuritide ib. buccella in cholera	105.	260. causo	202. cephalaa
syncope	190.	213. columella	
Panus quid	314.	165. elephantiasi	299. epilepsia
Paracynancha nomen	311.	225. ileo	
Paralysis quid *** b. 64. ex colica cura-		197. inflammatione renum	204. melan-
tio	240. ex gonorrhoea	230. phlegmone epatis	199. pleu-
105. triplex	422.	ritide	169. pneumonia
Paralysi affecta partis simpliciter signa	422.	176. phrenitide	
per se & per consensum	423.	136. & quantitas & locus ib. sanguinis	
Paralyseos, apoplexia, arthritidis convulsio-		rejectione varia	179. syncope
nis, elephantis, stuporis tremoris signa di-		187. tetano	159. vertigine
stinctiva	424. & apoplexia diff.	220. uteri suffocatio-	
& apoplexia diff.	329.	ne	208. satyriasi
tum apoplexia commune nomen	310.		210.
curatio	236. ex laxatione & extensione	Phlebotomia succedanea quae	152.
curatio	238. particularis curatio ib. no-	Phlegmatias quid	335.
mina	329. 331. subjectum	Phlegmone sine pure curatio.	204.
421. sympto-		Phorcea instrumentum	238.
mata	67. varia genera	Phragmos quid	316.
	329.	Phrenitis quid *** b. ex vitio jecoris	141. vi-
Paraplegia quid	64.	tio splenis ib. per consensum a thorace	143.
Paraplegia species	66.	In phrenitide affecti cerebri p se et p consen-	
Paresis quid 64. 66. causa	67.	sum	362. diaphragmatis per se & p con-
Paristhmia quid	313. 373.	sensum	363. partes consentientes
Paroxysmus quid	310.	143. syncope prius succurrendum	143. thora-
Pars affecta quid 349. per se quid ib. per		cis ratio habenda ib. totius cerebri sim-	
consensum ib.		pliciter affecti signa	360. partis cerebri
Partes consentiunt essentialiter & acciden-		ib. pericranij	361. meningum ibi.
taliter	350. corporis omnes morbo affe-	Phrenitides, apoplexia, epilepsia, lethargi,	
cta	349.	melancholia cognatio & cognitio	360.
Partis affecta tabula	358.	Phrenitidis curatio	135. & lethargi cogni-
Partis cujuslibet substantia triplex: solida,		tio	147. nomina
carnosa, spiritiuosa	364.	309. pars affecta	360.
Partis simpliciter affecta signa	351. per se	orta a phlegmone precordiorum curatio	
& per consensum sig. 356. unius vel plu-		139. prognostica	55. symptomatum cu-
rium sig. ib.		ratio	143. signa *** a.
Ex partis natura signa partis affecta	352.	Phreniticorum capitis irrigatio	138. cibus
Partus difficilis curatio	293.	qualis	137. 138. cubile, vestes, aer
Pastinaca radix	301.	curatio ib. inedia	136. phlebotomia ib.
Pectus quid	18.	somnus ut conciliandus	139.
Pectoris medela in phrenitide	143.	Phthisis quid	68. ex cachexia
Pedum unctio in cholera	196. lethargo	88. 90. ex co-	
Penis affecti simpliciter signa in satyriasi	414.	lica	111. ex empye
	210.	72. duplex	331. cura-
Perinaeos quid	210.	tio	240. nomina
Peripneumonia quid	19.	331. prognostica	71. sig-
		na	70. subjectum
		425.	
		Phthoe quid	69. 331.
		Φύεθλον quid	314.
		Pica quid	339.



<i>Picerium in pleuritide</i>	174.	<i>Pulmo non dolet & cur</i>	19. <i>purulentius</i>	374.
<i>Pilula bechica in pleuritide</i>	174.	<i>spirandi instrumentum</i>		18.
<i>Pilorum casus in elephantiasi</i>	130.	<i>Pulmonis abscessus</i>	74. <i>eiusdem curatio</i>	242.
<i>Piper in ovis in ptisana, in omnibus epatis bene proficit</i>	171.	<i>abscessum nomina</i>	332. <i>signa</i>	75.
<i>Pisces boni qui 218. quando exhibendi in pleuritide</i>	171.	<i>Pulmonis affectus</i>	19. <i>angustia quintuplex</i>	
<i>Pittacium quid</i>	217.	<i>426. in asthmate affecti signa</i>	427. <i>hydropis signa</i>	433. <i>idonea medicamenta</i>
<i>Πλάδι quid</i>	338.	<i>177. natura</i>	75. <i>nat. attractrix</i>	177. <i>partes</i>
<i>Platycoria quid</i>	66. 330.	<i>19. 371. 426. in peripneumonia lesi simpliciter, p se, p consensum signa</i>	376.	
<i>Plethos quid</i>	210.	<i>377. in phthisi affecti signa</i>	425. <i>vomica signa</i>	426.
<i>Pleura definitio 15. per se & per consensum affecta in pleuritide signa</i>	375. <i>purulentia quid</i>			77.
<i>72.</i>		<i>Pulmonarium quid</i>		77.
<i>Pleuritis quid 14. 15. ex ingluvie</i>	169. <i>spuria ex statu</i>	<i>176. 245. pars affecta</i>		
<i>175. exterior</i>	169.	<i>428. signa ib. prognostica</i>	78. <i>176. signa</i>	77.
<i>In pleuritide curatio non differenda & cur</i>		<i>Pulmonia quid</i>		19.
<i>168. pars affecta</i>	14. 373.	<i>Pulmonia nomina</i>	332. <i>symptomata</i>	19. 20.
<i>Pleuritidis & cognatorum morborum discrimen</i>	307. <i>curatio</i>	<i>Pupilla oculi vitium</i>		66.
<i>168. ex inedia curatio</i>	196. <i>nomina</i>	<i>Purgantia qua</i>	226. <i>in angina qualia</i>	163.
<i>314. prognostica</i>	168.	<i>Pharmacum purgans in epilepsia propue-</i>		
<i>69. notha progn.</i>	17. <i>symptomata</i>	<i>ris</i>	158. <i>paralyti</i>	237.
<i>15.</i>		<i>Purgantium formulae in lethargo</i>	146. <i>ca-</i>	
<i>Pleuriticorum potus</i>	174.	<i>talogus</i>		163.
<i>Pleuritici quando purulenti</i>	172.	<i>Purgantes cibi</i>		198.
<i>Pneumodes quid</i>	77. <i>nomen</i>	<i>Purgatio in cibis medicamentosa</i>		299.
<i>332.</i>		<i>Purgantia clanculum mista</i>	236. <i>simplicia</i>	
<i>Pneumonia breuiter conuenientia</i>	178. <i>no-</i>			235.
<i>mina</i>	314.	<i>Post purgationem quid faciendum</i>		231.
<i>Podagra quid</i>	121. 346. <i>raro continua</i>	<i>Pus rumpentia medicamenta</i>	249. <i>facien-</i>	
<i>125.</i>		<i>tia qua</i>		164.
<i>Podagra prognostica</i>	125. <i>signa ib.</i>	<i>Ex pure rejecto signa partis affecta</i>		353.
<i>Pomorum usus</i>	171.	<i>Purisin empye color</i>	73. <i>à jecore transitus</i>	
<i>Porrum cum sua coma & amygdala amara cum, remore in pleuritide</i>	171.	<i>varius</i>		249.
<i>Potiones in sanguinis reiectione</i>	182.	<i>Purulentia quid</i>		71. 72.
<i>Potus in causo</i>	213. <i>modicus in pneumonia</i>	<i>Purulentia epatis signa</i>		249.
<i>omni cur</i>	178. <i>parcissimus in reiectione</i>	<i>Putrida febris duplex</i>		384.
<i>sanguinis & cur</i>	185. <i>frequentior in syn-</i>	<i>Putrida febris signa</i>		387.
<i>cope</i>	189.	<i>Pye quid</i>		69.
<i>Precordia inflammata cutis tumida aut concaua</i>	147.	<i>Pylori affectus qui</i>		436.
<i>Priapismi nomina</i>	322.			
<i>Proboscis quid</i>	127.			
<i>Psoa quid</i>	347. 348.			
<i>Ptisana mixta</i>	171.			
<i>Ptisane cremor cum melle in tetano</i>	159.			
<i>in pneumonia</i>	178. <i>usus in phthisi</i>			
<i>241.</i>				
<i>pleuritide</i>	170. <i>laus</i>			
<i>170. preparatio</i>	224.			
<i>πτύσις quid</i>	21.			
<i>Pueri cachexia obnoxij</i>	90. <i>cholera</i>			
<i>34. cra-</i>				
<i>spedo</i>	12. <i>diarrhaea</i>			
<i>116. ileo</i>	35. <i>phthoa</i>			
<i>71. pleuritidi</i>	17. <i>scirrbo lienis</i>			
<i>83. tetan-</i>				
<i>nos ulceribus testium</i>	13. <i>& cur.</i>			

R.

Rarefactio vena quid

24.

29 3

Kaub



<i>Aud unde</i>	348	<i>in renum calculo</i> 101. <i>ejectio ab ore</i> 21.
<i>Recidiva unde</i>	175.	314. <i>profluuij ex renibus signa</i> 434. &
<i>Ex regione signa partis affecta</i>	352.	<i>pulmone rejecti signa</i> 27. <i>rejecti a siccitate</i>
<i>Regius morbus. Vide icterus.</i>		186.
<i>Rejectio quid</i>	21.	<i>Ex sanguinis vomitu signa ventriculi pe-</i>
<i>Rejectiois signa</i>	21.	<i>toris, capitis affecti signa</i> 356.
<i>Remedium aequale</i>	197.	<i>Saphati quid</i> 348.
<i>Renes, glandulae</i>	42.	<i>Saphena vena quae</i> 317.
<i>Renes alterutrius affecti signa</i>	409.	<i>Ex sapore partis affecta signa</i> 357.
<i>Renum acuti affectus</i> 42. <i>affectorum nomi-</i>		<i>Saponis usus in elephantiasi</i> 300.
<i>na</i> 321, 337. <i>affectorum obstructione</i>		<i>Satyri quid</i> 48. <i>nomen</i> 322.
<i>signa</i> 408, 410. <i>calculus</i> 45. <i>calculi &</i>		<i>Satyriasis quid</i> 48. <i>lepra</i> 347. <i>idem quod</i>
<i>ulceris curatio</i> 260. <i>in diabeti affecto-</i>		<i>elephantiasis</i> 128. <i>causa</i> 209. <i>curatio ib.</i>
<i>rum signa</i> 433. <i>descriptio</i> 98, 336. <i>gru-</i>		<i>medela</i> 49. <i>nomina</i> 322. <i>subjectum du-</i>
<i>mi sanguinei</i> 45. <i>hemorrhagia</i> 43. <i>in-</i>		<i>plex in viris, in feminis</i> 414. <i>symptoma-</i>
<i>flammatorum signa</i> 408. <i>inflammationi</i>		<i>ta</i> 49, 209.
<i>consentientes partes</i> 203. <i>inflammatio-</i>		<i>Scabies unde</i> 347.
<i>nis curatio</i> 203. <i>morborum curatio</i> 261.		<i>Scirrhi inflammationibus succedant</i> 250.
<i>nomina</i> 336. <i>phlegmone</i> 45. <i>substantia</i>		<i>lienis curatio ib.</i>
<i>205. ulcera</i> 45, 99, 102.		<i>Scorbutus, icterus niger, voluulus hamati-</i>
<i>Respiratio actio thoracis</i> 426.		<i>tes, magni lienes, niger albos, cognata</i>
<i>Respirationis instrumenta quae</i> 371.		<i>nomina</i> 333.
<i>Ex retentis signa partis affecta</i> 354.		<i>Scorbuti pars affecta</i> 429. <i>nomina</i> 333.
<i>Rhei radice facultas</i> 183.		<i>Scotodine quid</i> 54.
<i>Rheas fistula</i> 102. <i>quid</i> 207.		<i>Scotoma quid</i> 54.
<i>Rigere quid</i> 311.		<i>Senes cacexia obnoxij</i> 90. <i>diarrhea</i> 110.
<i>Rigoris curatio. Vide tetanus.</i>		<i>phthisi</i> 71. <i>pleuritidi</i> 17. <i>stomachi affe-</i>
<i>Ruptura vena quid</i> 24.		<i>ctui</i> 108. <i>tetanos uuae</i> 12.
<i>Ryteon quid</i> 112.		<i>Sepia in cibis</i> 34.
		<i>A sexu signa partis affecta</i> 352.
		<i>Siccantia remedia quae</i> 235.
		<i>Ex siccitate partis affecta signa</i> 353.
		<i>Signorum partis affecta diuisio</i> 351.
		<i>Sinapi facultas</i> 218. <i>aluuum mouet</i> 150.
		<i>purgat</i> 163.
		<i>Sinapisimus</i> 150. <i>in cephalaea</i> 217.
		<i>Sinciput locus communis sensibus</i> 160.
		<i>Siphylis unde</i> 347.
		<i>Sitis immoderata quid</i> 339. <i>remedia</i> 112.
		<i>in phrenitide rem</i> 144.
		<i>Situm tollentia</i> 259, 266.
		<i>Ex situ morbi signa partis affecta</i> 352.
		<i>Soda Arabum quid</i> 323.
		<i>Somnus quid sit</i> 49. <i>multus nocet</i> 222.
		227.
		<i>Somnum cociliantia</i> 139, 140. <i>tollentia</i> 150.
		<i>Somnifica quando vitanda</i> 178. <i>in pneumo-</i>
		<i>nia ib.</i>
		<i>Soporifera in ileo</i> 197.
		<i>Ex sono partis affecta signa</i> 352.
		<i>Sphagitides vena *** b.</i>

Spasmi



I N D I E X

<i>Spasmi & paralysis differentia</i>	368.	<i>Syncopa definitio</i> 28. 29. 30. 187. non est sto-	
<i>Spasmus cynicus quid</i>	64.	<i>machi affectus</i> 29. <i>causa causus</i> 187. re-	
<i>Spasmi cynici partes affecta</i> 68. <i>signa</i> 370.		<i>medium vinum</i> 144. <i>curatio</i> 187. <i>nomi-</i>	
<i>symptomata</i>	67.	<i>na</i> 314. <i>pars affecta, signa affecta simpli-</i>	
<i>Spina inunctio in lethargo</i> 147. <i>in paralyfi</i>		<i>citer, per se, per consensum</i> 381. <i>progno-</i>	
<i>affecta signa</i>	423.	<i>stica</i> 187. & <i>phrenitidis cognatio</i> 189.	
<i>Spirationis necessitas</i> 18. <i>instrumenta</i> ib.		<i>symptomata</i> 30. <i>desinentis signa</i> 193. <i>ex</i>	
<i>Spiritus duplex</i>	364.	<i>syncopa tabes</i> ib. <i>ab uteri strangulatu</i>	
<i>Splenis nomina. Vide lienis.</i>		<i>differ.</i>	413.
<i>Splenici & colici doloris signa distinctiva</i>	429.	<i>Synochus duplex</i> 315. <i>epidemicus anni</i>	
		1580.	315.
<i>Spongia nocent in vesica affectu</i> 206. <i>usus</i>		<i>Synochi putris signa</i> 390. <i>no putris</i> sig. 389.	
<i>in syncope</i>	192.	<i>Syntexis ex cachexia</i>	88. 90.
<i>Spongijis utendum pro fotu</i>	164.	<i>Syntecticus fluor</i>	340.
<i>Spuilio quid</i>	21.	<i>Syntectici qui</i>	81.
<i>Ex spuito signa partis affecta</i>	353.	<i>Syphilis unde</i>	347.
<i>σαφύλωμα quid</i>	312.	<i>Syria obnoxia tonsillarum affectibus</i>	14.
<i>Ex stercore partis affecta signa</i>	353.		
<i>Sterrutamenta in cephalaa</i> 215 <i>lethargo</i>		T.	
<i>144 vertigine</i> 220. <i>vulvae strangulatu</i> 290.		<i>Tabis curatio</i>	151. 193.
<i>Sternon quid</i>	71.	<i>Tabes ex syncope</i>	193.
<i>Stomachus vita principium non est</i> 29. <i>quid</i>		<i>Taurus jugulatus similes epileptici</i>	2.
339. <i>tergo adherescit</i>	231.	<i>Temporum vena exorta ex diarrhaa</i>	109.
<i>Stomachi affectuum nomina</i> 338. <i>ardoris</i>		<i>Temerè orta</i>	60.
<i>causa & remedia</i> 144. <i>affectus</i> 106. <i>affe-</i>		<i>Tenebrae an conueniant phreniticis</i>	135.
<i>cti signa</i> ib. <i>à bile affecti signa</i> 107. <i>com-</i>		<i>Tenesmus quid</i> 113. <i>in cholera</i>	33.
<i>pressio</i> 436. <i>vitio laborantium curatio</i>		<i>Tenesmi & dysenteria differentia</i> 438. <i>no-</i>	
265. <i>descriptio</i> 106. <i>dolor quos morbos</i>		<i>mina</i>	343.
<i>parit</i> 436. <i>nomina</i> 337. <i>remedium in</i>		<i>Tenoris cum corpulentia collatio</i>	75.
<i>phrenitide</i> 143. <i>symptomata</i> 30. 436. &		<i>Tergo stomachus adherescit & ubi</i>	231.
<i>uteri similis affectus</i>	119.	<i>Tertiana continuè signa</i> 390. <i>interpolatè</i>	
<i>Stomachici qui</i>	339.	<i>sig.</i> 392. <i>notha sig.</i>	394.
<i>Storyne instrum.</i>	216.	<i>Testium dolor in colica</i>	111.
<i>Strangulatione uteri viri non infestantur</i>		<i>Tetani definitio</i> 4. 29. <i>causa</i> 4. 159. <i>curatio</i>	
50. <i>in viris similis affectus</i>	48.	158. <i>diuisio</i> 4. <i>nomina</i> 311. <i>pars affecta</i>	
<i>Stranguria nomina</i>	321.	<i>principalis, minus principalis, per se, per</i>	
<i>Strophii & dysenteria discrimen</i>	438.	<i>consensum signa</i> 368. <i>partes affecta</i> 160.	
<i>Stuporis & paralysis discrimen</i>	425.	<i>prognostica</i> 5. <i>symptomata</i> ib. & 159. <i>ex</i>	
<i>Subeth quid</i>	309.	<i>vulnere curatio</i>	160.
<i>Subsidentia quid</i>	426.	<i>Tetanici domicilium</i>	159.
<i>Subuersio ventriculi quid</i>	338.	<i>Therma in elephantiasi</i> 302. <i>melancholia</i>	
<i>Succingens membrana quid</i>	15.		234.
<i>Sudor syncopticus qualis</i>	144.	<i>Thoracem in omnibus morbis acutis medi-</i>	
<i>Sudores syntecticos cohibentia</i>	191.	<i>cari oportet</i>	143.
<i>Ex sudore signa partis affecta</i>	354.	<i>Thoraci adhibenda in cholera</i>	196.
<i>Sudorifica in causo</i>	203.	<i>Thoracis affecti in phrenitide remedia</i> 143.	
<i>Sulphuris usus in pleuritide</i>	171.	<i>calesacti signum</i> 356. <i>spatij in suppura-</i>	
<i>Suppuratorum febris signa</i>	393.	<i>tione affecti</i>	426.
<i>Synanche quid</i> 8. <i>nomen</i>	311.	<i>Thorax in omnibus acutis morbis compati-</i>	
<i>Ex synanche cynanche</i>	10.	<i>tur</i>	143.
<i>Syncopa in iudicatorijs diebus</i>	188.	<i>Tov⊙ quid</i>	4.

Tonsil-



<i>Tonsillarum affectarum subjectum</i> 373. signa ib. affectus causa 13. ulcera 12.	<i>Vesica affecta in quo libet morbo</i> 147. in lethargo ib.
<i>Tonsilla quid</i> 313.	<i>Vesica affectuum nomina</i> 321. 337. descriptio 44. curatio 205. 261. inflammationis signa 104. 411. affectuum acutorum pars affecta 410. morbi 44. prognostica 107. obstructionis signa 411. resolutionis remedium 156. substantia 205.
<i>Tophi in arthritide</i> 124.	<i>Vesicarum bubularum usus in fotu</i> 261.
<i>Topica in pleuritide</i> 172.	<i>Veternosi. Vide lethargus.</i>
<i>Tragemata nocent</i> 219. 224.	<i>Venus noxia</i> 219. 229.
<i>Tragi pro cibo</i> 170. facultas ib.	<i>Victus conueniens doloribus</i> 217. febris 155.
<i>Tremoris & paralysis discrimen</i> 425.	<i>Ex victus forma signa partis affecta</i> 352.
<i>Tremoris manuum & pedum remedia</i> 148.	<i>Vigilia nocet</i> 222.
<i>Tumores in elephantiasi</i> 130.	<i>Vinum in ileo</i> 199. in phrenitide quando 144. quale in pneumonia 178.
<i>Tympanias quid</i> 92.	<i>Vini laudes</i> 144. mixtio 223. facultates 211. usus in cephalaa 215. cholera 195. commendatio in phrenitide 144. usus in syncope 188. 189. 190.
<i>Tympanites quid</i> 335. signa 93. subjectum 431.	<i>Ex viperis medicamentum</i> 260. 265. 267.
<i>Tympania signa</i> 93. 432.	<i>Viperina carnes in elephantiasi</i> 300.
<i>V.</i>	<i>Viri obnoxij dysenteria</i> 116. furori 58.
<i>Vari quid</i> 124.	<i>Visa varia melancholicorum</i> 63.
<i>Variolarum nomen</i> 313. signa 398.	<i>Ex vitæ conditione signa partis affecta</i> 352.
<i>Vaxiy quid</i> 320.	<i>Vitiligo quid</i> 348.
<i>Weldsiech</i> 348.	<i>Ulcera epatis 248. faucium ut curanda</i> 167. in tetano qualia 161.
<i>Vena carotides quid</i> 46. sanguinis 25.	<i>Unguenta fomentis præstant & cur</i> 154.
<i>Vena in pleuritide incidenda ex opposito latere & cur</i> 169. secanda in salubribus partibus & cur 152.	<i>Unguenti forma in lethargo</i> 154. paralysis 237.
<i>Vena sectio eodem die in pleuritide</i> 169.	<i>Uñctiones capitis in syncope</i> 189. totius corporis in pleuritide 169. tetano 159. in melancholiauales 234. pedum, ventris, spine, maxillarum in cholera 196. pneumonia 178.
<i>Vena caua affecta signa</i> 407. descriptio 38. diuisio & nomina 317. inflammatio 321. morbi symptomata 40. 41.	<i>Voluuli curatio. Vide ilei.</i>
<i>Vena circa guttur * * * b. lata in elephantiasi</i> 130.	<i>Vomica quid</i> 332.
<i>Venarumo diuisi</i> 317. à vesica ad intestina obstructio 84.	<i>Vomica pulmonis subjectum</i> 426. signa ib. & empyematos differ. 332.
<i>Venter in quolibet morbo affectus</i> 147.	<i>Vomitus ut ciendus in pueris</i> 157. prouocatio in adultis in epilepsia 158. prouocatio 267. remedium 234. in ileo 197. lethargo 153. vertigine 221.
<i>Ventriculus afficitur per se, vel per consensum</i> 435. signa ib.	<i>Vretici quinam</i> 433.
<i>Ventriculi affectuum nomina</i> 340. calefacti signum 356. in cholera affecti per se, per consensum signa 402. commoda 248. descriptio 108. fundi affectus 436. intemperiei signa ib. in lienteria affecti 439. in omnibus medicamentis habenda ratio 250. nomina 340. partes 435. subuersionis remedium 234.	<i>Ex urina suppressa partis affecta signa</i> 354.
<i>Auentriculo icterus</i> 84.	<i>Urinam mouentia in vesica affectibus</i> 206. citantia que 202. 250. in calculo 261.
<i>Ver obnoxium reiectione sanguinis</i> 27.	<i>Urina color</i> 353. contenta ib. spuma
<i>Vertigo quid</i> 54. ex cephalalgia 54.	<i>Ex urinis signa partis affecta</i> 353. capilli, carum-
<i>Vertiginem qua faciunt</i> 228.	
<i>Vertiginis varia cause</i> 220.	
<i>Vertiginis, cephalaa, epilepsia, apoplexia, hypochymatos signa distinctiua</i> 419. curatio 220. nomina 324. pars affecta 418. symptomata 54.	



I N D E X.

caruncula, arenula, 353. lapis, grumus, pus, pituita 354. interclusio 42. suppressio 44. profluuium 96. profluuium triplex 433.	prolapsus curatio 289. prolapsus 344. prolapsus remedium 121. scirrhi curatio 285. strangulatus discrimen à cognatis morbis ut apoplexia, epilepsia lethargo, syncope 413. suffocationis nomina 321. suffocationis curatio 207. strangulatus curatio 287. in strangulatu affecti signa 412. strangulatus subiectum ib.
Vrtica usus in lethargo 149.	Ex utero strangulata an sit mortua signa 413.
Vterus sanguinem in albidū colorem transfmutat 119. quomodo odoramentis offendatur vel iuuetur 322.	Vulua descriptio 46. & 48.
Vteri nomina 321. partes qua 345. partes affecta 207. tunica 345. morbi qui 117. motus triplex 321. natura 207. abscessus curatio 280. affectuum nomina 334. affecti curatio 275. canceri curatio 284. affectus colica 341. & intestini similes affectus 119. & stomachi soli affectus ib. fissurarū, condylomatū, hamorrhoidū curatio 297. exulcerationis curatio 283. ulcera 119. inflationis curatio 287. fluoris signa 118. fluoris prognostica ib. fluoris species ib. fluoris curatio 279. hydrops 95. hydrops signa 433. inflammationis & declinationis curatio 280. obturati curatio 290. profluuij curatio 278. affecti in profluuiio per se & per consensum signa 440. doloris & colici discrimen 405. profluuij subiectum 439. signa ib.	Vulua prolapsus 120. strangulatus 46. strangulatus remedia 47. strangulatus symptomata 47.
	Vua quid 11.
	Vua nomina 312. curatio 165. ulcerose remedia 167. & columella differ. 165. symptomata 12. subiectum quod 372. signa simpliciter per se, per consensum ib.
	Vulua. Vide uterus.
	Vulpanser quid 302.
	Z.
	Zäpfle quid 312.
	Zipperleunde 346.

F I N I S.



ERRATA.

- Fol. 11. *Corpus calidum, lege solidum.*
 Fol. 15. *In sua enim ipsi, adde sede.*
 Fol. 21. *ex ipsorum ore, lege ipso ore.*
 Fol. 24. *ἐσπερωτήν lege ἐπανερωτήν.*
 Fol. 27. *Φθόναυ lege Φθόαι.*
 Fol. 30. *natura nexus, adde, id est.*
 Fol. 31. *anhelitum, id est, dele, id est.*
 Fol. 37. *ἦθε pro ἦτι.*
 Eodem γο. α. *Adde τῆς σκιάδος καὶ συγγείας ἢ κάλυψις ἐμοίως σκευάσωντα, μικρον ἢ καὶ κρημνισμῶν.*
 Eodem ἀρόπ. Ⓞ. *lege ἀρόπις.*
 Eodem χειραμάτης, *lege χειραμάτης.*
 Fol. 73. *altero lege 74. Et fol. 74. lege 75.*
 Fol. 77. *al. longior, dele al.*
 Fol. 86. *generabilis lege genera bilis.*
 Fol. 96. *mencrorum, lege membrorum.*
 Fol. 111. *execueunt, lege execuerunt.*
 Fol. 123. *ὄβρις, ὄβρις, Ⓞ. bos, asinus lege ὄβρις καὶ ὄβρις, dens & humerus.*
 Fol. 131. *malè habent, lege habet.*
 Fol. 137. *Semiuncia, lege semiunciam.*
 Eodem, *enegribus, lege generibus.*
 Eodem, *apophlegmatismῶν, lege apophlegmatismῶν.*
 Maturalia, *lege naturalia.*
 Fol. 151. *μαρασμῶν lege μαρσμοῦ.*
 Fol. 164. *herundinibus, lege hirundinibus.*
 Fol. 165. *successionum, lege succissionem.*
 Fol. 168. *tonfilla, lege tonsilla.*
 Fol. 178. *somnificijs, lege somnificis.*
 Fol. 193. *Perperit, lege peperit.*
 Fol. 194. *Expedit, lege expetit.*
 Fol. 201. *a arteria, lege & arteria.*
 Fol. 203. *in calculus, l. calculis, calculus lege calculus.*
 Fol. 208. *fussile, l. fusile.*
 Fol. 213. *morbui, l. morbus.*
 Fol. 217. *malefactum, lege madesactum.*
 Fol. 224. *osta l. tosta.*
 Fol. 227. *phalam, lege phialam.*
 Fol. 232. *causu, lege causa.*
 Fol. 232. *κυάμια, lege κυάμια faba, lege cyathi.*
 Fol. 235. *ad medicamenta, lege at.*
 Fol. 237. *enegribus, lege generibus.*
 Fol. 237. *maturalia, l. naturalia.*
 Eodem. *quadringenta, l. quadraginta.*
 Fol. 240. *juuernunt, lege juuerunt.*
 Fol. 249. *dandum tot l. dandum est.*
 Fol. 250. *est l. sunt.*
 Fol. 260. *ex porris, lege ex pomis.*
 Fol. 296. *infimo pede l. in fimo pedes.*
 Fol. 310. *derre lege darre.*
 Fol. 312. *λοιμικὰ, l. λοιμικὰ.*
 Fol. 314. *Gracis hamorrhagiam l. Gracis hamorrhagiam vocant.*
 Fol. 315. *Non eam ob causam, l. Non eam ob causam sic dicta videtur, sed à loco affecto ἡσὸ τῆς χολιδῶν.*
 Fol. 316. *nouum nomen adde colica.*
 Fol. 324. *σκοτώμια lege σκοτώμα.*
 Fol. 333. *Schorbuchs l. Schorbuch Schus l. Schur.*
 Fol. 348. *languinis l. lanugini.*
 Fol. 352. *Causa ut attrectatio dele totum paragraphum. Causa enim effectus non est.*
 Fol. 359. *Causa attrectatio. Hic similiter dele totam lineam.*
 Fol. 383. *Focus februm est fomes l. est locus causa.*

F I N I S.

