

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ,

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

* Δοκίμ' εἰ μοι εἴτα γραφῆς εἶναι ταῦτα μάλιστα, δόξα
* ἀκαταμάχτα ἐστὶ τοιοῦντι τροσίν, τῆς αἰτίας ἐόντα εἰς
* δόξα. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ διαίτης ἀείων.

ΤΟΜΟΣ Β'.

1864.

ΤΕΥΧΟΣ Θ'.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΩΙ ΤΕΥΧΕΙ ΤΟΥΤΩΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Α'. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ [34.] Περὶ τῆς ὀλοφυκτιδώσεως, ἢ τοῦ ὀλοφυκτιδώδους πυρετοῦ (Variolae, Febris variolosae) [Σ. καὶ τ.]. — [2.] Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σφιλεδικῶν παθήσεων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν [Ε. ἢ σ.]. Β. κηρογενεῖα [43]. Περὶ κηρογενεῖας καὶ τῆς θεραπείας αὐτῆς [Σ. καὶ τ.]. — 59. Περὶ νέας θεραπευτικῆς

μεθόδου πρὸς ἴασιν τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν εὐστασιανῶν σαλπγγῶν προερχομένης δυσκοιλίας. Γ'. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ [51.] Περὶ τοῦ ἐμπυροξυλικοῦ ὀξέος (Acidum pyrolignosum) καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. [Σ. καὶ τ.]. — 60. Περὶ τοῦ χρωμικοῦ ὀξέος ὡς τοπικοῦ θεραπευτικοῦ μέσου. — 61. Περὶ νέας θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν φύλλων

τῆς ἐλάτης. Δ'. ΠΟΙΚΙΛΑ [50.] Περὶ διαδόσεως τῆς σφιλεδίας διὰ τοῦ δαμαλειασμοῦ (Vaccinationis) [Ε. ἢ σ.]. — 62. Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδειλλῶν καὶ περὶ νέου τινὸς τρόπου, δι' οὗ γίνεται σκοπιμώταρον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαίμαξις.

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ.

[34.] Περὶ τῆς ὀλοφυκτιδώσεως, ἢ τοῦ ὀλοφυκτιδώδους πυρετοῦ (Variolae, Febris variolosae).

[Συνέχεια καὶ τέλος.]

Περὶ τῆς διαγνώσεως τοῦ ὀλοφυκτιδώδους πυρετοῦ.

Πρὸς διάγνωσιν τῆς ὀλοφυκτιδώσεως, ἢ ἡ ἀποδρομὴ εἶναι ἡ συνήθης, δὲν ἀπαιτεῖται ἰδιάζουσα τις κλινικὴ πείρα καὶ ἀκρίβεια, καθότι οἱ χαρακτηριστικὲς τῆς νόσου εἰσὶ τοσοῦτον διάδηλοι, ὥστε καὶ ὁ ἥττον ἠσκημένος ὀφθαλμὸς διαγιγνώσκει αὐτήν. Μάλιστα δὲ εὐδιάγνωστος εἶναι ἡ νόσος ἐν ταῖς σφαιροτέραις αὐτῆς μορφαῖς, ὅταν ἦ κατὰ τὸ στάδιον τῆς διάνθησεως (Floritionis). ἤττον εὐδιάγνωστος εἶναι ἡ νόσος κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς εἰσβολὴν καὶ ὅταν ἡ μορφή αὐτῆς ἦ ἐκ τῶν ἡπίων,

ὡς διακρίνει ἡ σμικρότης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐξανθημάτων. Αἱ δερματικαὶ δὲ παθήσεις, μεθ' ὧν ἐνδέχεται νὰ συγχυθῆ διαγνωστικῶς ἡ ὀλοφυκτιδώσις εἰσὶν αἱ ἐξῆς.

α'. Ἡ ἐρευθλασις (Morbilli) καὶ ἰδίως ἡ μορφὴ αὐτῆς ἐκείνη, καθ' ἣν τὸ ἐξάνθημα παρουσιάζεται, οὐχὶ ἐν εἰδει κηλιδίων, ἀλλ' ἐν εἰδει ἐκφυματίων. Εἰς τὴν διαγνωστικὴν ταύτην πλάνην περιπίπτουσι πολλάκις πολλοὶ τῶν ἰατρῶν. Πρέπει ὅμως νὰ ὤμεν πρὸς αὐτοὺς ἐπιεικεῖς, ἀναλογιζόμενοι, ὅτι ἀμφότερα τὰ περὶ ὧν ὁ λόγος νοσήματα παρουσιάζουσι κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν ἀπὸ τῆς εἰσβολῆς τὴν αὐτὴν νοσολογικὴν εἰκόνα. Ἐπὶ ἀμφοτέρων, δηλαδὴ, τῶν νοσημάτων τούτων κατὰ τὸν εἰρημένον καιρὸν ἐπιφαίνονται ψυδρακιδόδη, ἐρυθρὰ, ἐπαναστημάτια καθ' ὅλον τὸ δέρμα, ἢ κατὰ μεγάλας μοῖρας αὐτοῦ. Καὶ εἶναι μὲν ἀληθές, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ἐρευθλασιος ἡ ἐρυθρότης τῶν ψυδρακιδίων εἶναι θαυτοτέρα καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὅσον φακῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ὀλοφυκτιδώδους

τῆς λύμφης ἢ δαμαλειακῆ ἐκδυσίαι, διὰ δὲ τοῦ αἵματος ἢ συριλιδικῆ πάθησις.

[Ἔπεται ἡ συνέχεια.]

62. Περὶ τοῦ προσφοριωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδελλῶν καὶ περὶ νέου τινὸς τρόπου, δι' οὗ γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαίμαξις.

Κατὰ τὰς ἐκθέσεις τῶν ἐπιτετραμμένων τῆν διεύθυνσιν τῶν ἐν Πρωσσίᾳ στρατιωτικῶν θεραπευτηρίων ὁ ἀπὸ τοῦ 1860 εἰς αὐτὰ εἰσπαχθεὶς ἐξαιματισμὸς τῶν βδελλῶν πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν αὐτῶν ἐπήνεγκε λίαν ἀγαθὰ ἀποτελέσματα. Καὶ τῷ μὲν 1860 ἐγένοντο ἐκ τῶν ἤδη χρησιμευσασῶν βδελλῶν ἐθισθηκότα 88 ἐπὶ ταῖς ἐκπύων ἐκ νέου ἐπιτήδεια πρὸς βδάλλειν (ὥστε οὕτως ἐπιτετεύθη οἰκονομία 1223 ταλῆρων), τῷ δὲ 1861 ἀγδομήκοτα τρεῖς ε. τ. ε. (ὥστε ἡ γενομένη οἰκονομία συνεποσώθη εἰς 1544 τ.). Ἐξεταζομένων δὲ ἐπὶ μέρους τῶν ἐν ἐκάστῳ τῶν θεραπευτηρίων ἐπιτευχθέντων ἀποτελεσμάτων, εὐρίσκεται, ὅτι ἐν τισὶ μὲν ἡ ἐπιτευθεῖσα οἰκονομία ἦν 62. 3% ἐν ἄλλοις δὲ 123. 5%. Ἐν ἐνὶ μάλιστα κατωρθώθη νὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ ἐφαρμοσθῶσι 32 βδέλλαι 135 φορές, καὶ πάλιν νὰ μείνωσιν αἱ 11 ἐξ αὐτῶν ζῶσαι καὶ πρὸς βδάλλειν ἐπιτήδεια. Ὡστε ἡ οὕτως ἐπιτευθεῖσα οἰκονομία ἦν 321%.

Ἐκ πάντων τῶν πρὸς ἐξαιματισμὸν τῶν βδελλῶν δοκιμασθέντων τρόπων ὁ ἀνυσιμώτατος ἀπεδέχθη ὁ ἐξῆς ἄμα ἀποπεσοῦσα ἢ βδέλλα ἐντίθεται εἰς ἀβαθὲς τι σκυφίον, ἐμπριέχον δύο οὐγγίαις ὄξους κεκραμένου μετὰ πολλοῦ ὕδατος. Εὐθὺς δὲ μετὰ ταῦτα ἐκπιέζεται διὰ τῶν δακτύλων ἡρέμα καὶ εὐαφῶς τὸ ἐν τῷ θηρίῳ αἷμα, γινομένης τῆς ἐκθλίψεως ἀπὸ τοῦ οὐραίου ἄκρου ἐπὶ τὸ κεφαλικόν. Μετὰ ταῦτα ἐντίθεται ἡ βδέλλα εἰς καθαρὸν ὕδωρ. Σημειωτέον προσέτι, ὅτι πρέπει νὰ ἀποχέηται τὸ ἀπαῖ χρησιμεῦσαν ὀξύκρατον.

Καὶ ταῦτα μὲν περιληπτικώτερον περὶ τοῦ προσφοριωτέρου μέσου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδελλῶν καὶ τῆς οὕτως ἐπιτυγχανομένης οὐκ εὐκαταφρονήτου οἰκονομίας.

Ἐρχόμεθα ἤδη ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν τῆς ὑπὸ τοῦ ἐν Βερολίῳ ἱατροῦ Κ. Beer ἀρτίως ἐπινοηθείσης καινοτομίας περὶ τὸν τρόπον, δι' οὗ γίνεται ἡ διὰ βδελλῶν ἀφαίμαξις. Ὁ ἱατρός οὗτος ἐμβάλλει μικρὰν ἐντομήν πρὸς τῷ οὐραίῳ ἄκρῳ τῆς βδέλλαις, ἀφοῦ αὐτὴ διὰ τῆς βδάλλσεως ὑπερπληρωθῆ αἷματος. Ἐκ τῆς τομῆς ταύτης ἐκβλύζει τὸ αἷμα ὡς ὕδωρ ἀπὸ κρήνης " (α Fountänenartig), κατὰ

τὴν ἔκφρασιν αὐτὴν τοῦ Κ. Beer, ἐνῶ τὸ Κρικωτὸν ἐξακολουθεῖ νὰ βδάλλῃ ἐπὶ πολλὰς ὥρας μετὰ τὴν εἰς αὐτὸ ἐμβολὴν τῆς τομῆς. Ἐὰν δὲ τὸ πᾶσόν τοῦ ἀφαιρεθέντος αἵματος θεωρηθῆ ἄρκοῦν, τότε ἐπιπάσσειται ὀλίγον ὀφθαλμικὸν ἄλας ἐπὶ τοῦ χωρίου, καθ' ὃ εἶναι προσεσταμένη ἡ βδέλλα, καὶ οὕτως ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀπόπτωσις αὐτῆς. Τὴν νέαν ταύτην μέθοδον ὠνόμασεν ὁ, ὡς εἴρηται, ἐπινοήσας αὐτὴν ἱατρός Κ. Beer *Bdellatomie* (βδελλοτομία). Προστίθησι δὲ, ὅτι τὰ δῆγματα τῶν βδελλῶν καὶ μετὰ τὴν κατὰ τὴν εἰρημένην μέθοδον δι' αὐτῶν ἀφαίμαξιν οὐδαμῶς συνεπάγονται δυσάρεστον τινα συνέπειαν.

Αἱ περαιτέρω περὶ τὸ ἀντικείμενον τοῦτο ἐρευνᾶται τοῦ Κ. Beer ἐδίδαξαν ἔτι,

α.) ὅτι ἡ ἐμβολὴ τῆς ἐντομῆς πρέπει νὰ γίνηται ἀφοῦ ἡ βδέλλα ἐκμυζήσῃ τοσοῦτον, ὥστε νὰ διογκωθῆ ὑπὸ τοῦ αἵματος.

β.) ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐμβληθῆ ἡ τομὴ οὔτε κατὰ τὰ γεννητικὰ ὄργανα τοῦ θηρίου (δηλ. οὔτε κατὰ τὸ 24^{ον}, οὔδὲ κατὰ τὸ 29^{ον} κρικίον αὐτοῦ), μηδὲ κατὰ τὴν ἐντερικὴν ἐξίθμην. Ὡστε πρὸς ἀποφυγὴν τῆς τρώσεως τῶν μερῶν τούτων δὲν πρέπει νὰ ἐμβάλληται ἡ τομὴ κατὰ τὴν μεσάτην γραμμὴν τῆς κοιλίας, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰ πλάγια (καὶ ὀπισθεν).

γ.) ὅτι ὁσάκις ἡ ἐκτομὴ ἐμβληθῆ πέραν τοῦ μέσου (πρὸς τὸ κεφαλικὸν ἄκρον), ἢ πρὶν ἔτι πλησθῆ αἵματος ἢ βδέλλα, ἀποκίπτει αὐτὴ ἄμα τῆ ἐμβολῆ τῆς ἐντομῆς.

Τὰ πλεονεκτήματα τῆς μεθόδου ταύτης, ἅτινα, κατὰ τὸν Κ. Beer, καθιστῶσιν αὐτὴν ἀσυγκρίτως ὑπερτέραν τῆς καθ' ἣν ἐγένετο ἄχρι τοῦδε ἡ διὰ βδελλῶν ἀφαίμαξις, εἰσι τὰ ἀκόλουθα.

α.) Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον δυνάμεθα νὰ ἀφαιρέσωμεν ἐκάστοτε τοσοῦτον αἷματος, ὅσου ἀπαιτεῖ τὴν ἀφαίρεσιν ὁ βαθμὸς τῆς ὑπαρχούσης φλεγμονῆς.

β.) Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον γινομένης τῆς ἀφαιμάξεως, εἶναι δυνατόν νὰ προσδιορισθῆ τὸ πᾶσόν τοῦ ἀφαιρουμένου αἵματος, ἐντιθεμένου τοῦ τὴν ἐντομὴν φέροντος οὐραίου ἄκρου τῆς βδέλλαις εἰς βαθμωτὸν ἀγγεῖον πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ αἵματος καὶ προσδιορισμὸν τοῦ πλήθους αὐτοῦ.