

ΓΑΛΗΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΙΑΡΥΘΕΝ ΤΩ 1870 ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, ΜΑΚΚΑ, ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ

ΚΑΙ


ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΥΠΟ

Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ.

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΤΟΜ. ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. Γ. ΠΑΣΣΑΡΗ
1886

ΓΑΛΗΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΙΑΡΙΘΕΣ ΤΩ 1870 ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, Ν. ΜΑΚΚΑ, Ν. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΧΟΝ

ΥΠΟ

Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ.

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑΣ

Διὰ τὸ Ἐξωτερικόν Δρ. Ν. 20.
» » Ἐσωτερικόν » » 15.
» τοὺς κκ. Φοιτητάς . . . » » 8.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ ΓΑΛΗΝΟΥ
Ὁδὸς Πινακωτῶν
ΑΡΙΘΜΟΣ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Περὶ τῆς θεραπείας τῆς βρογχοπνευμονίας τῶν παιδῶν διὰ τοῦ ἰωδιδίου καλίου, ὑπὸ Α. Ζίννη, — Ἱατρικὴ ἔποψις τοῦ 1885, ὑπὸ Ι. Π. Ξισπυρῆ (ἐν Καρδαρῶν). — Γενικὴ ἔποψις τῶν περὶ τοῦ ὁστέου θωρακῶν. Ἐκ τῶν ἐν Βιέννῃ ἀπομνημονευμάτων Δ. Βλαχοπούλου (ἐν Βερολίνῳ), (Τέλος). — Μελέται περὶ τῶν αἰτίων καὶ τῆς ἀποσοφίσσεως τοῦ βαχτισμοῦ, κατὰ J. Comby, (Συνέχ.). — Εἰδοποιήσεις. — Παραρρημάτων διορθώσεις.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

τῆς βρογχοπνευμονίας τῶν παιδῶν διὰ τοῦ
ἰωδιδίου καλίου.

ὑπὸ Α. ΖΙΝΝΗ (Καθηγ. τῆς κλιν. τῶν παιδῶν).

Ἐπιφυλασσόμενοι νὰ πραγματοποιῶμεν βραδύτερον διὰ μακρῶν ἐπὶ τῇ βίψει κλινικῶν παρατηρήσεων τὸ σπουδαιότατον τοῦτο ζήτημα τῆς θεραπευτικῆς τῆς παιδικῆς ἡλικίας, περιορίζομεθα σήμερον νὰ δημοσιεύσωμεν πᾶν βραχέως τὰ μέχρι τοῦδε ἐκ τῆς χρήσεως τοῦ ἰωδιδίου καλίου ἐπὶ τῆς βρογχοπνευμονίας τῶν παιδῶν ἀποτελέσματα, ἱκανὰ ἡγοῦμενοι ταῦτα, ἵνα μετὰ θάρρους συστήσωμεν τοῖς συναδέλφοις ἡμῶν τὴν χρῆσιν τοῦ φαρμάκου τούτου.

Γινώσκοντες τὴν ἀληθῶς πολλὰκις θαυμασίαν ἐνέργειαν τοῦ ἰωδιδίου
ΓΑΛ. ΤΟΜ. ΙΕ'. 6

καλίου πρὸς καταστολὴν τῶν δυσπνευμονίων παροξυσμῶν τῶν παρὰ τὴν πνευμονίαν ἐπὶ τοῦ ἐμφυσήματος τῶν πνευμόνων μετὰ κατάρρου τῶν βρόγχων, συνελάθωμεν τὴν ιδέαν νὰ χορηγήσωμεν τὸ φάρμακον τοῦτο κατὰ τῆς βρογχοπνευμονίας τῶν παιδίων, νόσου, καθ' ἣς τὰ γνωστὰ θεραπευτικὰ μέσα, ὡς ἡ καθημερινὴ πείρα διδάσκει, συχνάκις ναυαγοῦσι καὶ εἰς αὐτὰς τὰς χεῖρας τοῦ μᾶλλον πεπειχημένου ἱατροῦ. Μαρτύριον τῆς ἀληθείας ταύτης ἔστω ἡ ἐκ τῆς νόσου ταύτης ἀπανταχοῦ συμβαίνουσα φοβερὰ θνησιμότης. Ὅθεν ἀπὸ τοῦ 1877 ἕως σήμερον ἐχορηγήσαμεν τὸ ἰωδιούχον κάλιον εἰς πολλὰ παιδιὰ ἐν ἡλικίᾳ ἀπὸ 6 μηνῶν μέχρι πέντε ἐτῶν, πάσχοντα βρογχοπνευμονίαν. Ἰδοὺ δὲ καὶ τὰ ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε κλινικῶν παρατηρήσεων ἐπὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ φαρμάκου τούτου παρίσμετα.

1. — Τὸ ἰωδιούχον κάλιον ἐδείχθη κυρίως λυσιτελές ἐπὶ τῆς πρωτοπαθοῦς βρογχοπνευμονίας, ἡ δὲ ἐνέργεια αὐτοῦ ἦν πολλῶ ἐπιτυχαστέρα χορηγουμένου ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου ἢ εἰς περίοδον προκεχωρημένην. Ἐπὶ δὲ τῆς ἐπερχομένης κατὰ τὸ λείριον ἢ τὴν κοκκύτιδα, ἡ ὠφέλεια αὐτοῦ εἶναι, καθ' ἣν μέχρι τοῦδε τουλάχιστον πείρα ἐδίδαξεν ἡμᾶς, λίαν ἀμφίβολος.

2. — Τὸ φάρμακον τοῦτο ὠφελεῖ ἰδίως εἰς παιδιὰ εὐρώστου ἔξω. Ἐξ ἐναντίας εἰς ἀδύνατα καὶ καχεκτικὰ σπανίως ἐπιτυγχάνει. Ἡ δὲ ὠφέλεια αὐτοῦ ἦν πολλῶ βεβαιωτέρα εἰς παιδιὰ ἀπὸ 1—5 ἐτῶν ἢ εἰς παιδιὰ μικρότερα, ἡλικίας.

3. — Ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ εἶναι πολλῶ ταχύτερα καὶ ἀσφαλεστέρα ἐπὶ τῆς ὑπεροξείας μορφῆς τῆς βρογχοπνευμονίας ἢ ἐπὶ τῆς ὀξείας.

Τὰ ἐκ τῆς χορηγήσεως τοῦ ἰωδιούχου καλίου κλινικὰ φαινόμενα εἶσι τὰ ἑξῆς:

Τὸ φάρμακον τοῦτο διδόμενον διαλελυμένον ἐντὸς τριῶν οὐγγιῶν ὕδατος ἀπεσταγμένου ἀπὸ 10—25 σιταρίων ἀναλόγως τῆς ἡλικίας ἐντὸς 24 ὥρων, καταβιβάζει συχνάκις ἐν διαστήματι δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν τὴν θερμοκρασίαν ἀπὸ 1—2 βαθμῶν, ἐλαττώνει ἐπαισθητῶς τὴν συχνότητα τῆς ἀναπνοῆς, καθίστησι δὲ τὴν βῆχα ὑγρότεραν καὶ τὴν ἀποβολὴν τῶν φλεγμάτων εὐχερεστέραν. Συγχρόνως δὲ ἡ στηθοσκοπικὴ ἐξέταση δεικνύει θετικὴν τροπὴν ἐπὶ τὰ κρείττω πάντων τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ἐὰν ἐκ τῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου τούτου μὴ ἐπέλθῃ ἡ προσδοκώμενη ὠφέλεια ἐντὸς τριῶν τῶν πολὺ ἡμερῶν, ἡ ἐξακολούθησις αὐτοῦ εἶναι ὅλως ἀνωφελής. — Ἡ τελειὰ λύσις τῆς βρογχοπνευμονίας διὰ τῆς χρήσεως τοῦ ἰωδιούχου καλίου ἐπέρχεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πολλῶ ταχύτερον ἢ διὰ τῶν συνήθων μέσων, ἰδίως δὲ ὅταν τὸ φάρμακον τοῦτο χορηγῇται ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου. Ἐνταῦθα ὀφείλομεν νὰ σημειώσωμεν χάριν ἀκριβείας, ὅτι πολλάκις, κυρίως δ' ἐν ἀρχῇ τῆς δοκιμασίας τοῦ φαρμάκου τούτου,

ἐποιησάμεθα συγχρόνως χρῆσιν σικκῶν κούφων καὶ ἐκδορίων ἐφημέρων, ἀλλὰ εἰς τὰ θεραπευτικὰ ταῦτα μέσα ἀποδίδομεν ὅλως δευτερεύουσιν ἐνέργειαν.

Πολλοὶ τῶν ἐν Ἀθόνησι συναδέλφων ἡμῶν, οἱ ἐυστήσαμεν τὴν δοκιμασίαν τοῦ φαρμάκου τούτου, ἐδήλωσαν ἡμῖν ὅτι ἐπὶ πολλῶν περιπτώσεων εὖρον αὐτὸ λίαν ὠφέλιμον.

Τελευτώντας ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ ἰωδιούχον κάλιον δὲν δύναται μὲν νὰ θεωρηθῇ ἀναμφισβήτως εἰδικὸν φάρμακον κατὰ τῆς βρογχοπνευμονίας τῶν παιδίων, ἀλλ' ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε παρατηρήσεων ἄξιον πολλῆς συστάσεως πρὸς δοκιμασίαν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΩΪΣ ΤΟΥ 1885.

ὑπὸ Ι. Η. ΠΙΣΠΗΡΗ (ἐν Καρθασσαρᾷ).

Μόλις ἀποχωρισθεὶς τῶν σεβαστῶν μοι καθηγητῶν καὶ ἄμα ἀρξάμενος τῆς πρακτικότητος τῆς Θείας, καθ' Ἱπποκράτην, ἐπιστήμης, οὐδέποτε μοι διέφυγεν ἡ ἰδέα τῆς ὅσον ὁλόν τε καθορίσεως πλείπτων μὲν καὶ ἄλλων ἱατρικῶν ζητημάτων, μάλιστα δ' ἐν Ἑλλάδι τῆς συχνότητος ἢ μὴ πολλῶν νόσων ἐν τινι ὥρισμένη τῆς Πατρίδος μοίρᾳ. Καὶ ὅτι μὲν πολλὰ εἰσέτι ζητήματα δὲν διελευκάνθησαν, οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἀντιδοξεῖ, καὶ αἱ καθ' ἐκάστην δὲ πολὺμοχοι καὶ ἐπίμονοι ἐργασίαι πολλῶν περὶ τὰς λεπτότητας εἰδικῶν ἀνδρῶν, μαρτυροῦσιν ὅτι δ' ἔτι μᾶλλον ἰανὴ ἄγνοια καὶ ἀγλὸς κατέχει τὴν ἐπιστήμην, τὴν Ἑλληνικὴν, περὶ πολλῶν χωρῶν τῆς Ἑλλάδος ἰδίᾳ δὲ περὶ τῶν ἐκαστοῦ, καὶ πότε, καὶ εἰ δυνατόν διὰ τίνα αἰτίαν ἐπιχωριάζουσιν ἢ μὴ νόσων, τοῦτο αὖθις δηλοῖ ἡ ἔλλειψις εἰσέτι παρατηρήσεων τοιαύτης φύσεως, εἰ μὴ γε περὶ πασῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πλείστων, τοῦ ὅπερ ἐπιτυγχανόμενον ὅσον δύναμις, ἤθελε βεβαίως καταστρώσει οὐ μόνον χωρογραφικόν, ἀλλὰ καὶ ἱατρικόν, ὡς εἰπεῖν, χάρτην τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων εἰδικῶν ζητημάτων, οὐ παντὸς πλεῖν ἐς Κόρινθον, ἀλλ' ἄλλοις δέδοται, ἐμοὶ δ' ἐπιτραπέτω ἡ ἀπλὴ ἀναγραφή καὶ ἀνακοίνωσις ἐν τῇ Γαλήνῃ τῶν νόσων, τῶν γνωστῶν αὐτῶν αἰτιῶν, τῆς συχνότητος καὶ ἐκβάσεως, νόσων, ἀστίναις ἡδυμήθην νὰ παρατηρήσω ἐν τῇ Καρθασσαρᾷ κατὰ τὸ παρελθόν ἤδη ἔτος, καὶ τοῦτο δὲ μὴ συμπληρωμένον, ἀλλ' ἑλλιπές, κατὰ τοὺς μῆνας Ἰούλιον, Αὐγούστιον καὶ Σεπτέμβριον τὸν πλεῖστον, δι' ἀνυπερέβλητον ἀνάγκην εἰς Ἡπειρον μεταβάσεώς μου, τοῦ ὅπερ τὰ μέγιστα μὲ λυπεῖ, διὰ τὸ γονιμώτερος εἶναι

τοὺς εἰρημένους μῆνας εἰς ἐλώδη μὲν νοστήματα ἐν πάσῃ χώρῃ, μάλιστα δὲ τῇ Καρβασσαρᾷ, ἄλλως πρωτευούσῃ τῆς ἐπαρχίας Βάλτου.

Ἡ πόλις Καρβασσαρᾷ κειμένη ἐν τῇ ἐνδοτάτῃ καὶ νοτίῃ μυγῇ τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου παριστᾷ ὄψιν κατὰ ξηρὰν ὅλως ἀνθυγιεινὴν, ἃτε περιβαλλομένη ἐκ δυσμῶν καὶ ἀντολῶν ὑπὸ λόφων λίαν ὑψηλῶν, καὶ προσπελαζόντων οὕτω πρὸς ἀλλήλους, ὥστε μόλις ἐγκαταλιμπάνουσι στενὴν τινὰ κλεισώρειαν πρὸς νότον τῆς πόλεως, ὥστε μόλις παριστᾷ δρίζοντά τινα πρὸς βορρᾶν καὶ μόνον, τὴν Ὀχλασσάν, πρὸς νότον τὴν κλεισώρειαν, πρὸς ἀνατολὰς δὲ καὶ δυσμὰς ὑπέρεκκινεῖται λίαν οἱ εἰρημένοι λόφοι, ὧν ὁ μὲν πρὸς δυσμὰς ἀποτελεῖ τὸ βραειότερον τμήμα τῆς καλουμένης Δειράδος Πλατύ, ὁ δὲ πρὸς ἀνατολὰς τὸν ἐφ' οὗ ἡ ἀρχαιοτέρα πόλις Αἰμυναία.

Ἄνεμοι δὲ συνήθως πνέουσιν ὀξέφυροι ὧν λίαν ὑγιεινός, ὁ καὶ συχνότερος καὶ μάλιστα ἀπὸ Ἰανουρίου τέλη περίπου ἀρχόμενος, ὁσάκις δὲ πνέῃ ὁ νότος, λίαν ἐντείνονται καὶ πάντα μὲν τὰ ὑπάρχοντα νοστήματα, μάλιστα δ' ἐκφαίνονται τὰ ἐλειογενῆ διὰ τὴν πρὸς νότον Καρβασσαρᾷ κειμένην λίμνην Νεζερόν, ἣτις ὑπερεκχειλίζουσα τὸν χειμῶνα καταπλημμυρεῖ τὴν στενὴν πεδιάδα Στάνου, καὶ τότε τῆς γυνωπτικῆς ἐκ τούτων ἀποσυνθέσεως ἐπερχομένης, βλάπτεται λίαν ἡ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως ὑγίεια, μάλιστα δὲ ἡ τῶν τῆς δυτικῆς συνοικίας, προσφορώτερον ἐκείσε διὰ τὴν Δειράδα καὶ κλεισώρειαν πνέοντος τοῦ νότου, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν χειμῶνα ἔτι καὶ ἐν εὐδίᾳ νοτίου πνέοντος ἀνέμου καὶ μάλιστα μετὰ ὀμβλίας τὴν πρῶταν συνήθως, αὐθις ἀναφκίνονται ἐπιδημικῶς, ὡς εἰπεῖν, οἱ ἐλειογενεῖς, οἱ ἄλλως τε ὑποθαλαπόμενοι ὑπὸ τοῦ ἐδάφους τῆς πόλεως, ὅντοι ἀργιλλώδους, καὶ κατὰ πάντα ὑστὸν δυσκόλως ἀποξηραίνοντο, πολλὰ δὲ μάλλον ἐκ τῶν διὰ τοὺς ἀλίγους καὶ κακούς ὀχετοὺς συμβαίνουσιν πλημμυρῶν, ὧν μίαν μὲν πέρυσι, δύο δὲ φέτος τὸν χειμῶνα ἐγένοντο, καὶ οὕτω τῶν κατοίκων ἐς αἰὶ καθύγρων ὄντων, τοῦθ' ὅπερ αὐθις ἐπαυξάνει ἐκ τῆς ἀνηλιότητος τῆς πόλεως διὰ τοὺς ἐκκτέρωθεν κειμένους λόφους εἰς τρόπον ὥστε κατὰ τὸν χειμῶνα ἡ μάλλον εὐήλιος οἰκία καὶ κατὰ τὴν ἐνηλιωτάτην ἡμέραν μόλις ἡλιάζεται τέσσαρας ὥρας. Ὁ βορρᾶς δὲν εἶνε τόσον νοσογόνος εἰς ἐλώδη νοστήματα, εἰ καὶ πρὸς βορρᾶν τῆς πόλεως κεῖται ἡ κυρίως καλουμένη πεδιάς τοῦ Βάλτου, ἣτις πρὸς τὴν χερσίτην καλλιεργίαν τῇ ἐπικρατούσῃ καθ' ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν γεωπόνων πάντων πανθομολογούμενα, ἐνέχει καὶ τὸν ἐλωδέστατον Ἀράπην. Πρὸς τούτοις βοριοδυτικῶς κεῖται ἡ οὐχ' ἥτιον ἐλώδης χώρα τοῦ χωρίου Σπέρτου ἐκ μίξεως τῶν γλυκέων καὶ ὀχλασσίων προερχομένων ὑδάτων, περικλείω δὲ νῆ ὑπομνήσω ὅτι ἄπασα ἡ νοτία καὶ ἀνατολικὴ ἀκτὴ τοῦ Καρβασσαρικοῦ κόλπου γέμει περικλίω γλυκέων ὑδάτων ἐκ βλυζόντων ὑπὸ, κατὰ καὶ ἐλάχιστόν τι ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὸ εἶ-

κρον τῆς θαλάσσης. Ὡστε πρὸς τοῖς ἀνέμοις ἀφικνουμένοις ἐξ ἐλωδῶν μερῶν, τὰ μάλα συμβάλλει εἰς τὴν περικλείω τῶν ἐλωδῶν νότων ἢ τε θέσις τῆς πόλεως, τὸ περιβάλλον ταύτην καὶ τὰ ἀνέμια ὑδάτα.

Αἱ νόσοι, ἃς παρετήρησα κατὰ τὸ μνησθέν χρονικὸν διάστημα ἀναλυτικώτερον ἐκφαίνονται ἐν τοῖς ἐπομένους πίναξιν καὶ κατὰ μὲν τὰ ὀργανικὰ συστήματα ἔχουσιν ὡδε:

Πίναξ Α.

Κρανίου καὶ ἐγκεφαλονωτιαίου συστήματος.	Ἡπατος	
Τραύματα κεφαλῆς	1.	Ἰκτερας 1.
Ἡμικρανία	3.	Κίρρωσις Ἡπατος 1.
Νευραλγία κεφαλῆς	1.	Καρδίας.
Ἐπιληψία	2.	Ἀνεπάρκεια μητροειδοῦς 1.
Ὑστερισμοί	3.	Ὀδοντομητρίου συστήματος.
Ἀποπληξία	1.	Ὀσφυαλγία 2.
Δέρματος.		Ψωμμάσις 1.
Κνήμεν	2.	Ἰσχυρία 1.
Δοθιήν	1.	Ἀναπνευστικὸν σύστημα.
Δερματίτις ἀκνῶδης	1.	Βρογχίτις 31.
Ἐγκαύματα	3.	» τριχοειδῆς 3.
Κίρσοι ποδῶν	1.	» χροία 1.
Ὀφθαλμῶν.		Πνευμονία 12.
Βλεφαρδαδίτις	1.	Τυροειδῆς βρογχοπνευμονία. 2.
Τραύμα κερατοειδοῦς	1.	Βρογχοπνευμονία 1.
Φλυκταινώδης κερατοειδίτις	1.	Βρογχοσφαγία 2.
Χοιραδικὴ ὀφθαλμία	2.	Ασφυγγίτις ὑμενογόνος 1.
Ρινοῦς.		» καταρρώδης 1.
Ῥινορραγία	1.	Φυματώσις 2.
Τραύμα ρινοῦς	2.	Γεννητικῶν ὀργάνων καὶ
Πεπτικοῦ σωλήρος.		ἰδίᾳ τῆς γυναικὸς
Ὑπογενίτις	3.	Βοτρυειδῆς μύλη 1.
Ἀμυγδαλίτις	8.	Ἐπιλόχειος πυρετός 3.
Φρυγγολαρυγγίτις	2.	Ἐπὶ τοῦ τοκετός 1.
Ἀφιδῶδης στοματίτις	1.	Ἐπίσχεσις ὑτέρου 1.
Ἐλμινθίασις	8.	Μητρορραγία 1.
Δυσκοιλίτης	2.	Ἐνδομητρίτις χρονία 2.
Δυσεντερικὴς κατάρρευσις	3.	Δυσκρασίαι.
Κωλικοὶ ἐντέρων	1.	Χοιράδωσις 2.
Γαστροαλγία	1.	Σύριλις 2.
Διάρροις	14.	Ἐλειογενῆ νοσήματα.
Καρκίνος στομάχου	1.	Τυροειδῆς πυρετός 8.
Ταυνία	1.	Γαστρίτις » 27.
		Ῥευματικὴ » 33.

Διαλείπων	38.	Τραύμα καρπού	1.
Ἑλώδης κηδεία	3.	Περικοστίτις κνημιαία	1.
Κακοήθης σπασμωδικός πυρετός	1.	Φλεγμονή γόνατος	2.
» κωμωδίας »	1.	Φλέγων δεξιᾶς παρεΐας	1.
Ὀστών, ἁρθρῶν καὶ μυῶν.		ῤευματισμός	1.
Κάταγμα δεξιᾶς κνήμης	1.	Ἀρθρίτις	1.
Τραύμα ῥιζομηρίου	1.		

Καὶ τσαυτὰ μὲν (210 περίπου) καὶ τοιαῦτα εἰσιν αἱ παρατηρηθεῖσαι νόσοι, ἥ δὲ μηνιαία αὐτῶν ἐμφάνισις ὡςδε ἔχει·

Πίναξ 2.

Ἰανουάριος.		Ὀσφυαλγία	1.
ῤινορραγία	1.	Κεραιοειδοῦς τραύμα	1.
Τυφοειδής πυρετός	2.	Ἀπρίλιος.	
Βρογχίτις	7.	ῤευματικός πυρετός	3.
ῤευματικός πυρετός	4.	Φρυγγολαρυγγίτις	2.
Ἐπιληψία	1.	ῤινός τραύμα	1.
Ἑλμινθίασις	1.	Ὀσφυαλγία	1.
Δυσκοιλίτης	1.	Βρογχίτις	2.
Δυσεντερικός κατάρρους	1.	Δοθιήν	1.
Πνευμονία	1.	ῤιζομηρίου τραύμα	1.
Γαστρικός πυρετός	2.	ῤευματισμός	1.
Υπογενίτις	1.	Πνευμονία	1.
Φεβρουάριος.		Τυφοειδής πυρετός	1.
Ἑλώδης κηδεία	3.	Νευραλγία κεφαλῆς	1.
Βρογχίτις	7.	Μάϊος	
ῤευματικός πυρετός	1.	Δερματίτις ἀκνῶδης	1.
Υπογενίτις	2.	Τυφοειδής πυρετός	2.
Ἀνεπάρκεια μητροειδοῦς	1.	Βοτρυοειδής μύλη	1.
Ἡμικρανία	1.	Πνευμονία	2.
Πνευμονία	2.	ῤευματικός πυρετός	3.
Τριχοειδής βρογχίτις	1.	Ἀμυγδαλίτις	1.
Δυσεντερικός κατάρρους	1.	Φλυκταινώδης κεραιοειδίτις	1.
Κάταγμα δεξιᾶς κνήμης	1.	Διαλείπων	1.
Μάρτιος		Τραύμα καρπού	1.
ῤευματικός πυρετός	8.	Περικοστίτις κνημιαία	1.
Πνευμονία	2.	Ἰούλιος.	
Κωλικοί ἐντέρων	1.	Χοιρδική ὀφθαλμία	2.
Μνήμη αἰδοίων	2.	Διάρροια	4.
Γαστραλγία	1.	Διαλείπων	3.
Βρογχίτις	2.	Γαστρικός πυρετός	3.
Τυφοειδής βρογχοπνευμονία	2.	Βρογχορραγία	2.
Ἀμυγδαλίτις	2.	Πνευμονία	1.

Τριχοειδής βρογχίτις	1.	Τραύμα κεφαλῆς	1.
Χοιρδωσις	2.	Δυσεντερικός κατάρρους	1.
Λαρυγγίτις ὑμενογόνης	1.	Κακοήθης σπασμωδικός πυρετός	1.
ῤευματικός πυρετός	1.	Ἑλμινθίασις	4.
Ἀμυγδαλίτις	3.	Γαστρικός πυρετός	8.
Φυματίωσις	1.	Υστερισμός	1.
Ἰκτερος νεογνοῦ	1.	Ξηρὸς τοκετός	1.
Τυφοειδής πυρετός	1.	Ἐπίσχεσις ὑστέρου	4.
Ψαμμίασις	1.	Τυφοειδής πυρετός	2.
Σεπτέμβριος.		Ἡμικρανία	1.
Ἀμυγδαλίτις	1.	Κίρσοι ποδῶν	1.
Γαστρικός πυρετός	2.	Βρογχίτις χρονία	1.
Διάρροια	3.	Μητρορραγία	1.
Ἐπιλόχειος πυρετός	1.	Ἀποπληξία	1.
Φλεγμονή γόνατος	1.	Δεκέμβριος.	
Διαλείπων	2.	Βρογχίτις	7.
Ἐγκαυμα	1.	Ἡμικρανία	1.
Βρογχίτις	1.	Γαστρικός πυρετός	6.
Ὀκτώβριος.		Ταινία	1.
Καρκίνος στομάχου	1.	ῤευματικός πυρετός	1.
Πνευμονία	3.	Ἀρθρίτις	2.
Διαλείπων	12.	Στοματίτις ἀφθώδης	1.
Διάρροια	6.	Διαλείπων	5.
Βρογχίτις	4.	Κίρρωσις ἥπατος	1.
Λαρυγγίτις καταρρώδης	1.	Ἐγκαυμα	1.
Κακοήθης κωμωδίας πυρετός	4.	Ἐνδομητρίτις χρονία	2.
Γαστρικός πυρετός	5.	Τριχοειδής βρογχίτις	1.
Ἑλμινθίασις	1.	Φλέγων δεξιᾶς παρεΐας	1.
		Ἑλμινθίασις	2.
Νοέμβριος.		Διάρροια	1.
Διαλείπων	9.	Ἰσχυρία	1.
Ἀμυγδαλίτις	4.	Βρογχοπνευμονία	1.
ῤευματικός πυρετός	12.	Σύφιλις	2.
Ἐγκαυμα	1.	Βλεφαρκαθενίτις	1.

(ἀκολουθεῖ)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΨΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΩΝ

Ἐκ τῶν ἐν Βιέννῃ ἀπομνημονευμάτων Δ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
(ἐν Βερολίῳ).

(Συνέχεια καὶ τέλος· ὅρα σελ. 72)

Ἡ δὲ τοῦ φαρμάκου ἐπενέργεια συνίσταται εἰς τὴν δισφύρῳσιν τῶν κατὰ

τὴν περιφέρειαν ἀγγείων, καὶ ἐπομένως εἰς τὴν ἐλάττωσιν τῆς κατὰ τῆς καρδίας ἀντιστάσεως αὐτῶν. Ἐν ἐγκρατικαῖς συμφορήσεσιν ἀντενδρύνεται ἀπολύτως.

Ἐν δὲ τῷ νευρικῷ ἀσθματι ὁ αὐτὸς ἀναγράφει.

1. — Rp. Kal. Jodat. 4 Grmm. = (Dr. 1).

Extract. et pulv. liquid. aa. 4 Grmm.

F. l. art. mass. ex que formant. Pilulae N° 60.

Consparg. pulv. rad. Irid. Florent.

D. Sig. Τρις τῆς ἡμέρας ἀνὰ 5 καταπόσια.

Τοῦ φαρμάκου γίνεται χρῆσις ἐπὶ πολλὸν χρόνον ἢ καὶ ἐπὶ ἔτη, ὅτε δὲ μὴ ἢ δόσις ἐλαττωθῇ εἰς 9, 6 ἢ καὶ 4 καταπόσια τὴν ἡμέραν.

2. — Rp. Iodaethyl. 5 gramm. D. Sig. Ἐξωτερικῶς κατὰ σταγόναις, ἥτοι

Ἐν δυσπνοιᾷ χέονται τούτου 5 σταγόναις ἐντὸς λίαν θερμοῦ (καὶ κενοῦ) κυλίου, οἱ δ' ἀναπτυσσόμενοι ἀτμοὶ εἰσπνέονται παρὰ τοῦ ἀρρώστου.

3. — Rp. Morph. acetic. 10 centigram.

Aqu. font. destill. 10 gramm.

Solv. D. Sig. Δι' ὑποδορείους ἐγχύσεις,

Πρὸς καταστολὴν εἰσβαλόντος ἤδη, ἰσχυροῦ καὶ δι' ἄλλων μέσων μὴ καταβαλλομένου παροξυσμοῦ· ἀλλ' ἢ τοῦ ποσοῦ τῆς ἐνέσεως αὐξήσει δεικνύται μεγίστης περισκέψεως.

Ἐτι δὲ χρῆσις βρωμιούχου καλίου ὡς ἐν τῇ ἐπιληψίᾳ, ἥτοι

4. — Rp. Kal. bromat. 20 60 grmm.

Div. in dos. aeq. N° 20.

Dent. ad chart. corat.

Sig. Πρὸς καὶ ἐσπέραις ἀνὰ ἐν ξηρίον ἐντὸς ζαχαρ. ὑδατος,

Τοῦτο δὲ εἰς μικρὰς μὲν δόσεις παρέχεται ἐν μεγάλοις τῶν προσβαλόντων χρονικοῖς διαστήμασιν, εἰς μεγάλας δὲ, ἐν συχνότητι αὐτῶν· ὁ αὐτὸς δὲ τρόπος (τῆς χρήσεως) τηρητέος καὶ ἐν τῇ παροχῇ τῆς θεικῆς κινίνης, ἥτις ὁμοῦ μετὰ τὴν διέλευσιν τῶν παροξυσμῶν δίδεται ἐπὶ πολλὸν ἔτι χρόνον εἰς δόσιν ἐνὸς κόκκου δις ἢ τρις τῆς ἡμέρας.

Ἐν παρουσίᾳ νευρῆς εἰσβαλλούσης βρευματικῆς παθῆσεως ὡφελεῖ ἡ χρῆσις τοῦ ἰωδιούχου καλίου καὶ θερμῶν ἀντιβρευματικῶν λουτρῶν, οἷα τὰ τοῦ Baden παρὰ τῇ Βιέννῃ. Ἀλλὰ καὶ ἡ κατὰ καιροῦ διαμονὴ ἐν τοῖς οὕτω δὴ πνευματικοῖς λεγομένοις κατὰστήμασιν (ὅπου αἱ ἀνταποκρίσεις διὰ τοῦ πεπιεσμένου ἀέρος γίνονται), καθίσταται ἐπὶ πολλὸν χρόνον ὡφέλιμος.

Ἢ δὲ θεωρεῖται τῆς συχνῆς συμβαίνουσας παρέσεως τοῦ διαβρώχματος δέον νὰ γίνηται ἢ διὰ φαρμάκου ἢ διὰ γαλβανισμοῦ· ἀλλ' ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ λαμοῦ γαλβανισμὸς τοῦ περιπλανωμένου καὶ τῶν εὐκισθητο-

τέρων σημείων τῶν μετοπλευρῶν νεύρων εἶνε εἰς τὰς μᾶλλον προσφάτους περιπτώσεις ἰδιαζόντως χρήσιμος. Ἐν ἀνταντακτικῇ δ' ἐπενεργείᾳ ἐνεκα κλίσεων τῆς μήτρας εἶνε λίαν σπουδαία ἡ τοπικὴ ταύτης θεωρεῖται. Ἐτι δ' εἶνε ὡφέλιμος ἐν τοῖς παροξυσμοῖς καὶ ἡ τοῦ πρὸς κέντημα χάρτου διὰ νήτρου χρῆσις.

Ὁ δὲ Braun συνίστησι καὶ ἀναγράφει τὰ ἐξῆς κατὰ τοῦ σπασμοῦ τῆς γλωττίδος ἢ τοῦ ὀξυφώνου λαρυγγισμοῦ ἢ ἄλλως τοῦ τῶν παιδίων ἀσθματος (Spasmus Glottidis, Laryngismus stridulus, Asthma infantum).

Ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ παροξυσμοῦ καὶ ἐν τούτῳ καταπολεμεῖται ἡ ἀσφυκτικὴ ἢ ἀποπληκτικὴ τοῦ μικροῦ ἀρρώστου κατὰστασις διὰ τηρήσεως τούτου ἐν ὀρθίᾳ θέσει, διὰ συχνῶν ἐπὶ τοῦ προσώπου βαντισμῶν μετὰ ψυχροῦ ὕδατος καὶ διὰ καταλλήλων κρούσεων ἐπὶ τῆς ῥάχews καὶ τοῦ θωρακίου ἐν γένει τοῦ κορμοῦ· σὺν τούτοις δὲ γίνεται χρῆσις ἀσφραντηρίων οὐσιῶν, ὡς αἰθέρος, χλωροφυρμηλίου (Chloroformium id. προηγ. ὑποσημ. κγ.) μηδικοῦ σιλφίου (Assafoetida) ἀμμωνίας ἢ Ἀγγλικοῦ ἀσφραντηρίου ἑλατος.

Μετὰ δὲ τὸν παροξυσμὸν, ἐκτὸς τῆς ἀπολύτου ἡσυχίας τοῦ πάσχοντος καὶ τῆς συχνῆς ἀνανεώσεως τοῦ ἀέρος τοῦ δωματίου αὐτοῦ, γίνεται χρῆσις χλιαροῦ ἐγχύματος Μαλίσσης, ἀντισπασμωδικῶν σκευασμῶν τοῦ ψευδαργύρου μετὰ καλομέλιτος, ἡπίων ἢ καὶ τι θορυχωτέρων καθαρτικῶν μετ' ὕδατος συντεθλασμένων πικρῶν ἀμυγδαλῶν, κλυτμῶν δι' ὄξους ἢ διὰ μηδικοῦ σιλφίου, χλιαρῶν λουτρῶν μετὰ ποσοῦ τινος αἰουτίδας (διὰ λύσεως στάχτης) ἢ ὀξους. Οὐδέποτε γίνεται χρῆσις ἀφαιμάξεων ἢ ἐκδορῶν· ἅμα δὲ ἀποφυγὴ πάσης ὑπερπληρώσεως τοῦ στομάχου καὶ δυσπέπτων τροφῶν, ἔτι δὲ ἐκροβίσεως ἢ οἰωνοδήποτε ἄλλων διεγερτικῶν ἢ θορυχωδῶν συγκινήσεων· τέλος δὲ χρῆσις ὑγιεινοῦ δροσεροῦ ἀέρος καὶ ἀναλγίου καὶ καταλλήλου κινήσεως.

Μετ' ἰσχυροῦς δὲ παροξυσμοῦ καὶ εἰδικῶν τυχῶν τούτων ἐπανόδου γίνεται χρῆσις δακτυλίτιδος (Digitalis) μετὰ μορρίνης.

Κατὰ λόγον δὲ τῶν εἰδικῶν περιπτώσεων ἀναγράφεται ἔλαιον τοῦ ἡπατος τοῦ ὀνίσκου (Ol. jecor. asel.) βάλανος ἰωδίου, ἰωδοῦχος σίδηρος, κινίνη μετὰ σιδηρούχων (ἢ καὶ μετὰ τιτανούχων) σκευασμῶν, οἶνος τοῦ Μαίαγα ἢ τοῦ ἐν Οὐγγαρίᾳ Erbau (Erbauer Wein).

Ὁ δὲ Berends ἐν περιπτώσει ἐντελοῦς παρεμποδίσεως τῆς ἀποχρέμψεως ἐν τῷ ἀσθματι ἀναγράφει τὸ ἐξῆς·

Rp. Gummi-Ammoniac. 5,0—10,0.

Vitell. ovi unius

Aq. Foenicul. 50,0.

Lip. Ammonii anis. 12,0.

Vin. stibiat. 8,0
 Symp. Althaeae. 15,0.

M. D. S. Αναταρακταμένου κατὰ δίσκον ἐν μέγχι κοχλιαρίου.
 Παρὰ δὲ τοῦ Troussseau ἀνευρίσκεται τὸ ἀρτηνικὸν νάτρον οὕτω κατὰ
 τοῦ ἄσθματος ἀναγεγραμμένον·

Rp. Natrii arseniciei. 0,05.
 Ap. destillatae 100,00.
 Tinctur. coccinellae q. s. ad colorand.

M. D. S. Δις τῆς ἡμέρας μετὰ τὸ φαγεῖν ἐν Τεῖου κοχλιαρίου αὐξομέ-
 νης τῆς δόσεως καὶ ἑκάστην. Ἡ πρωτίστη δὴ δόσις εἶνε ἕτη μὲ 0,0025.
 Natr. arseniciei.

Ἐκ πάντων τῶν περὶ ἄσθματος καὶ τῶν θεωριῶν αὐτοῦ εἰρημένων ἐξά-
 γονται τὰ ἑξῆς, συμπεράσματα·

1. — Ὅτι τὸ ἄσθμα εἶνε βρογχικὴ πάθησις, ἥς πρωτίστη αἰτία εἶνε
 νεύρωσις τις, ἢ ὑπερρεθισμὸς τοῦ νευρικοῦ τῆς ἀναπνοῆς συστήματος.
 2. — ὅτι αὕτη ἢ τῶν βρόγχων σπασμωδικὴ κατὰστασις ὠφελεῖ μὲν ἐνίοτε
 εἰς τὴν ἐν ταῖς ἀεροφορίαις ὁδοῖς ἐπιβλαβῶν οὐσιῶν ἐξοδὸν ἐμποδὼν γιγ-
 νομένη, ἢ τὴν ξένων σωμάτων ἐξωσιν διευκολύνουσα κ. οὕ. κ., ἀλλ' ἔνεκα
 διαφόρων αἰτιῶν, (ἥτοι ἐξ ἐρεθισμοῦ τῶν ἰδίως πνευμονικῶν νεύρων, ἐξ
 ἀντανεκλαστικῶν ἐπενεργειῶν ἄλλου τινος νεύρου ἢ καὶ αὐτῶν τῶν νευ-
 ρικῶν κέντρων), δύνανται οἱ σπασμωδικοὶ αὐτῶν παροξυσμοὶ νὰ ἐγγίνωνται
 καὶ ὑπάρχουσι συχνότατα ἀνευ ὠφελείας. 3. — Ὅτι αὕτη ἢ σπασμωδικὴ
 κατὰστασις ἐπεκτείνεται εἴτα ἐπὶ τῶν ἀναπνευστικῶν μυῶν. 4. — ὅτι
 αὕτη γεννᾷ βρογχόρροιαν, βρογχίτιδα, διεύρυνσιν τῶν βρόγχων, ἢ μᾶλλον
 τῶν πνευμονικῶν κυψελῶν, στάσιν τοῦ αἵματος καὶ παρὰ παιδίαις ἄλλας
 εἶτι, κατὰ λόγον τῆς ἡλικίας αὐτῶν, τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ἀλλοιώ-
 σεις. 5. — ὅτι τὸ ἄσθμα σπανίως μένει καθαρὸν, τείνει δ' αἰετὶ πρὸς ἐπι-
 πλοκάς μετὰ κατάρρου, πνευμονικοῦ ἐμφυτήματος, καρδιακῶν νόσων,
 κ. οὕ. κ. 6. — ὅτι ἐν τῇ θεωρίᾳ δέον εἰκτὸς νὰ προσέγῃ μὲν τὸν νοῦν
 εἰς ταύτας τὰς ἐκγόνους παθήσεις, πρὸ πικρῶς ὅμως εἰς τὴν τοῦ νευρικοῦ
 συστήματος. 7. — ὅτι ἐκ πάντων τῶν θεραπευτικῶν μέσων τὰ ἐν τῇ ἀτ-
 μῶδι καὶ ἀερώδι καταστάσει εἰσπνεόμενα εἰσι τὰ πρὸς καταστολὴν τοῦ
 νευρικοῦ ἐρεθισμοῦ ἐπιτηδείστερα καὶ τὰ πρὸς ἀντιπερισπαστικὴν τινα
 ἐπὶ τοῦ βλεννοῦ μένος πρὸς ἔκτασιν λυσιτελέστερα. 8. — ὅτι τὴν τῆς εἰ-
 ρημένης νευρώσεως ἑδρὰ δὲν δυνάμεθα μὲν μετ' ἀκριθείας νὰ ὀρίσωμεν,
 ἀλλ' ὅμως οὐδόλως δυνάμεθα καὶ νὰ διαψεύσωμεν.

ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΟΒΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΑΧΙΤΙΣΜΟΥ.

KATA J. COMBY.

(Συνέχ. "Ορ. Τόμ. ΙΕ'. Σελ. 404),

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Προφύλαξις.

Ἡ σπουδαιότερὰ ἐνδειξις διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ῥαχίτισμοῦ προφυλακὴν
 ἐκπηγάζει ἐκ τοῦ τετάρτου συμπεράσματος τοῦ πρώτου μέρους τῆς πα-
 ρούσης μελέτης τοῦ διακλαμβάνοντος τὰ τῆς προώρου διατροφῆς. Πρὸ τῆς
 συμπληρώσεως τοῦ πρώτου τῆς ἡλικίας ἔτους οὐδαμῶς ἄλλη τροφή ἐπι-
 τρέπειται πλὴν τοῦ γάλακτος, καὶ δὴ ἀπορρυκτέα ἐντελῶς κατὰ τὴν
 ἡλικίαν ταύτην πᾶσα στερεὰ τροφή, ὡς ἐπίσης καὶ πᾶν ποτόν.

Ὅταν ἐπιστῇ ὁ χρόνος τῆς χρήσεως τροφῶν ἄλλων πλὴν τοῦ γάλα-
 κτος γανέτω ἢ ἐκλογὴ αὐτῶν μετὰ συνέσεως· οὕτω προτιμητέα αἱ ἐν
 μικρῇ ὄγκῳ πλείονα ὀρεπτικά καὶ εὐπεπτα συστατικά ἐνέχουσιν, ὡς
 τὸ γάλα, τὰ ὠὰ καὶ, ἀπορρυκτέα δὲ τὰ κρέατα καὶ τὰ ποιάδια, ὅπως
 βελήνηδον ἐξοικειωθῇ ὁ στόμαχος διὰ τὰς τελευταίας ταύτας τροφάς.
 Ἐν ἄλλαις λέξεσι δέον ὅπως μὴ γένηται αἰφνιδικὰ μετὰβολαὶ ἀπὸ τοῦ
 μητρικοῦ γάλακτος εἰς τροφὰς ἄλλοτρίας.

Τεθέντος ὅτι ἡ μόνη πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ ῥαχίτισμοῦ παρὰ τοῖς νεογνοῖς
 τροφή εἶναι τὸ γάλα, ἴδωμεν τίνι τρόπῳ ἐπιτυγχάνεται ἡ προφύλαξις ἐπὶ
 φυσικῇ, μικτῇ καὶ τεχνητῇ γαλακτοτροφίᾳ.

α'. — Φυσικὴ Γαλακτοτροφία

Ἰδωμεν ἐν ταῖς πρόσθεν ἐξαιρετικῇ ἐπιγίνεται ῥαχίτις καὶ ἐπὶ
 τῆς φυσικῇ γαλακτοτροφίᾳ, ὅποταν δηλονότι τρέφεται τὸ βρέφος χωρὶς
 τῆς φυσικῆς καὶ κανόνος· δέον λοιπὸν πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ κακοῦ καὶ κατὰ τὰς
 ἐξαιρετικὰς ταύτας περιστάσεις νὰ ταχθῶσιν οἱ δέοντες κανόνες, ἀπὸ ῥο-
 ῖα μακρῶς πείρας καὶ παρατηρήσεως.

Κατὰ γενικὸν κανόνα μικρὰ δίδοται προσυγὴ εἰς τὸ ποσόν δέον
 νὰ θηλάζῃ τὸ βρέφος ἐντὸς εἴκοσι καὶ τεσσάρων ὥρων· αἱ πολλὰ τῶν
 τροφῶν προσφέρουσι τὸν μικτὸν ἔμκ ὡς κλαυθυμνήσι τὸ βρέφος εἴτε
 φρονούσαι ὅτι ἡ τοῦ βρέφους ἀνησυχία προσέρχεται ἐκ τῆς πείνης, εἴτε
 πρὸς ἀποφυγὴν ἐτέρων ἐνοχλήσεων, ἀλλ' οὐχ' ἥττον καὶ ἐκ τῶν ἰατρῶν
 πολλοὶ μικρὸν τὸν νοῦν προσέχοντες εἰς τὸ μέρος τοῦτο τῆς ἀνατροφῆς
 τῶν βρεφῶν παρακινῶσι τὸν κατὰ δίσκον θηλασμόν, οὕτως ὥστε δωδε-
 καίαις τοῦ νυχθημέρου θηλάζουσι τὰ βρέφη.

Πρῶτος δὲ Bouchard καὶ μετ' αὐτὸ καὶ ἕτεροι ἰατροὶ ἐν οἷς καὶ ὁ J.

Comby εξανέστησαν κατά τοῦ πλήθους τούτου τῶν γευμάτων τῶν μικρῶν βρεφῶν θεωροῦντες αὐτὸ λίαν ὑπερβολικὸν καὶ παραινοῦντες νὰ προσφέρηται ὁ μικρὸς ἐξάκις δι' ἡμέρας κατ' ἀνώτατον ὅρον ὡς ἐξῆς· πρῶτος θηλασμὸς τῇ 3ῃ ὥρᾳ τῆς πρωῒας· δεύτερος τῇ 9ῃ ὥρᾳ· τρίτος τὴν μεσημβρίαν· τέταρτος τῇ 3ῃ ὥρᾳ μετὰ μεσημβρίαν· πέμπτος τῇ 6ῃ ὥρᾳ, καὶ ἕκτος τῇ 9ῃ ὥρᾳ, μεθ' ὃ μενέτω τὸ βρέφος ἐν ἡσυχίᾳ· εἰς σπανίας μόνον περιπτώσεις, καὶ εἰς βρέφη λίαν ἀνήσυχα ἐπιτρέπεται καὶ ἔσθιομος θηλασμὸς τὴν νύκτα.

Τοῦ θηλασμοῦ ἐνεργουμένου κατὰ τὸν ἄνω ρηθέντα τρόπον οὐδέποτε ἐπὶ φυσικῇ γαλακτοτροφίᾳ ἐπιγίνεται ὁ ῥαχιτισμὸς, πλὴν ὅμως τῆς διαρρημιώσεως ταύτης τοῦ πλήθους· τῶν θηλασμῶν ἀπαιτεῖται καὶ ὁ ὅσον οἶον τε μεθοδικώτερος περιορισμὸς τοῦ ποσοῦ τοῦ ἐκαστοτε λαμβανομένου γάλακτος, διότι εἰ μὲν τὸ ποτὸν εἶναι ὀλίγον τὸ βρέφος ἀπισχνᾷ, εἰ δὲ πλεον τοῦ δέοντος ἐπιγίνονται ἔμετοι τεθρομβωμένου γάλακτος, ἐρευγμοὶ δῖνοι, διάρροια, καὶ γαστρικαὶ διαταραχαὶ ἐπιβάλλουσιν τὴν ἐλάττωσιν τῆς τροφῆς, δέον λοιπὸν ἐξ ἀρχῆς νὰ κανονίζηται μεθοδικῶς τὸ ποτὸν τοῦ γάλακτος κατὰ πάντα θηλασμόν.

Σημειωτέον ὅτι τὰ βρέφη λίαν εὐκόλως συμμορφοῦνται πρὸς τοὺς κανονισμοὺς τούτους τῆς γαλακτοτροφίας, αἱ δὲ ἀνησυχίαι καὶ οἱ κλαυθμισταὶ αὐτῶν μόνον ἐπὶ ὀλιγίσταις ἡμέραις διαρκοῦσιν, ἂν' ἑτέρου δὲ διὰ τῆς τοιαύτης τοῦ θηλασμοῦ τακτοποιήσεως αἱ τῶν μητέρων ἔστιαι δὲ καὶ τῶν τροφῶν ἐκ τούτου ἐνοχλήσεις εἶναι ἐλάχισται καὶ ἀσήμανται.

Ἡ ἀπὸ τοῦ ῥαχιτισμοῦ προφύλαξις διὰ τῆς φυσικῆς γαλακτοτροφίας ἀποδίδει τελεία τοῦ θηλασμοῦ παραινόμενον πλέον τοῦ ἔτους, καὶ μὴ προσφερομένης κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἑτέρας τροφῆς.

6'. — Μικτὴ Γαλακτοτροφία

Καίτοι τῆς μικτῆς γαλακτοτροφίας οὕτης ὑπὸ ὅλας τὰς ἐπόψεις ὑποδεστέρας τῆς φυσικῆς, ὡς ἐν τοῖς πρὸςθεν εἰρηται, ὑπάρχουσιν ὅμως περιπτώσεις καὶ ὅς ἐνεκα πολλῶν λόγων ἐπιβάλλεται.

Ἐπὶ τῇ ὑποθέσει ὅτι γυνὴ τις θηλάζει δύο βρέφη, ἢ ὅτι θηλάζουσα ἐν βρέφος στερεῖται ἱκανοῦ κατὰ ποσὸν γάλακτος, αὕτη δέον ὅπως μὴ ἀναπληρώσῃ τὴν ἑλλειψιν τοῦ μητρικοῦ γάλακτος διὰ τροφῆς ἄλλης ἀλλὰ διὰ γάλακτος καλῆς ποιότητος καὶ εἰς ἀρκούταν ποσότητα, καὶ εἰς τὴν περίστασιν ταύτην τὰ διαλείμματα τῶν γευμάτων ἔστωσαν τριῶρα. Καὶ ὡς πρὸς μὲν τὸ ποσὸν τοῦ ξένου ἔστω τοῦτο γάλακτος ἀπὸ 80—100 γραμμάτων δις ἢ τρίς δι' ἡμέρας, ὡς πρὸς δὲ τὴν ποσότητα ἔστω τὸ ξένον γάλα λίαν μετρίως ἡραιωμένον μεθ' ὕδατος σακχαρούχου, καὶ θερμὸν ἐπὶ ἀμολούτρου εἰς θερμοκρασίαν 36°—39°, οὐδόλως ἐπιτρέπεται ἢ χορᾷ τοῦ θηλάττου.

Διὰ τῆς μικτῆς ταύτης γαλακτοτροφίας οὕτω ἐνεργουμένης χωρὶς θη-

λάστρου καὶ χωρὶς τῆς χρήσεως ἑτέρων στερεῶν ἢ ὑγρῶν τροφῶν προσκτώνται λίαν εὐάρεστα ἀποτελέσματα ὡς πρὸς τὴν προφύλαξιν ἀπὸ τοῦ ῥαχιτισμοῦ.

γ'. — Τεχνητὴ Γαλακτοτροφία.

Αἱ μέχρι τοῦδε προσπαθεῖαι τῶν ἱατρῶν πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ ῥαχιτισμοῦ ἐπὶ τῆς τεχνητῆς γαλακτοτροφίας ἀπέβησαν μάταιαι, ὥστε δι-καίως ὁ τρόπος οὗτος τῆς διατροφῆς θεωρεῖται ἡ σκόπελος τῆς ὑγιεινῆς τῶν παιδῶν. Καίτοι ὅμως τοιαύτη εἶναι ἡ κατάστασις τῶν πραγμάτων, ἐπειδὴ ἐνλοτε ἐπιβάλλεται ἡ τεχνητὴ γαλακτοτροφία ἐκ περιστάσεων ἀνεξαρτήτων τῆς θελήσεως τοῦ ἱατροῦ καὶ τῶν οἰκογενειῶν, ζητητέον τὰ μέσα δι' ὧν κατορθοῦται ὁ τοιοῦτος τῆς διατροφῆς τρόπος ἥττον ἐπιβλαβής.

Πρῶτος κανὼν κατὰ τὴν τεχνητὴν γαλακτοτοτροφίαν ἔστω ἡ ἀποφυγὴ τοῦ θηλάστρου, καὶ δὴ τοῦ διὰ μακροῦ σωλήνος, ὅπερ κατὰ τὴν ἑκφρασιν τοῦ Natalis Guilloi ἐφάρμοιτο πλείονα βρέφη ἢ ἡ πυρετὶς ἐνηλίκους· Ἀληθῶς τὸ θηλάστρον εἶναι λίαν πρόσφορον διὰ τὰς τροφὰς· αἵτινες τοποθετοῦνται αὐτὸ παρὰ τὸ κατακεκλιμένον βρέφος ἐγκαταλιμπάνουσιν αὐτὸ ἐν ἡρεμίᾳ καὶ ἐπιδίδονται εἰς ἄλλα ἔργα καὶ ἐνάπαυσιν· ἀλλ' ἡ ἡσυχία αὕτη εἶναι λίαν παροδική, διότι τάχιστα ἐπιγίνεται εἰς τὸ βρέφος διάρροια καὶ ἀθρεψία.

Τὸ ζήτημα τῆς μεταδόσεως τῆς φυμκτιώσεως διὰ τοῦ γάλακτος τῶν ἀγγελῶν δασκίς αὐταὶ τυγχάνουσι πάσχουσι δὲν εἶναι εἰσέτι λελυμένον, τινὲς θεωροῦσιν ὅτι μετὰ τὴν ζέσιν τὸ γάλα ἀπόλλυσιν τὴν ιδιότητα τοῦ μεταδίδειν τὴν νόσον, ἀλλὰ τὸ ζέσκειν γάλα εἶναι δύσπεπτον· Ὁ J. Comby δίδει τοὺς ἐξῆς κανόνες ὡς πρὸς τὴν τεχνητὴν γαλακτοτροφίαν.

Τὸ γάλα δίδεται καθαρὸν, ἐν περιπτώσει δὲ μὴ ἀνοχῆς ἔδραιούται δι' ὕδατος σακχαρούχου εἰς ἀνχολίαν 1 : 5, εἰς θερμοκρασίαν 36°—37° ἀμολούτρου ἢν εὐκόλως ἀντιλαμβάνομεθα διὰ τοῦ δακτύλου, καὶ διὰ κυθίσκου ἢ διὰ μικροῦ κοχλιαρίου, ἀναλόγως δὲ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ βρέφους· τὸ προσφερόμενον ποσὸν κυμαίνεται ἀπὸ 80. 100 ἕως 150 γραμμάτων εἰς ἕκαστον γεῦμα ἐξάκις ἢ ἐπτάκις ἐντὸς εἰκοσίων καὶ τεσσαρῶν ὥρων, τοῦτέστιν 600 ἕως 1000 γράμματα ἐν 24 ὡρᾷ δι' ἡμέρας. Διὰ τῆς μεθόδου ταύτης τῆς διατροφῆς ἀποσποδοῦνται ὡς τὰ πολλὰ οἱ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τῆς τεχνητῆς γαλακτοτροφίας κίνδυνοι.

Τὰ ἀπὸ τῆς τεχνητῆς γαλακτοτροφίας δυσάρεστα ἐπακολούθηματα εἶναι δεινότερα τὸ θέρος ἐνεκα τῶν αἰρηνθίων μεταβολῶν ὅς ὑφίσταται τὸ γάλα κατὰ τὴν θερμὴν τοῦ ἔτους ὥραν, διὸ κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην δέον τὸ γάλα συχνάκις νὰ ἀμελγῇται.

Μ' ὅλας ὅμως τὰς προφυλάξεις καὶ τὴν διδομένην εἰς τὴν τεχνητὴν

γαλακτοτροφίαν προσοχήν οὐδόλως τὰ ἀπὸ ταύτης ἀποτελέσματα εἶναι παραβλητέα πρὸς τὰ τῆς φυσικῆς γαλακτοτροφίας, καθότι καὶ τὸ ἔξι στον τοῦ βοείου γάλακτος εἶναι πάντοτε ὑποδεέστερον ὑπὸ τὴν ἐποψὴν τῆς θρεπτικότητος τοῦ τῆς γυναικός, τούτου ἕνεκα ἐνίοτε κατὰ τὴν τεχνικὴν γαλακτοτροφίαν καὶ τὴν τὰ μάλιστα τεχνηέντως διευθυνομένην ἐπισυμβίνει ὁ ῥαχίτισμός, ὅστις ὅμως ὡς τὰ πολλὰ εἶναι ἐλαφρὸς, αἱ ἀπ' αὐτοῦ παραμορφώσεις τοῦ σώματος ἥττον ἐντονοὶ, ἢ βλάβεις καὶ ἡ ὁδὸν τοφίαν ἐπιγενεῖς, ἀλλὰ πάντα ταῦτα παρέρχονται προαύσης τῆς ἡλικίας καὶ οὐδὲν ὑπολείπεται τοῦ κακοῦ ἔχους, μετὰ μεγάλης εὐκολίας καὶ ταχύτητος διαλυομένων ἀπασθὼν τοῦ σκελετοῦ τῶν παραμορφώσεων.

Δὲν παρέρχονται ὅμως μετὰ τῆς αὐτῆς εὐκολίας καὶ ταχύτητος καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ῥαχίτισμοῦ φαινόμενα, καὶ δὴ αἱ γαστρικαὶ διαταραχαί, αἵτινες ἐπὶ μακρὸν παραμένονται μετὰ τὴν ἔξαιν τῆς νόσου τούτων δὲ αἱ μᾶλλον ἐπιμένονσαι εἶναι ἡ δυσπεψία καὶ ἡ τοῦ στομάχου διαστολή. Ἄλλ' ὅψ' ἑτέρου ἐκ τῆς κλινικῆς παρατηρήσεως παραδεκτέον ὅτι αἱ παλαιὰ τῶν χρονίων νόσων καὶ τῶν διαθέσεων αἱ εἰς τὰς μετέπειτα ἡλικίας ἀναφαινόμεναι ὀφείλονται εἰς τὴν ἐλαττωματικὴν καὶ κακὴν πρώτην διατροφήν, τοιαῦται δὲ διαθετικαὶ νόσοι ἰδίως εἶναι ἡ χοιράδωσις καὶ ἡ ἀρθρίτις.

(ἀκολουθεῖ) Γ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

SIROP D'HYPHOS-PHITES DE FELLOWS.

Παρασκευαζόμενον ἐν Νέα Ὑόρκη ὑπὸ τοῦ χημικοῦ

JAMES FELLOWS.

Τὸ περὶ οὗ πρόκειται σκεύασμα ἐνέχει

Τὰ κυριώτερα τοῦ ζωικοῦ ὁργανισμοῦ συστατικά, Κάλιον καὶ Τίτανον. Ὁξειδωμένους ἐνώσεις, Σίδηρον καὶ Μαγγανήσιον. Τονικά, Κινίνη καὶ Στρυχνίνη. Καὶ τὸ ζώϊκον θειμελιώδες συστατικόν, τὸν Φώσφορον.

Διαφέρει πάντων τῶν ἄλλων ὁμοταγῶν σκευασμάτων διότι εἶναι εὐάρεστον τὴν γεῦσιν, ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ στομάχου εὐνοϊκῶς, καὶ οὐδὲν ἐπιγίνεται κακὸν ἀπὸ τῆς παρατεταμένης αὐτοῦ χρήσεως.

Μεγάλαν ἐκτέτακτο ὑπόληψιν ἐν Ἀμερικῇ καὶ Ἀγγλίᾳ δ.κ. τὸ νόσιμον τῆς χρήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν ὁρακταίαν τῆς φθίσεως, τῆς χρονίας βρογχίτιδος καὶ ἑτέρων τῶν ἀναπνευστικῶν ὁργάνων παθήσεων. Οὐχ' ἥτονδε ὠφελεῖ καὶ κατὰ ποικίλων νευρικῶν νόσων, ὡς καὶ κατὰ τῆς ἀτονίας. — Αἱ θεραπευτικαὶ αὐτοῦ ἐνέργειαι ἀποδοτέαι εἰς τὰς τονωτικὰς καὶ θρεπτικὰς αὐτοῦ ἰδιότητας δι' ὧν αἱ διάφοροι ὁργανικαὶ λειτουργίαι ἐπανέρχονται εἰς τὸ κατὰ φύσιν. Οὕτω καὶ αἱ περιπτώσεις ἐνδείκνυνται ἡ τῆς ἐννευρώσεως τόνωσις διὰ τονωτικῆς θεραπείας, τὸ σκεύασμα τοῦτο ἵναι τὰ μάλιστα ὠφέλιμον. Ἐνεργεῖ ταχέως, διεγείρει τὴν ὁρεξίν, ρυθμίζει

τὴν πέψιν, διευκολύνει τὴν ἀπορρόφωσιν καὶ μετὰ τῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν μεταβάλλει εἰς τὴν κυκλοφορίαν. Ἐπίσης ὠφελεῖ καὶ κατὰ τῶν φρενοπαθειῶν καὶ ἐν γένει πάτης νευρικῆς παθήσεως.

Ἐκάστη φιάλη περιέχει 8 οὔγκιας, ἤτοι 50 περίπου δόσεις.

Εὐρίσκεται ἐν Ἀθήναις παρὰ τῷ κ. Κ. Ὀλυμπίῳ. Πᾶσα περὶ τούτου ἀγγελία ὤριστα μόνον διὰ τὰ ἱατρικὰ περιοδικά.

ΔΙΔΑΓΣΙΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΣ.

ΓΑΤΑ L. ROSSENTHAL.

Σκουαζομένη εἰς τὸ φαρμακεῖον τῆς Αὐλῆς ἐν Jena (Γερμανία)

ΥΠΟ R. SLUTZ.

Βραβευθεῖσα ἐν Βρυξελλαῖς, ἐν Ἀλλῇ, ἐν Φρανκφούρτῃ καὶ ἐν Βιέννῃ.

Ἡ διήλυσις αὕτη ἐνέχει ἅπαντα τοῦ κρέατος τὰ θρεπτικὰ συστατικά πλὴν τοῦ λίπους καὶ τῶν νεύρων. Οὐδόλως διεγείρει πεπτομένη καὶ ὑπὸ τῶν λίαν ἀπθηνῶν στομάχων τῶν οὐδὲν ἕτερον στερεῶς ἢ ὑγρῶς τροφῆς εἶδος ἀνεχομένων, πρὸς δὲ κέκτῃται γεῦσιν λίαν εὐάρεστον ὁποῦ κρέατος.

Περὶ τῆς διαλύσεως ταύτης πολὺς μετ' ἐπαίνων λόγος γίνεται ἐν τῷ συγγράμματι Sammlung, klinischer Vorträge ὑπὸ Richard Volkmann ἀρ. 62, καὶ ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ Wiel, ὡς καὶ ἐν τοῖς περιοδικοῖς Gesundheit ἀρ. 14. 1882. καὶ Wiener Medicinal Presse ἀρ. 2. 1883.

Γενικὴ ἀποθήκη ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς Eastern Agency, ἐν Ἀθήναις δὲ γίνονται δεκταὶ παραγγελίαι εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Γαλλοῦ καὶ τὸ Φαρμακεῖον Α. Τσεράχη. Ὁδ. Σόλωνος.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ (OFFICINE)

ἡ Συλλογὴ τῶν κατὰ τὴν πρακτικὴν φαρμακοποιῶν.

Διαλαμβάνουσα

Περὶληψὶν ἀπασθὼν τῶν φαρμακοποιῶν, τῶν ἱατρικῶν καὶ φαρμακευτικῶν συνταγολογίων τῶν διαφόρων ἐπικρατειῶν. Τοξικολογίαν, ἢ τὸν τρόπον τοῦ ἀνιχνεύειν τὰ δηλητήρια. Φαρμακευτικὰς δοκιμασίας. Φαρμακοποιῶν κτηνιατρικῆς, ὁμοιοπαθητικῆς. Θεραπευτικὸν ἐγκόλπιον, ἅπαντα τὰ νέα φάρμακα γενικὴν τῶν φαρμάκων διατίμησιν.

ΥΠΟ DORVAULD.

Ἐκδόσις 10η ἐντελῶς ἀνασκευασθεῖσα ἐκ 1000 σελ. κείμενον. Σχήματα ἐν τῷ κειμένῳ. Ξινη ὀνοματολογία.

Εὐρίσκεται ἐν Ἑλλάδι εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Γαλλοῦ.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ διὰ τὸν Γαληνὸν εἶναι δεκταί εἰς τὸ γραφεῖον αὐτοῦ ὁδ. Πινγκοτὼν 8, καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς EASTERN AGENCY. Karakeuy Dairmen Han.

Ἡ διεύθυνσις EASTERN AGENCY ἐπιφορτίζεται τὰς ἀγγελίας διὰ τὰς ἐν Ἑλλάδι καὶ τὸ ἐξωτερικὸν ἐφημερίδας. Δίδει ἐμπορικὰς πληροφορίας περὶ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὑποδεικνύει ἐπὶ τῇ αἰτήσεϊ εἰς τὰ ἐν Εὐρώπῃ καταστήματα τοὺς καλλιτέρους ἀντιπροσώπους διὰ τὴν κατανάλωσιν τῶν προϊόντων. Προμηθεύει τέλος ἐξ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς βιβλία, ἐργαλεῖα, καὶ παντὸς εἶδους ἀντικείμενα χρήσιμα εἴτε διὰ τὸ ἐπάγγελμα εἴτε διὰ τὴν ἰδίαν τῶν κκ. ἱατρῶν καὶ φαρμακοποιῶν χρῆσιν.

Παραρρημάτων διορθώσεις

Εἰς τὰ περὶ ἁσθματος τοῦ κ. Βλαχοπούλου

Ἐν Σελ. 222	Σελ. 1	Ἀντὶ τακτέστησαν	Γραφ. κατέστησαν
» » 237	» 35	» ἰνώδης	» ἰώδης
» » »	» 40	» διευρυσμέναι	» διευρυσμένα
» » 250	» 8	» σταμίου	» στομίου
» » 251	» 18	» εἰς τινὰς	» εἰς τινὰ
» » »	» 22	» διχτετρωμέναι	» διατετρωμέναι
» » »	» 29	» ἀμφαλωτοῦ	» ἀμφαλωτοῦ
» » 252	» 7	» (ρίζιμεντιαν)	» (ρίζιμεντιαν)
» » 262	» 30	» παρδετή	» παρδεκτή
» » 263	» 9	» ἀνατομικάς	» ἀνατομικαί
» » »	» 12	» αἰτιολογική	» αἰτιολογική
» » »	» 32+23	» (πνευμονικοῦ)	» (πνευμονογαστρικοῦ)
» » 281	» 12	» ἁσθματικοῦ	» ἁσθματικοῦ παροξυσμοῦ
» » 283	» 143	» κινήσεις	» κνήμας
» » 284	» 19	» τοιχώματα	» τοιχώματα
» » 285	» 2	» ἐναφαινεται	» ἀναφαινεται
» » »	» 17	» καὶ ἐν ταῖς ἐπιπλοκαῖς	» καὶ τὰ ἐν ταῖς ἐπιπλοκαῖς
» » 296	» 5	» κινούμενοι	» κυανούμενος
» » 297	» 20	» πυώδους	» ποώδους
» » 299	» 4	» τὰς τοῦ ἁσθματος εἰς	» τὰς τοῦ ἁσθματος αἰτίαις εἰς
» » »	» 20	» ὕστερον μεταβάς	» ὕστερον μεταβάς
» » 300	» 3	» κοιλίδας	» κοιλίδας
» » »	» 29+30	» ἀνακλαστικὴν	» ἀντανεκλαστικὴν
» » »	» 30	» ἀνακλαστικῶς	» ἀντανεκλαστικῶς
» » »	» 30	» ἐπὶ ἀνακλίντρον	» ἐπὶ ἀνακλίντρου

ΑΓΓΕΛΙΑΙ διὰ τὸν Γαληνὸν εἶναι δεκταὶ εἰς τὸ γραφεῖον αὐτοῦ ὁδ. Πινγκοτῶν 8, καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς EASTERN AGENCY. Karakeuy Deirmen Han.

Ἡ διεύθυνσις EASTERN AGENCY ἐπιφορτίζεται τὰς ἀγγελίας διὰ τὰς ἐν Ἑλλάδι καὶ τὸ ἐξωτερικὸν ἐφημερίδας. Αἶδει ἐμπορικὰς πληροφoρίας περὶ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὑποδεικνύει ἐπὶ τῇ αἰτήσῃ εἰς τὰ ἐν Εὐρώπῃ καταστήματα τοὺς καλλιτέρους ἀντιπροσώπους διὰ τὴν πρoσtάλασιν τῶν προϊόντων. Προμηθεύει τέλος ἐξ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς βιβλία, ἐργαλεῖα, καὶ παντὸς εἶδους ἀντικείμενα χρήσιμα εἴτε διὰ τὸ ἐπάγγελμα εἴτε διὰ τὴν ἰδίαν τῶν κκ. ἱατρῶν καὶ φαρμακοποιῶν χρῆσιν.

Παραρρημάτων διορθώσεις

Εἰς τὰ περὶ ἁσθματος τοῦ κ. Βλαχοπούλου

Ἐν Σελ. 222	Στ. 1	Ἀντὶ τατέστησαν	Γραφ. κατέστησαν
» » 237	» 35	» ἰνώδης	» ἰώδης
» » »	» 40	» διευρυσμέναι	» διευρυσμένα
» » 250	» 8	» στομίου	» στομίου
» » 251	» 18	» εἰς τινὰς	» εἰς τινὰ
» » »	» 22	» διατετρωμέναι	» διατετρημέναι
» » »	» 29	» ἀμφαλωτοῦ	» ἀμφαλωτοῦ
» » 252	» 7	» (pizimeliun)	» (pizimeliun)
» » 262	» 30	» πρκαδετή	» πρκαδετή
» » 263	» 9	» ἀνατομικὰς	» ἀνατομικαί
» » »	» 12	» αἰτιολογική	» αἰτιολογική
» » »	» 32+23	» (πνευμονικοῦ)	» (πνευμονογαστρικοῦ)
» » 281	» 12	» ἀσθματικοῦ	» ἀσθματικοῦ παροξυσμοῦ
» » 283	» 14+3	» κινήσεις	» κνήμας
» » 284	» 19	» τοιχώματα	» τοιχώματα
» » 285	» 2	» ἀναφαίνεται	» ἀναφαίνεται
» » »	» 17	» καὶ ἐν ταῖς ἐπιπλοκαῖς	» καὶ τὰ ἐν ταῖς ἐπιπλοκαῖς
» » 296	» 5	» κινούμενοι	» κυανούμενοι
» » 297	» 20	» πυώδους	» ποώδους
» » 299	» 4	» τὰς τοῦ ἀσθματος εἰς	» τὰς τοῦ ἀσθματος αἰτίαις εἰς
» » »	» 20	» ὑστερον μεταβὰς	» ὑστερον μεταβὰς
» » 300	» 3	» κοιλίδας	» κοιλάδας
» » »	» 29+30	» ἀνακλαστικὴν	» ἀντανκλαστικὴν
» » »	» 30	» ἀνακλαστικῶς	» ἀντανκλαστικῶς
» » »	» 30	» ἐπὶ ἀνακλίντρον	» ἐπὶ ἀνακλίντρον

του, κατὰ τὴν τῆς μάμμης διὰ τοῦ ὠτίτου ἐξέτασιν, ὅν, ὡς λέγει, εἶρε φραγμένον παρκαμέτα.

Ἐξέτασις τοῦ νεογνοῦ. — Τὸ μὲν πρόσωπον εὐτραφέες, σύνοφρό πως, κοίλον στόματος θερμόν, θώρακα ἐπιπολαίως λειτουργοῦντα, καρδίαν πάλ-
λουσαν ἕως 200κι; κατὰ πᾶν λεπτόν τῆς ὥρας, ὀμφαλίδι φυσικὴν μετ' ἐλαφρῆς ἐρυθρότητος, κοιλίαν τυμπανικὴν μετ' ἐξοιδήσεως σφοδρῆς τῶν
δερμικῶν φλεβῶν, ἀλγεινὴν σφόδρα κατὰ τὴν ἐπίψαυσιν, ἐξ οὗ κλυθυνοί,
τὰ σπάργαντα κατὰ πᾶσαν ἀλλοτρίαν οὐρόδρεκτα, ἡ διὰ τοῦ δακτύλου ἐξε-
τασις ἕνα καὶ ἡμισυ δακτύλου; ἄνωθι τοῦ πρωκτοῦ κώλυμα ἀδιάβατον
ἐδειξεν.

Διαγνωσθέντος διαφράγματος τοῦ ὀρθοῦ (συγγενοῦς διαμφορτίως), ἐξ οὗ
βέβαιος ὁ θάνατος, ὑπέδειξα τὴν ἀπόλυτον ἀνάγκην ἐγγχειρήσεως, ἣν
εὐχαρίστως οἱ οἰκεῖοι παρεδέξαντο, προηγηθέντος χθὲς τοῦ θεοῦ βαπτί-
σματος.

Τὴν 3 μεταμεσημβρινὴν ὥραν, παραλαβὼν τοὺς ἰατροὺς κκ.Δ. Τριαντα-
φυλλάκον καὶ Παύλον Ἰωαννίδην, προσέστην εἰς τὴν ἐγγχειρήσιν, ἐν ᾗ πρηνι-
σθέντος ἐπὶ προσκεφαλαίου τοῦ βρέφους μετὰ συγκαμμένων πρὸς τὴν
κοιλίαν τῶν γονάτων, εἰσήγαγον ἐλαιοβραχὴ ὅλην τὴν χώνην τῆς διακελυ-
τῶν ὠτων διόπτρας, ἣν ἔδωκα θατέρω τῶν βοηθῶν, ὅστις διέστειλεν
ὅσον ἔδει τὰ σκέλη ταύτης, ὅτε ἡ κατὰ βάλος κατόπτεισις ἐρυθρὰν
σφόδρα σαρκώδη ἐδειξεν ἐπιφάνειαν, ἣν δι' ἀργυροῦ γυναικείου καθετῆ-
ρος ἐξετάσας εὖρον ἀδιάβατον, ὅθεν τοῦτον ἐξαγαγὼν δοκιμαστικὴν τρι-
γωνον ἀκίδα πῦν τῇ καλαμίσκῃ μετὰ πολλοῦ κόπου ἄνευ δδύνης τοῦ
βρέφους εἰσήγαγον, ὅσον δακτύλου βαθύως ἐπὶ τὰ ἔσθαι καὶ ἄνω τοῦ δια-
φράγματος μᾶλλον πρὸς τ' ἀριστερά· ἐξαχθείσης τῆς ἀκίδος ἤλυσσα διὰ
τοῦ σωλήνος λεπτόν συριγμόν ἐκ τῆς ἐξόδου ἀερίων δυσωδῶν, ἐξ ὧν οἱ
βοηθοὶ τὰς αὐτῶν ὄψεις ἀπέσπυρον. Πάραυτα διὰ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ εἰσή-
γαγον τρίγωνον ἀκίδα τῶν ὑδροκλήδων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ βάθους δύο δακτύ-
λους ἔσωθεν τοῦ δακτυλίου, ἀλλ' οὐδὲν σημεῖον μηχανίου ἐξῆλθε μετὰ
τὴν τῆς ἀκίδος ἐξοδόν, πλὴν σταγόνων τινῶν φλεβώδους αἵματος. Διὰ
τοῦ σωλήνος δὲ ταύτης, μικρῇ μεταλλίνῃ κλύσματι ὕδαρ χλιαρὸν μετὰ
βαρῆς ποσότητος ἐγχύσας, τοῦτο μόνον μικρὸν ὕφαιμον ἐξῆλθε, παρρηθὺς
τὸν ἀριστερόν ὡτίτην εἰσαγαγὼν περιέστρεψα πολλάκις περὶ τὸ νέον
τμήμα πρὸς διαστολὴν αὐτοῦ, καὶ οἱ βοηθοὶ ἀμφοτέρω ὡσαύτως ἦν δὲ
δὲ τοῦτο ὑπόπληρος σαρκώδους οὐσίας. Εἰσαγαγὼν ὅθεν διακρομήλῃ θριαλ-
λίδι ἐκ μοτοῦ ἐλαιοβραχὴ ἀπῆλθον ἀναγκάσας δύο σιγ. καλομέλιτος; εἰς
12 ξηρία, κατὰ δίσκον ἀνὰ ἓν, καὶ ἐπέλειψιν κοιλίας ἀλοιφῇ ἐκ δύο
δρ. ὑδραργυρικῆς φαιῆς, 5 σιγ. ἐκχυλίσματος εὐθαλαίας καὶ οὐγγίας ἀ-
λοιφῆς δενδρομαλάχης, ὅπως κατὰ τετράωρον διὰ ποσοῦ ὅσον ἀμυγδαλίου
ἐπιτρίβεται.

Τὴν 4. πρωτὴν ἔμαθον, ὅτι τρεῖς ἡμέρας κατὰ τὴν νύκτα ὅλην τὰς αὐ-
τὰς οὐσίας μετ' ὀλίγου γάλακτος, ἡ θριαλλίς ἐξηρέθη, ὁ ὕπνος ἥσυχος·
ὄγκος κοιλίας ἐλάττωσεν, ἡπαρ μικρὸν ἐξωγκωμένον, σπλὴν φυσικὸς, ὀμφα-
λὶς ἀρχομένη ἀπονεκροῦσθαι, ἄνευ ἐρυθρότητος πέριξ, ἐπίκρουσις μετρίως
εὐήχος. Εἰσαγαγὼν τὸν γυναικεῖον καθετῆρα ἐπὶ τοῦ διατρηθέντος δια-
φράγματος, σπασμὸν ἔδρας, καὶ τεινεσμούς τινας ἡσθάνθη. Διακλύσας καὶ
αὐτὴς παρήγγειλα γενικὴν λουτρον πιτύρων, καὶ τ' αὐτὰ ἰχματὰ καὶ τὴν
δείλιν, καὶ ὅλην τὴν νύκτα.

Τὴν 5. οὐδεμίαν εὖρον βελτίωσιν ἕως τῆς 4ης μ. μ. ὥρας, ὅτε εἰσα-
γαγὼν τὸν καθετῆρα εὖρον σύμφυσιν τῆς τεχνήτης ὀπῆς σχεδὸν τελείαν,
ὅτε ἐγχύσας τέσσαρα ὑπόθερμα κλυσμάτια, ἀπῆλθον, τ' αὐτὰ τοὺς οἰ-
κειοὺς ἐπειπῶν.

Τὴν 6. 11ην πρωτὴν ὥραν, εὖρον ὄψιν φυσικὴν τοῦ προσώπου, κοιλίαν
μαλακὴν, ἀποπατήσεις πολλάκις ἐφ' ὅλην τὴν νύκτα, φυσικὰς τῆς ἡλι-
κίας αὐτῆς, μετὰ προηγηθέντα ὀκτὼ κλυσμάτια, μεθ' ἧς μετὰ σφοδρῶν
τεινεσμῶν καὶ κλαυθμηρισμῶν ἐξῆλθεν ἐκ τῆς ἔδρας αὐτῆς βάλος μελα-
νοπράσινος, συμπαγῆς, ὅσον ἀμυγδαλίου μεγάλου, ἐπὶ χριστός αἵματι με-
λανῷ κατὰ τὸ πρόσθιον ἄκρον, ὅν οἱ οἰκεῖοι οὐκ ἐτήρησαν πρὸς ἐξέτασιν
κρείττονα, ὕστερον δ' ἐντερικαὶ ὕλαι κιτρινοπράσινοι βρώδεις, ἐθήλασεν,
ὕπνωσεν ὕστερον, καὶ ἤδη ἔχει καθ' ὅλα καλῶς, μεθ' ἧς παραγγείλας τὰ
δέοντα διέκοψα πλέον ὡς ἀσκόπους τὰς περικιτέρω ἐπισκέψεις.

Τὴν 8ην διερχόμενος ἤκουσά τινα τῶν θείων αὐτῆς, ὅτι ἔχει λίαν
καλῶς. Τὴν 10ην περὶ τὴν πρωτὴν ἀπεβίωσεν ἐνδεκαήμερος οὐσα.

Πρὶν δὲ τῆς νεκροψίας, ἦν μετὰ πολλοῦ κόπου κατωρθώθη νὰ ἐνερ-
γήσωμεν, ἔμαθον παρὰ τῆς μάμμης αὐτῆς, ὅτι τὴν πρωτὴν τῆς 9ης ἐξῆ-
πνησε κακοδιάθετον κατασχεθὲν τὴν νύκτα ὑπὸ βηχός, ἐρυθρότητος πα-
ρειῶν, ἄνευ ὀρέξεως, ἐθήλασε, τρεῖς ἐφ' ὅλην τὴν ἡμέραν, ἤμεσεν ἀπαξ,
ἐλαβε καὶ τινας κενώσεις.

Νεκροψία. — Μετὰ τῶν δύο ἰατρῶν, οὗς εἶχον βοηθοὺς κατὰ τὴν
ἐγγχειρήσιν, ἐνεργήσαντες τὴν νεκροψίαν ἐν τῇ περιβόλῃ τοῦ γαμοῦ τῆς Με-
ταμορφώσεως εὗρομεν μετὰ τὴν διαίρεσιν τῶν κοιλιακῶν κλύσματων
μετρίαν ὑπεραιμίαν τοῦ ἐντερικοῦ σωλήνος, ἄνευ ἔχνου; περιτονίτιδος.
Ὁ στόμαχος φυσικὸς ἔφερε γάλα πεπηγός, ἡπαρ, σπλὴν, νεφροὶ φυσικά·
τὸ κατιὸν κώλον ὑπεραιμικὸν καθ' ὅλους τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ, ἐνέχον
κόπρου ποσότητα ὅσον οὐγγίης ἐπικαθημένην εἰς διάφραγμα ἐν αὐτῇ
κρεμᾶμενον ἐν εἴδει μαρσοπίου· ἕνα καὶ ἡμισυ δακτύλον ἄνωθι τοῦ χεί-
λου, τῆς ἔδρας, ὁ βλεννομήν τοῦ ὀρθοῦ ἀπέληγεν εἰς τυφλὸν σάκκον, ἐν
τῇ μέσῃ ἀκριβῶς διάτρητον (διὰ τῆς ἐγγχειρήσεως), κάτωθι τούτου ἦν
μόνον ὀμυώδης ὑμὴν τοῦ ὀρθοῦ μετὰ τοῦ ὀρρώδους; μίαν ὑπεραιμικὴν
ἀμφοτέρω. Τὸ διάφραγμα ἦν δυσεκτατόν, ὑπόσκληρον, παχύτερον τοῦ δ-

μολόγου ιστοῦ, συγκρινόμενου τοῦ πάχους αὐτοῦ πρὸς τὸν βλεννομένον τοῦ αὐτοῦ ἐντέρου δλίγον ἄνωθι. Διανοιχθέντος τοῦ θώρακος εὐρέθη τὸ κατώτερον ἡμισυ τοῦ δεξιοῦ πνεύμονος φέρον σφήνωσιν, ὑπομέλαν, ποῦ καὶ ποῦ κατὰ τὴν θλίψιν ἐκρέοντος ἀφρώδους ὑγροῦ· ὁμοίαν ἀλλ' ὀλίγη ἐκτάσεως ἔφερε καὶ ὁ κατώτερος δπίσθιος λοβὸς τοῦ ἀριστεροῦ πνεύμονος ἢ καρδία φυσική· τὸ κρᾶνιον δὲν ἠνεώχθη.

Πόθεν ἐπῆλθεν ὁ θάνατος; Βεβαίως ἢ ἐγχειρήσεις ἦν ἐπιτυχής. Ἐὰν εἴ αὐτῆς, ἔπρεπε νὰ εὐρωμεν φλεγμονὴν τοῦ ὀρθοῦ, τοῦ πυχέος, ὥσως τῶν λεπτῶν καὶ τοῦ περιτοναίου, μετὰ τινος ὥρας, ἢ καὶ μίαν ἢ δύο ἡμέρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν, ἀλλ' ἐπῆλθε μετὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως προηγηθείσης βηχὸς καὶ ἄλλων βεβαίως σημείων πνευμονίας, ὡς καὶ πρὸ ἐνός ἔτους εἰς τὸ πρὸ τῆς Βακκοῦς τεχθὲν ἄρρεν, ἀδελφὸν αὐτῆς, ὅπερ ὑπὸ τὴν ἐπίσκεψιν ἐμπείρου συναδέλφου μετ' ὀλίγας ἡμέρας ἀπὸ τοῦ τοκετοῦ ἐκείνου συνέβη ν' ἀποθάνῃ ἐξ ὀξυτάτης πνευμονίας. Ὁρίλιμον νομίζομεν εἰς τοῦς εὐρεθησομένους εἰς ἐκτέλεσιν ὁμοίας ἐγχειρήσεως νὰ συστήσωμεν τὴν διὰ πυρηνομαχειρίου εὐθέος κατὰ τὰ πλάγια διαίρεσιν τοῦ διαφράγματος εἰς μείζονά πως ἔκτασιν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΟΨΙΣ ΤΟΥ 1885.

ὑπὸ Ι. Π. ΠΙΣΗΡΙΗ (ἐν Καρδασσοῦ).

(Συνέχεια. ἑρμ. σελ. 83).

Κατὰ δὲ τὴν ἡλικίαν, τὸ φύλον καὶ τὸν θάνατον αἱ νόσοι αὗται ἔχουσιν ὡδε·

Πίναξ 3.

Νόσοι	Ἡλικία	Ἄρρεν	Θῆλυ	Θάνατος
Τραῦμα κεφαλῆς	35	1	—	—
Ἡμικρανία	38—48	1	2	—
Νευραλγία κεφαλῆς	20	—	1	—
Ἐπιληψία	13—20	2	—	—
Ὑστερισμός	25—29	—	3	—
Ἀποπληξία	85	1	—	1
Κνήφη	24—85	2	—	—
Δοθιήν	38	1	—	—
Δερματῖτις ἀκνώδης	1 1/2	1	—	—

Νόσοι	Ἡλικία	Ἄρρεν	Θῆλυ	Θάνατος
Ἐγκυμα	3—55	1	2	1
Κίρσοι ποδῶν	45	1	—	—
Βλεφραδενίτις	9	1	—	—
Τραῦμα κερατοειδοῦς	12	1	—	—
Χοιραδικὴ ὀφθαλμία	20—22	—	2	—
Φλυκταινώδης κερατοειδίτις	28	—	1	—
Ῥινορραγία	2	1	—	—
Τραῦμα ῥινός	5—21	2	—	—
Ὑπογενίτις	9—47	1	2	—
Ἀμυγδαλίτις	2—30	4	4	—
Φαρυγγολαρυγγίτις	2 1/2—6	2	—	—
Ἀφθώδης στοματίτις	2	—	1	—
Ἑλμινθίασις	3—14	5	3	—
Δυσκοιλιότης	3—38	1	1	—
Δυσεντερικὸς κατάρρους	30—42	1	2	—
Κωλικοὶ ἐντέρων	33	1	—	—
Γαστραλγία	21	1	—	—
Διάρροια	1 1/2—70	8	6	—
Καρκῖνος στομάχου	65	1	—	1
Ταϊνία	42	1	—	—
Ἰκτερός νεογνοῦ	4 ἡμερῶν	—	1	1
Κίρρωσις ἥπατος	65 ἐτῶν	1	—	1
Βρογχίτις	1—65	22	9	—
» τριχοειδής	17 ἡμ.—2 ἐτ.	2	1	2
Πνευμονία	4—55	6	6	4
Τυροειδὴς βρογχοπνευμονία	35—58	1	1	2
Βρογχοπνευμονία	34	1	—	—
Βρογχορραγία	17—19	1	1	—
Λαρυγγίτις ὁμενογόνος	2	1	—	1
» καταρρώδης	48	—	1	—
Φυματίωσις	17—19	1	1	2
Βρογχίτις χρόνια	48	1	—	—
Τυφοειδὴς πυρετός	6—38	4	4	—
Γαστρικός »	2—53	20	7	—
Ῥευματικός »	2—68	24	9	—
Διαλείποντες	1—86	21	12	—
Ἐλώδης κηχεξία	15—37	2	1	—
Κακοήθης κωμωτώδης πυρετός	1 1/2	1	—	1
» σπασμωδικός »	2 1/2	—	1	—
Ἀνεπάρκεια μιτραειδοῦς	48	1	—	1
Ὁσφυαλγία	10—37	2	—	—
Ψαμμίασις	35	—	1	—

Νόσοι	Ἡλικία	Ἀρρεν	Θῆλυ	Θάνατος
Ἰσχυρία	65	1	—	—
Βοτρυοειδῆς μύλη	38	—	1	—
Ἐπιλόχειος πυρετός	24—37	—	3	1
Ξηρὸς τοκετός	22	—	1	—
Ἐπίσχεσις υστερίου	22	—	1	—
Μητρορραγία	33	—	1	—
Ἐνδομητρίτις χρονία	26—29	—	2	—
Χοιράδωσις	10—20	—	2	—
Σύφιλις	19—23	2	—	—
Κάταγμα δεξιᾶς κνήμης	9	1	—	—
Τραῦμα ριζομηρίου	38	1	—	—
Τραῦμα καρποῦ	24	1	—	—
Περιοστίτις κνημιαία	25	1	—	—
Φλεγμονὴ γόνατος	86	1	—	—
Φλέγμων δεξιᾶς παρειᾶς	22	—	1	—
Ρευματισμός	10	—	1	—
Ἀρθρίτις	18—40	—	2	—

Ἐκ τῶν ἄνω οὖν συνάγομεν ὅτι ἐκ τῶν 210 ἀσθενῶν, οὓς ἠδυνήθησαν καὶ παρατηρήσω κατὰ τὸ ἐννεάμηνον τοῦ παρελθόντος ἔτους διάστημα, οἱ πλεῖστοι ἔφερον ἐκ τῶν εἰρημένων νόσων τὰς ἐξῆς κατὰ συχνότητα καὶ ὑπεροχήν, ἧτοι πρωτεύουσι μὲν τὰ ἐλαιογενῆ νοσήματα (105) μετὰ πασῶν σχεδὸν τῶν ἐκφύσεων καὶ τῶν πλείστων κατηγοριῶν αὐτῶν, ἔπονται δὲ τούτοις τὰ τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (56), τούτοις δὲ τὰ τοῦ πεπτικοῦ (44), τούτοις τὰ τοῦ ἐγκεφαλονωτιαίου (11), τούτοις τὰ δυσκρασιὰ (10), τούτοις τὰ τῆς μήτρας (9), τούτοις τὰ τοῦ δέρματος (8), τούτοις δὲ τὰ τῶν ὀφθαλμῶν (5), τούτοις τὰ τῶν οὐροποιητικῶν ὀργάνων (4), τὰ τῆς ρινὸς (3), τὰ τοῦ ἥπατος (2), τὰ τραύματα, αἱ δυσκρασίαι καὶ οὕτω καθεξῆς.

Θάνατοι δὲ ἐπὶ τῶν 210 περίπου νόσων συνέβησαν ἐν ἔλῳ 19, οἵτινες, ὡς ἐν τῷ ἄνω ὑπ' ἀριθμ. 3 πίνακι δέδεικται, ὑπάρχονται· 1 μὲν εἰς αἱματηρὰν ἀποπληξίν συμβῆσκον εἰς 85ετῇ τοῦ ἀγῶνος ἀπόστρατον συνταγματάρχην, ὃν ἔτυχεν νὰ ἴδω κατὰ τὴν δευτέραν προσβολὴν τρεῖς μῆνας μετὰ τὴν πρώτην ἐπελθούσων. — 1 δὲ εἰς ἔγκαυμα τριτοβάθμιον, καταλαμβάνον τὴν κοιλίαν πᾶσαν, τὰ ἄνω καὶ κάτω ἄκρα τριετοῦς παιδός, θανόντος τὴν δευτέραν ἡμέραν τῆς νόσου ἐξ ἀποψύξεως. — 1 εἰς καρκίνον τοῦ στομάχου παρ' 65ετῆς ἀνδρὸς, ὅστις πλὴν τῆς καταχρήσεως τῶν οἶνοπνευματωδῶν δὲν παρουσίαν οὐδεμίαν κληρονομικὴν διέθεσιν, ὡς ἐκάστοτε ἐπυνθανόμεν, καὶ ὃν ἐξελαμβάνομεν μετὰ πολλῶν ἐνταφ-

θῶν τε καὶ ἀλλαχού συναδέλφων τὸ κατ' ἀρχὰς ὡς χρόνιον γαστρικὸν κατάρρεον, πάντων τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ καρκίνου συμπτωμάτων ἐλλειπόντων, εἴτα πρῶτον ἡμεῖς, οὐ μόνον ὑποπευθόμενοι, ἀλλὰ καὶ ἐπεμείναμεν εἰς τὴν τοῦ καρκίνου διέγνωσιν, ἐρειδόμενοι ἐπὶ σκληρότητός τινος ἢ τραχύτητος τῇ ἐπὶ τοῦ πυλωροῦ πίεσει, ἢ δ' ἐπιμονὴ ἡμῶν ἔπεισε βραδύτερον καὶ ἑτέρους συναδέλφους, μείζονός τε τῆς σκληρότητος γενομένης καὶ τῶν καφεσιδῶν καὶ αἱματηρῶν ἐμεσμάτων ἐπιφανέντων. — 1 εἰς ἔκταρον νεογνοῦ 9 ἡλέος, 4 ἡμερῶν, ὅπερ, ἐκ μητρὸς καθ' ἅπασαν τὴν κύησιν ὑπὸ ἀμφιμερινῶν καὶ τριταίων προσβολομένης, παρείχετο τὸν μὲν σπλῆνα ἐξόχως, τὸ δ' ἦπαρ ἱκανῶς ἐξωγλωμένον. — 1 ἐκ κηρώσεως τοῦ ἥπατος, συμβητόμενος, ὅσον οὐπω, καὶ οὐτινος τὴν ἱστορίαν θέλομεν, εἰ Θεὸς θέλει, ἀνακοινῶται ἐν τῷ Γαλήνῳ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, παρ' ἀνδρὶ 68ετῆ. — 2 δὲ εἰς τριχοειδῆ βρογχίτιδα, μίαν μὲν παρὰ παιδί 17 ἡμερῶν ἀτροφικῶ, καχεκτικῶ καὶ ἐλωδῶς μεμιασμένῳ διὰ τοὺς χρόνιους τῆς μητρὸς αὐτοῦ κατὰ τὴν κύησιν ἅπασαν μέχρι τοκετοῦ καὶ πρὶν τὴν δ' ἑτέραν παρὰ διετετὶ παιδί μετὰ διπλῆς ὑμενογόνου πνευμονίας. — 4 δὲ εἰς πνευμονιῶντας, οἵτινες οὐχὶ τόσο ν διὰ τὴν πνευμονίαν, νίκας. — 4 δὲ εἰς πνευμονιῶντας, οἵτινες οὐχὶ τόσο ν διὰ τὴν πνευμονίαν, ὅσον διὰ τὴν συμπύρεδρον αὐτῇ τριχοειδῇ βρογχίτιδι, ὣν μία εἴρηται (ἡῦτω δὲ ὑπολείπονται 3 διὰ πνευμονίαν θάνατοι), ἢ τὸ διπλοῦν τῆς πνευμονίας. — 1 δὲ παρὰ παιδί διετετὶ δι' ὑμενογόνον λαρυγγίτιδα, ὑπὸ συναδέλφου νεκροπευομένην, παρ' ἐμοῦ δ' ἐν συμβουλίῳ παρατηρηθεῖσαν. — 2 δὲ εἰς τυροειδῆ βρογχοπνευμονίαν, τὴν μὲν παρ' ἀνδρὶ 35ετῆ καχεκτικῇ καὶ ἐλωδῶς λίαν μεμιασμένῳ, τὴν δὲ παρὰ γυναίκα 58ετῆ ἀτροφικῶς χοιραδικῇ καὶ ἐλωδῶς μεμιασμένῳ. — 2 εἰς πυρετικῶν, τὴν μὲν παρὰ θυγατρὶ 17ετῆ ταχέως (2—3 μῆνας) ἐκφυγεῖσαν καὶ κακῶς λήξασαν (καγχορειδῆς φυματίωσις), διότι, περὶεργον, αὕτη κληρονομικὸν μὲν οὐδὲν εἶχεν, ὑπερῆται δὲ ἐν τῇ οἰκίᾳ τῆς 58οῦς γυναικὸς τῆς ὑπὸ τῆς τυροειδοῦς βρογχοπνευμονίας προσβληθείσης καὶ θανούσης, ἀλλ' ἦτις ἔχει υἱοῦ, καὶ θυγατέρας, πατέρας καὶ μητέρας ἡδὴ, χοιραδικοῦ μὲν πάντας, ἀλλ' οὐδὲν εἰσέτι ἐλσημάναντας, ἴδωμεν ὅμως καὶ σκοποῦμεν ἐπιμόνω ἰδαίν τὴν δὲ παρ' 19ετῇ νεανίᾳ ἀφροδιτιστικῇ ἀναισθητικῶς καὶ καπνίζοντι, ὅπερ καὶ ὑπὸ κραταιοτάτης κατελείφθη τὸ πρῶτον βρογχορραγίας, ἐξ ἧς ὅλη μεγίστη λεκάνη ἐπληρώθη. — 1 δὲ παρὰ παιδί 1|12 ἔτους διὰ κακοήθου κομωκτώδη πυρετόν, καθ' ὃν κύριον μὲν ἦν τὸ κῶμα, ἡ πικνυλῆς ἀναισθησία, καὶ ἡ τελεία ἑλλειψις ἀντανεκλαστικῶν φαινομένων, οὐδαμοῦ δ' οὐδ' ἐπὶ ὑπονοίᾳ ἐπεφάνησαν σπασμοὶ ἢ ὀπισθότονος, καὶ καθ' οὗ οὐδὲως ἤνυσεν ἡ τε κίνησις πολλὴ καὶ πολλὰχῶς δοθεῖσα, καὶ τὰ ἐρεθιστικά ἐπὶ τοῦ δέρματος καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ἀχένου καὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης ἐπὶ τοῦ δέρματος καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ἀχένου καὶ τῆς σπονδυλικῆς στήλης ἐπισπαστικά, ἀλλ' ἀνάρπαστον ἐγένετο. — 1 δὲ ἐξ ἀνεπαρκείας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδος τῆς καρδίας παρ' ἀνδρὶ 48ετῆ, ὅστις εἰ καὶ οὐδέποτε

ἔπαθεν ὁ δὲ τῶν ἄρθρων ρευματισμὸν, διήγεν ὁμοίως βίον ἐν τῷ μνησθέντι Ἀράπῃ, τόπῳ ἐλωθεστέατῳ, καὶ ἐποιεῖτο κατὰ χρῆσιν πότου καὶ φαγητοῦ, ἢ δὲ τῆς νόσου αὐτοῦ διέγνωσις μετὰ ἱκνῶς· μετὰ συναδέλφων λογοσκέψεις, τῶν μὲν, ἐπιφανέντος ἤδη τοῦ ὕδατος ἀκτίτου, ἐρμηνεύοντων εἰς τὴν ἰδέαν τῆς κυρώσεως τοῦ ἥπατος (ἐποιεῖτο δὲ καὶ κατὰ χρῆσιν, ὡς εἶπευ, τῆς ῥακῆς) διὰ τὴν ἀνωσίαν τοῦ ἥπατος ἐκ τοῦ ἀκτίτου καὶ τὸ δεύτερον στάδιον τῆς μοσχοκαρυσειδοῦς αὐτοῦ μορφῆς καὶ ἀλλοιωσεως, τῶν δὲ εἰς χρονίαν Ἡρίχθειν νόσον διὰ τὴν συμπάρεδρον παρουσίαν τοῦ ἐν τοῖς οὖροις λευκώματος, ἐδίησε νὰ στερεωθῇ τὸ μὲν τῇ ἐπιμόνῳ ἡμῶν ἰδέᾳ, τὸ δὲ τῇ συγκυριανεύσει καὶ τῶν σεβαστῶν καθηγητῶν κ. κ. Πρετεντέρη, Ὁρμανίδου, καὶ Μακκᾶ, συσκευθέντων ἐπὶ τῇ βᾶσει λεπτομερεστέρως περὶ τοῦ ἀθηνοῦς ἐκθέσεως. — 1 δὲ εἰς ἐπιλόχειον πυρετὸν ἐκφάνεντα τὴν ἡμέραν ἀπὸ τοῦ τοκετοῦ παρὰ 37^{τετ} γυναικί, θεραπευομένην παρ' ἄλλου μὲν συναδέλφου, παρ' ἡμῶν δ' ἐν συμβουλίῳ μόνον.

Ὡςτε ἐκ τῶν 18 θανάτων, τινὲς μὲν ἀνῆκον εἰς ὅπως ἀνιάτους νόσους, τινὲς δὲ ἰατῆς, ἔχομεν δ' αὖτις θνησιμότητα 9|12 τῆς 0|0 περίπου. (ἀκολουθεῖ)

ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΟΒΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΑΧΙΤΙΣΜΟΥ.

KATA J. COMBY.

(Συνέχ. καὶ τέλος "Ορ. Σελ. 91).

Συμπεράσματα.

Αἰτιολογία. — 1. — Ἡ κακὴ τῶν νεογνῶν διατροφή εἶναι ἡ κυριώτερά τοῦ ραχιτισμοῦ αἰτία.

2. — Κακὴ δὲ τροφή εἶναι πᾶσα ἄλλη πλὴν τοῦ γυναικείου γάλακτος, διδομένη εἰς τὸ βρέφος πρὸ τῆς συμπληρώσεως τοῦ πρώτου ἔτους τῆς ἡλικίας αὐτοῦ.

3. — Ἐπίσης κακὴ τροφή θεωρεῖται καὶ ἡ διατροφή τοῦ βρέφους διὰ γυναικείου γάλακτος ἀκανονίστως προσφερομένου, ἢ τῆς τροφῆς μὴ αὐτῆς ἀγαθῆς.

4. — Τὸ ἀσφαλέστερον πρὸς ἀνάπτυξιν τοῦ ραχιτισμοῦ μέσον εἶναι ἡ πρόωρος τοῦ βρέφους διατροφή διὰ ζυμῶν, ῥοφημάτων καὶ λοιπῶν τροφῶν πλὴν τοῦ γάλακτος.

5. — Ἡ διὰ τοῦ θηλάστρου διὰ μακροῦ σωλῆνος τεχνητὴ τοῦ βρέφους

διατροφή εἶναι συχνὴ τοῦ ραχιτισμοῦ αἰτία, ἥττον κινδυνώδη εἶναι τὸ θήλαστρον χωρὶς σωλῆνος, δ' κυκλίτικος, τὸ κοχλερίον.

6. — Ἡ μικτὴ γαλακτοτροφία, ἥττον τῆς τεχνητῆς κινδυνώδης, προκαλεῖ οὐχ' ἦτον καὶ αὐτὴ ἐνίοτε τὸν ραχιτισμόν.

7. — Καὶ ὁ πρόωρος, τέλος ἀπογαλακτισμὸς εἶναι ἰσχυρὰ τοῦ ραχιτισμοῦ αἰτία.

Προφύλαξις. — 1. — Ἡ φυσικὴ, ἢ ἡ διὰ τοῦ γυναικείου γάλακτος γαλακτοτροφία, εἶναι τὸ ἀσφαλέστερον προφυλακτικὸν κατὰ τοῦ ραχιτισμοῦ μέσον.

2. — Ὅπως ὁμοίως καὶ ὁ τρόπος οὗτος τῆς διατροφῆς εὐδοκιμήσῃ ἔστω κανονικὸς (6—7 θηλάσμοι δι' ἡμέρας).

3. — Ἀνυποφύκτου οὕτης τῆς μικτῆς γαλακτοτροφίας δεόν νὰ ἀποφεύγηται ἡ χρῆσις τοῦ θηλάστρου καὶ νὰ γίνηται χρῆσις κυκλίτικου ἢ κοχλερίου.

4. — Τῆς τεχνητῆς γαλακτοτροφίας ἐπιβαλλομένης δεόν νὰ προσφέρηται γάλα καλῆς ποιότητος, καθαρὸν μετ' ὀλίγου ὕδατος, χλιαρὸν ἄλλ' οὐχὶ ζέσαν καὶ χωρὶς θηλάστρου.

5. — Βεβαίως ἢ ἐπτάκις δι' ἡμέρας τὸ βρέφος δεόν νὰ λαμβάνῃ, ἀναλόγως τῆς ἡλικίας καὶ τῆς ἀναπτύξεως αὐτοῦ, ὅσον 100—150 γραμμῶν γάλακτος.

6. — Ἐπ' οὐδεμίᾳ προφάσει ἐπιτρέπεται πρὸ τῆς συμπληρώσεως τοῦ πρώτου ἔτους ἑτέρα τροφή πλὴν τοῦ γάλακτος.

7. — Ὁ ἀπογαλακτισμὸς γενέσθω μετὰ τὸ πρῶτον ἔτος, ἢ δὲ μετὰ τοῦτο διατροφή ἔστω μετὰ πολλῶν προφυλάξεων. Γ.

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΟΥΧΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΕἰΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥ- ΤΙΚΗΝ ΕἰΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ὑπὸ Δ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ (ἐν Βερολίνῳ).

1. — Ὑπεροσμικὸν ὀξύ. — Acidum hyperosmicum, s. Acid. perosmicum, s. Acid. osmicum, s. Acid. osminicum. Ueberosmiumsäure, s. Osmiumsäure. — Acide osmique. — Osmic acid, s. hyperosmic acid.

Τὸ ἔλας τοῦτο συντίθεται διὰ τῆς ἐνώσεως ἐνὸς ἀτόμου ὀσμίου μετὰ 4 ἀτ. ὀξυγόνου ἥτοι εἶνε τετροεῖδιον τοῦ ὀσμίου Os O_4 .

Παρασκευὴ. — Ἀπολαμβάνεται δὲ ἐκ τοῦ καθαρῷ μεταλλικοῦ ὀσμίου

ἐν λίαν ὑψηλῇ θερμοκρασίᾳ, τῇ διοχετεύσει πυκνοῦ ρεύματος ἀέρος, μέχρι λευκοῦ διαπυρρμένου· τὸ δ' οὕτως ἐν ἀερώδει καταστάσει ἀναπτυσσόμενον ὑπεροσμικὸν δέξιν διοχετεύεται ἐντὸς καταψυγμένων δοχείων.

Ἰδιότητες.—Συνίσταται ἐκ στιλβουσῶν, διαφανῶν, ὑποκιτρινωπῶν βελονῶν, ἰσχυρῶς τὴν ὀσμὴν κεντητικῶν, τὴν τοῦ χλωρίου καὶ ἰώδους ὑπομιμησκουσῶν· εἰσι δὲ λίαν πτητικαί. Οἱ ἀτμοὶ αὐτοῦ ἐρεθίζουν καὶ ὑπερβολὴν τὰς βλεννομεμβράνας, καὶ δύνανται κατὰ τὸν Deville καὶ τύφλωσιν καὶ ἐπιφέρωσι· διαλύεται εὐκόλως ἐν ὕδατι· ἄνευ μὲν οὐδενὸς τούτου χρωματισμοῦ, ἀλλ' ἡ διήλυσίς ὑπὸ τὴν ἐπίρροπὴν τοῦ φωτός καὶ ὀργανικῶν οὐσιῶν καθίσταται μελανόφαιος, μεταλλικοῦ ὀσμίου χρώμα καὶ ζέοντος. Ἐν δ' οἰνοπνευματώδει διαλύσει καθιζάνει ἐντὸς 24 ὥρων ἅπαν τὸ ὄσμιν ὡς τεθρυδρῶξιδιον· αἱ ὑδατώδεις αὐτοῦ διαλύσεις δέον καὶ προφυλάσσονται ἐκ τοῦ φωτός ἐντὸς ὑελίνων φιαλῶν μεθ' ὑελίνου πύματος, αἱ ἐν ψυχρῷ τόπῳ τηρουμένων. Ἐν τῇ ἐμπορίᾳ μεταφέρεται εἰς ποσὸν 0,5 καὶ 1,0 γραμμ. ἐντὸς ἐρμητικῶς ἐπιπωματισμένων καὶ ἐσφραγισμένων ὑελίνων σωληνίσκων.

Ἐνέργεια καὶ χρῆσις. Ὁ Delbaille συνίστησιν ἐνέσεις εἰς παρεγχυματώδεις ὄγκους, ὡς σαρκώματα καὶ λυμφώματα· ὁ δὲ Szimann καὶ Eulenburg παρετήρησαν δι' αὐτῶν (τῶν ἐνέσεων) ἀπαύξησιν καὶ τοῦ ὄγκου τῶν βρογχικῶν. Ὑποδορεῖς ἐνέσεις ἐπαινεῖ ὁ Neuber εἰς τὰς κατὰ τὴν περιφέρειαν νευραλγίας· ἐκ 12 δὲ τοιούτων περιπτώσεων τρεῖς μὲν ἰάθησαν ἐντελῶς, 4 δὲ ἐθελωτίωθησαν ἐπαισθητῶς, τῶν λοιπῶν 5 ἄνευ προφανοῦς ὠφελείας διαμεινασῶν (Eulenburg)· ὁ δὲ Mohr παρετήρησε καὶ εἰς ρευματικὰς ἰσχιαλγίας εὐχέριστα ἀποτελέσματα. Αἱ ἐνέσεις εἰσὶν εὐπρόσδεκτοι τοῖς ἀρρώστοις, καθὼς ὀλίγον ὀδυνηρά· σμικρὰν δ' ἄλλως ἐξόγκωσιν, καὶ ταχέως ἐξαλειφόμενῃ ἐρυθρότητι συνεπάγονται. Εἰς μίαν ὁμῶς περίπτωσιν παρετήρησεν ὁ Redtenbacher φλεγμονώδη τοῦ δέρματος κατὰ τῆσιν, βράδιον δὲ διφθερίδην (οὐχὶ διφθεριτιδοειδῆ) αὐτοῦ ἐπιπύκνωσιν. Ἐσωτερικῶς δὲ ἐχρήτατο τῷ ἄλλω τούτῳ ὁ Wildermuth ἐν τῇ ἐπιληψίᾳ.

Δόσις.—Εἰς ἐνέσεις παρέχεται ἡ ὑδατώδης αὐτοῦ διάλυσις εἰς ὅσον 1:0|0 οὕτως·

Rp. Acid. hyperosmic. 0,1.

Ap. destill. 10,0.

Solv. Det. ad vitr. fusc. epistomat. vitr. bene clausum.

Sig. Τὸ πρὸς ἐνέσιν ποσὸν συνίσταται ἐν ἀρχῇ ἐκ τοῦ 1|5 τοῦ ὅλου ἐν τῇ σύριγγι ἐμπεριεχομένου, εἰς δ' αὖξεται βαθμυθὴν μέχρι τοῦ ὅλου ἐν αὐτῇ διὰ μίαν ἐνέσιν. Ἐν δὲ τῇ διανομῇ τοῦ ὀξέος ἀνάγκη μεγίστης προσοχῆς εἰς προφύλαξιν τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἀποφυγὴν τῆς εἰσνεύσεως τῶν ἄτμων αὐτοῦ.

Ἐσωτερικῶς δὲ δίδεται εἰς ὅσον 0,001 πολλάκις τῆς ἡμέρας ἐν εἰδεί καταποτίων μάλλον μετὰ τοῦ λευκοῦ βώλου (Bulus alb.), καθόσον αἱ διαλύσεις εἰσὶν ἥσσον εὐπρόσδεκτοι. Ὁ Wildermuth συνίστησιν ὡσαύτως ἀντ' αὐτοῦ τὸ ὀσμικὸν κέλιον εἰς δόσιν 0,001 πολλάκις τῆς ἡμέρας μέχρι 0,015 εἰς καταπότια μετὰ λευκοῦ βώλου.

2. — Ἀγαρικίνη. — Agaricinum. — Agaricine. Agaricin.

Τὸ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Ἀγαρικίνη ἐν τῇ ἐμπορίᾳ εὐρισκόμενον, καὶ ὡς παρεσκευασμένον ἐνεργὸν τοῦ μύκητος τῆς ἀγρίας πίτυος (Fungus Laricis) στοιχεῖον σημειούμενον, εἶνε λευκὴ, κρυσταλλώδης κόκκις, καὶ πιθανῶς (καίπερ συχνὰ μάλλον ἢ ἥσσον ἀκαθάρτη) ταύτην τῇ ἀγαρικινικῇ ὀξεί (Fleury), καθόσον λαρικίνη (Laricin) κατὰ τὸν Martius, ἀγαρικίνη (Agaricin) κατὰ τὸν Schoonbrodt εἰσι μάλλον ἥττον ἀκαθάρτον ἀγαρικινικὸν δέξιν (Jahns). Ὡς πάντῃ δὲ καθαρὴν ἀγαρικίνην (Agaricinum purissimum) φέρει ὁ Merck εἰς τὸ ἐμπόριον παρασκευασμένην, ὅπερ λίαν πιθανῶς εἶνε καθαρὸν καὶ πάσης καθαρτικῆς ῥητίνης ἀπηλλαγμένον.

Συντίθεται δ' ἡ ἀγαρικίνη, ὡς εἴρηται, ἐξ ἀγαρικινικοῦ δξέος, καὶ παρίσταται χημικῶς οὕτως Ἀγαρικίνιον = $C_{16}H_{30}O + H_2O$. (Jahns).

Ἐνέργεια καὶ χρῆσις.—Ἐν Ἀγγλίᾳ ὁ Young ἐπῆνεσε τὴν ἀγαρικίνην ὡς φάρμακον κατὰ τῶν ἀφθόνων ἰδρώτων, καὶ δὴ τῶν νυκτερινῶν παρὰ τοῖς φθισικοῖς, ἀλλ' ἄλλοι θεωροῦσιν αὐτὸ ὡς οὐχὶ ἀπολύτως βέλτιον μέσον πρὸς περιορισμὸν τῶν ἀφθόνων ἰδρώτων ἐν γένει. Ἡ δὲ πλήρης αὐτοῦ ἐνέργεια παρουσιάζεται κατὰ τὸν Seifert εἰς διάστημα 5—6 ὥρ. Ἀλλως δὲ παρὰ τοῖς φθισικοῖς προκαλεῖ ὕπνον, μετρίζει τοὺς τῆς βηχῆς παροξυσμούς, εἰτα δὲ τὴν θερμοκρασίαν καὶ τὴν τοῦ σφυγμοῦ συχνότητα, ἕτινα ὁ Seifert ὁμῶς ἐν μέρει μόνον ἐπιβεβαιοῖ.

Δόσις.—Ἐξωτερικῶς μὲν παρέχεται εἰς ὑποδορεῖς ἐνέσεις, αἵτινες ὁμῶς κατὰ τὸν Seifert, καθὼς ὀδυνηραί, εἰσὶν οὐχὶ πολλῆς συστάσεως ἀξιῶναι. Ἐσωτερικῶς δὲ δίδεται ἀπὸ 0,005—0,01 εἰς καταπότια μετὰ κόπης τοῦ Dower. Ὁ Seifert συνίστησι τὴν παροχὴν αὐτοῦ ὀλίγας ὥρας πρὸ τοῦ συνήθους χρόνου τῆς τῶν ἰδρώτων ἐκρήξεως.

Ἀναγράφεται δὲ οὕτως.

Rp.	Agaricin.	0,05.
	Spiritus	4,5.
	Glycerini	5,5.

M. D. S. Πρὸς ὑπόδειον ἐνεσιν· ἐνίσταται δὲ πᾶν τὸ ἐν τῇ σύριγγι περιεχόμενον (Seifert).

'Εσωτερικῶς'
 Rp. Agaricini 0,5.
 Pulv. Dower 7,5.
 » rad. Alth.
 Macilag. gum. arab. aa 4,0.
 F. l. a. Pilulae N^o 100. Consperg. Licopod.
 D. S. Τὸ ἐσπέραι; λυμβάνει ὁ πάσχων 1—2 κατὰ πότιν.

3. — 'Αλοῖνη. — Aloinum. — Aloin. Aloine. Aloin.

Παρασκευή. — Ὡς γνωστὸν πρὸ πολλῶν ἤδη ἐτῶν κυκλοφορεῖ εἰς τὸ ἐμπόριον εἰδὸς τι ἄλλοης, λίαν καθαρῆς, ἐντελῶς κιτρίνης καὶ ὑπολαμπούσης, ἣτις κατ' οὐδὲν διαφέρει τῆς ἐκ τῆς νήσου, Socotora, προσηγομένης (Aloe socotrina) καλοῦσι δ' αὐτὴν συνήθως, 'Αλόνη σιλιπνήνη ἢ 'Αλόνη τοῦ Cap ἢ τῶν Barbades. Ταύτης δὲ τῆς Βαρβαδαλόης, ὅσον 25,0 διαλύονται εἰς 250 cc. (κυβ. ὑφεκατοστμ.) ζέοντος καὶ δι' ἄλικοῦ ὀξέος ὠξυνισμένου ὕδατος· μετὰ δὲ τὴν ἀπόψυξιν μεταγγίζεται τὸ ἐκ βητινωδῶν μαζῶν ἀπαλλοτριῶν καὶ ἐπιπολάζον καθαρὸν ὑγρὸν, καὶ ἐξατμισθὲν μεχρὸς μείνῃσι 50 cc. (κυβ. ὑφεκατ.) ἀφίσταται ἥρεμον πρὸς κρυσταλλοποίησιν· μετὰ 2 ἐβδομάδας ἐκθλίβονται τὰ κρύσταλλα ἐν τῇ πρὸς διήθησιν χάρτι, καὶ εἶτα δι' ἀνέκρυσταλλώσεως καθαρίζονται, μετ' ἡρακιωμένου οἰνοπνεύματος ἢ μετ' ὀξικού ὀξέος ἐκπλυνόμενα. Συντίθεται δὲ ἡ Βαρβαδαλόνη αὕτη ἐκ C₃₄ H₃₆ O₁₄ + H₂O. Αἱ δὲ ἀπολαυβανόμεναι ἐκ τῆς Socotra=aloe καὶ Natal=aloe Σοκαλοῖνη καὶ Ναταλοῖνη (Socaloinum καὶ Nataloinum) ἔχουσιν οὐχὶ τὴν αὐτὴν τῆς βαρβαδαλόης σύνθεσιν.

Ἐνέργεια καὶ χρῆσις. — Ἐσωτερικῶς παρεχομένη ἡ ἀλοῖνη ἐνεργεῖ καθαρτικῶς ὡς καὶ ἡ ἄλλοη ἀλλὰ βεβαιότερον καὶ δραστηριώτερον τῆς σοκαλοῖνης καὶ ναταλοῖνης, ἄλλως τε καὶ δι' ὑποδορείων ἐνέσεων ἐνεργεῖ αὕτη καθαρτικῶς (Froumüller, Hiller). Εἴς δ' ἐν χρήσει ἐν Ἀγγλίᾳ ὡς ὑπακτικὸν καθάρσιον πρὸ πάντων κατὰ τῆς συνήθους δυσκοιλιότητος.

Δόσις. — Ἐσωτερικῶς δίδεται 0,12—0,25 εἰς κατὰ πότιν, ἐξωτερικῶς δὲ πρὸς ὑποδορείου; ἐνέσεις τὸ αὐτὸ ποσὸν ἐν ὕδατῶδι διαλύσει.
 (ἀκολουθεῖ)

Θειούχον ἀσθεστίον εἰς θεραπείαν τῆς εὐλογίας. — Ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ὃ ἐν ταῖς Ἰνδίαις χειρουργὸς τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ J. Peters χρῆσιν ἐπιτυχῆ ἐποιήσατο εἰς τινὰς μόνον εὐλογιῶντας ἐξωτερικῶς τοῦ θειούχου ἀσθεστίου.

Κατὰ τὸ λήξαν ἔτος ὃ ἐν Καναδᾷ ἱατρὸς Mac-Arthur ἐφήρμοσε τὴν θεραπευτικὴν ταύτην ἀγωγὴν κατὰ τῆς συμπεπικνωμένης εὐλογίας εἰς τὰσχόντα, ὅστις ἔφερεν ἄπειρον φλυκταινῶν πληθὸς εἰς τὸν ἐπιπεφυκότα, τοῦ βλενοῦμένου τοῦ στόματος καὶ τῆς γλώττης, τὸ πρόσωπον, τὴν δὲ πισθίαν τοῦ σώματος ἐπιφάνειαν, τοὺς βραχίονας, τὰς κνήμας, ἀμα δὲ παρέκρουε καὶ διετέλει ὑπὸ τὸ κράτος μεγάλῃ τῶν δυνάμεων ἐκλύσεως καὶ κακῆς προγνώσεως.

Ἡ διάλυσις τοῦ θειούχου ἀσθεστίου γίνεται ὡς ἐξῆς 110 γράμματα τιτάνου, 220 γράμματα θείου ἐν 2840 γράμμασιν ὕδατος ζέουσιν ἕως ἀν ἀπομείνῃσι 1700 γράμματα, τὸ ὑγρὸν μετὰ ἀπόψυξιν διηθεῖται καὶ φυλάσσεται ἐντὸς ὑελίνων δοχείων.

Ὁ Mac-Arthur διὰ τῆς διαλύσεως ταύτης ἐπὶ ἡμέρας δις δι' ἡμέρας τὸ πρόσωπον, τὴν ῥάχιν, τοὺς βραχίονας καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ σώματος τοῦ πάσχοντος αὐτοῦ μέρη πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὴν χρῆσιν τοῦ θεραπευτικοῦ τούτου μέσου, τὴν δωδεκάτην μετὰ τὴν εἰσβολὴν τῆς νόσου ἡμέραν, ὁ πάσχων διετέλει εἰς κρείττονα κατὰστασιν, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀνεκτέτατο ἀνθρωπίνῃ ὀψιν, αἱ δὲ φλύκταιναι ἔβαινον πρὸς ἀποξήρανσιν, ἐπιγενῆς πυρετὸς δὲν ἐπῆλθε, πέντε δὲ ἡμέρας μετὰ τὴν πρώτην ἐπέλειψιν, αἱ φλύκταιναι ἦτο κεναὶ χωρὶς νὰ ἐξέλθῃ ἐξ αὐτῶν πύον. Κνισμὸς ἀφ' ἑτέρου δὲν ἐπῆλθε καὶ ἡ ἀνάρρωσις ἦτο ταχέει.

Ἰωδιοφόρμιον ὑποδερμικῶς εἰς θεραπείαν τῆς σφυλίδος. — Τὰ ἀπὸ τῆς χρήσεως τοῦ ὑδραργύρου καὶ τῶν σκευασμάτων αὐτοῦ, καίτοι ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν θεωρουμένου ὡς εἰδικοῦ κατὰ τῆς σφυλίδος, κακὰ ὄνησαν τοὺς ἱατροὺς εἰς ἀναζήτησιν ἑτέρου φαρμάκου εἰς ἀντικατάστασιν αὐτοῦ.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν τοιούτων δοκιμασθέντων συνίσταται ἐσχάτως ὡς τὸ καταλληλότερον τὸ ἰωδιοφόρμιον, ὅπερ ἐδοκιμάσθη ὑποδερμικῶς ὑπὸ τοῦ ἐν Erlangen Picket ἐπὶ δώδεκα περιπτώσεων, εἰς δόσιν 4 σιταρίων δι' ἡμέρας ἐν αἰθέρι διαλελυμένον. Συμπεραίνει δὲ ὁ Picket τὰδε ἐκ τῶν πειραμάτων αὐτοῦ.

Αἱ διὰ τοῦ ἰωδιοφορμίου ὑποδόραιοι ἐνέσεις ἐλαττοῦσι μὲν τὰ πρωτοπαθῆ τῆς σφυλίδος συμπτώματα, ἀλλ' εἶναι ὑπὸ τὴν ἐποψιν ταύτην ὑποδεέστερα τῶν σκευασμάτων τοῦ ὑδραργύρου.

Αἱ ὑποδόραιοι τοῦ ἰωδιοφορμίου ἐνέσεις ὠφελοῦσιν ὡς οὐδὲν ἄλλο φάρμακον κατὰ τὰς ὑποτροπιάσεις τοῦ κακοῦ.

Διὰ τοῦ ἰωδιοφορμίου ταχέως καταστέλλονται τὰ τριτογενῆ συμπτώματα.

Ἡ διάλυσις τοῦ ἰωδιοφορμίου σὺν τῇ ὑποδερμικῇ χρήτει εἶναι λίαν

ωφέλιμος και δίκην ψευδισμών κατά τῶν παθήσεων τοῦ στομάτου, τοῦ λάρυγγος και τοῦ φάρυγγος.

Καίτοι τὸ ἰωδιοφόριον τοπικῶς ἐπάγεται ἄλλος στιγμιαῖον λίαν σπασμωδῶς ὥμως προκαλεῖ ἀποστήματα. Γ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

SIROP D'HYPHOS-PHITES DE FELLOWS.

Παρασκευαζόμενον ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ ὑπὸ τοῦ χημικοῦ

JAMES FELLOWS.

Τὸ περὶ οὗ πρόκειται σκεύασμα ἐνέχει·

Τὰ κυριώτερα τοῦ ζωικοῦ ὀργανισμοῦ συστατικά, Κάλιον και Τίταινον. Ὁξειδωμένους ἐνώσεις, Σίδηρον και Μαγγανήσιον. Τονικά, Κινίνην και Στρυγνίνην. Καὶ τὸ ζωϊκὸν ὀσμωδωδὲς συστατικόν, τὸν Φώσφορον.

Διαφέρει πάντων τῶν ἄλλων ὁμοεργῶν σκευασμάτων διότι εἶναι εὐάρεστον τὴν γαστρίαν, ἐνεργεῖ ἐπὶ τοῦ στομάχου εὐνοϊκῶς, καὶ οὐδὲν ἐπιγίνεται κακὸν ἀπὸ τῆς παρατεταμένης αὐτοῦ χρήσεως.

Μεγάλαν ἐκτέτακτο ὑπόληψιν ἐν Ἀμερικῇ και Ἀγγλίᾳ διὰ τὸ νύσιμον τῆς χρήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν θεραπείαν τῆς φθίσεως, τῆς χρονίης βρογχίτιδος και ἐτέρων τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων παθήσεων. Οὐχ' ἤττον δὲ ὠφελεῖ καὶ κατὰ ποικίλων νευρικῶν νόσων, ὡς καὶ κατὰ τῆς ἀτονίας. — Αἱ θεραπευτικαὶ αὐτοῦ ἐνέργειαι ἀποδοτέαι εἰς τὰς τονωτικὰς και θρεπτικὰς αὐτοῦ ιδιότητάς δι' ὧν αἱ διάφοροι ὀργανικαὶ λειτουργίαι ἐπανερχονται εἰς τὸ κατὰ φύσιν. Οὕτω καθ' ἃς περιπτώσεις ἐνδείκνυνται ἡ τῆς ἐννεύρωσεως τόνωσις διὰ τονωτικῆς θεραπείας, τὸ σκεύασμα τοῦτο εἶναι τὰ μάλιστα ὠφέλιμον. Ἐνεργεῖ ταχέως, διεγείρει τὴν ὄρεξιν, βυθμίζει τὴν πέψιν, διευκολύνει τὴν ἀπορρόφωσιν και μετὰ τῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν μεταδίδει εἰς τὴν κυκλοφορίαν. Ἐπίσης ὠφελεῖ καὶ κατὰ τῶν φρενοπαθειῶν και ἐν γένει πάσης νευρικῆς παθήσεως.

Ἐκάστη φιάλη περιέχει 8 οὔγκιας, ἥτοι 50 περίπου δόσεις.

Εὐρίσκεται ἐν Ἀθήναις παρὰ τῷ κ. Κ. Ὀλυμπίῳ. Πᾶσα περὶ τούτου ἀγγελία ὠρίσται μόνον διὰ τὰ ἱατρικὰ περιοδικά.

ΔΙΔΑΥΣΙΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΣ.

FATA L. ROSSENTHAL.

Σκευαζομένη εἰς τὸ φαρμακεῖον τῆς Αὐλῆς ἐν Jena (Γερμανία)

ὑπὸ R. SLUTZ.

Βραβευθεῖσα ἐν Βρυξελλαῖς, ἐν Ἀλλῃ, ἐν Φρανκφούρτῃ και ἐν Βιέννῃ.

Ἡ διάλυσις αὕτη ἐνέχει ἅπαντα τοῦ νοποῦ κρέατος τὰ θρεπτικὰ συστατικά πλὴν τοῦ λίπους και τῶν νεύρων. Οὐδὲν διεγείρει πεπτομένη και ὑπὸ τῶν λίαν ἀσθενῶν στομάχων τῶν οὐδὲν ἕτερον στερεῶς ἢ ὑγρῶς τροφῆς εἶδος ἀνεχομένων, πρὸς δὲ κέκτεται γαστρίαν λίαν εὐάρεστον ὀπτοῦ κρέατος.

Περὶ τῆς διαλύσεως ταύτης πολὺς μετ' ἐπαίνων λόγος γίνεται ἐν τῇ συγγράμματι Sammlung, klinischer Vorträge ὑπὸ Richard Volkmann ἀρ. 62, καὶ ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ Wiel, ὡς καὶ ἐν τοῖς περιοδικαῖς Gesundheit ἀρ. 14. 1882. καὶ Wiener Medicinal Presse ἀρ. 9. 1883.

Γενικὴ ἀποθήκη ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς Eastern Agency, ἐν Ἀθήναις δὲ γίνονται δεκταὶ παραγγελίαι εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Γαλλοῦ και τὸ Φαρμακεῖον Α. Τσεράχη. Ὁδ. Σόλωνος.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ (OFFICINE)

ἡ Συλλογὴ τῶν κατὰ τὴν πρακτικὴν φαρμακοποιῶσαν.

Διαλαμβάνουσα

Περὶληψιν ἀπασῶν τῶν φαρμακοποιῶν, τῶν ἱατρικῶν και φαρμακευτικῶν συγκαταλογίων τῶν διαφόρων ἐπικρατειῶν. Τοξικολογίαν, ἢ τὸν τρόπον τοῦ ἀνιχνεύειν τὰ δηλητήρια. Φαρμακευτικὰς δοκιμασίας. Φαρμακοποιῶν κτηνιατρικῆς, οὐσιοπαθητικῆς. Θεραπευτικῶν ἐγκόλπιον, ἅπαντα τὰ νέα φάρμακα. Γενικὴν τῶν φαρμάκων διατίμησιν.

ὑπὸ DORVAULD.

Ἐκδοσις 10ῃ ἐντελὲς ἀνασκευασθεῖσα ἐκ 1000 σελ. κείμενον. Σχήματα ἐν τῷ κειμένῳ. Ξενη ὀνοματολογία.

Εὐρίσκεται ἐν Ἑλλάδι εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Γαλλοῦ.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ διὰ τὸν Γαλλὸν εἶναι δεκταὶ εἰς τὸ γραφεῖον αὐτοῦ ὁδ. Πανατοῦ 8, καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς Eastern Agency-Karakouy Deirinen Han.

Ἡ διεύθυνσις EASTERN AGENCY ἐπιφορτίζεται τὰς ἀγγελίας διὰ τὰς ἐν Ἑλλάδι και τὸ ἐξωτερικὸν ἐφημερίδας. Αἰδεῖ ἐμπορικὰς πληροφορίας περὶ Ἑλλάδος και τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐποδεικνύει ἐπὶ τῇ αἰτήσεϊ

εἰς τὰ ἐν Εὐρώπῃ καταστήματα τοὺς καλλιτέρους ἀντιπροσώπους διὰ τὴν κατανάλωσιν τῶν προϊόντων. Προμηθεύει τέλος ἐξ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς βιβλία, ἐργαλεῖα, καὶ παντὸς εἶδους ἀντικείμενα χρήσιμα εἴτε διὰ τὸ ἐπάγγελμα εἴτε διὰ τὴν ἰδίαν τῶν κκ. ἰατρῶν καὶ φαρμακοποιῶν χρῆσιν.

Νικολαΐδης. — Ἀντίδοτον κατὰ τῶν κακῶν τῆς νικοτιανῆς εἰς τοὺς καπνίζοντας ἀποτελεσμάτων. Εὐρίσκεται ἐν Ἀθήναις παρὰ τῇ Διευθύνσει τοῦ Γαληνοῦ.

BIBLIOGRAPHIQUE

Περικλέους Πατρικίου. — Τὰ πάθη τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ θεραπεία αὐτῶν. — Τόμος Α'. — Ἐν Ἀθήναις. 1885. Δρ. 12.
Τοῦ αὐτοῦ. — Περὶ τῶν τραυμάτων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν. — Μέρους Α' καὶ Β'. — Ἐν Ἀθήναις. — Δρ. ἐν ὄλῳ 15.

Φ. Νιμεβέρου. — Εἰδικὴ Νοσολογία καὶ Θεραπευτικὴ. Ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ καὶ διὰ σημειώσεων καὶ προσθηκῶν ἐπανηθηθεῖσα, ὑπὸ Γ. Καραμήτσα. — Τόμος Δεύτερος. — Ἐν Ἀθήναις 1885. — Δρ. 18.

Α. Δ. Γεωργαντῆ. — Στοιχεῖα Ἱατροδικαστικῆς. Τόμ. Α'. Ἀθῆναι 1885. Τιμὴ τοῦ ὅλου συγγράμματος Δρ. 32 πληρωτέαι ἐπὶ τῇ παραλαβῇ τοῦ Α'. τόμου. Εὐρίσκεται εἰς τὸ βιβλιοπωλεῖον κ. Μπέκ. — Ὁ Β'. τόμος ὑπὸ τὰ πιεστήρια.

Publications du Progrès médical. Paris. 14. Rue de Carmes.
DE L'APHASIE
et de ses diverses formes
par L. D^r BERNARD.

Un volume in 8^o de 271 pages, avec 32 figures. — Prix 4 fr.

BOURNEVILLE et BRICON. — Manuel de technique des autopsies.
— 1. Vol. in 320, de 240 pages, prix broché 2 fr. 50. cartonné 3 fr. — Librairie du Progrès Médical. Rue des Carmes, 4. Paris.